

# L I B E R

*z,e,m.* tres angulos habet notos, quare laterum proportiones notæ erunt;  
Sed erat *z,e.* nota respectu semidiametri epicycli, aut respectu linea*e,z,b.*  
quare *m,z.* respectu eodem nota erit, quare &c.

## PROPOSITIO XIX.

Ad semidiametrum eccentrici omnes lineas reliquas certis  
sub proportionibus referre.

Ponatur pro libito semidiameter eccentrici quotlibet partitum ut  $60^{\circ}$ ,  
more Ptolemaei. Cum autem proportio semidiametri epicycli ad lineam *n*,  
*z.* inuenta sit ex  $15$ . huius, & proportio *n,z.* ad *n,m.* semidiametrum ex pre-  
cedenti pateat, erit proportio semidiametri epicycli ad semidiametrum e-  
ccentrici in partibus quibuscumq; nota, quare etiam epicycli semidiametri,  
in partibus semidiametri eccentrici ad libitum positis nota erit proportio.  
Item ex  $17$ . & praecedente, proportio semidiametri epicycli ad lineam *b,h.*  
& ad semidiametrum parui circuli clivita est. Sed & *b,h.* ad *h,z.* nota con-  
cludebatur. Iam uero proportio semidiametri eccentrici ad semidiametrum  
epicycli nota est, quare exhibunt proportiones semidiametri eccentrici ad lis-  
neam *b,h.* & *m,z.* notæ, quod quidem intendebatur. Inuenit autem Ptole-  
maeus, ponendo semidiametrum eccentrici  $60^{\circ}$ . partium, semidiametrum e-  
picycli  $22$ . partium, &  $30$ . mi. & unamquamq; linearum *b,h,h,z.* & *m,z.*  
trium partium.

## PROPOSITIO XX.

Ea quæ de motibus Mercurij, & linearum proportionibus  
conclusa sunt, an experimentis concordēt uisualibus attentare.

Superius in quindecima huius reperimus per binas obseruationes  
longitudinum maiorum Mercurij, quod eo per medium cursum à longi-  
tudine eccentrici longiore distantiam  $4.$  signorum communium habente,  
aggregatum ex duabus longitudinibus magnis, matutina scilicet, & uesper-  
tina sit  $47.gra.45.mi.$  ferē. Si igitur per numerationem suppositis propor-  
tionibus linearum, & ceteris ante hac conclusis, idem concorditer inuenie-  
mus, fidem habebimus omnibus iam inuentis. Huius itaq; gratia sit li-  
nea *a,e.* transiens per longitudinem longiorem eccentrici, & propiorem, &  
sit à longitudine longior ex parte libræ, è uero propior ex parte arietis. In hac  
linea *d.* sit centrum mundi, *g.* uero centrum motus æqualis, & *h.* centrū par-  
ui circuli. Sitq; angulus *a,g,z.* quatuor signorum communium, scilicet  $120^{\circ}$ .  
graduum, ut quatuor recti sunt  $360^{\circ}$ . & super centro *z.* describo epicyclic cir-  
culum *t,k.* ductis duabus rectis eum contingentibus lineis *d,t.* & *d,k.* pun-  
cta uero contractuum centro epicycli copulabo per lineas *t,z.* & *k,z.* Cen-  
trum autem epicycli cum centro mundi continuabo per lineam *d,z.* faciam  
quocq; angulum *a,b,h.* æqualem angulo *a,g,z.* & lineam *b,h.* semidiametrū  
parui circuli æqualem *b,g.* continuando duo puncta *h,g.* per lineam *h,*  
*g.* Deinde à punto *d.* ad lineam *g,z.* demittam perpendicularē *d,l.* Quo-  
bus sic aptatis, inquiram angulum *t,d,k.* qui aggregat duas longitudines  
Mercurij magnas. In hoc situ epicycli, quia angulus *a,b,h.* æqualis est  
angulo *a,g,z.* & linea *b,h.* semidiameter parui circuli, erit propter moti-  
um similitudinem punctus *h.* centrum eccentrici. Angulus autem *h,b,g.* est  
tertia

