

C. 11. C. 2.

But - 129

no 7

R. 40

5/15

~~B. n. 58~~

Smir







L 19696255

i 19696371






REGLI
ALUMIN

DE C

trianguli g
 Sit prisma
 a b c d, e f g
 uisiones pl
 terum K l m
 planum sec
 triangulare
 triangulori
 uitatis cent
 lorum a d c
 iungantur
 no k l m n
 ctis s t. erit
 strauimus,
 tis centrum
 ipsius prisma
 ctum uero
 tis triangul
 tis a d c, e
 o q, p r, s t,
 trum graui
 a b c d, que
 p r cētrum
 sit autem x
 u x, quæ sec
 cabit enim
 plano: atq;
 Dico idem
 tius prisma
 tatis centri
 habebit, qu
 Archimedi
 gulum k n
 triangulum

VIT. SOLID. 13

is medium.
 sita plana sint quadrilatera
 c g, d h bifariam: & per di
 sectionem faciat quadrila
 c per lineas a c, a e ducatur
 m diuidet in duo prismata
 c e f g, a d c e h g. Sint autē



centrum quadrilateri K l m n.
 quoque grauitatis esse to
 quadrilateri k l m n graui
 y t eandem proportionem
 m ad triangulum k l m, ex 8
 is planorum. Vt autem triā
 c est ut triangulum a d c ad
 sunt, ita prisma a d c e h g.

s. huius.

D

12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

F E D E R I C I


C O M M A N D I N I

V R B I N A T I S

L I B E R D E C E N T R O

G R A V I T A T I S

S O L I D O R V M.




CVM PRIVILEGIO IN ANNOS X.

B O N O N I A E,

Ex Officina Alexandri Benacii.

M D L X V.



ALEXANDRO FARNESIO
CARDINALI AMPLISSIMO,
ET OPTIMO.



VM multæ res in mathematicis disciplinis nequaquam satis adhuc explicatæ sint, tum perdifficilis, & perobscura quæstio est de centro grauitatis corporum solidorum; quæ, & ad cognoscendum pulcherrima est, & ad multa, quæ à mathematicis proponuntur, præclare intelligenda maximum affert adiumentum. de qua neminem ex mathematicis, neque nostra, neque patrum nostrorum memoria scriptum reliquisse scimus. & quamuis in earum monumentis literarum nõ nulla reperiantur, ex quibus in hanc sententiam adduci possumus, vt existimemus hanc rem ab iisdẽ vberime tractatam esse; tamen nescio quo fato adhuc in eiusmodi librorum ignoratione versamur. Archimedes quidem mathematicorũ princeps in libello, cuius inscriptio est, κέντρα βάρων ἐπιπέδων, de centro planorum copiosissime, atque acutissime conscripsit: & in eo explicando summã ingenii, & scientiæ gloriã est cõsecutus. Sed de cognitione cẽtri grauitatis corporũ solidorũ nulla in eius libris litera inuenitur. non multos abhinc annos MARCELLVS II. PONT. MAX.

cum adhuc Cardinalis esset, mihi, quæ sua erat humanitas, libros eiusdem Archimedis de ijs, quæ vehuntur in aqua, latine redditos dono dedit. hos cum ego, ut aliorum studia incitarem, emendandos, & cõmentariis illustrandos suscepissem, animaduerti dubitari non posse, quin Archimedes vel de hac materia scripsisset, vel aliorum mathematicorum scripta perlegisset. nam in iis tum alia nonnulla, tum maxime illam propositionem, ut euidentem, & aliàs probatam assumit, Centrũ grauitatis in portionibus conoidis rectanguli axem ita diuidere, vt pars, quæ ad verticem terminatur, alterius partis, quæ ad basim dupla sit. Verum hæc ad eam partem mathematicarum disciplinarum præcipue refertur, in qua de centro grauitatis corporum solidorum tractatur. non est autem consentaneum Archimedes illum admirabilem virum hanc propositionem sibi argumentis confirmandam existimaturum non fuisse, nisi eam vel aliis in locis probauisset, vel ab aliis probatam esse comperisset. quamobrem nequid in iis libris intelligendis desiderari posset, statui hanc etiam partem vel à veteribus prætermisam, vel tractatam quidem, sed in tenebris iacentem, non intactam relinquere; atque ex assidua mathematicorum, præsertim Archimedis lectione, quæ mihi in mentem venerunt, ea in medium afferre; ut centri grauitatis corporum solidorum, si non perfectam, at certe aliquam noti-

tiam haberemus. Quem meum laborem nō mathematicis solum, verum iis etiam, qui naturæ obscuritate delectantur, nō iniucundam fore speravi: multa enim *προβλήματα* cognitione dignissima, quæ ad utrâque scientiam attinent, sese legentibus obtulissent. neque id vlli mirandum videri debet. vt enim in corporibus nostris omnia membra, ex quibus certa quædam officia nascuntur, diuino quodam ordine inter se implicata, & colligata sunt: in iisq; admirabilis illa conspiratio, quam *σύμπνοια* græci vocant, elucescit, ita tres illæ Philosophiæ (ut Aristotelis verbo vtar) quæ veritatem solam propositam habent, licet quibusdam quasi finibus suis regantur: tamen earū vnâqueque per se ipsam quodammodo imperfecta est: neque altera sine alterius auxilio plene comprehendi potest. complures præterea mathematicorum nodi ante hac explicatu difficillimi nullo negotio expediti essent: atque (ut vno verbo complectar) nisi mea valde amo, tractationem hanc meam studiosis non mediocrem vtilitatem, & magnam voluptatem allaturam esse mihi persuasi. cum autem ad hoc scribendum aggressus essem, allatus est ad me liber Francisci Maurolici Messanensis, in quo vir ille doctissimus, & in iis disciplinis exercitatissimus affirmabat se de centro grauitatis corporum solidorum conscripsisse. cum hoc intellexissem, sustinui me paulisper: tacitusque expectavi, dum opus cla-

risimi uiri, quem semper honoris causa nomino, in lucem proferretur: mihi enim exploratissimum erat: Franciscum Maurolicum multo doctius, & exquisitius hoc disciplinarum genus scriptis suis traditurum. sed cum id tardius fieret, hoc est, ut ego interpretor, diligentius, mihi diutius hac scriptione non supersedendum esse duxi, praesertim cum iam libri Archimedis de iis, quae uehuntur in aqua, opera mea illustrati typis excudendi essent. nec me alia causa impulisset, ut de centro grauitatis corporum solidorum scriberem, nisi ut hac etiam ratione lux eis quam maxime fieri posset afferretur. atque id eò mihi faciendum existimaui, quòd in spem ueniebam fore, ut cum ego ex omnibus mathematicis primus, hanc materiam explicandam suscepissem; si quid errati forte à me commissum esset, boni uiri potius id meae destudiosis hominibus bene merendi cupiditati, quam arrogantiae ascriberent. restabat ut considerarem, cui potissimum ex principibus uiris contemplationem hanc, nunc primum memoriae, ac literis proditam dedicarem. harum mearum cogitationum summa facta, existimaui nemini conuenientius de centro grauitatis corporum opus dicari oportere, quam ALEXANDRO FARNESIO grauisimo, ac prudentissimo Cardinali, quo in uiro summa fortuna semper cum summa uirtute certauit. quid enim maxime in te admirari debeant homines, obscurum est; usum ne re-

rum, qui pueritiæ tempus extremum principium habuisti, & imperiorũ, & ad Reges, & Imperatores honorificentissimarum legationum; an excellentiam in omni genere literarum, qui vix adolescētulus, quæ homines iam confirmata ætate summo studio, diuturnisq; laboribus didicerunt, scientia, & cognitione comprehendisti: an consilium, & sapientiam in regendis, & gubernãdis Ciuitatibus, cuius grauiissimæ sententiæ in sanctissimo Reip. Christianæ consilio dictæ, potius diuina oracula, quàm sententiæ habitæ sunt, & habentur. prætermitto liberalitatem, & magnificentiam tuam, quam in studiosissimo quoque honestando quotidie magis ostendis, ne videar auribus tuis potius, quàm veritati seruire. quamuis à te in tot præclaros viros tanta beneficia collata sunt, & conferuntur, vt omnibus testatum sit, nihil tibi esse charius, nihil iucundius, quàm eximia tua liberalitate homines ad amplexandam virtutem, licet currentes incitare. nihil dico de ceteris virtutibus tuis, quæ tantæ sunt, quantæ ne cogitatione quidem comprehendi possunt. Quamobrem hac præcipue de causa te huius meæ lucubrationis patronum esse volui, quam ea, qua soles, humanitate accipies. te enim semper ob diuinas virtutes tuas colui, & obseruaui: nihilq; mihi fuit optatius; quàm tibi perspectum esse meum erga te animum; singularemq; obseruantiam. cœlum igitur digito attingam, si post grauiissimas oc-

cupationes tuas legendo Federici tui libro aliquid
impertiri temporis non grauaberis : eumq; in iis, qui
tibi semper addicti erunt, numerare . Vale.

Federicus Commandinus .

FEDERICI COMMANDINI
 VRBINATIS LIBER DE CENTRO
 GRAVITATIS SOLIDORVM.

DEFINITIONES.



CENTRUM grauitatis, Pappus
 Alexandrinus in octauo ma-
 thematicarum collectionum
 libro ita diffiniuit.

λέγομεν δὲ κέντρον βάρους ἐκάστου σώ-
 ματος εἶναι σημεῖον τι κείμενον ἐντὸς, ἀφ'
 οὗ κατ' ἐπιπέδον ἀρτῆθεν ἐπὶ βάρους ἡμέρῃ
 φερόμενον, καὶ φυλάσσει τὴν ἐξ ἀρχῆς θέ-

σιν, οὐ μὴ περιτρεπόμενον ἐντῆ φορᾷ. hoc est,

Dicimus autem centrum grauitatis uniuscu-
 iusque corporis punctum quoddam intra posi-
 tum, à quo si graue appensum mente concipia-
 tur, dum fertur quiescit; & seruat eam, quam in
 principio habebat positionem: neque in ipsa la-
 tione circumuertitur.

Possumus etiam hoc modo diffinire.

Centrum grauitatis uniuscuiusque solidæ figu-
 ræ est punctum illud intra positum, circa quod
 undique partes æqualium momentorum consi-
 stunt: si enim per tale centrum ducatur planum
 figuram quomodocunque secans semper in par-

tes æqueponderantes ipsam diuidet.

- 2 Prismatici, cylindri, & portionis cylindri axem appello rectam lineam, quæ oppositorum planorum centra grauitatis coniungit.
- 3 Pyramidis, conici, & portionis conici axem dico lineam, quæ à uertice ad centrum grauitatis basis perducitur.
- 4 Si pyramis, conus, portio conici, uel conoidis sectetur plano basi æquidistante, pars, quæ est ad basim, frustum pyramidis, conici, portionis conici, uel conoidis dicetur; quorum plana æquidistantia, quæ opponuntur similia sunt, & inæqualia: axes uero sunt axium figurarum partes, quæ in ipsis comprehenduntur.

P E T I T I O N E S.

- 1 Solidarum figurarum similium centra grauitatis similiter sunt posita.
- 2 Solidis figuris similibus, & æqualibus inter se aptatis, centra quoque grauitatis ipsarum inter se aptata erunt.


T H E O R E M A I. P R O P O S I T I O I.

Omnis figuræ rectilineæ in circulo descriptæ, quæ æqualibus lateribus, & angulis contine-

tur, centrum grauitatis est idem, quod circuli centrum.

Sit primo triangulum æquilaterum abc in circulo descriptum: & diuisa ac bifariam in d , ducatur bd . erit in linea bd centrum grauitatis triãguli abc , ex tertia decima primi libri Archimedis de centro grauitatis planorum. Et

quoniam linea ab est æqualis lineæ bc ; & ad ipsi dc ; estq; bd utrique communis: triangulum abd æquale erit triangulo cbd : & anguli angulis æquales, qui æqualibus lateribus subtenduntur. ergo anguli ad d utriq; recti sunt. quod cum linea bd secet ac bifariam, & ad angulos rectos; in ipsa bd est centrum circuli, quare in eadem bd linea erit




8. primũ.

13. primũ.

corol. primæ tertiæ

centrum grauitatis triãguli, & circuli centrum. Similiter diuisa ab bifariam in e , & ducta ce , ostendetur in ipsa utrumque centrum contineri. ergo ea erunt in puncto, in quo lineæ bd, ce conueniunt. triãguli igitur abc centrum grauitatis est idem, quod circuli centrum.

Sit quadratum $abcd$ in circulo descriptum: & ducantur ac, bd , quæ conueniant in e . ergo punctum e est centrum grauitatis quadrati, ex decima eiusdem libri Archimedis. Sed cum omnes anguli ad a, b, c, d recti sint; erit abc semicirculus: itemq; bcd : & propterea lineæ ac, bd diametri circuli:



31. tertiũ.

F E D. C O M M A N D I N I

quæ quidem in centro conveniunt. idem igitur est centrum gravitatis quadrati, & circuli centrum.

Sit pentagonum æquilaterum, & æquiangulum in circulo descriptum a b c d e: & iuncta b d, bifariamq; in f diuisa;

ducatur e f, & producatu ad circuli circumferentiam in g;

quæ lineam a e in h secet: deinde iungantur a c, c e. Eodem modo, quo supra demonstra-

bimus angulum b c f æqualem esse angulo d c f; & angulos ad f utrosque rectos: & idcirco lineam c f g per circuli cen-

trum transire. Quoniam igitur latera c b, b a, & c d, d e æqualia sunt; & æquales anguli c b a, c d e: erit basis c a basi c e, & angulus b c a angulo d c e æqualis. ergo & reliquis a c h, reliquo e c h. est autem c h utrique triangulo a c h, e c h communis. quare basis a h æqualis est basi h e: & anguli, qui ad h recti: suntq; recti, qui ad f. ergo lineæ a e, b d inter se se æquidistant. Itaque cum trapezij a b d e latera b d, a e æquidistantia à linea f h bifariam diuidantur; centrum gravitatis ipsius erit in linea f h, ex ultima eiusdem libri Archimedis. Sed trianguli b c d centrum gravitatis est in linea c f. ergo in eadem linea c h est centrum gravitatis trapezij a b d e, & trianguli b c d: hoc est pentagoni ipsius centrum: & centrum circuli. Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k; ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.



trum transire. Quoniam igitur latera c b, b a, & c d, d e æqualia sunt; & æquales anguli c b a, c d e: erit basis c a basi c e, & angulus b c a angulo d c e æqualis. ergo & reliquis a c h, reliquo e c h. est autem c h utrique triangulo a c h, e c h communis. quare basis a h æqualis est basi h e: & anguli, qui ad h recti: suntq; recti, qui ad f. ergo lineæ a e, b d inter se se æquidistant. Itaque cum trapezij a b d e latera b d, a e æquidistantia à linea f h bifariam diuidantur; centrum gravitatis ipsius erit in linea f h, ex ultima eiusdem libri Archimedis. Sed trianguli b c d centrum gravitatis est in linea c f. ergo in eadem linea c h est centrum gravitatis trapezij a b d e, & trianguli b c d: hoc est pentagoni ipsius centrum: & centrum circuli. Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k; ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.

Sit hexagonum a b c d e f æquilaterum, & æquiangulum in circulo designatum: iunganturq; b d, a e: & bifariam se-

ctæ in g, h: ducatur e g, & producatu ad circuli circumferentiam in i; quæ lineam a e in k secet: deinde iungantur a c, c e. Eodem modo, quo supra demonstra-

bimus angulum b c f æqualem esse angulo d c f; & angulos ad f utrosque rectos: & idcirco lineam c f g per circuli centrum transire. Quoniam igitur latera c b, b a, & c d, d e æqualia sunt; & æquales anguli c b a, c d e: erit basis c a basi c e, & angulus b c a angulo d c e æqualis. ergo & reliquis a c h, reliquo e c h. est autem c h utrique triangulo a c h, e c h communis. quare basis a h æqualis est basi h e: & anguli, qui ad h recti: suntq; recti, qui ad f. ergo lineæ a e, b d inter se se æquidistant. Itaque cum trapezij a b d e latera b d, a e æquidistantia à linea f h bifariam diuidantur; centrum gravitatis ipsius erit in linea f h, ex ultima eiusdem libri Archimedis. Sed trianguli b c d centrum gravitatis est in linea c f. ergo in eadem linea c h est centrum gravitatis trapezij a b d e, & trianguli b c d: hoc est pentagoni ipsius centrum: & centrum circuli. Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k; ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.

Itaque cum trapezij a b d e latera b d, a e æquidistantia à linea f h bifariam diuidantur; centrum gravitatis ipsius erit in linea f h, ex ultima eiusdem libri Archimedis. Sed trianguli b c d centrum gravitatis est in linea c f. ergo in eadem linea c h est centrum gravitatis trapezij a b d e, & trianguli b c d: hoc est pentagoni ipsius centrum: & centrum circuli. Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k; ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.

Sed trianguli b c d centrum gravitatis est in linea c f. ergo in eadem linea c h est centrum gravitatis trapezij a b d e, & trianguli b c d: hoc est pentagoni ipsius centrum: & centrum circuli. Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k; ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.

hoc est pentagoni ipsius centrum: & centrum circuli. Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k; ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.

Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k; ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.

Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.

Sit hexagonum a b c d e f æquilaterum, & æquiangulum in circulo designatum: iunganturq; b d, a e: & bifariam se-

ctæ in g, h: ducatur e g, & producatu ad circuli circumferentiam in i; quæ lineam a e in k secet: deinde iungantur a c, c e. Eodem modo, quo supra demonstra-

bimus angulum b c f æqualem esse angulo d c f; & angulos ad f utrosque rectos: & idcirco lineam c f g per circuli centrum transire. Quoniam igitur latera c b, b a, & c d, d e æqualia sunt; & æquales anguli c b a, c d e: erit basis c a basi c e, & angulus b c a angulo d c e æqualis. ergo & reliquis a c h, reliquo e c h. est autem c h utrique triangulo a c h, e c h communis. quare basis a h æqualis est basi h e: & anguli, qui ad h recti: suntq; recti, qui ad f. ergo lineæ a e, b d inter se se æquidistant. Itaque cum trapezij a b d e latera b d, a e æquidistantia à linea f h bifariam diuidantur; centrum gravitatis ipsius erit in linea f h, ex ultima eiusdem libri Archimedis. Sed trianguli b c d centrum gravitatis est in linea c f. ergo in eadem linea c h est centrum gravitatis trapezij a b d e, & trianguli b c d: hoc est pentagoni ipsius centrum: & centrum circuli. Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k; ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.


Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.

Sit hexagonum a b c d e f æquilaterum, & æquiangulum in circulo designatum: iunganturq; b d, a e: & bifariam se-

ctæ in g, h: ducatur e g, & producatu ad circuli circumferentiam in i; quæ lineam a e in k secet: deinde iungantur a c, c e. Eodem modo, quo supra demonstra-


bimus angulum b c f æqualem esse angulo d c f; & angulos ad f utrosque rectos: & idcirco lineam c f g per circuli centrum transire. Quoniam igitur latera c b, b a, & c d, d e æqualia sunt; & æquales anguli c b a, c d e: erit basis c a basi c e, & angulus b c a angulo d c e æqualis. ergo & reliquis a c h, reliquo e c h. est autem c h utrique triangulo a c h, e c h communis. quare basis a h æqualis est basi h e: & anguli, qui ad h recti: suntq; recti, qui ad f. ergo lineæ a e, b d inter se se æquidistant. Itaque cum trapezij a b d e latera b d, a e æquidistantia à linea f h bifariam diuidantur; centrum gravitatis ipsius erit in linea f h, ex ultima eiusdem libri Archimedis. Sed trianguli b c d centrum gravitatis est in linea c f. ergo in eadem linea c h est centrum gravitatis trapezij a b d e, & trianguli b c d: hoc est pentagoni ipsius centrum: & centrum circuli. Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k; ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conveniunt, idem sit centrum circuli, & centrum gravitatis pentagoni.

Et a b d in g puncto, ducatur c g; & protrahatur ad circuli usque circumferentiam; quæ secet a e in h. Similiter concludemus c g per centrum circuli transire: & bifariam secare lineam a e; itemq; lineas b d, a e inter se æquidistantes esse. Cum igitur c g per centrum circuli transeat; & ad punctum f perueniat necesse est: quod c d e f sit dimidium circumferentiæ circuli. Quare in eadem diametro c f erunt centra gravitatis triangulorum b c d, a f e, & quadrilateri a b d e, ex quibus constat hexagonum a b c d e f. perspicuum est igitur in ipsa c f esse circuli centrum, & centrum gravitatis hexagoni. Rursus ducta altera diametro a d, eisdem rationibus ostendemus in ipsa utrumque centrum inesse. Centrum ergo gravitatis hexagoni, & centrum circuli idem erit.



13. Archimedis . . .
9. eiusdem.

Sit heptagonum a b c d e f g æquilaterum atque æquiangulum in circulo descriptum: & iungantur c e, b f, a g: diuisa autem c e bifariam in puncto h: & iuncta d h producat in k. non aliter demonstrabimus in linea d k esse centrum circuli, & centrum gravitatis trianguli c d e, & trapeziorum b c e f, a b f g, hoc est centrum totius heptagoni: & rursus eadem centra in alia diametro c l similiter ducta contineri. Quare & centrum gravitatis heptagoni, & centrum circuli in idem punctum conueniunt. Eodem mo



do in reliquis figuris æquilateris, & æquiangulis, quæ in circulo describuntur, probabimus cẽtrum grauitatis earum, & centrum circuli idem esse. quod quidem demonstrare oportebat.

Ex quibus apparet cuiuslibet figuræ rectilineæ in circulo plane descriptæ centrum grauitatis idẽ esse, quod & circuli centrum.

ὑποκείμενος

Figuram in circulo plane descriptam appellamus, cuiusmodi est ea, quæ in duodecimo elementorum libro, propositione secunda describitur. ex æqualibus enim lateribus, & angulis constare perspicuum est.

THEOREMA II, PROPOSITIO II.


Omnis figuræ rectilineæ in ellipsi plane descriptæ centrum grauitatis est idem, quod ellipsis centrum.

Quo modo figura rectilinea in ellipsi plane describatur, docuimus in commentarijs in quintam propositionem libri Archimedis de conoidibus, & sphaeroidibus.

Sit ellipsis $abcd$, cuius maior axis ac , minor bd : iunganturq; ab, bc, cd, da : & bifariam diuidantur in punctis $efgh$. à centro autem, quod sit k ductæ lineæ ke, kf, kg, kh usque ad sectionem in puncta $lmno$ protrahantur: & iungantur lm, mn, no, ol , ita ut ac secet lineas lo, mn , in $z\phi$ punctis, & bd secet lm, on in $\chi\psi$. erunt lk, kn linea una, itemq; linea una ipsæ mk, ko : & lineæ ba, cd æquidistant lineæ mo : & bc, ad ipsi ln . rursus lo, mn axi bd æquidistant: & $lm,$

on ipsi a c. Quoniam enim triangulorum a b k, a d k, latus b k est æquale lateri k d; & a k utrique commune; anguliq; ad k recti basis a b basi a d; & reliqui anguli reliquis an- 8. primis

gulis æquales erunt. eadem quoque ratione ostendetur b c æqualis c d; & a b ipsi b c. quare omnes a b, b c, c d, d a sunt æquales. & quoniam anguli ad a æquales sunt angulis ad c; erunt anguli b a c, a c d coalterni inter se æquales; itemq; d a c, a c b. ergo c d ipsi b a; & a d ipsi b c æquidistant. At uero cum lineæ a b, c d inter se æquidistantes bifariam secantur in punctis e g; erit linea l e k g n diameter sectionis, & linea una, ex demonstratis in uigesima octava secundi con-




corum. Et eadem ratione linea una m f k h o. Sunt autē a d, b c inter se se æquales, & æquidistantes. quare & earum dimidiæ a h, b f; itemq; h d, f e; & quæ ipsas coniungunt rectæ 33. primis
lineæ æquales, & æquidistantes erunt. æquidistant igitur b a, c d diametro m o: & pariter a d, b c ipsi l n æquidistare ostendemus. Si igitur manēte diametro a c intelligatur a b c portio ellipsis ad portionem a d c moueri, cum primum b applicuerit ad d, cōgruet tota portio toti portioni, lineaq; b a lineæ a d; & b c ipsi c d congruet: punctum uero e cadet in h; f in g; & linea k e in lineam k h: & k f in k g. quare & e l in h o, et f m in g n. At ipsa l z in z o; et m phi in phi n cadet. congruet igitur triangulum l k z triangulo o k z: et

F E D. C O M M A N D I N I

28. primi.

triangulum $m k \phi$ triangulo $n k \phi$. ergo anguli $l z k$, $o z k$, $m \phi k$, $n \phi k$ æquales sunt, ac recti. quòd cum etiam recti sint, qui ad k ; æquidistant lineæ $l o$, $m n$ axi $b d$. & ita demonstrabuntur $l m$, $o n$ ipsi $a c$ æquidistare. Rursus si iungantur $a l$, $l b$, $b m$, $m c$, $c n$, $n d$, $d o$, $o a$: & bifariam dividantur: à centro autem k ad divisiones ductæ lineæ protrahantur usque ad sectionem in puncta $p q r s t u x y$: & postremo $p y$, $q x$, $r u$, $s t$, $q r$, $p s$, $y t$, $x u$ coniungantur. Similiter ostendemus lineas

$p y$, $q x$, $r u$, $s t$ axi $b d$ æquidistantes esse: & $q r$, $p s$, $y t$, $x u$ æquidistantes ipsi $a c$. Itaque dico harum figurarum in ellipso descriptarum centrum gravitatis esse punctum k , idem quod & ellipsis centrum. quadrilateri enim $a b c d$ centrum est k , ex decima eiusdem libri Archimedis, quippe cū in eo omnes diametri cōveniāt.



13. Archimedis.

Ultima.


Sed in figura $a l b m c n d o$, quoniam trianguli $a l b$ centrum gravitatis est in linea $l e$: trapezium $i j q$; $a b m o$ centrum in linea $e k$: trapezium $i j o m c d$ in $k g$: & trianguli $c n d$ in ipsa $g n$: erit magnitudinis ex his omnibus constantis, videlicet totius figuræ centrum gravitatis in linea $l n$: & ob eandem causam in linea $o m$. est enim trianguli $a o d$ centrum in linea $o h$: trapezium $a l n d$ in $h k$: trapezium $i j l b c n$ in $k f$: & trianguli $b m c$ in $f m$. cum ergo figuræ $a l b m c n d o$ centrum gravitatis sit in linea $l n$, & in linea $o m$; erit centrum ipsius punctum k , in quo

quo scilicet ln , om conueniunt. Postremo in figura $a p l q b r m s c t n u d x o y$ centrum grauitatis trianguli $p a y$, & trapezii $p l o y$ est in linea $a z$: trapeziorum uero $l q x o$, $q b d x$ centrum est in linea $z k$: & trapeziorum $b r u d$, $r m n u$ in $k \phi$: & denique trapezii $m s t n$; & trianguli $s c t$ in ϕc . quare magnitudinis ex his compositæ centrū in linea $a c$ consistit. Rursus trianguli $q b r$, & trapezii $q l m r$ centrum est in linea $b \chi$: trapeziorum $l p s m$, $p a c s$, $a y t c$, $y o n t$ in linea $\chi \phi$: trapeziiq; $o x u n$, & trianguli $x d u$ centrum in $\downarrow d$. totius ergo magnitudinis centrum est in linea $b d$. ex quo sequitur, centrum grauitatis figuræ $a p l q b r m s c t n u d x o y$ esse punctū K , lineis scilicet $a c$, $b d$ commune, quæ omnia demonstrare oportebat.

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Cuiuslibet portio-
nis circuli, & ellipsis,
quæ dimidia non fit
maior, centrum graui-
tatis in portio-
nis dia-
metro consistit.

HOC eodem prorsus
modo demonstrabitur,
quo in libro de centro gra-
uitatis planorum ab Ar-
chimede demonstratū est,
in portione cōtenta recta
linea, & rectanguli coni se-
ctione grauitatis cētrum
esse in diametro portio-
nis. Et ita demonstrari po-



B

F E D. C O M M A N D I N I

test in portione, quæ recta linea & obtusianguli conï sectione, seu hyperbola continetur.

T H E O R E M A I I I I . P R O P O S I T I O I I I I .


I N circulo & ellipsi idem est figuræ & grauitatis centrum .

S I T circulus, uel ellipsis, cuius centrum a . Dico a grauitatis quoque centrum esse. Si enim fieri potest, sit b centrum grauitatis : & iuncta a b extra figuram in c producatu r : quam uero proportionem habet linea c a ad a b, habeat circulus a ad alium circulum, in quo d ; uel ellipsis ad aliam ellipsim : & in circulo, uel ellipsi figura rectilinea plane describatur adeo, ut tandem relinquuntur portiones quædam minores circulo, uel ellipsi d ; quæ figura sit e f g h k l m n . Illud uero in circulo fieri posse ex duodecimo elementorum libro, propositione secunda manifeste constat ; at in ellipsi nos demonstra-

uimus in commentariis in quintam propositionem Archimedis de conoidibus, & spheroidibus. erit igitur a centrum grauitatis ipsius figuræ, quod proxime ostendimus. Itaque quoniam circulus a ad circulum d ; uel ellipsis a ad ellipsim d eandem proportionem habet, quam linea c a ad a b : portiones uero sunt minores circulo uel ellipsi d : habebit circulus, uel ellipsis ad portiones maiorem proportionem, quam c a ad a b : & diuidendo figura rectilinea e f g h k l m n ad portiones

8. quinti.

19. quinti apud Campanum .




habebit

habet maiorē proportionē, quam cb ad ba . fiat ob ad ba , ut figura rectilinea ad portiones. cum igitur à circulo, uel ellipsi, cuius grauitatis centrum est b , auferatur figura rectilinea $efghklmn$, cuius centrum a ; reliquæ magnitudinis ex portionibus compositæ centrum grauitatis erit in linea ab producta, & in puncto o , extra figuram posito. quod quidem fieri nullo modo posse perspicuum est. sequitur ergo, ut circuli & ellipsis centrum grauitatis sit punctum a , idem quod figuræ centrum.

A L I T E R.


Sit circulus, uel ellipsis $abcd$, cuius diameter db , & centrum e : ducaturq; per e recta linea ac , secans ipsam db ad rectos angulos. erunt adc , abc circuli, uel ellipsis dimidiæ portiones. Itaque quoniam portiois adc cêtrū grauitatis est in diametro de : & portiois abc centrum est in ipsa eb : totius circuli, uel ellipsis grauitatis centrum erit in diametro db .

Sit autem portiois adc cêtrū grauitatis f : & sumatur



Sit autem portiois adc cêtrū grauitatis f : & sumatur


B 2



S. Archimedis.

in linea $e b$ punctū g , ita ut sit $g e$ æqualis $e f$. erit g portionis $a b c$ centrum. nam si hæc portiones, quæ æquales & similes sunt, inter se se aptentur, ita ut $b e$ cadat in $d e$, & punctum b in d cadet, & g in f : figuris autem æqualibus, & similibus inter se aptatis, centra quoque grauitatis ipsarum inter se aptata erunt, ex quinta petitione Archimedis in libro de centro grauitatis planorum. Quare cum portionis $a d c$ centrum grauitatis sit f : & portionis $a b c$ centrum g : magnitudinis; quæ ex utrisque efficitur: hoc est circuli uel ellipsis grauitatis centrum in medio lineæ $f g$, quod est e , consistet, ex quarta propositione eiusdem libri Archimedis. ergo circuli, uel ellipsis centrum grauitatis est idem, quod figuræ centrum. atque illud est, quod demonstrare oportebat.

Ex quibus sequitur portionis circuli, uel ellipsis, quæ dimidia maior sit, centrum grauitatis in diametro quoque ipsius consistere.




Sit enim maior portio $a b c$, cuius diameter $b d$, & compleatur circulus, uel ellipsis, ut portio reliqua sit $a e c$, diameter

metrum habens e d. Quoniam igitur circuli uel ellipsis a e c b grauitatis centrum est in diametro b e, & portio- nis a e c centrum in linea e d: reliquæ portio- nis, uidelicet a b c centrum grauitatis in ipsa b d consistat necesse est, ex octaua propositione eiusdem.

THEOREMA V. PROPOSITIO V.

SI prisma secetur plano oppositis planis æqui- distante, sectio erit figura æqualis & similis ei, quæ est oppositorum planorum, centrum graui- tatis in axe habens.

Sit prisma, in quo plana opposita sint triangula a b c, d e f; axis g h: & secetur plano iam dictis planis æquidistā- te; quod faciat sectionem k l m; & axi in pūcto n occurrat. Dico k l m triangulum æquale esse, & simile triangulis a b c d e f; atque eius grauitatis centrum esse pūctum n. Quo- niam enim plana a b c k l m æquidistantia secā- tur a plano a e; rectæ li- neæ a b, k l, quæ sunt ip- forum cōmunes sectio- nes inter se se æquidi- stant. Sed æquidistant a d, b e; cum a e sit para- lelogrammum, ex pris- matis diffinitione. ergo & a l parallelogrammū erit; & propterea linea k l, ipsi a b æqualis. Si- militer demonstrabitur l m æquidistans, & æqua- lis b c; & m k ipsi c a.



16. unde-
cimi.

34. primi

FED. COMMANDINI


10. undecimi

10. undecimi

4. sexti

per 5. petitionem Archimedis.

Itaque quoniam duæ lineæ Kl , lm se se tangentes, duabus lineis se se tangentibus ab , bc æquidistant; nec sunt in eodem plano: angulus klm æqualis est angulo abc : & ita angulus lmk , angulo bca , & mkl ipsi cab æqualis probabitur. triangulum ergo klm est æquale, & simile triangulo abc . quare & triangulo def . Ducatur linea cg , & per ipsam, & per cf ducatur planum secans prisma, cuius & parallelogrammi ae communis sectio sit opq . transibit linea fq per h , & mp per n . nam cum plana æquidistantia secentur à plano cq , communes eorum sectiones cg , mp , fq sibi ipsis æquidistant. Sed & æquidistant ab , kl , de . anguli ergo aoc , kpm , dqf inter se æquales sunt: & sunt æquales qui ad puncta akd constituuntur. quare & reliqui reliquis æquales; & triangula aoc , kmp , dfq inter se similia erunt. Vt igitur ca ad ao , ita fd ad dq : & permutando ut ca ad fd , ita ao ad dq . est autem ca æqualis fd . ergo & ao ipsi dq . eadem quoque ratione & ao ipsi kp æqualis demonstrabitur. Itaque si triangula, abc , def æqualia & similia inter se aptentur, cadet linea fq in lineam cg . Sed & centrū gravitatis h in g centrū cadet. trānsibit igitur linea fq per h : & planum per co & cf ductū per axē gh ducetur: idcircoq; lineam mp etiā per n trānsire necesse erit. Quoniam ergo fh , cg æquales sunt, & æquidistantes: itemq; hq , go ; rectæ lineæ, quæ ipsas cōnectūt cmf , gnh , opq æquales & æquidistantes erūt.



æqui-

æquidistant autem cg , mn p . ergo parallelogrāma sunt on , gm , & linea mn æqualis cg ; & np ipsi go . aptatis igitur klm , abc triāgulis, quæ æqualia & similia sūt; linea mp in co , & punctum n in g cadet. Quòd cū g sit centrum gravitatis trianguli abc , & n trianguli klm gravitatis centrum erit: id, quod demonstrandum relinquebatur. Simili ratione idem contingere demonstrabimus in aliis prismatibus, siue quadrilatera, siue plurilatera habeant plana, quæ opponuntur.

COROLLARIUM.

Ex iam demonstratis perspicue apparet, cuiuslibet prismatis axem, parallelogrammorum lateribus, quæ ab oppositis planis ducuntur æquidistare.

THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Cuiuslibet prismatis centrum gravitatis est in plano, quod oppositis planis æquidistans, reliquorum planorum latera bifariam dividit.


Sit prisma, in quo plana, quæ opponuntur sint triāgula ace , bdf : & parallelogrammorum latera ab , cd , e bifariam dividantur in punctis ghk : per divisiones autem planum ducatur; cuius sectio figura ghK . erit linea 33. primi
 gh æquidistans lineis ac , bd & hk ipsis ce , df . quare ex decimaquinta undecimi elementorum, planum illud planis ace , bdf æquidistabit, & faciet sectionem figuram ipsis æqualem, & similem, ut proxime demonstravimus. 5. huius
 Dico centrum gravitatis prismatis esse in plano ghk . Si enim fieri potest, sit eius centrum l : & ducatur lm usque ad planum ghk , quæ ipsi ab æquidistet.

x. decimi

s. huius


ergo linea a g continenter in duas partes æquales diuisa, relinquetur tãdem pars aliqua n g, quæ minor erit l m. Vtraque uero linearum a g, g b diuidatur in partes æquales ipsi n g: & per puncta diuisionum plana oppositis planis æquidistantia ducantur. erunt sectiones figuræ æquales, ac similes ipsis a c e, b d f: & totum prisma diuisum erit in prismata æqualia, & similia: quæ cum inter se congruãt; & grauitatis centra sibi ipsis congruentia, respondentiaq; habebunt. Itaq;

sunt magnitudines quædã æquales ipsi n h, & numero pares, quarum centra grauitatis in eadẽ recta linea constituuntur: duæ uero mediæ æquales sunt: & quæ ex utraque parte ipsarum similiter æquales: & æquales rectæ lineæ, quæ inter grauitatis centra interiiciuntur. quare ex corollario quintæ propositionis primi libri Archimedis de centro graui-



tatis planorum; magnitudinis ex his omnibus compositæ centrum grauitatis est in medio lineæ, quæ magnitudinum mediarum centra coniungit. at qui non ita res habet,

bet, si quidem l extra medias magnitudines positum est. Constat igitur centrum grauitatis prismatis esse in plano



ghk , quod nos demonstrandum proposuimus. At si opposita plana in prismatico sint quadrilatera, uel plurilatera, eadem erit in omnibus demonstratio.

THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

Cuiuslibet cylindri, & cuiuslibet cylindri portionis centrum grauitatis est in plano, quod basi-
bus æquidistans, parallelogrammi per axem late-
ra bifariam secat.


F E D. C O M M A N D I N I

SIT cylindrus, uel cylindri portio a c: & plano per a^m xem ducto secetur; cuius sectio fit parallelogrammum a b c d: & bifariam diuisis a d, b c parallelogrammi lateribus, per diuisionum puncta e f planum basi æquidistans ducatur; quod faciet sectionem, in cylindro quidem circulum æqualem iis, qui sunt in basibus, ut demonstrauit Serenus in libro cylindricorum, propositione quinta: in cylindri uero portione ellipsim æqualem, & similem eis, quæ sunt in oppositis planis, quod nos


demonstrauimus in commentariis in librum Archimedis de conoidibus, & spheroidibus. Dico centrum grauitatis cylindri, uel cylindri portionis esse in plano e f. Si enī fieri potest, fit centrum g: & ducatur g h ipsi a d æquidistans, usque ad e f planum.

Itaque linea a e continenter diuisa bifariam, erit tandem pars aliqua ipsius k e, minor g h. Diuidantur ergo lineæ a e, e d in partes æquales ipsi k e: & per diuisiones plana basibus æquidistantia ducantur. erunt iam sectiones, figuræ æquales, & similes eis, quæ sunt

in basibus: atque erit cylindrus in cylindros diuisus: & cylindri portio in portiones æquales, & similes ipsi k f. reliqua similiter, ut superius in prismatico concludentur.



THE O-




THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Cuiuslibet prismatis, & cuiuslibet cylindri, uel cylindri portionis grauitatis centrum in medio ipsius axis consistit.

Sit primum a f prisma æquidistantibus planis contentū, quod solidum parallelepipedum appellatur: & oppositorum planorum c f, a h, d a, f g latera bifariam diuidantur in punctis k l m n o p q r s t u x: & per diuisiones ducantur plana k n, o r, s x. communes autem eorum planorum sectiones sint lineæ y z, θ φ, χ ψ: quæ in puncto ω conueniāt. erit ex decima eiusdem libri Archimedis parallelogrammi c f centrum grauitatis punctum y; parallelogrammi a h

centrum z: parallelogrammi a d, θ : parallelogrammi f g, ϕ :

parallelogrammi d h, χ : & parallelogrammi c g centrū ψ : atque erit ω punctum medium uniuscuiusque axis, uidelicet eius lineæ, quæ oppositorum planorū centra coniungit. Dico ω centrum esse grauitatis ipsius solidi. est enim, ut demonstrauius,



6. huius

solidi a f centrum grauitatis in plano K n; quod oppositis planis a d, g f æquidistans reliquorum planorum latera bifariam diuidit: & similitudine idem centrum est in plano o r, æquidistante planis a e, b f oppositis. ergo in communi ipsorum sectione: uidelicet in linea y z. Sed est etiam in plano t u, quod quidē y z secat in ω . Constat igitur centrum grauitatis solidi esse punctum ω , medium scilicet axium, hoc est linearum, quæ planorum oppositorum centra coniungunt.


Sit aliud prima a f; & in eo plana, quæ opponuntur, triangula a b c, d e f. diuisisq; bifariam parallelogrammorum lateribus a d, b e, c f in punctis g h k, per diuisiones planū ducatur, quod oppositis planis æquidistans faciet sectionē triangulum g h k æquale, & simile ipsis a b c, d e f. Rursus diuidatur a b bifariam in l: & iuncta cl per ipsam, & per c k f planum ducatur prisma secans, cuius, & parallelogrammi a e communis sectio sit l m n. diuidet punctum m lineam g h bifariam; & ita n diuidet lineam d e: quoniam triangula a c l, g k m, d f n æqualia sunt, & similia, ut supra demonstrauius. Iam ex iis, quæ tradita sunt, constat centrum grauitatis prismatis in plano g h k contineri. Dico ipsam esse in linea k m. Si enim fieri potest, sit o centrum;

5. huius

& per

DE CENTRO GRAVIT. SOLID. II

& per o ducatur o p ad k m ipsi h g æquidistans. Itaque li
nea h m bifariã usque eò diuidatur, quoad reliqua sit pars
quædam q m, minor o p. deinde h m, m g diuidantur in
partes æquales ipsi m q: & per diuisiones lineæ ipsi m K
æquidistantes ducantur. puncta uero, in quibus hæ trian-
gulorum latera secant, coniungantur ductis lineis r s, t u,



xy; quæ basi gh æquidistabunt. Quoniam enim lineæ gz,
h α sunt æquales: itemq; æquales gm, mh: ut mg ad gz,
ita crit mh, ad h α: & diuidendo, ut m z ad z g, ita m α ad
α h. Sed ut m z ad z g, ita kr ad rg: & ut m α ad α h, ita ks
ad sh. quare ut kr ad rg, ita ks ad sh. æquidistant igitur
inter se r s, gh. eadem quoque ratione demonstrabimus

2. sexti.
1. quinti
2. sexti.

Itaque solidi parallelepipedī $y\gamma$ centrum gravitatis est in linea $\delta\epsilon$: solidi $u\beta$ centrum est in linea $\epsilon\eta$: & solidi $s z$ in linea ηm , quæ quidem lineæ axes sunt, cum planorum oppositorum centra coniungant. ergo magnitudinis ex his solidis compositæ centrum gravitatis est in linea δm , quod sit θ ; & iuncta θo producat: à puncto autem h ducatur $h\mu$ ipsi $m k$ æquidistans, quæ cum θo in μ conveniat. triangulum igitur ghk ad omnia triangula $gzr, r\beta t, t\gamma x, x\delta k, k\delta y, y u, u s, s\alpha h$ eandem habet proportionem, quam hm ad $m q$; hoc est, quam $\mu\theta$ ad $\theta\lambda$: nam si $hm, \mu\theta$ produci intelligantur, quousque coeant; erit ob linearum $qy, m k$ æquidistantiam, ut hq ad qm , ita $\mu\lambda$ ad $\lambda\theta$: & componendo, ut hm ad $m q$, ita $\mu\theta$ ad $\theta\lambda$. linea uero θo maior est, quàm $\theta\lambda$: habebit igitur $\mu\theta$ ad $\theta\lambda$ maiorem proportionem, quàm ad θo . quare triangulum etiam ghk ad omnia iam dicta triangula maiorem proportionē habebit, quàm $\mu\theta$ ad θo . sed ut triangulū ghk ad omnia triangula, ita totū prisma $a f$ ad omnia prismata $gzr, r\beta t, t\gamma x, x\delta k, k\delta y, y u, u s, s\alpha h$: quoniam enim solida parallelepipeda æque alta, eandem inter se proportionem habent, quam bases; ut ex trigesima secunda undecimi elementorum constat. sunt autem solida parallelepipeda prismatum triangulares bases habentium dupla: sequitur, ut etiam huiusmodi prismata inter se sint, sicut eorum bases. ergo totum prisma ad omnia prismata maiorem proportionem habet, quam $\mu\theta$ ad θo : & dividendo solida parallelepipeda $y\gamma, u\beta, s z$ ad omnia prismata proportionem habent maiorem, quàm μo ad $o\theta$. fiat $v o$ ad $o\theta$, ut solida parallelepipeda $y\gamma, u\beta, s z$ ad omnia prismata. Itaque cum à prismate $a f$, cuius cētrum gravitatis est o , auferatur magnitudo ex solidis parallelepipedis $y\gamma, u\beta, s z$ constans: atque ipsius gravitatis centrum sit θ : reliquæ magnitudinis, quæ ex omnibus prismatibus constat, gravitatis centrum erit in linea θo producta: & in puncto v , ex octava propositione eiusdem libri Archi-

8. quinti.


28. undecimi

15. quinti

19. quinti apud Campanum.

F E D. C O M M A N D I N I

medis . ergo punctum v extra prisma $a f$ positum, centrū erit magnitudinis cōpositæ ex omnibus prismatibus $g z r$, $r \beta t$, $t \gamma x$, $x \delta k$, $k \delta y$, $y u$, $u s$, $s \alpha h$, quod fieri nullo modo potest. est enim ex definitione centrum gravitatis solidæ figuræ intra ipsam positum, non extra. quare relinquatur, ut cētrum gravitatis prismatis sit in linea $K m$. Rursus $b c$ bifariam in ξ diuidatur : & ducta $a \xi$, per ipsam, & per lineam $a g d$ planum ducatur ; quod prisma secet : faciatq; in parallelogrammo $b f$ sectionem $\xi \pi$ diuidet punctum π lineam quoque $c f$ bifariam : & erit plani eius, & trianguli $g h K$ communis sectio $g u$; quòd pūctum u in medio lineæ $h K$




positum si t . Similiter demonstrabimus centrum gravitatis prismatis in ipsa $g u$ inesse . sit autem planorum $c f n l$; $a d \pi \xi$ communis sectio linea $\rho \sigma \tau$; quæ quidem prismatis axis erit, cum transeat per centra gravitatis triangulorum $a b c$, $g h k$, $d e f$, ex quartadecima eiusdem . ergo centrum gravitatis prismatis $a f$ est punctum σ , centrum scilicet
trianguli

trianguli ghK , & ipsius $\rho\tau$ axis medium.

Sit prisma ag , cuius opposita plana sint quadrilatera $abcd$, $efgh$: secenturq; ae , bf , cg , dh bifariam: & per divisiones planum ducatur; quod sectionem faciat quadrilaterum $klmn$. Deinde iuncta ac per lineas ac , ae ducatur planum secans prisma, quod ipsum diuidet in duo prismata triangulares bases habentia abc efg , adc ehg . Sint autem

triangulorum abc , efg gravitatis centra op : & triangulorum adc , ehg centra qr : iunganturq; op , qr ; quæ plano $klmn$ occurrant in punctis st . erit ex iis, quæ demonstrauimus, punctum s gravitatis centrum trianguli klm ; & ipsius prismatis abc efg : punctum uero t centrum gravitatis trianguli knm , & prismatis adc , ehg . iunctis igitur oq , pr , st , erit in linea oq centrum gravitatis quadrilateri $abcd$, quod sit u : & in linea pr centrum quadrilateri $efgh$ sit autem x . denique iungatur ux , quæ secet lineam st in y . se




cabit enim cum sint in eodem plano: atq; erit y gravitatis centrum quadrilateri $klmn$. Dico idem punctum y centrum quoque gravitatis esse totius prismatis. Quoniam enim quadrilateri $klmn$ gravitatis centrum est y : linea sy ad yt eandem proportionem habebit, quam triangulum knm ad triangulum klm , ex 8 Archimedis de centro gravitatis planorum. Ut autem triangulum knm ad ipsum klm , hoc est ut triangulum adc ad triangulum abc , æqualia enim sunt, ita prisma adc ehg .

s. huius.

similiter demonstrabitur totius prismatis a K gravitatis esse centrum. Simili ratione & in aliis prismatibus illud idem facile demonstrabitur. Quo autem pacto in omni figura rectilinea centrum gravitatis inveniatur, docuimus in commentariis in sextam propositionem Archimedis de quadratura parabolæ.

Sit cylindrus, uel cylindri portio c e cuius axis a b: seceturq; plano per axem ducto; quod sectionem faciat parallelogrammum c d e f: & diuisis c f, d e bifariam in punctis



g h, per ea ducatur planum basi æquidistans. erit sectio g h circulus, uel ellipsis, centrum habens in axe; quod sit K: atque erunt ex iis, quæ demonstrauiimus, centra gravitatis planorum oppositorum puncta a b: & plani g h ipsum k, in quo quidem plano est centrum gravitatis cylindri, uel cylindri portionis. Dico punctum K cylindri quoque, uel cylindri portionis gravitatis centrum esse. Si enim fieri potest, sit l centrum: ducaturq; k l, & extra figuram in m producat. quam uero proportionem habet linea m K ad k l


4. huius.

habeat circulus, uel ellipsis gh ad aliud spaciū, in quo ut
 & in circulo, uel ellipsi plane describatur rectilinea figura,
 ita ut tādē relinquātur portiones minores spacio u , quæ
 sit $opgqrsht$: descriptaq; simili figura in oppositis pla-
 nis cd, fe , per lineas sibi ipsis respondentes plana ducātur.
 Itaque cylindrus, uel cylindri portio diuiditur in prisma,
 cuius quidem basis est figura rectilinea iam dicta, centrum
 que grauitatis punctum K : & in multa solida, quæ pro basi
 bus habent relictas portiones, quas nos solidas portiones
 appellabimus. cum igitur portiones sint minores spacio
 u , circulus, uel ellipsis gh ad portiones maiorem propor-
 tionem habebit, quàm linea mk ad Kl . fiat nk ad Kl , ut
 circulus uel ellipsis gh ad ipsas portiones. Sed ut circulus
 uel ellipsis gh ad figuram rectilineam in ipsa descri-
 ptam, ita est cylindrus uel cylindri portio ce ad prisma,
 quod rectilineam figuram pro basi habet, & altitudinem
 æqualem; id, quod infra demonstrabitur. ergo per conuer-
 sionem rationis, ut circulus, uel ellipsis gh ad portiones re-
 lictas, ita cylindrus, uel cylindri portio ce ad solidas por-
 tiones, quare cylindrus uel cylindri portio ad solidas por-
 tiones eandem proportionem habet, quam linea nk ad kl
 & diuidendo prisma, cuius basis est rectilinea figura, ad so-
 lidas portiones eandem proportionem habet, quam nl ad
 lk . & quoniam a cylindro uel cylindri portione, cuius gra-
 uitatis centrum est l , aufertur prisma basim habens rectili-
 neam figurā, cuius centrū grauitatis est K : residuæ magnitu-
 dinis ex solidis portionibus cōpositæ grauitatis cētrū erit
 in linea kl protracta, & in puncto n ; quod est absurdū. relin-
 quitur ergo, ut cētrum grauitatis cylindri; uel cylindri por-
 tionis sit punctū k . quæ omnia demonstrāda proposuimus.

At uero cylindrum, uel cylindri portionē ce
 ad prisma, cuius basis est rectilinea figura in spa-
 cio gh descripta, & altitudo æqualis; eandem ha-
 bere

bere proportionem, quam spacium gh ad dictā figuram, hoc modo demonstrabimus.



Intelligatur circulus, uel ellipsis x æqualis figuræ rectilineæ in gh spacio descriptæ: & ab x constituatur conus, uel




coni portio, altitudinē habens eandē, quā cylindrus uel cylindri portio c . Sit deinde rectilinea figura, in qua y eadē, quæ in spacio gh descripta est: & ab hac pyramis æque alta constituatur. Dico conū uel conū portionē x pyramidi y æqualē esse. nisi enim sit æqualis, uel maior, uel minor erit.

Sit primum maior, et exuperet solido z . Itaque in circulo, uel ellipsi x describatur figura rectilinea; & in ea pyramis eandem, quam conus, uel conū portio altitudinem habens, ita ut portiones relictæ minores sint solido z , quemadmodum docetur in duodecimo libro elementorum propositione undecima. erit pyramis x adhuc pyramide y maior. & quoniam pyramides æque altæ inter se sunt, sicuti bases; pyramis x ad pyramidem y eandem proportionem habet, quàm figura rectilinea x ad figuram y . Sed figura recti

6. duodecimi.



linea x cum sit minor circulo, uel ellipfi, est etiam minor figura rectilinea y . ergo pyramis x pyramide y minor erit. Sed & maior; quod fieri nō potest. At si conus, uel conii portio x ponatur minor pyramide y : fit alter conus æque altus, uel altera conii portio χ ipsi pyramidi y æqualis. erit eius basis circulus, uel ellipfis maior circulo, uel ellipfi x , quorum excessus sit spacium ω . Si igitur in circulo, uel ellipfi χ figura rectilinea describatur, ita ut portiones relictæ sint ω spacio minores, eiusmodi figura adhuc maior erit circulo, uel ellipfi x , hoc est figura rectilinea y : & pyramis in ea constituta minor cono, uel conii portione χ , hoc est minor pyramide y . est ergo ut χ figura rectilinea ad figuram rectilineam y , ita pyramis χ ad pyramidem y . quare cum figura rectilinea χ sit maior figura y : erit & pyramis χ pyramide y maior. sed erat minor; quod rursus fieri non potest. non est igitur conus, uel conii portio x neque maior, neque minor pyramide y . ergo ipsi necessario est æqualis. Itaque quoniam ut conus ad conum, uel conii portio ad conii



ni portionem, ita est cylindrus ad cylindrum, uel cylindri portio ad cylindri portionem: & ut pyramis ad pyramidem, ita prisma ad prisma, cum eadem sit basis, & æqualis altitudo; erit cylindrus uel cylindri portio x prismati y æqualis, estq; ut spacium $g h$ ad spacium x , ita cylindrus, uel cylindri portio $c e$ ad cylindrum, uel cylindri portionem x . Constat igitur cylindrum uel cylindri portionē $c e$, ad prisma y , quippe cuius basis est figura rectilinea in spacio $g h$ descripta, eandem proportionem habere, quam spacium $g h$ habet ad spacium x , hoc est ad dictam figuram. quod demonstrandum fuerat. 7. quinti

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.

Si pyramis secetur plano basi æquidistante; sectio erit figura similis ei, quæ est basis, centrum grauitatis in axe habens.


16. undecimi

10. undecimi

16. undecimi
10. undecimi

libri


SIT pyramis, cuius basis triangulum abc ; axis de : & fecetur plano basi æquidistante; quod sectionē faciat fgh ; occurratq; axi in puncto k . Dico fgh triangulum esse, ipsi abc simile; cuius gravitatis centrum est K . Quoniã enim duo plana æquidistantia abc , fgh secantur à plano abd ; communes eorum sectiones ab , fg æquidistantes erunt: & eadem ratione æquidistantes ipsæ bc , gh : & ca , hf . Quòd cum duæ lineæ fg , gh , duabus ab , bc æquidistant, nec sint in eodem plano; angulus ad g æqualis est angulo ad b : & similiter angulus ad h angulo ad c : angulusq; ad f ei, qui ad a est æqualis. triangulum igitur fgh simile est triangulo abc . At uero punctum k centrum esse gravitatis trianguli fgh hoc modo ostendemus. Ducantur plana per axem, & per lineas da , db , dc : erunt communes sectiones fK , ae æquidistantes: pariterq; kg , eb ; & kh , ec : quare angulus kfh angulo $ea c$; & angulus kfg ipsi $ea b$ est æqualis. Eadem ratione anguli ad g angulis ad b : & anguli ad h iis, qui ad c æquales erunt. ergo puncta e K in triangulis abc , fgh similiter sunt posita, per sextam positionem Archimedis in libro de centro gravitatis planorum. Sed cum e sit centrum gravitatis trianguli abc , erit ex undecima propositione eiusdem libri, & K trianguli fgh gravitatis centrum. id quod demonstrare oportebat. Non aliter in ceteris pyramidibus, quod propositum est demonstrabitur.



PROBLEMA I. PROPOSITIO X.

DATA qualibet pyramide, fieri potest, ut figura solida in ipsa inscribatur, & altera circumscribatur ex prismatibus æqualem altitudinem habētibus, ita ut circumscripta inscriptam excedat magnitudine, quæ minor sit quacūque solida magnitudine proposita.

Sit pyramis, cuius basis triangulū a b c; axis d e. Sitq; prisma, quod eandē basim habeat, & axem eundem. Itaque hoc prismate continenter secto bifariam, plano basi æquidistāte, relinquetur tādē prisma quoddam minus proposita magnitudine: quod quidem basim eandem habeat, quam pyramis, & axem e f. diuidatur d e in partes æquales ipsi e f in punctis g h k l m n: & per diuisiones plana ducātur: quæ basibus æquidistant, erunt sectiones, triangula ipsi a b c similia, ut proxime ostendimus. ab uno quoque autē horum triangulorum duo prismata cōstruantur; unum quidem ad partes e; alterum ad



E


partes d. in pyramide igitur inscripta erit quædam figura, ex prismatibus æqualem altitudinem habentibus cõstans, ad partes e: & altera circumscripta ad partes d. Sed unumquodque eorum prismatum, quæ in figura inscripta continentur, æquale est prismati, quod ab eodem fit triangulo in figura circumscripta: nam prisma p q prismati p o est æquale; prisma s t æquale prismati s r; prisma x y prismati x u; prisma $\nu \theta$ prismati νz ; prisma μv prismati $\mu \lambda$; prisma $\rho \sigma$ prismati $\rho \pi$; & prisma $\phi \chi$ prismati $\phi \tau$ æquale. relinquitur ergo, ut circumscripta figura exuperet inscriptã prismate, quod basim habet a b c triangulum, & axem e f. Illud uero minus est solida magnitudine proposita. Eadẽ ratione inscribetur, & circumscribetur solida figura in pyramide, quæ quadrilateram, uel plurilaterã basim habeat.

PROBLEMA II. PROPOSITIO XI.

DATO cono, fieri potest, ut figura solida inscribatur, & altera circumscribatur ex cylindris æqualem habentibus altitudinem, ita ut circumscripta superet inscriptam, magnitudine, quæ solida magnitudine proposita fit minor.

SIT conus, cuius axis b d: & secetur plano per axem ducto, ut sectio sit triangulum a b c: intelligaturq; cylindrus, qui basim eandem, & eundem axem habeat. Hoc igitur cylindro continenter bifariam secto, relinquetur cylindrus minor solida magnitudine proposita. Sit autem is cylindrus, qui basim habet circulum circa diametrum a c, & axem d e. Itaque diuidatur b d in partes æquales ipsi d e in punctis f g h k l m: & per ea ducantur plana conum secantia; quæ basi æquidistant. erunt sectiones circuli, centra in axi habentes, ut in primo libro conicorum, propositione


trone quarta Apollonius demonstravit. Si igitur à singulis horum circulorum, duo cylindri fiant; unus quidem ad basis partes; alter ad partes uerticis: inscripta erit in cono solida quædam figura, & altera circumscripta ex cylindris æqualem altitudinem habentibus constans; quorum unusquisque, qui in figura inscripta continetur æqualis est ei, qui ab eodem fit circulo in figura circumscripta. Itaque cylindrus $o p$ æqualis est cylindro $o n$; cylindrus $r s$ cylindro $r q$; cylindrus $u x$ cylindro $u t$ est æqualis; & alii aliis similiter. quare constat circumscriptam figuram superare inscriptam cylindro, cuius basis est circulus circa diametrum $a c$, & axis $d e$. atque hic est minor solida magnitudine proposita.



PROBLEMA III. PROPOSITIO XII.

DATA conii portione, potest solida quædam figura inscribi, & altera circumscribi ex cylindri portionibus æqualem altitudinem habentibus; ita ut circumscripta inscriptam exuperet, magnitudine, quæ minor sit solida magnitudine proposita.

Figuram eiusmodi, & inscribemus, & circūscribemus, ita ut in cono dictum est.




PROBLEMA III. PROPOSITIO XIII.

DATA sphaeræ portione, quæ dimidia sphaera maior non sit, potest solida quædam portio inscribi & altera circumscribi ex cylindris æqualem altitudinem habentibus, ita ut circumscripta inscriptam excedat magnitudine, quæ solida magnitudine proposita sit minor.

HOC etiam eodem prorsus modo fiet: atque ut ab Archimede traditum est in conoidum, & sphaeroidum portionibus, propositione uigesima prima libri de conoidibus, & sphaeroidibus.

THEO




THEOREMA X. PROPOSITIO XIII.

Cuiuslibet pyramidis, & cuiuslibet coni, uel conii portionis, centrum grauitatis in axe cōsistit.


SIT pyramis, cuius basis triangulum $a b c$: & axis $d e$. Dico in linea $d e$ ipsius grauitatis centrum inesse. Si enim fieri potest, sit centrum f : & ab f ducatur ad basim pyramidis linea $f g$, axi æquidistans: iunctaq; $e g$ ad latera trianguli $a b c$ producat in h . quam uero proportionem habet linea $h e$ ad $e g$, habeat pyramis ad aliud solidum, in quo K : inscribaturq; in pyramide solida figura, & altera circumscribatur ex prismatibus æqualem habentibus altitudinem, ita ut circumscripta inscriptam exuperet magnitudine, quæ solidò k sit minor. Et quoniam in pyramide planum basi æquidistans ductum sectionem facit figuram similem ei, quæ est basis; centrumq; grauitatis in axe habentem: erit prismatis $s t$ grauitatis centrū in linea $r q$; prismatis $u x$ centrum in linea $q p$; prismatis $y z$ in linea $p o$; prismatis $\nu \theta$ in linea $o n$; prismatis $\lambda \mu$ in linea $n m$; prismatis $\nu \pi$ in $m l$; & denique prismatis $\rho \sigma$ in $l e$. quare to-

tius figuræ inscriptæ centrum grauitatis est in linea $r e$:
 quod sit τ :iū-
 ctaque τf , &
 producta, à
 puncto h du-
 catur linea a-
 xi pyramidis
 æquidistans,
 quæ cū linea
 τf conueniat
 in ϕ . habebit
 $\phi \tau$ ad τf ean-
 dem propor-
 tionem, quā
 $h e$ ad $e g$.
 Quoniam igitur
 excessus,
 quo circūscri-
 pta figura in-
 scripta supe-
 rat, minor est
 solido κ ; py-
 ramis ad eun-
 dē excessū ma-
 iorē propor-
 tionē habet,
 quā ad κ so-
 lidum: uideli-
 cet maiorem,
 quā linea h
 e ad $e g$; hoc
 est quā $\phi \tau$
 ad τf : & propterea multo maiorem habet ad partem ex-
 cessus, quæ intra pyramidem comprehenditur. Itaque ha-
 beat




beat eam, quam $\chi\tau$ ad τf . erit diuidendo ut χf ad $f\tau$, ita figura solida inscripta ad partem excessus, quæ est intra pyramidem. Cum ergo à pyramide, cuius grauitatis cētrum est punctum f , solida figura inscripta auferatur, cuius centrū τ : reliquæ magnitudinis constantis ex parte excessus, quæ est intra pyramidem, centrum grauitatis erit in linea τf producta, & in puncto χ . quod fieri non potest. Sequitur igitur, ut centrum grauitatis pyramidis in linea $d e$; hoc est in eius axe consistat.

Sit conus, uel conici portio, cuius axis $b d$: & secetur plano per axem, ut sectio fit triangulum $a b c$. Dico centrum grauitatis ipsius esse in linea $b d$. Sit enim, si fieri potest, centrū



e: perq; e ducatur e f axi æquidistans: & quam proportionem habet $c d$ ad $d f$, habeat conus, uel conici portio ad solidum g . inscribatur ergo in cono, uel conici portione soli

da figura, & altera circumscribatur ex cylindris, uel cylindri portionibus, sicuti dictum est, ita ut excessus, quo figura circumscripta inscriptam superat, sit solido g minor. Itaque centrum grauitatis cylindri, uel cylindri portionis $q r$ est in linea $p o$; cylindri, uel cylindri portionis $s t$ centrum in linea $o n$; centrum $u x$ in linea $n m$; $y z$ in $m b$; $\nu \delta$ in $l k$; $\lambda \mu$ in $K h$; & denique $\nu \pi$ centrum in $h d$. ergo figu-




ræ inscriptæ centrum est in linea $p d$. Sit autem p : & iuncta $p e$ protendatur, ut cum linea, quæ à pũcto c ducta fuerit axi æquidistans, conueniat in σ . erit σp ad $p e$, ut $c d$ ad $d f$: & conus, seu conici portio ad excessum, quo circumscripta figura inscriptam superat, habebit maiorem proportionem, quàm σp ad $p e$. ergo ad partem excessus, quæ intra ipsius superficiem comprehenditur, multo maiorem proportionem habebit. habeat eam, quam τp ad $p e$. erit diuidendo

diuidendo figura solida in scripta ad dictam excessus partem, ut τ e ad e ρ . & quoniam à cono, seu cono portione, cuius grauitatis centrum est e, aufertur figura in scripta, cuius centrum ρ : residuæ magnitudinis composiæ ex parte excessus, quæ intra cono, uel cono portione superficiem continetur, centrum grauitatis erit in linea ρ e protracta, atque in puncto τ . quod est absurdum. cõstat ergo centrũ grauitatis cono, uel cono portione, esse in axe b d: quod demonstrandum proposuimus.

THEOREMA XI. PROPOSITIO XV.

Cuiuslibet portione sphaeræ uel sphaeroidis, quæ dimidia maior non sit: itemq; cuiuslibet portione conoidis, uel abscissæ plano ad axem recto, uel non recto, centrum grauitatis in axe consistit.


Demonstratio similis erit ei, quam supra in cono, uel cono portione attulimus, ne toties eadem frustra iterentur.



THEOREMA XII. PROPOSITIO XVI.

In sphaera, & sphaeroide idem est grauitatis, & figurae centrum.

Secetur sphaera, uel sphaeroides plano per axem ducto; quod sectionem faciat circulum, uel ellipfim a b c d, cuius diameter, & sphaerae, uel sphaeroidis axis d b; & centrum e. Dico e grauitatis etiam centrum esse. secetur enim altero plano per e, ad planum secans recto, cuius sectio sit circulus circa diametrum a c, erunt a d c, a b c dimidiae portiones sphaerae, uel sphaeroidis. & quoniam portiones a d c grauitatis centrum est in linea d, & centrum portiones a b c in ipsa b e; totius sphaerae, uel sphaeroidis grauitatis centrum in axe d b consistet. Quod si portiones a d c centrum grauitatis ponatur esse f, & fiat ipsi f e aequalis e g: punctum g por-




per 2. pe-
titionem
4 Arch-
medis.

tionis a b c centrum erit. solidis enim figuris similibus & aequalibus inter se aptatis, & centra grauitatis ipsarum inter se aptentur necesse est. ex quo fit, ut magnitudinis, quae ex utroque constat, hoc est ipsius sphaerae, uel sphaeroidis grauitatis centrum sit in medio lineae f g, uidelicet in e. Sphaera igitur, uel sphaeroidis grauitatis centrum est idem, quod centrum figurae.

Ex

Ex demonstratis perspicue apparet, portioni sphaerae uel sphaeroidis, quae dimidia maior est, centrum grauitatis in axe consistere.


Data enim qualibet maiori portioe, quonia totius sphaerae, uel sphaeroidis grauitatis centrum est in axe; est autem & in axe centrum portio- nis minoris: reliquae portio- nis uidelicet maioris centrum in axe neces- sario consistet.



THEOREMA XIII. PROPOSITIO XVII.

Cuiuslibet pyramidis trian- gularis basim habetis gra- uitatis centrum est in pun- cto, in quo ipsius axes con- ueniunt.

Sit pyramis, cuius basim trian- gulum abc , axis de : sitq; trian- guli bdc grauitatis centrum f : & iungatur af . erit & a axis eius- dem pyramidis ex tertia diffini- tione huius. Itaque quoniam centrum grauitatis est in axe de ; est autem & in axe af ; quod proxime demonstraui



mus: erit utique grauitatis centrum pyramidis punctum
g: in quo scilicet ipsi axes conueniunt.



THEOREMA XIII. PROPOSITIO XVIII.

Si solidum parallelepipedum secetur plano
basibus æquidistante; erit solidum ad solidum,
sicut altitudo ad altitudinem, uel sicut axis ad
axem.

Sit solidum parallelepipedum $abcde fgh$, cuius axis kl : seceturq; plano basibus æquidistante, quod faciat sectionem $mno p$; & axi in puncto q occurrat. Dico solidum gm ad solidum mc eam proportionem habere, quam altitudo solidi gm habet ad solidi mc altitudinem; uel quam axis kq ad axem ql . Si enim axis Kl ad basis planum sit perpendicularis, & linea gc , quæ ex quinta huius ipsi kl æquidistat, perpendicularis erit ad idem planum, & solidi altitudinem dimetietur. Itaque solidum gm ad solidum mc eam proportionem habet, quam parallelogrammum gn ad parallelogrammum nc , hoc est quam linea go , quæ

27. undeci
mi.

i. sexti.



est

est solidi gm altitudo ad $o e$ altitudinem solidi mc , uel quā axis $k q$ ad $q l$ axem. Si uero axis $k l$ non sit perpendicularis ad planum basis; ducatur a puncto k ad idem planum perpendicularis $k r$, occurrēs plano $m n o p$ in s . similiter demōstrabimus solidum gm ad solidū mc ita esse, ut axis $k q$ ad axem $q l$. Sed ut $K q$ ad $q l$, ita $k s$ altitudo ad altitudinem $s r$; nam lineæ $K l$, $K r$ à planis æquidistantibus in eadem proportionem secantur. ergo solidum gm ad solidum mc eandē proportionem habet, quam altitudo ad altitudinē, uel quam axis ad axem. quod demōstrare oportebat.


17. undecimi

THEOREMA XV. PROPOSITIO XIX.

Solida parallelepipeda in eadem basi, uel in æqualibus basibus constituta eam inter se proportionem habent, quam altitudines: & si axes ipsorum cum basibus æquales angulos contineant, eam quoque, quam axes proportionem habebūt.

Sint solida parallelepipeda in eadē basi cōstituta $abcd$, $abef$: & sit solidi $abcd$ altitudo minor: producatu-
 tem planum cd adeo, ut solidum $abef$ secet; cuius sectio sit gh . erūt soli-
 da $abcd$, $abgh$

in eadem basi,
 & æquali altitu-
 dine inter se æ-
 qualia. Quoniā
 igitur solidum
 $abef$ secatur
 plano basibus
 æquidistāte, erit
 solidum $ghef$
 ad ipsum $abgh$



29. undecimi

18. huius

7. quinti. ut altitudo ad altitudinem: & componendo conuertendo que solidum a b g h, hoc est solidum a b c d ipsi æquale, ad solidum a b e f, ut altitudo solidi a b c d ad solidi a b e f altitudinem.



31. undecimi. Sint solida parallelepipeda a b, c d in æqualibus basibus constituta: sitq; b e altitudo solidi a b: & solidi c d altitudo d f; quæ quidem maior sit, quàm b e. Dico solidum a b ad solidum c d eandem habere proportionem, quam b e ad d f: abscindatur enim à linea d f æqualis ipsi b e, quæ sit g f: & per g ducatur planum secans solidum c d; quod basi bus æquidistet, faciatq; sectionē h k. erunt solida a b, c k æque

alta inter se æqualia cū æquales bases habeant.

18. huius Sed solidū h d ad solidum c k est, ut altitudo d g ad g f altitudinē; se

7. quinti. catur enim solidum c d plano basi bus æquidistante: & rursus cōponendo, conuertendoq; solidū c k ad solidum c d, ut g f ad f d. ergo solidum a b, quod est æquale ipsi c k ad solidum c d eam proportionem habet, quam altitudo g f, hoc est b e ad d f altitudinem.



Sint deinde solida parallelepipeda a b, a c in eadem basi; quorum axes d e, f e cum ipsa æquales angu



los

los contineant. Dico solidum ab ad solidum ac eadem habere proportionem, quam axis de ad axem ef . Si enim axes in eadem recta linea fuerint constituti, hæc duo solida, in unum, atque idem solidum conuenient. quare ex iis, quæ proxime tradita sunt, habebit solidum ab ad solidum ac eandem proportionem, quam axis de ad ef axem. Si uero axes non sint in eadem recta linea, demittantur a punctis d, f perpendiculares ad basis planum, dg, fh : & iungantur eg, eh . Quoniam igitur axes cum basibus æquales angulos continent, erit $d e g$ angulus æqualis angulo $f e h$: & sunt anguli $ad g h$ recti, quare, & reliquus $e d g$ æqualis erit reliquo $e f h$: & triangulum $d e g$ triangulo $f e h$ simile. ergo $g d$ ad $d e$ est, ut $h f$ ad $f e$: & permutando $g d$ ad $h f$, ut $d e$ ad $e f$. Sed solidum ab ad solidum ac eandem proportionem habet, quam $d g$ altitudo ad altitudinē $f h$. ergo & eandē habebit, quā axis de ad axē ef .

Postremo sint solida parallelepipeda ab, cd in



æqualibus basibus, quorum axes cum basibus æquales angulos faciant. Dico solidum a b ad solidū c d ita esse, ut axis e f ad axem g h : nam si axes ad planum basis recti sint, illud perspicue constat: quoniam eadem linea, & axem & solidi altitudinem determinabit. Si uero sint inclinati, à punctis e g ad subiectum planum perpendiculares ducantur e k, g l : & iungantur f k, h l. rursus quoniam axes cum basibus æquales faciunt angulos, eodem modo demonstrabitur, triangulum e f K triangulo g h l simile esse: & e k ad g l, ut e f ad g h. Solidum autem a b ad solidum c d est, ut e K ad g l. ergo & ut axis e f ad axem g h. quæ omnia demonstrare oportebat.

Ex iis quæ demonstrata sunt, facile constare potest, prismata omnia & pyramides, quæ triangulares bases habent, siue in eisdem, siue in æqualibus basibus constituentur, eandem proportionem habere, quam altitudines: & si axes cum basibus æquales angulos contineant, similiter eandem, quam axes, habere proportionem: sunt enim solida parallelepipeda prismatum triangulares bases habentiū dupla; & pyramidum sextupla.

15. quinti

28. undecimi.
7. duodecimi.


THEOREMA XVI. PROPOSITIO XX.

Prismata omnia & pyramides, quæ in eisdem, uel æqualibus basibus constituuntur, eam inter se proportionem habent, quam altitudines: & si axes cum basibus faciant angulos æquales, eam etiam, quam axes habent proportionem.

Sint

Sint duo prismata a e, a f, quorum eadem basis quadrilatera a b c d: sitq; prismatis a e altitudo e g; & prismatis a f altitudo f h. Dico prisma a e ad prisma a f eam habere proportionem, quam e g ad f h. iungatur enim a c: & in unoquoque prismate duo prismata intelligantur, quorum bases sint triangu-

la a b c, a c d. habebunt duo prismate in eadem basi a b c constituta, proportionem eadem, quam ipsorum altitudines e g, f h, ex iam demonstratis. & similiter alia duo, quæ sunt in basi a





c d. quare totum prisma a e ad prisma a f eandem proportionem habebit, quam altitudo e g ad f h altitudinem. Quòd cum prismata sint pyramidum tripla, & ipsæ pyramides, quarum eadem est basis quadrilatera, & altitudo prismatum altitudini æqualis, eam inter se proportionem habebunt, quam altitudines.

12. quinti

Si uero prismata bases æquales habeant, nō easdem, sint duo eiusmodi prismata a e, f l: & sit basis prismatis a e quadrilaterum a b c d; & prismatis f l quadrilaterum f g h k. Dico prisma a e ad prisma f l ita esse, ut altitudo illius ad huius altitudinem. nam si altitudo sit eadem, intelligantur duæ pyramides a b c d e, f g h k l, quæ inter se æquales erunt, cum æquales bases, & altitudinem eandem habeant. quare & prismata a e, f l, quæ sunt harum pyramidum tripla, æqualia sint necesse est. ex quibus perspicue constat propositum. Si uero altitudo prismatis f l sit maior, à prismate f l abscindatur prisma f m, quod æque altum sit, atq; ipsum a e,



6. duodecimi
15. quinti

erunt eadem ra-
tione prismata a
e, f m inter se æ-
qualia. quare si-
militer demon-
strabitur prisma
f m ad prisma f l
eandem habere
proportionem,
quam prismatis
f m altitudo ad
altitudinem ip-
sius f l. ergo & prisma a e ad prisma f l eandem propor-
tionem habebit, quam altitudo ad altitudinem. sequitur
igitur ut & pyramides, quæ in æqualibus basibus constituū-
tur, eandem inter se se, quam altitudines, proportionem
habeant.



Sint deinde prismata a e, a f in eadem basi a b c d; quorū
axes cum basibus æquales angulos contineant: & sit prif-
matis

matis a e axis gh; & prismatis a f axis l h. Dico prisma
 a e ad prisma a f eam proportionem habere, quam gh ad
 hl. ducantur à punctis g l perpendiculares ad basis pla-
 num g K, l m: & iungantur k h,
 h m. Itaque quoniam anguli g h
 k, l h m sunt æquales, similiter ut
 supra demonstrabimus, triangu-
 la gh K, l h m similia esse; & ut g
 K ad l m, ita gh ad hl. habet au-
 tem prisma a e ad prisma a f ean-
 dem proportionem, quam altitu-
 do g K ad altitudinem l m, sicuti
 demonstratum est. ergo & ean-
 dem habebit, quam gh, ad hl. py-
 ramis igitur a b c d g ad pyrami-
 dem a b c d l eandem proportio-
 nem habebit, quam axis gh ad hl axem.




Denique sint prismata a e, k o in æqualibus basibus a b
 c d, k l m n constituta; quorum axes cum basibus æquales
 faciant angulos: sitq; prismatis a e axis f g, & altitudo f h:
 prismatis autem k o axis p q, & altitudo p r. Dico prisma
 a e ad prisma k o ita esse, ut f g ad p q. iunctis enim g h,

q r, eodem, quo supra, modo ostendemus f g ad p q, ut f h ad p r. sed prisma a e ad ipsum κ o est, ut f h ad p r. ergo & ut f g axis ad axem p q. ex quibus fit, ut pyramis a b c d f ad pyrami-

dē κ l m n p eandem habeat proportionē, quā axis ad axē. quod demonstrā dū fuerat.

Simili ratione in aliis prismatibus & pyramidibus eadem demonstrabuntur.




THEOREMA XVII. PROPOSITIO XXI.

Prismata omnia, & pyramides inter se proportionem habent compositam ex proportione basium, & proportione altitudinum.

Sint duo prismata a e, g m: sitq; prismatis a e basis quadrilaterum a b c d, & altitudo e f: prismatis uero g m basis quadrilaterum g h k l, & altitudo m n. Dico prisma a e ad prisma g m proportionem habere compositam ex proportione basis a b c d ad basim g h k l, & ex proportione altitudinis e f, ad altitudinem m n.

Sint enim primum e f, m n æquales: & ut basis a b c d ad basim g h k l, ita fiat linea, in qua o ad lineam, in qua p: ut autem e f ad m n, ita linea p ad lineam q. erunt lineæ p q inter se æquales. Itaque prisma a e ad prisma g m eã
pro


proportionem habet, quam basis $a b c d$ ad basim $g h k l$: si enim intelligantur duæ pyramides $a b c d e, g h k l m$, habebunt hæ inter se proportionem eandem, quam ipsarum bases ex sexta duodecimi elementorum. Sed ut basis $a b c d$ ad $g h k l$ basim, ita linea o ad lineam p ; hoc est ad lineam q ei æqualem. ergo prisma $a e$ ad prisma $g m$ est, ut linea o ad lineam q . proportio autem o ad q cõposita est ex proportione o ad p , & ex proportione p ad q . quare prisma $a e$ ad prisma $g m$, & idcirco pyramis $a b c d e$, ad pyramidem $g h k l m$ proportionem habet ex eisdem proportionibus compositam, uidelicet ex proportione basis $a b c d$ ad basim $g h k l$, & ex proportione altitudinis $e f$ ad $m n$ altitudinem. Quòd si lineæ $e f, m n$ inæquales ponantur, sit $e f$ minor: & ut $e f$ ad $m n$, ita fiat linea p ad lineam u : de



inde ab ipsa $m n$ abscindatur $r n$ æqualis $e f$: & per r ducatur planum, quod oppositis planis æquidistans faciat sectionem $s t$. erit prisma $a e$, ad prisma $g t$, ut basis $a b c d$ ad basim $g h k l$; hoc est ut o ad p : ut autem prisma $g t$ ad prisma $g m$, ita altitudo $r n$; hoc est $e f$ ad altitudinē $m n$; uidelicet linea p ad lineam u . ergo ex æquali prisma $a e$ ad prisma $g m$ est, ut linea o ad ipsam u . Sed proportio o ad u cõposita est ex proportione o ad p , quæ est basis $a b c d$ ad basim $g h k l$; & ex proportione p ad u , quæ est altitudinis $e f$ ad altitudinem $m n$. prisma igitur $a e$ ad prisma $g m$

20. huius

compositam proportionem habet ex proportione basiū,
& proportione altitudinum. Quare & pyramis, cuius ba-
sis est quadrilaterum a b c d, & altitudo e f ad pyramidem,



cuius basis quadrilaterum g h k l, & altitudo m n, compo-
sitam habet proportionem ex proportione basium a b c d,
g h k l, & ex proportione altitudinum e f, m n. quod qui-
dem demonstrasse oportebat.

Ex iam demonstratis perspicuum est, prisma
ta omnia, & pyramides, in quibus axes cum basi-
bus æquales angulos continent, proportionem
habere compositam ex basium proportione, &
proportione axium. demonstratum est enim, a-
xes inter se eandem proportionem habere, quam
ipsæ altitudines.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XXII.

CVIVSLIBET pyramidis, & cuiuslibet coni,
uel

uel conii portionis axis à centro grauitatis ita diuiditur, ut pars, quæ terminatur ad uerticem reliquæ partis, quæ ad basim, sit tripla.


Sit pyramis, cuius basis triangulum abc ; axis de ; & grauitatis centrum k . Dico lineam dk ipsius k e triplam esse. trianguli enim bdc centrum grauitatis sit punctum f ; triânguli adc centrũ g ; & trianguli adb sit h : & iungantur af , bg , ch . Quoniam igitur centrũ grauitatis pyramidis in axe cõsistit: suntq; de , af , bg , ch eiusdẽ pyramidis axes: conuenient omnes in idẽ punctũ k , quod est grauitatis centrum.

17. huius

Itaque animo concipiamus hanc pyramidem diuisam in quatuor pyramides, quarum bases sint ipsa pyramidis triangula; & axis punctum k quæ quidem pyramides inter se æquales sunt, ut demõstrabitur.

uertex

Ducatur enĩ per lineas dc , de planum secãs, ut sit ipsius, & basis abc cõmunis sectio recta linea cl : eiusdẽ uero & triânguli adb sit linea dh . erit linea al æqualis ipsi lb : nam centrum grauitatis trianguli consistit in linea, quæ ab angulo ad dimidiam basim perducitur, ex tertia decima Archimedis, quare triangulum acl æquale est triangulo bcl : & propterea pyramis, cuius basis triangulum acl , uertex d , est æqualis pyramidi, cuius basis bcl triangulum, & idem uertex. pyramides enim, quæ ab eodẽ



I. sexti.



est triangulo bcl : & propterea pyramis, cuius basis triangulum acl , uertex d , est æqualis pyramidi, cuius basis bcl triangulum, & idem uertex. pyramides enim, quæ ab eodẽ

5. duodecimi.

sunt uertice, eandem proportionem habent, quam ipsarū bases. eadem ratione pyramis a c l k pyramidi b c l κ: & pyramis a d l k ipsi b d l κ pyramidi æqualis erit. Itaque si à pyramide a c l d auferantur pyramides a c l k, a d l k: & à pyramide b c l d auferantur pyramides b c l κ, d b l K: quæ relinquuntur erunt æqualia. æqualis igitur est pyramis a c d κ pyramidi b c d κ. Rursus si per lineas a d, d e ducatur planum quod pyramidem secet: sitq; eius & basis communis sectio a e m: similiter ostendetur pyramis a b d K æqualis pyramidi a c d κ. ducto denique alio plano per lineas c a, a f: ut eius, & trianguli c d b communis sectio sit c f n, pyramis a b c k pyramidi a c d κ æqualis demonstrabitur. cū ergo tres pyramides b c d k, a b d k, a b c k uni, & eidem pyramidi a c d k sint æquales, omnes inter se se æquales erūt. Sed ut pyramis a b c d ad pyramidem a b c κ, ita d e axis ad axem κ e, ex uigesima propositione huius: sunt enim hæ pyramides in eadem basi, & axes cum basibus æquales continent angulos, quòd in eadem recta linea constituantur. quare diuidendo, ut tres pyramides a c d k, b c d K, a b d K ad pyramidem a b c K, ita d k ad κ e. constat igitur lineam d K ipsius κ e triplam esse. sed & a κ tripla est K f: itemque b K ipsius K g: & c κ ipsius κ l tripla. quod eodem modo demonstrabimus.

Sit pyramis, cuius basis quadrilaterum a b c d; axis e f: & diuidatur e f in g, ita ut e g ipsius g f sit tripla. Dico centrum grauitatis pyramidis esse punctum g. ducatur enim linea b d diuidens basim in duo triangula a b d, b c d: ex quibus intelligatur cōstitui duæ pyramides a b d e, b c d e: sitque pyramidis a b d e axis e h; & pyramidis b c d e axis e K: & iungatur h K, quæ per f transibit: est enim in ipsa h K centrum grauitatis magnitudinis compositæ ex triangulis a b d, b c d, hoc est ipsius quadrilateri. Itaque centrum grauitatis pyramidis a b d e sit punctum l: & pyramidis b c d e sit m. ducta igitur l m ipsi h m lineæ æquidistabit: nam e l ad l h


I h eandem habet proportionem, quam e m ad m k, uidelicet
 cet triplam. quare linea l m ipsam e f secabit in puncto g;
 etenim e g ad g f est, ut e l ad l h. præterea quoniam h k, l m
 æquidistant, erunt triangula h e f, l e g similia: itemq; inter
 se similia f e k, g e m: & ut e f ad e g, ita h f ad l g: & ita f k ad
 g m. ergo ut h f ad l g, ita f k ad g m: & permutando ut h f
 ad f k, ita l g ad g m. sed cum h sit centrum trianguli a b d;
 & k triāguli b c d: punctū uero f totius quadrilateri a b c d
 centrum: erit ex 8. Archimedis de centro grauitatis plano
 rum h f ad f k, ut triangulum b c d ad triangulum a b d: ut
 autem b c d triangulum ad triangulum a b d, ita pyramis
 b c d e ad pyramidem a b d e. ergo
 linea l g ad g m erit, ut pyramis
 b c d e ad pyramidē a b d e. ex quo
 sequitur, ut totius pyramidis
 a b c d e punctum g sit grauitatis
 centrum. Rursus sit pyramis ba-
 sim habens pentagonum a b c d e:
 & axem f g: diuidaturq; axis in pū
 cto h, ita ut f h ad h g triplam habe
 at proportionem. Dico h grauita-
 tis centrū esse pyramidis a b c d e f.
 iungatur enim e b: intelligaturq;
 pyramis, cuius uertex f, & basis
 triangulum a b e: & alia pyramis
 intelligatur eundem uerticem ha-
 bens, & basim b c d e quadrilaterū:
 sit autem pyramidis a b e f axis f k,
 & grauitatis centrum l: & pyrami-
 dis b c d e f axis f m, & centrum gra-
 uitatis n: iunganturq; k m, l n;
 quæ per puncta g h transibunt.
 Rursus eodem modo, quo sup ra,
 demonstrabimus lineas k g m, l h n sibi ipsis æquidistare:



H

& denique punctum h pyramidis a b c d e f grauitatis esse centrum, & ita in aliis.

Sit conus, uel conij portio axem habens b d: seceturque plano per axem, quod sectionem faciat triangulum a b c: & b d axis diuidatur in e, ita ut b e ipsius e d sit tripla. Dico punctum e conij, uel conij portionis, grauitatis esse centrum. Si enim fieri potest, sit centrum f: & producatu r e f extra figuram in g. quam uero proportionem habet g e ad e f, habeat basis conij, uel conij portionis, hoc est circulus, uel ellipsis circa diametrum a c ad aliud spacium, in quo h. Itaque in circulo, uel ellipsi plane describatur rectilinea figura a k l m c n o p, ita ut quæ relinquuntur portiones sint minores spacio h: & intelligatur pyramis basim habens rectilineam figuram a k l m c n o p, & axem b d; cuius quidem grauitatis centrum erit punctum e, ut iam demonstraui. Et quoniam portiones sunt minores spacio h, circulus, uel ellipsis ad portiones ma-



io rem proportionem habet, quam g e ad e f. sed ut circulus, uel ellipsis ad figuram rectilineam sibi inscriptam, ita conus, uel conij portio ad pyramidem, quæ figuram rectilineam pro basi habet; & altitudinem æqualem: etenim supra

pra demonstratum est, ita esse cylindrum, uel cylindri por- 8. huius
tionem ad prisma, cuius basis rectilinea figura, & æqua-
lis altitudo. ergo per conuersionem rationis, ut circulus,
uel ellipsis ad portiones, ita conus, uel conij portio ad por-
tiones solidas. quare conus uel conij portio ad portiones
solidas maiorem habet proportionem, quam ge ad ef : &
diuidendo, pyramis ad portiones solidas maiorem pro-
portionem habet, quam gf ad fe . fiat igitur qf ad fe
ut pyramis ad dictas portiones. Itaque quoniam à cono
uel conij portione, cuius grauitatis centrum est f , aufer-
tur pyramis, cuius centrum e ; reliquæ magnitudinis,
quæ ex solidis portionibus constat, centrum grauitatis
erit in linea ef protracta, & in puncto q . quod fieri
non potest: est enim centrum grauitatis intra. Constat
igitur conij, uel conij portionis grauitatis centrum esse pun-
ctum e . quæ omnia demonstrare oportebat.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXIII.

QVODLIBET frustum à pyramide, quæ
triangularem basim habeat, abscissum, diuiditur
in tres pyramides proportionales, in ea proportio-
ne, quæ est lateris maioris basis ad latus minoris
ipsi respondens.

Hoc demonstrauit Leonardus Pisanus in libro, qui de
praxi geometriæ inscribitur. Sed quoniam is adhuc im-
pressus non est; nos ipsius demonstrationem breuiter
perstringemus, rem ipsam secuti, non uerba. Sit fru-
stum pyramidis $abcde$, cuius maior basis triangulum
 abc , minor def : & iunctis ae , ec , cd , per line-
as ae , ec ducatur planum secans frustum: itemque per
lineas ec , cd ; & per cd , da alia plana ducantur, quæ
diuident frustum in tres pyramides $abce$, $adce$, $defc$.

1. sexti.

5. duodecimi.


11. quinti.

4. sexti.

Dico eas proportionales esse in proportione, quæ est lateris ab ad latus de , ita ut earum maior sit abe , media $adce$, & minor $defc$. Quoniam enim lineæ de , ab æquidistant; & inter ipsas sunt triangula abe , ade ; erit triangulum abe

ad triangulum ade , ut linea ab ad lineam de . ut autem triangulum abe ad triangulum ade , ita pyramis $abec$ ad pyramidem $adec$: habent enim altitudinem eandem, quæ est à puncto c ad planum, in quo quadrilaterum $abed$. ergo ut ab ad de , ita pyramis $abec$ ad pyramidem $adec$.

Rursus quoniam æquidistantes sunt ac , df ; erit eadem ratione pyramis $adce$ ad pyramidem $cdfe$, ut ac ad df . Sed ut ac ad df , ita ab ad de , quoniam triangula abc , def similia sunt, ex nona huius. quare ut pyramis $abec$ ad pyramidem $adce$, ita pyramis $adce$ ad ipsam $cdfe$. frustum igitur $abcdfe$ diuiditur in tres pyramides proportionales in ea proportione, quæ est lateris ab ad de latus, & earum maior est abe , media $adce$, & minor $defc$. quod demonstrare oportebat.




PROBLEMA V. PROPOSITIO XXIII.

QVODLIBET frustum pyramidis, uel conii, uel conii portionis, plano basi æquidistanti ita secare, ut sectio sit proportionalis inter maiorem, & minorem basim.

Sit

SIT frustum pyramidis a e, cuius maior basis triangulum a b c, minor d e f: & oporteat ipsum plano, quod basi æquidistet, ita secare, ut sectio sit proportionalis inter triângula a b c, d e f. Inueniatur inter lineas a b, d e media proportionalis, quæ sit b g: & à puncto g erigatur g h æquidistans b e, secansq; a d in h: deinde per h ducatur planum basibus æquidistans, cuius sectio sit triangulum h k l. Dico triangulum h k l proportionale esse inter triangula a b c, d e f, hoc est triangulum a b c ad triangulum h k l eandem habere proportionem, quam triângulum h k l ad ipsum d e f. Quoniã enim lineæ a b, h k æquidistantium planorum sectiones inter se æquidistant: atque æquidistant b k, g h: linea h k ipsi g b est æqualis: & propterea proportionalis inter a b, d e. quare ut a b ad h k, ita est h k ad d e. fiat ut h k ad d e, ita d e ad aliam lineam, in qua sit m. erit ex æquali ut a b ad d e, ita h k ad m. Et quoniam triangula a b c, h k l, d e f similia sunt; triangulũ a b c ad triangulum h k l est, ut linea a b ad lineam d e: triangulũ autem h k l ad ipsum d e f est, ut h k ad m. ergo triangulum a b c ad triangulum h k l eandem proportionem habet, quam triangulum h k l ad ipsum d e f. Eodem modo in aliis frustis pyramidis idem demonstrabitur.



16. undecimi

34. primi


9. huius corol.
20. sexti

11. quinti

Sit frustum conii, uel conii portionis a d: & secetur plano per axem, cuius sectio sit a b c d, ita ut maior ipsius basis sit circulus, uel ellipsis circa diametrum a b; minor circa c d. Rursus inter lineas a b, c d inueniatur proportionalis b e: & ab e ducta e f æquidistante b d, quæ lineam c a in f secet,

2. duode-
cimi

per f planum basibus æquidistans ducatur, ut sit sectio cir-
culus, uel ellipsis circa diametrum $f g$. Dico sectionem $a b$
ad sectionem $f g$ eandem proportionem habere, quam $f g$
ad ipsam $c d$. Simili enim ratione, qua supra, demonstrabi-
tur quadratum $a b$ ad quadratum $f g$ ita esse, ut quadratū
 $f g$ ad $c d$ quadratum. Sed circuli inter se eandem propor-
tionem habent, quam diametrorum quadrata. ellipses au-
tem circa $a b, f g, c d$, quæ similes sunt, ut ostendimus in cō-
mentariis in principium libri Archimedis de conoidibus,
& spheroidibus, eam habēt proportionem, quam quadra-
ta diametrorum, quæ eiusdem rationis sunt, ex corollario
septimæ propositionis eiusdem li-
bri. ellipses enim nunc appello ip-
sa spacia ellipsis contenta. ergo
circulus, uel ellipsis $a b$ ad circulū,
uel ellipsim $f g$ eam proportionem
habet, quam circulus, uel ellipsis
 $f g$ ad circulum uel ellipsim $c d$.
quod quidem faciendum propo-
suimus.




THEOREMA XX. PROPOSITIO XXV.


QVODLIBET frustum pyramidis, uel conī,
uel conī portionis ad pyramidem, uel conum, uel
conī portionem, cuius basis eadem est, & æqualis
altitudo, eandem proportionē habet, quam utræ
que bases, maior, & minor simul sumptæ vnà cū
ea, quæ inter ipsas sit proportionalis, ad basim ma-
iorem.

Sit

SIT frustum pyramidis, uel conii, uel conii portionis a d, cuius maior basis a b, minor c d. & secetur altero plano basi æquidistante, ita ut sectio e f sit proportionalis inter bases a b, c d. constituatur autem pyramis, uel conus, uel conii portio a g b, cuius basis sit eadem, quæ basis maior frusti, & altitudo æqualis. Dico frustum a d ad pyramidem, uel conum, uel conii portionem a g b eandem proportionem habere, quàm utræque bases, a b, c d unà cum e f ad basim a b. est enim frustum a d æquale pyramidi, uel cono, uel conii portio, cuius basis ex tribus basibus a b, e f, c d constat; & altitudo ipsius altitudini est æqualis: quod mox ostendemus. Sed pyrami-



des, conii, uel conii portiones, quæ sunt æquali altitudine, eadem inter se, quam bases, proportionem habent, sicuti demonstratum est, partim ab Euclide in duodecimo libro elementorum, partim à nobis in cõmentariis in undecimam propositionem Archimedis de conoidibus, & spheroidibus. quare pyramis, uel conus, uel conii portio, cuius basis est tribus illis basibus æqualis ad a g b eam habet proportionem, quam bases a b, e f, c d ad a b basim. Frustum igitur a d ad a g b




6.11. duo
decimi

pyramidem, uel conum, uel conii portionem eandem proportionem habet, quam bases $a b, c d$ unà cum $e f$ ad basim $a b$: quod demonstrare uolebamus.


Frustum uero $a d$ æquale esse pyramidi, uel cono, uel conii portioni, cuius basis constat ex basibus $a b, c d, e f$, & altitudo frusti altitudini est æqualis, hoc modo ostendemus.

Sit frustum pyramidis $a b c d e f$, cuius maior basis triangulum $a b c$; minor $d e f$: & secetur plano basi-stante, quod sectionem faciat triangulum $g h k$ inter triangula $a b c, d e f$ proportionale. Iam ex iis, quæ demonstrata sunt in 23. huius, patet frustum $a b c d e f$ diuidi in tres pyramides proportionales; & earum maiorem esse pyramidem $a b c d$ minorem uero $d e f b$. ergo pyramis à triangulo $g h k$ constituta, quæ altitudinem habeat frusti altitudini æqualem, proportionalis est inter pyramides $a b c d, d e f b$: & idcirco frustum $a b c d e f$ tribus dictis pyramidibus æquale erit. Itaque si intelligatur alia pyramis æque alta, quæ basim habeat ex tribus basibus $a b c, d e f, g h k$ constantem; perspicuum est ipsam eisdem pyramidibus, & propterea ipsi frusto æqualem esse.



Rursus sit frustum pyramidis $a g$, cuius maior basis quadrilaterum $a b c d$, minor $e f g h$: & secetur plano basi-stante, ita ut fiat sectio quadrilaterum $K l m n$, quod sit proportionale inter quadrilatera $a b c d, e f g h$. Dico pyramidem, cuius basis sit æqualis tribus quadrilateris $a b c d, k l m n, e f g h$, & altitudo æqualis altitudini frusti, ipsi frusto $a g$ æqualem esse. Ducatur enim planum per lineas $f b, h d$, quod

quod dividat frustum in duo frustra triangulares bases habentia, videlicet in frustum $a b d e f h$, & in frustum $b c d f g h$. erit triangulum $k l n$ proportionale inter triangula $a b d$, $e f h$: & triangulum $l m n$ proportionale inter $b c d$, $f g h$. sed pyramis æque alta, cuius basis constat ex tribus triangulis $a b d$, $k l n$, $e f h$, demonstrata est frusto $a b d e f h$ æqualis: & similiter pyramis, cuius basis constat ex triangulis $b c d$, $l m n$, $f g h$ æqualis frusto $b c d f g h$: componuntur autem tria quadrilatera $a b c d$, $k l m n$, $e f g h$ è sex triangulis iam dictis, pyramis igitur basim habens æqualem tribus quadrilateris, & altitudinem eandem ipsi frusto $a g$ est æqualis. Eodem modo illud demonstrabitur in aliis eiusmodi frustis.




Sit frustum conii, uel conii portionis $a d$; cuius maior basis circulus, uel ellipsis circa diametrum $a b$; minor circa $c d$: & secetur plano, quod basibus æquidistet, faciatq; sectionem circulum, uel ellipsem circa diametrum $e f$, ita ut inter circulos, uel ellipses $a b$, $c d$ sit proportionalis. Dico conum, uel conii portionem, cuius basis est æqualis tribus circulis, uel tribus ellipsis $a b$, $e f$, $c d$; & altitudo eadem, quæ frusti $a d$, ipsi frusto æqualem esse. producatu enim frusti superficies quousque coeat in unum punctum, quod sit g : & conii, uel conii portionis $a g b$ axis sit $g h$, occurrens planis $a b$, $e f$, $c d$ in punctis $h k l$: circa circulum uero describatur quadratum $m n o p$, & circa ellipsem rectangulum $m n o p$, quod ex ipsius diametris constat: iunctisq; $g m$, $g n$, $g o$, $g p$, ex eodem uertice intelligatur pyramis basim habens dictum quadratum, uel rectangulum: & plana in quibus sunt circuli, uel ellipses $e f$, $c d$ usque ad eius latera

9. huius

2. duode-
cimi.

7. de co-
noidibus
& sphae-
roidibus

producantur. Quoniam igitur pyramis secatur planis basi æquidistantibus, sectiones similes erunt: atque erunt quadrata, uel rectangula circa circulos, uel ellipses descripta, quemadmodum & in ipsa basi. Sed cum circuli inter se eã proportionem habeant, quam diametrorum quadrata: itemq; ellipses eam quam rectangula ex ipsarum diametris constantia: & sit circulus, uel ellipsis circa diametrum e f



proportionalis inter circulos, uel ellipses a b, c d; erit re-
ctangulum e f etiam inter rectangula a b, c d proportio-
nale: per rectangulum enim nunc breuitatis causa etiã ip-
sum quadratum intelligemus. quare ex iis, quæ proxime
dicta sunt, pyramis basim habens æqualem dictis rectangu-
lis, & altitudinem eandem, quam frustum a d, ipsi frusto à
pyramide abscisso æqualis probabitur. ut autem rectangu-
lum c d ad rectangulũ e f, ita circulus, uel ellipsis c d ad e f
circulum, uel ellipsim: componendoq; ut rectangula c d,
e f, ad e f rectangulum, ita circuli, uel ellipses e d, e f, ad e f:
& ut rectangulum e f ad rectangulum a b, ita circulus, uel
ellipsis e f ad a b circulum, uel ellipsim: ergo ex æquali, &
componendo, ut rectangula c d, e f, a b ad ipsum a b, ita cir-
culi,

culi, uel ellipses $c d, e f a b$ ad circulum, uel ellipsum $a b$. Intelligatur pyramis q basim habens æqualem tribus rectangulis $a b, e f, c d$; & altitudinem eandem, quam frustum $a d$. intelligatur etiam conus, uel conii portio q , eadem altitudine, cuius basis sit tribus circulis, uel tribus ellipsis $a b, e f, c d$ æqualis. postremo intelligatur pyramis $a l b$, cuius basis sit rectangulum $m n o p$, & altitudo eadem, quæ frusti: itemq; intelligatur conus, uel conii portio $a l b$, cuius basis circulus, uel ellipsis circa diametrum $a b$, & eadem altitudo. ut igitur rectangula $a b, e f, c d$ ad rectangulum $a b$, ita pyramis q ad pyramidem $a l b$; & ut circuli, uel ellipses $a b, e f, c d$ ad $a b$ circulum, uel ellipsum, ita conus, uel conii portio q ad conum, uel conii portionem $a l b$. conus igitur, uel conii portio q ad conum, uel conii portionem $a l b$ est, ut pyramis q ad pyramidem $a l b$. sed pyramis $a l b$ ad pyramidem $a g b$ est, ut altitudo ad altitudinem, ex 20. huius: & ita est conus, uel conii portio $a l b$ ad conum, uel conii portionem $a g b$ ex 14. duodecimi elementorum, & ex iis, quæ nos demonstrauimus in commentariis in undecimam de conoidibus, & sphaeroidibus, propositione quarta. pyramis autem $a g b$ ad pyramidem $c g d$ proportionem habet compositam ex proportione basium & proportione altitudinum, ex uigesima prima huius: & similiter conus, uel conii portio $a g b$ ad conum, uel conii portionem $c g d$ proportionem habet compositam ex eisdem proportionibus, per ea, quæ in dictis commentariis demonstrauimus, propositione quinta, & sexta: altitudo enim in utrisque eadem est, & bases inter se eandem habent proportionem. ergo ut pyramis $a g b$ ad pyramidem $c g d$, ita est conus, uel conii portio $a g b$ ad $a g d$ conum, uel conii portionem: & per conuersionem rationis, ut pyramis $a g b$ ad frustum à pyramide abscissum, ita conus uel conii portio $a g b$ ad frustum $a d$. ex æquali igitur, ut pyramis q ad frustum à pyramide abscissum, ita conus uel conii portio q ad

6. r. duo
decimi

frustum a d. Sed pyramis q æqualis est frusto à pyramide abscisso, ut demonstrauius. ergo & conus, uel conij portio q, cuius basis ex tribus circulis, uel ellipsis a b, e f, c d constat, & altitudo eadem, quæ frusti: ipsi frusto a d est æqualis. atque illud est, quod demonstrare oportebat.


THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXVI.

C. V I V S L I B E T frusti à pyramide, uel cono, uel conij portione abscissi, centrum grauitatis est in axe, ita ut eo primum in duas portiones diuiso, portio superior, quæ minorem basim attingit ad portionem reliquam eam habeat proportionem, quam duplum lateris, uel diametri maioris basis, vnà cum latere, uel diametro minoris, ipsi respondente, habet ad duplum lateris, uel diametri minoris basis vnà cū latere, uel diametro maioris: deinde à puncto diuisionis quarta parte superioris portionis in ipsa sumpta: & rursus ab inferioris portionis termino, qui est ad basim maiorem, sumpta quarta parte totius axis: centrum sit in linea, quæ his finibus continetur, atque in eo lineæ puncto, quo sic diuiditur, ut tota linea ad partem propinquiorem minori basi, eadem proportionem habeat, quam frustum ad pyramidē, uel conum, uel conij portionem, cuius basis sit eadem, quæ basis maior, & altitudo frusti altitudini æqualis.


Sit frustum a e a pyramide, quæ triangularem basim habeat abscissum: cuius maior basis triangulum a b c, minor d e f; & axis g h. ducto autem plano per axem & per lineã da, quod sectionem faciat da κ l quadrilaterum; puncta K l lineas b c, e f bifariam secabunt. nam cum g h sit axis frusti: erit h centrum grauitatis trianguli a b c: & g

3. diffi. huius.

centrum uero cuiuslibet trianguli est in recta linea, quæ ab angulo ipsius ad dimidiã basim ducitur ex decimatertia primi libri Archimedis de cẽtro grauitatis planorum. quare centrũ grauitatis trapezii b c f e est in linea K l, quod sit m: & à puncto m ad axem ducta m n ipsi a k, uel d l æquidistante; erit axis g h diuisus in portiones g n, n h, quas diximus: eandem enim proportionem habet g n ad n h, quã l m ad m k. At l m ad m K habet eam, quã duplum lateris maioris basis b c unã cum latere minoris e f ad duplum lateris e f unã cum latere b c, ex ultima eiusdem libri Archimedis. Itaque à linea n g abscindatur, quarta




Ultima e. iusdẽ libri Archimedis.



pars, quæ sit n p: & ab axe h g abscindatur itidem quarta pars h o: & quam proportionem habet frustum ad pyramidem, cuius maior basis est triangulum a b c, & altitudo ipsi æqualis; habeat o p ad p q. Dico centrum grauitatis frusti esse in linea p o, & in puncto q. namque ipsum esse in linea g h manifeste constat. protractis enim frusti pla

nis, quousque in unum punctum r conueniant; erit pyramidis $abc r$, & pyramidis $def r$ grauitatis centrum in linea rh . ergo & reliquæ magnitudinis, uidelicet frusti centrum in eadem linea necessario comperietur. Iungantur db, dc, dh, dm : & per lineas db, dc ducto altero plano intelligatur frustum in duas pyramides diuisum: in pyramidem quidem, cuius basis est triangulum abc , uertex d : & in eam, cuius idem uertex, & basis trapezium $b c f e$. erit igitur pyramidis $abcd$ axis dh , & pyramidis $b c f e d$ axis dm : atque erunt tres axes gh, dh, dm in eodem plano $da Kl$. ducatur præterea per o linea st ipsi $a K$ æquidistans, quæ lineam dh in u secet: per p uero ducatur xy æquidistans eidem, secansque dm in z : & iungatur zu , quæ secet gh in ϕ . transibit ea per q : & erunt ϕq unum, atque idem punctum; ut inferius apparebit. Quoniam igitur linea uo æquidistat ipsi dg , erit du ad uh , ut go ad oh . Sed go tripla est oh . quare & du ipsius uh est tripla: & ideo pyramidis $abcd$ centrum grauitatis erit punctum u . Rursus quoniam zy ipsi dl æquidistat, dz ad zm est, ut ly ad ym : estque ly ad ym , ut gp ad pn . ergo dz ad zm est, ut gp ad pn . Quòd cum gp sit tripla pn ; erit etiam dz ipsius zm tripla. atque ob eandem causam punctum z est centrū grauitatis pyramidis $b c f e d$. iuncta igitur zu , in ea erit cētrum

2. sexti.



gra-

grauitatis magnitudinis, quæ ex utrisque pyramidibus constat; hoc est ipsius frusti. Sed frusti centrum est etiam in axe gh . ergo in puncto ϕ , in quo lineæ zu, gh conueniunt. Itaque $u\phi$ ad ϕz eam proportionem habet, quam pyramis $b c f e d$ ad pyramidem $a b c d$. & componendo uz ad $z\phi$ eam habet, quam frustum ad pyramidem $a b c d$. Ut uero uz ad $z\phi$, ita op ad $p\phi$ ob similitudinem triangulorum, $u o \phi, z p \phi$. quare op ad $p\phi$ est ut frustum ad pyramidem $a b c d$. sed ita erat op ad $p q$. æquales igitur sunt $p\phi, p q$: & $q\phi$ unum atque idem punctum. ex quibus sequitur lineam zu secare op in q : & propterea punctum q ipsius frusti grauitatis centrum esse.


8. primi
libri Ar-
chimedris
de cetro
grauita-
tis plano-
rum
7. quinti.

Sit frustum ag à pyramide, quæ quadrangularem basim habeat abscissum, cuius maior basis $abcd$, minor $efgh$, & axis kl . diuidatur autem primū kl , ita ut quam proportionem habet duplum lateris ab unā cum latere ef ad duplum lateris ef unā cum ab ; habeat km ad ml . deinde à puncto m ad k sumatur quarta pars ipsius mk , quæ sit mn . & rursus ab l sumatur quarta pars totius axis lk , quæ sit lo . postremo fiat on ad np , ut frustum ag ad pyramidē, cuius basis sit eadem, quæ frusti, & altitudo æqualis. Dico punctum p frusti ag grauitatis centrum esse. ducantur enim ac, eg : & intelligantur duo frustra triangulares bases habentia, quorum alterum lf ex basibus abc, efg cōstet; alterum lh ex basibus acd, egh . Sitq; frusti lf axis qr ; in quo grauitatis centrum s : frusti uero lh axis tu , & x grauitatis centrum: deinde iungantur ur, tq, xs . transibit ur per l : quoniam l est centrum grauitatis quadranguli $abcd$: & puncta ru grauitatis centra triangulorum abc, acd ; in quæ quadrangulum ipsum diuiditur. eadem quoque ratione tq per punctum k transibit. At uero proportionem, ex quibus frustorum grauitatis centra inquiremus, eadem sunt in toto frusto ag , & in frustis lf, lh . Sunt enim per octauam huius quadrilatera $abcd, efg h$ similia:

F E D. C O M M A N D I N I

itemq; similia triangula a b c, e f g: & a c d, e g h. idcircoq; latera sibi ipsis respondentia eandem inter se se proportionem seruant. Vt igitur duplum lateris a b unà cum latere e f ad duplum lateris e f unà cum a b, ita est duplum a d lateris unà cum latere e h ad duplum e h unà cum a d: & ita in aliis.

Rursus frustum a g ad pyramidē, cuius eadem est basis, & æqualis altitudo eandem proportionē habet, quam frustū l f ad pyramidē, quæ est eadē basi, & æquali altitudine: & similiter quam l h frustum ad pyramidē, quæ ex eadē basi, & æquali altitudine constat. nam si inter ipsas bases mediæ proportionales constituan-



e. sexti .

tur, tres bases simul sumptæ ad maiorem basim in omnibus eodem modo se habebunt. Vnde fit, ut axes Kl, q r, t u à punctis p s x in eandem proportionem secentur. ergo. linea x s per p transibit: & lineæ r u, s x, q t inter se æquidistantes erunt. Itaque cum frusti a g latera producta

ducta fuerint, ita ut in unum punctum y cocant, erunt tria
 gala uyl, xyp, tyk inter se similia: & similia etiam triangu-
 la lyr, pys, kyq . quare ut in 19 huius, demonstrabitur
 $xp, ad ps$: itemq; tk ad lq eandem habere proportionem,
 quam ul ad lr . Sed ut ul ad lr , ita est triangulum abc ad
 triangulum acd : & ut tk ad Kq , ita triangulum efg ad
 triangulum $efgh$. Vt autem triangulum abc ad triangu-
 lum acd , ita pyramis bcy ad pyramidem acd . & ut
 triangulum efg ad triangulum $efgh$, ita pyramis $efgy$
 ad pyramidem $efghy$; ergo ut pyramis bcy ad pyramidem
 acd , ita pyramis $efgy$ ad pyramidem $efghy$. reliquum
 igitur frustum $l f$ ad reliquum frustum lh est ut pyramis bcy
 ad pyramidem acd , hoc est ut ul ad lr , & ut xp ad ps .
 Quod cum frusti lf centrum gravitatis sit s : & frusti lh sit
 centrum x : constat punctum p totius frusti ag gravitatis
 esse centrum. Eodem modo fiet demonstratio etiam in
 aliis pyramidibus.

19. quinti

8. Archi-
 medis.

Sit frustum ad à cono, uel cono portione abscissum, cu-
 ius maior basis circulus, uel ellipsis circa diametrum ab ;
 minor circa diametrum cd : & axis ef . diuidatur autem ef
 in g , ita ut eg ad gf eandem proportionem habeat, quam
 duplum diametri ab unà cum diametro cd ad duplum cd
 unà cum ab . Sitq; gh quarta pars lineæ ge : & sit fK item
 quarta pars totius fe axis. Rursus quam proportionem
 habet frustum ad ad conum, uel cono portione, in eadē
 basi, & æquali altitudine, habeat linea Kh ad hl . Dico pun-
 ctum l frusti ad gravitatis centrum esse. Si enim fieri po-
 test, sit m centrum: producaturnq; lm extra frustum in n :
 & ut nl ad lm , ita fiat circulus, uel ellipsis circa diametrum
 ab ad aliud spacium, in quo sit o . Itaque in circulo, uel
 ellipsi circa diametrum ab rectilinea figura plane descri-
 batur, ita ut quæ relinquuntur portiones sint o spacio mi-
 nores: & intelligatur pyramis apb , basim habens rectili-
 neam figuram in circulo, uel ellipsi ab descriptam: à qua

K

FED. COMMANDINI

frustum pyramidis sit abscissum. erit ex iis quæ proxime tradidimus, frusti pyramidis a d centrum grauitatis l. Quoniam igitur portiones spacio o minores sunt; habebit circulus, uel ellipsis a b ad


portiones dictas maiorē proportionem, quàm n l ad l m. sed ut circulus, uel ellipsis a b ad portiones, ita a p b conus, uel coniportio ad solidas portiones, id quod supra demonstratum est: & ut circulus

22. huius

uel ellipsis c d ad portiones, quæ ipsi insunt, ita conus, uel coniportio c p d ad solidas ipsius portiones. Quòd cum figuræ in circulis, uel ellipsis a b c d descriptæ similes sint, erit proportio circuli, uel ellipsis a b ad suas portiones, eadē, quæ circuli uel ellipsis c d ad suas. ergo conus, uel coniportio a p b ad portiones solidas eadēdem habet proportionē, quam conus, uel coniportio c p d ad solidas ipsius portiones.

19. quinti

portiones. reliquum igitur coniportionis frustū, scilicet a d ad reliquas portiones solidas in ipso contentas eandem proportionē habet, quam conus, uel coniportio a p b ad solidas portiones: hoc est eandem, quam circulus, uel ellipsis a b ad portiones planas. quare frustum coniportionis a d ad



ad portiones solidas maiorem habet proportionē, quàm nl ad lm : & diuidendo frustum pyramidis ad dictas portiones maiorem proportionem habet, quàm nm ad ml . fiat igitur ut frustum pyramidis ad portiones, ita qm ad ml . Itaque quoniam à frusto conī, uel conī portionis ad , cuius grauitatis centrum est m , aufertur frustum pyramidis habens centrum l ; erit reliquæ magnitudinis, quæ ex portionibus solidis constat; grauitatis cētrum in linea lm producta, atque in puncto q , extra figuram posito: quod fieri nullo modo potest. relinquatur ergo, ut punctum l sit frusti ad grauitatis centrum. quæ omnia demonstranda proponebantur.


THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXVII.

OMNIVM solidorum in sphaera descriptorum, quæ æqualibus, & similibus basibus continentur, centrum grauitatis est idem, quod sphaeræ centrum.


Solida eiusmodi corpora regularia appellare solent, de quibus agitur in tribus ultimis libris elementorum: sunt autem numero quinque, tetrahedrum, uel pyramis, hexahedrum, uel cubus, octahedrum, dodecahedrum, & icosahedrum.

Sit primo $abcd$ pyramis in sphaera descripta, cuius sphaeræ centrum sit e . Dico e pyramidis $abcd$ grauitatis esse centrum. Si enim iuncta de producat ad basim abc in f ; ex iis, quæ demonstrauit Campanus in quartodecimo libro elementorum, propositione decima quinta, & decima septima, erit f centrum circuli circa triangulum abc descripti: atque erit ef sexta pars ipsius sphaeræ axis. quare ex prima huius constat trianguli abc grauitatis centrum esse punctum f : & idcirco lineam df esse pyramidis axem.

At cum $e f$ sit sexta pars axis sphaerae, crit $d e$ tripla $e f$. ergo punctum e est grauitatis centrum ipsius pyramidis : quod in uigesima secunda huius demonstratum fuit. Sed e est centrum sphaerae . Sequitur igitur, ut centrum grauitatis pyramidis in sphaera descriptae idem sit, quod ipsius sphaerae centrum .




Sit cubus in sphaera descriptus $a b$, & oppositorum planorum lateribus bifariam diuisis, per puncta diuisionum plana ducantur, ut communis ipsorum sectio sit recta linea $c d$. Itaque si ducatur $a b$, solidi scilicet diameter, linea $a b, c d$ ex trigesima nona undecimi sese bifariam secabunt. secent autem in puncto e . erit e centrū grauitatis solidi $a b$, id quod demonstratum est in octaua huius. Sed quoniam ab est sphaerae diametro aequalis, ut in decima quinta propositione tertii decimi libri elementorum ostenditur : punctum e sphaerae quoque centrum erit. Cubi igitur in sphaera descripti grauitatis centrum idem est, quod centrum ipsius sphaerae .



Sit octahedrum $a b c d e f$, in sphaera descriptum, cuius sphaerae centrum sit g . Dico punctum g ipsius octahedri grauitatis centrum esse . Constat enim ex iis, quae demonstrata sunt à Campano in quinto decimo libro elementorum, propositione sextadecima eiusmodi solidum diuidi in duas pyramides aequales, & similes; uidelicet in pyramidem,


dem, cuius basis est quadratum $a b c d$, & altitudo $e g$: & in pyramidem, cuius eadē basis, altitudoq; $f g$; ut sint $e g$, $g f$ semidiametri sphaeræ, & linea una. Cū igitur g sit sphaeræ centrum, erit etiam centrum circuli, qui circa quadratū $a b c d$ describitur: & propterea eiusdem quadrati gravitatis centrum: quod in prima propositione huius demonstratum est. quare pyramidis $a b c d e$ axis erit $e g$: & pyramidis $a b c d f$ axis $f g$. Itaque sit h centrum gravitatis pyramidis $a b c d e$, & pyramidis $a b c d f$ centrum sit k : perspicuum est ex uigesima secunda propositione huius, lineā $e h$ triplam esse $h g$: cōponendoq; $e g$ ipsius $g h$ quadruplam. & eadē ratione $f g$ quadruplā ipsius $g k$. quod cum $e g$, $g f$ sint æquales, & $h g$, $g k$ necessario æquales erunt. ergo ex quarta propositione primi libri Archimedis de cētro gravitatis planorū, totius octahedri, quod ex dictis pyramidibus constat, centrum gravitatis erit punctum g idem, quod ipsius sphaeræ centrum.



Sit icosaedrum $a d$ descriptum in sphaera, cuius centrū sit g . Dico g ipsius icosaedri gravitatis esse centrum. Si enim ab angulo a per g ducatur recta linea usque ad sphaeræ superficiem; constat ex sexta decima propositione libri tertii decimi elementorum, cadere eam in angulum ipsi a oppositum. cadat in d : sitq; una aliqua basis icosaedri triangulum $a b c$: & iunctæ $b g$, $c g$ producantur, & cadant in angulos $e f$, ipsis $b c$ oppositos. Itaque per triangula $a b c$, $d e f$ ducantur plana sphaeram secantia. erunt hæ se-


13. primi
14. primi

etiones circuli ex prima propositione sphaericorum Theodosii: unus quidem circa triangulum abc descriptus: alter uero circa def : & quoniam triangula abc , def aequalia sunt, & similia; erunt ex prima, & secunda propositione duodecimi libri elementorum, circuli quoque inter se se aequales. postremo à centro g ad circulum abc perpendicularis ducatur gh ; & alia perpendicularis ducatur ad circulum def , quæ sit gk ; & iungantur ah , dk . perspicuum est ex corollario primæ sphaericorum Theodosii, punctum h centrum esse circuli abc , & k centrum circuli def . Quoniam igitur triangulorum gah , gdK latus ag est æquale lateri gd ; sunt enim à centro sphaeræ ad superficiem: atque est ah æquale dk : & ex sexta propositione libri primi sphaericorum Theodosii gh ipsi gK : triangulum gah æquale erit, & simile gdK triangulo: & angulus agh æqualis angulo dgK . sed anguli agh , hgd sunt æquales duobus rectis. ergo & ipsi hgd , dgk duobus rectis æquales erunt. & idcirco hg , gk una, atque eadem erit linea. cum autem h sit centrû circuli, & trianguli abc gravitatis centrû probabitur ex iis, quæ in prima propositione huius tradita sunt. quare gh erit pyramidis $abcg$ axis. & ob eandem causam gk axis pyramidis $defg$. Itaque centrum gravitatis pyramidis $abcg$ sit pûctum l , & pyramidis $defg$ sit m . Similiter ut supra demonstrabimus mg , gl inter se æquales esse, & punctum g gravitatis centrum magnitudinis, quæ ex utrisque pyramidibus constat. eodem modo demonstrabitur, quarumcunque duarum pyramidum, quæ opponuntur, gravitatis centrû esse



esse punctum g . Sequitur ergo ut icosaedri centrum gravitatis sit idem, quod ipsius sphaerae centrum.

Sit dodecahedrum $a f$ in sphaera designatum, sitque sphaerae centrum m . Dico m centrum esse gravitatis ipsius dodecahedri. Sit enim pentagonum $a b c d e$ una ex duodecim basibus solidi $a f$: & iuncta $a m$ producat ad sphaerae superficiem. cadet in angulum ipsi a oppositum; quod colligitur ex decima septima propositione tertii decimi libri elementorum. cadat in f . at si ab aliis angulis $b c d e$ per centrum itidem lineae ducantur ad superficiem sphaerae in puncta $g h k l$; cadent haec in alios angulos basis, quae ipsi $a b c d$ basi opponitur. transeant ergo per pentagona $a b c d e$, $f g h k l$ plana sphaeram secantia, quae facient sectiones circulos aequales inter se se: postea ducantur ex centro sphaerae m perpendiculares ad plana dictorum circulo-
rum; ad
circulum quidem $a b c d e$
perpendicularis $m n$: & ad
circulum $f g h k l$ ipsa $m o$,
erunt puncta $n o$ circulo-
rum
centra: & lineae $m n, m o$ in
ter se aequales: quod circu-
li aequales sint. Eodem mo-
do, quo supra, demonstrabi-
mus lineas $m n, m o$ in una
atque eandem lineam con-
venire. ergo cum puncta $n o$ sint centra circulo-
rum, con-
stat ex prima huius & pentagono-
rum gravitatis esse centra:
idcircoq; $m n, m o$ pyramidum $a b c d e m, f g h k l m$ axes.
ponatur $a b c d e m$ pyramidis gravitatis centrum p : & py-
ramidis $f g h k l m$ ipsum q centrum. erunt $p m, m q$ aequa-
les, & punctum m gravitatis centrum magnitudinis, quae
ex ipsis pyramidibus constat. eodem modo probabitur qua-
rumlibet pyramidum, quae e regione opponuntur, centrū



corol. pri-
mae sphae-
ricorum
Theod.
6. primi
phaerico-
rum.

grauitatis esse punctum m . patet igitur totius dodecahedri, centrum grauitatis idē esse, quod & sphaeræ ipsum comprehendentis centrum. quæ quidem omnia demonstrasse oportebat.

PROBLEMA VI. PROPOSITIO XXVIII.


DATA qualibet portione conoidis rectanguli, abscissa plano ad axem recto, uel non recto; fieri potest, ut portio solida inscribatur, uel circumscribatur ex cylindris, uel cylindri portionibus, æqualem habentibus altitudinem, ita ut recta linea, quæ inter centrum grauitatis portionis, & figuræ inscriptæ, uel circumscriptæ interiicitur, sit minor qualibet recta linea proposita.

Sit portio conoidis rectanguli abc , cuius axis bd , grauitatisq; centrum e : & sit g recta linea proposita. quam uero proportionem habet linea be ad lineam g , eandem habeat portio conoidis ad solidum h : & circumscribatur portioni figura, sicuti dictum est, ita ut portiones reliquæ sint solido h minores: cuius quidem figuræ centrum grauitatis sit punctum κ . Dico lineam ke minorem esse lineam g proposita. nisi enim sit minor, uel æqualis, uel maior erit. & quoniam figura circumscripta ad reliquas portiones maiorem proportionem habet, quàm portio conoidis ad solidum h ; hoc est maiorem, quàm be ad g : & be ad g non minorem habet proportionem, quàm ad ke , propterea quod ke non ponitur minor ipsa g : habebit figura circumscripta ad portiones reliquas maiorem proportionem quàm be ad ke : & diuidendo portio conoidis ad reliquas portiones habebit maiorem, quàm $b\kappa$ ad Ke . quare si fiat ut portio conoidis

8. quinti.


29. quinti
ex traditione
Cassiani.

noidis ad portiones reliquas, ita alia linea, quæ sit lk ad ke : erit lk maior, quam bk : & ideo punctum l extra portionem cadet. Quoniã igitur à figura circumscripta, cuius gravitatis centrum est k , aufertur portio conoidis, cuius centrum e , habetq; lK ad Ke eam proportionem, quam portio conoidis ad reliquas portiones; erit punctum l extra portionem cadēs, centrum magnitudinis ex reliquis portionibus compositæ. illud autem fieri nullo modo potest. quare constat lineam ke ipsa g linea proposta minorem esse.



Rursus inscribatur portioni figura, uidelicet cylindrus mn , ut sit ipsius altitudo æqualis dimidio axis bd :

& quam proportionem habet be ad g , habeat mn cylindrus ad solidum o . inscribatur deinde eidem alia figura, ita ut portiones reliquæ sint solidi o minores: & centrum gravitatis figuræ sit p . Dico lineam pe ipsa g minorē esse, si enim non sit minor, eodem, quo supra modo demonstrabimus figuram in-



scriptam ad reliquas portiones maiorem proportionem habere, quàm be ad ep . & si fiat alia linea le ad ep , ut est figura inscripta ad reliquas portiones, pūctum l extra por-

L

tionem cadet: Itaque cum à portione conoidis, cuius grauitatis centrum e auferatur inscripta figura, centrum habens p : & sit l e ad e p , ut figura inscripta ad portiones reliquas: erit magnitudinis, quæ ex reliquis portionibus constat, centrum grauitatis punctum l , extra portionem cadens. quod fieri nequit. ergo linea p e minor est ipsa g linea proposita.


Ex quibus perspicuum est centrum grauitatis figuræ inscriptæ, & circumscriptæ eo magis accedere ad portionis centrum, quo pluribus cylindris, uel cylindri portionibus constet: fiatq; figura inscripta maior, & circumscripta minor. & quanquam continenter ad portionis centrū propius admoueatur: nunquam tamen ad ipsum perueniet. sequeretur enim figuram inscriptam, nō solum portioni, sed etiam circumscriptæ figuræ æqualem esse. quod est absurdum.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXIX.

CVIVSLIBET portionis conoidis rectanguli axis à cētro grauitatis ita diuiditur, ut pars quæ terminatur ad uerticem, reliquæ partis, quæ ad basim sit dupla.

SIT portio conoidis rectanguli uel abscissa plano ad axem recto, uel non recto: & secta ipsa altero plano per axē sit superficiei sectio abc rectanguli coni sectio, uel parabole; plani abscindentis portionem sectio sit recta linea ac : axis portionis, & sectionis diameter bd . Sumatur autem in linea bd punctum e , ita ut be sit ipsius ed dupla. Dico
e por-

e portionis a b c grauitatis esse centrum. Diuidatur enim b d bifariam in m : & rursus d m, m b bifariam diuidantur in punctis n, o: inscribaturq; portio- ni figura solida, & altera circum scribatur ex cy- lindris æqualem altitudinem ha- bentibus, ut su- perius dictū est. Sit autem pri- mum figura in- scripta cylindrus f g: & circūscri- pta ex cylindris a h, κ l constet. punctum n erit centrum graui- tatis figuræ in- scriptæ, mediū scilicet ipsius d m axis: atq; idē erit centrum cy- lindri a h: & cy- lindri κ l centrū o, axis b m me- dium. quare si li



7.huius

L 2


8. primi
libri Ar-
chimedisi

11. duo-
decimi.

15. quinti

2. duode-
cimi.

neam on ita di-
uiserimus in p,
ut quã propor-
tionẽ habet cy-
lindrus a h ad
cylindrum κ l,
habeat linea op
ad pn: centrum
grauitatis toti-
us figuræ circũ-
scriptæ erit pun-
ctum p. Sed cy-
lindri, qui sunt
æquali altitudi-
ne, eandem in-
ter se se, quam
bases propor-
tionem habent:
estq; ut linea db
ad bm, ita qua-
dratũ lineæ ad
ad quadratũ ip-
sius km, ex uige-
sima primi libri
conicorũ: & ita
quadratum ac
ad quadratũ κ
g: hoc est circu-
lus circa diame-
trum ac ad cir-
culum circa dia-
metrum kg. du-
pla est autem li-
nea db lineæ




b m.

b m. ergo circulus a c circuli k g: & idcirco cylindrus a h cylindri k l duplus erit. quare & linea o p dupla ipsius p n. Deinde inscripta & circumscripta portioni alia figura, ita ut inscripta constituatur ex tribus cylindris q r, s g, t u: circumscripta uero ex quatuor a x, y z, k v, θ λ: diuidantur b o, o m, m n, n d bifariam in punctis μ v π ρ. Itaque cylindri θ λ centrum grauitatis est punctum μ: & cylindri k v centrum v. ergo si linea μ v diuidatur in σ, ita ut μ σ ad σ v proportionē eā habeat, quam cylindrus k v ad cylindrum θ λ, uidelicet quam quadratum κ m ad quadratum θ o, hoc est, quam linea m b ad b o: erit σ centrum magnitudinis compositæ ex cylindris k v, θ λ. & cum linea m b sit dupla b o, erit & μ σ ipsius σ v dupla. præterea quoniam cylindri y z centrum grauitatis est π, linea σ π ita diuisa in τ, ut σ τ ad τ π eam habeat proportionem, quam cylindrus y z ad duos cylindros k v, θ λ: erit τ centrum magnitudinis, quæ ex dictis tribus cylindris constat. cylindrus autē y z ad cylindrum θ λ est, ut linea n b ad b o, hoc est ut 3 ad 1: & ad cylindrum k v, ut n b ad b m, uidelicet ut 3 ad 2. quare y z cylindrus duobus cylindris k v, θ λ æqualis erit. & propterea linea σ τ æqualis ipsi τ π. denique cylindri a x centrum grauitatis est punctum ρ. & cum τ ρ diuisa fuerit in eā proportionem, quam habet cylindrus a x ad tres cylindros y z, k v, θ λ: erit in eo puncto centrum grauitatis totius figuræ circūscriptæ. Sed cylindrus a x ad ipsum y z est ut linea d b ad b n: hoc est ut 4 ad 3: & duo cylindri k v θ λ cylindro y z sunt æquales. cylindrus igitur a x ad tres iam dictos cylindros est ut 2 ad 3. Sed quoniā μ σ est duarum partium, & σ v unius, qualium μ π est sex; erit σ π partium quatuor: proptereaq; τ π duarum, & v π, hoc est π ρ trium. quare sequitur ut punctum π totius figuræ circūscriptæ sit centrum. Itaque fiat v v ad v π, ut μ σ ad σ v. & v ρ bifariam diuidatur in φ. Similiter ut in circumscripta figura ostendetur centrum magnitudinis compositæ ex cylin-

20. primi
CONICORUM


dris sg , tu esse punctum v : & totius figuræ inscriptæ, quæ constat ex cylindris qr , fg , tu esse ϕ centrum. Sunt enim hi cylindri æquales & similes cylindris yz , K , θ , λ , figuræ circumscriptæ. Quoniã igitur ut b e ad e d , ita est o p ad p n ; utraq; enim utriusque est dupla: erit componendo, ut b d ad d e , ita o n ad n p ; & permutando, ut b d ad o n , ita d e ad n p . Sed b d dupla est o n . ergo & e d ipsius n p dupla erit. quòd si e d bifariam dividatur in χ , erit χ d , uel e χ æqualis n p : & sublata e n , quæ est cõmunis utrique e χ , p n ,



relin-

relinquetur $p e$ ipsi $n \chi$ æqualis. cum autem $b e$ sit dupla $e d$, & $o p$ dupla $p n$, hoc est ipsius $e \chi$, & reliquum, uidelicet $b o$ unà cum $p e$ ipsius reliqui χd duplum erit. estque $b o$ dupla $e d$. ergo $p e$, hoc est $n \chi$ ipsius χp dupla. sed $d n$ dupla est $n e$. reliqua igitur $d \chi$ dupla reliquæ χn . sunt autem $d \chi$, $p n$ inter se æquales: itemq; æquales χn , $p e$. quare constat $n p$ ipsius $p e$ duplam esse. & idcirco $p e$ ipsi $e n$ æqualem. Rursus cum sit μv dupla $o v$, & $\mu \sigma$ dupla σv ; erit etiam reliqua $v \sigma$ reliquæ σo dupla. Eadem quoque ratione cōcludetur πv dupla $v m$. ergo ut $v \sigma$ ad σo , ita πv ad $v m$: componendoq; & permutando, ut $v o$ ad πm , ita $o \sigma$ ad $m v$: & sunt æquales $v o$, πm . quare & $o \sigma$, $m v$ æquales. præterea $\sigma \pi$ dupla est $\pi \tau$, & $v \pi$ ipsius πm . reliqua igitur σv reliquæ $m \tau$ dupla. atque erat $v \sigma$ dupla σo . ergo $m \tau$, σo æquales sunt: & ita æquales $m v$, $n \phi$. at $o \sigma$, est æqualis $m v$. Sequitur igitur, ut omnes $o \sigma$, $m \tau$, $m v$, $n \phi$ inter se sint æquales. Sed ut $\rho \pi$ ad $\pi \tau$, hoc est ut 3 ad 2, ita $n d$ ad $d \chi$: permutādoq; ut $\rho \pi$ ad $n d$, ita $\pi \tau$ ad $d \chi$. & sūt æquales $\rho \pi$, $n d$. ergo $d \chi$, hoc est $n p$, & $\pi \tau$ æquales. Sed etiam æquales $n \pi$, πm . reliqua igitur πp reliquæ $m \tau$, hoc est ipsi $n \phi$ æqualis erit. quare dempta $p \pi$ ex $p e$, & ϕn dempta ex $n e$, relinquitur $p e$ æqualis $e \tau$. Itaque π , ϕ centra figurarū secundo loco descriptarum a primis centris $p n$ æquali intervallo recedunt. quòd si rursus aliæ figuræ describantur, eodem modo demonstrabimus earum centra æqualiter ab his recedere, & ad portionis conoidis centrum propius ad moueri. Ex quibus constat lineam $\pi \phi$ à centro grauitatis portionis diuidi in partes æquales. Si enim fieri potest, non sit centrum in puncto e , quod est lineæ $\pi \phi$ medium: sed in \downarrow : & ipsi $\pi \downarrow$ æqualis fiat $\phi \omega$. Cum igitur in portione solida quædam figura inscribi possit, ita ut linea, quæ inter centrum grauitatis portionis, & inscriptæ figuræ interiicitur, qualibet linea proposita sit minor, quod proxime demonstrauimus: perueniet tandem ϕ centrum inscriptæ figuræ

FED. COMMANDINI



ad punctum ω . Sed quoniam π circumscripta itidem alia figura æquali intervallo ad portionis centrum accedit, ubi primum ϕ applicuerit se ad ω , & π ad punctum \downarrow , hoc est ad portionis centrum se applicabit. quod fieri nullo modo posse perspicuum est. non aliter idem absurdum sequetur, si ponamus centrum portionis recedere à medio ad partes ω ; esset enim aliquando centrum figuræ inscriptæ idem quod portionis centrū. ergo punctum e centrum erit gravitatis portionis abc . quod demonstrare oportebat.

Quod autem supra demonstratum est in portione conoidis recta per figuras, quæ ex cylindris æqualem altitudinem habentibus constant, idem similiter demonstrabimus per figuras ex cylindri portionibus constantes in ea portione, quæ plano non ad axem recto abscinditur. ut enim tradidimus in commentariis in undecimam propositionem libri Archimedis de conoidibus & sphæroidibus. portiones cylindri, quæ æquali sunt altitudinæ eam inter se se proportionem habent, quam ipsarum bases: bases autem quæ sunt ellipses similes eandem proportionem habere, quam quadrata diametrorum eiusdem rationis, ex corollario septimæ propositionis libri de conoidibus, & sphæroidibus, manifeste apparet.


corol. 15
de conoi-
dibus &
sphæroi-
dibus.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXX.

SI à portione conoidis rectanguli alia portio abscindatur, plano basi æquidistante; habebit portio tota ad eam, quæ abscissa est, duplam proportionem eius, quæ est basis maioris portionis ad basim minoris, uel quæ axis maioris ad axem minoris.

M

ABSCINDATUR à portione conoidis rectanguli abc alia portio ebf , plano basi æquidistante: & eadem portio secetur alio plano per axem; ut superficiei sectio sit parabole abc : planorū portiones abscindentium rectæ lineæ ac , ef : axis autem portionis, & sectionis diameter bd ; quam linea ef in puncto g secet. Dico portionem conoidis abc ad portionem ebf duplam proportionem habere eius, quæ est basis ac ad basim ef ; uel axis db ad bg axem. Intelligentur enim duo conus, seu conus portiones abc , ebf , eãdem basim, quam portiones conoidis, & æqualem habentes altitudinem. & quoniam abc portio conoidis sesquialtera est conus, seu portiones conus abc ; & portio ebf conus seu portiones conus ebf est sesquialtera, quod de-



monstrauit Archimedes in propositionibus 23, & 24 libri de conoidibus, & sphæroidibus: erit conoidis portio ad conoidis portionem, ut conus ad conum, uel ut conus portio ad conus portionem. Sed conus, uel conus portio abc ad conum, uel conus portionem ebf compositam proportionem habet ex proportione basis ac ad basim ef , & ex proportione altitudinis conus, uel conus portiones abc ad altitudinem ipsius ebf , ut nos demonstraui in commentariis in undecimam propositionem eiusdem libri Archimedis: altitudo autem ad altitudinem est, ut axis ad axem. quod quidem in conis rectis perspicuum est, in scalenis ue-

ro ita demonstrabitur. Ducatur à puncto b ad planum ba-
 sis a c perpendicularis linea b h , quæ ipsam e fin K fecet.
 erit b h altitudo coni, uel coni portionis a b c : & b K altitu-
 do e fg. Quod cum lineæ a c, e f inter se æquidistant, sunt
 enim planorum æquidistantium sectiones : habebit d b ad
 b g proportionem eandem, quam h b ad b k . quare por-
 tio conoidis a b c ad portionem e fg proportionem habet
 compositam ex proportione basis a c ad basim e f ; & ex
 proportione d b axis ad axem b g. Sed circulus, uel
 ellipsis circa diametrum a c ad circulum, uel ellipsim
 circa e f, est ut quadratum a c ad quadratum e f; hoc est ut
 quadratū a d ad quadratū e g. & quadratum a d ad quadra-
 tum e g est, ut linea d b ad lineam b g. circulus igitur, uel el-
 lipsis circa diametrum a c ad circulū, uel ellipsim circa e f,
 hoc est basis ad basim eandem proportionem habet, quā
 d b axis ad axem b g. ex quibus sequitur portionem a b c
 ad portionem e b f habere proportionem duplam eius,
 quæ est basis a c ad basim e f: uel axis d b ad b g axem. quod
 demonstrandum proponebatur.

16. unde-
 cimi.

4 sexti.

2. duode-
 cimi

7. de co-
 noidibus

& sphæ-
 roidibus

15. quinti
 20. primi


conicorū

THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXI.

Cuiuslibet frusti à portione rectanguli conoi-
 dis abscissi, centrum grauitatis est in axe, ita ut
 demptis primum à quadrato, quod fit ex diame-
 tro maioris basis, tertia ipsius parte, & duabus
 tertiis quadrati, quod fit ex diametro basis mino-
 ris : deinde à tertia parte quadrati maioris basis
 rursus dempta portione, ad quam reliquum qua-
 drati basis maioris unà cum dicta portione duplā
 proportionem habeat eius, quæ est quadrati ma-

ioris basis ad quadratum minoris: centrum sit in eo axis puncto, quo ita diuiditur ut pars, quæ minorem basim attingit ad alteram partem eandem proportionem habeat, quam dempto quadrato minoris basis à duabus tertiis quadrati maioris, habet id, quod reliquum est unà cum portione à tertia quadrati maioris parte dempta, ad reliquã eiusdem tertiæ portionem.

SIT frustum à portione rectanguli conoidis abscissum a b c d, cuius maior basis circulus, uel ellipsis circa diametrum b c, minor circa diametrum a d; & axis e f. describatur autem portio conoidis, à quo illud abscissum est, & pla-



no per axem ducto secetur; ut superficiæ sectio sit parabole b g c, cuius diameter, & axis portionis g f: deinde g f diuidatur in puncto h, ita ut g h sit dupla h f: & rursus g e in eandem proportionem diuidatur: sitq; g k ipsius k e dupla. Iã ex iis, quæ proxime demonstrauimus, constat centrum grauitatis portionis b g c esse h punctum: & portionis a g c punctum k. sumpto igitur infra h puncto l, ita ut k h ad h l
eam

eam proportionem habeat, quam $abc d$ frustum ad portionem $ag d$; erit punctum l eius frusti gravitatis cœtrum: habebitq; componendo Kl ad lh proportionem eandem, quam portio conoidis $b g c$ ad $ag d$ portionem. Itaq; quoniam quadratum $b f$ ad quadratum $a e$, hoc est quadratum $b c$ ad quadratum $a d$ est, ut linea fg ad ge : erunt duæ tertiæ quadrati $b c$ ad duas tertiæ quadrati $a d$, ut hg ad gk : & si à duabus tertiis quadrati $b c$ demptæ fuerint duæ tertiæ quadrati $a d$: erit diuidēdo id, quod relinquitur ad duas tertiæ quadrati $a d$, ut hk ad kg . Rursus duæ tertiæ quadrati $a d$ ad duas tertiæ quadrati $b c$ sunt, ut kg ad gh : & duæ tertiæ quadrati $b c$ ad tertiã partē ipsius, ut gh ad hf . ergo ex æquali id, quod relinquitur ex duabus tertiis quadrati $b c$, demptis ab ipsis quadrati $a d$ duabus tertiis, ad tertiã partem quadrati $b c$, ut kh ad hf : & ad portionem eiusdē tertiæ partis, ad quam unà cum ipsa portione, duplam proportionem habeat eius, quæ est quadrati $b c$ ad quadratū $a d$, ut Kl ad lh . habet enim Kl ad lh eandem proportionem, quam conoidis portio $b g c$ ad portionem $ag d$: portio autem $b g c$ ad portionem $ag d$ duplam proportionem habet eius, quæ est basis $b c$ ad basim $a d$: hoc est quadrati $b c$ ad quadratum $a d$; ut proxime demonstratum est. quare dempto $a d$ quadrato à duabus tertiis quadrati $b c$, erit id, quod relinquitur unà cum dicta portione tertiæ partis ad reliquam eiusdem portionem, ut el ad lf . Cum igitur centrum gravitatis frusti $abc d$ sit l , à quo axis ef in eam, quã diximus, proportionem diuidatur; constat uerū esse illud, quod demonstrandum proposuimus.

20. r. cono-
corum.

30 huius

FINIS LIBRI DE CENTRO
GRAVITATIS SOLIDORVM.

Impress. Bononiæ cum licentia Superiorum.

