


EVCLIDIS Megarensis, Philosophi & Mathe

MATICI EXCELLENTISSIMI, SEX LIBRI PRIORES, DE
Geometricis principijs, Græci & Latini, unâ cum demonstrationibus
propositionum, absq; literarum notis, ueris ac proprijs, & alijs quibus-
dam, usum earum concernentibus, non citra maximum
huius artis studiosorum emolumen-
tum adiectis,

ALGEBRAE PORRO REGVLAE, PROPTER NVME-
rorum exempla, passim propositionibus adiecta, his libris præmissæ
sunt, eademq; demonstratæ,

AUTHORE IOANNE SCHEVBELIO, IN
inçlyta Academia Tubingensi Euclidis
professore ordinario.



Cum gratia & priuilegio Cæsario,
ad quinquennium,

BASILEAE, PER IOAN-
nem Heruagium.

M. GARBICIVS ILLYRICVS
ad Lectorem,

Εὐκλείδης σοφίῳ πολλοὶ καὶ ἴσθρις ἀνδρες
ἔμματιέως μέμασαν πολλάκις ἐκπονίειν,
πρὸς τὸ εὐφραδέως πελυιδρεῖσι νόοιο
ἐκτέλεσαν μύναξ προδέρμνοι π πλίορ.
ἀλλ' ἔτερόν κείνῃ σοφίῃ πλείστοσι πρ' ἔμωκς
ἔξακειβωσ' ἀπλώδς δισηατάληπ' ἔφυ.
πρὸς εὐ σχεδὸν πάντας' ὡπ' μὲν δίοσις ἔσοχα πρὸς κή,
ἠδὲ διαφθρωσις πίλνατ' ἔπασαντέρη.
τῶν δ' ἀχειβέλι' τοῖς προδέν πρὸς κή ὡπ' προδείς,
πολλὰ τ' ἀναρθρώσας θήν' ὡπ' τριανότορα.
πάντα δ' ἀπώρπιας' εὐ ἀραρῶς πρὸς ἀδείγμασι πικνοῖς,
ὡς' ἔμλναι γύτωρ δύσπορορ ἔδερ' ἔπι.
τοῖς δ' ἀρα προσλιπῶρ μετωμῆς τὰ πλείστα διαήσει,
ἔκ' ἔπιγ' ὡς ἔ πάρε' κείν' ἀκίχητα λαχῶρ.

IOAN. SAMBVCVS PANNONIVS
Tirnaviensis.

*Hactenus Algebrae latuit quia regula multos,
Et summis tantum est illa adamata uiris:
Explicat hanc noster tanta Scheubelius arte,
Quilibet ut paucis perdidicisse queat.
Sex quoque demonstrat libros Megarensis abunde:
Ingenium quare, Lector amice, probes.*

NOBILIBVS, ERVDITIONE AC VIRTUTE

VIRIS ORNATISSIMIS, FVGGERIS, ANTONIO NATV SENIORI, ac fratris sui P. M. Reimundi filijs, Ioanni Iacobo, Georgio, Christophoro, Vdalrico, & Reimundo, fratribus, Kirchpergæ & Vuciffenhorni dominis, Mœcenatibus suis perpetuò colendissimis,
IOANNES SCHEVBELIVS S.



VM inter liberalia studia, quæ à liberis & ingenuis hominibus disci debent, Geometria etiam numerari meruerit, Euclidis uerò, *μαθηματικὴν ἡγεμόνην καὶ κορυφαίαν*, geometria in omnibus terris publicis scholis proponi cōsueuerit, quo illam laudatissimam consuetudinem meo etiam conatu iuuarem, cum omnes ipsius libros uno tempore tradere, propter multa impedimenta, difficile sit, priores scx, tanquam potiores, unâ cum Algebrae regulis, ad hos summè necessarijs, demonstrandos & declarandos suscepimus. At quoniam hic noster tradendi modus ab aliorum traditionibus non nihil uariat, huius diuersitatis causam, post expositam à nobis geometriæ originẽ & usum, declarabimus. Cum Nilus Ægypti fluuius, ut author est Strabo, longe lateq; augetes, se diffunderet, atq; sua exundatione deinde agrorum limites in illa uicinia ita turbaret, ut decrescente, & in suum se alueum recolligente aqua, limites & termini diluuiò confusi submouerentur prioribus finibus, quibus designandis significandisque erant constituti, eueniebat sanè ut nullus sui fundi, nec locum nec quantitatem certò assignare posset. Quamobrem ne contentiones inter uicinos orirentur, sed potius ut uera & iusta distributione suum quisq; fundum integrum reciperet, ab Ægyptijs, propter summam necessitatem & commoditatem, quam experiebantur metiendis agris, Geometria inuenta est; quemadmodum Phœnices, propter negociationem, Numerorum scientiam primò reperisse dicuntur. Hanc ab Ægyptijs acceptam Græci postea omni studio & diligentia excoluerunt. Non ideo tantum, ut hac in ædificando aut reliquis artibus mechanicis, magno suo cōmodo uterentur: sed multo magis, ut liberos suos ad philosophiam, omnesq; uitæ partes præpararent, ad quas res mensurarum cognitio non leuiter conduceret. Nam primùm quid quæso, in ulla parte philosophiæ sine demonstrandi scientiæ rectè cognosci potest, aut percipi? At demonstrationum doctrinæ, incredibile est, quantum lucis afferant exempla geometrica, quæ sine controuersia sunt omnium maximè & ad docendum, & ad intelligendum illustria & expedita. In oculos namq; incurrunt, & ad manifestas menti nostræ rationes referuntur. Deinde constat ex hac ipsa mensurarum noticia, non demonstrationes tantum longè plurimas, ad doctrinam de natura rerum illustrandam passim accommodatas, sed huius ipsius etiam

prima initia ex illa sumpta esse. Ex illa enim non plures mundos, non hunc ipsum in quo uiuimus, aut ullum omnino aliud corpus, infinitum esse ostenditur. Quæ sanè physicae uera sunt & propria exordia putanda. Quòd hæc ipsa mensurarum ratio & terræ amplitudinem metitur, & cœli ipsius spacia describit; & discipline sue, regulis quasi quibusdam, in cœlum subiectis mentibus hominum, omnes illos orbium & corporum cœlestium ortus, obitus, motusq; demonstrat. Atq; hæc tam multa & minimè contemnenda commoda ijs præcipuè affert, qui in umbra & ocio uiuentes, ueritatem exquirunt. Cum interim neq; pauciora, neq; leuiora ijs etiã præstet, qui ex umbra in solem progrediuntur, & in communi hominũ consuetudine uersantes, priuatam aut publicã rem gerũt. Galenus scribit, sæpe se in incertarum rationum æstu ualde anxium & dubium laborantem, Geometricarum demonstrationum beneficio subleuatum esse, quæ modum & uiam præclarè operandi sibi monstrauerint. Etenim cum animaduerneret rotunda & circularia ulcera tardius quàm longa curari, censuit eius curationis uiam sibi ex Geometria petendam esse. Proinde in lectionem de Isoperimetris incidens, inuenit, quòd circulus quidam omnium Isoperimetrarum figurarum esset capacissimus: nimirum quòd extrema eius undiq; plus à se mutuo, quàm in alijs Isoperimetris figuris, distarent. Hac ratione fretus, in Methodo curandi, ad finem libri tertij scribens, sic inquit:

τὰ μὲν γὰρ ἐγκύρσια δὲ τὰ χεῖλη αὐτῶν μάλιστα δεσμηγῆναι τε καὶ ἀφελῆσθαι. Ἡ συναγωγὴς ἀκρεβέσθρας δέεται, ὡς ἐ καὶ εἰσφάσις καὶ ἀγκυτήσιον ὑπὸ τούτων χεῖσιον.

Vnde Hippocrates etiam filium suũ Thessalum, in quadam ad ipsum epistola, hortatur, ne uel Geometriam, uel Arithmeticam negligat, inter alia scribens his uerbis:

Ἰσορίας δὲ μελέτω σὺ πᾶσι, γεωμετρικῆς καὶ ἀριθμητικῆς.

Et grauis author Quintilianus, eandem etiam Geometriam oratori suo, Rempub. domi & in pace gubernaturo, necessariam esse, multis & grauibus de causis ostendit. Ac res ipsa clamat, foris & in bello usum huius non uulgarem existere, cum castris scilicet locus est capiendus, magnæ moles loco mouendæ, machinæ bellicæ & tormenta fabricanda, aut trañcienda flumina pontibus, obsidēda hostium mœnia, & huius generis sexcenta alia facienda sunt. Celebratur Archimedis industria, quæ sola & acerrimos summi Imperatoris Marcelli impetus leui sepe momēto frustrata est, & obsidionem Syracusarũ in longius traxit. Inter ciues aut̃ & milites magna uis est ordinis, magna cōcordiæ, magna amoris mutui: quas res in primis efficit & conseruat in hominũ societatibus proportio Geometrica. Quare Plato hanc, ut salutarẽ, præcipuè asciscendã esse duxit ciuitatibus, quæ rerum suarum statum optimũ esse uellent, & quàm firmissimum. Vbi enim pro meritis & dignitate, magistratus & imperia

optimis

optimis & prudentissimis mandantur, ubi ordines & discrimina personarum seruantur, ubi melior imperat, paret & obtemperat imprudentior, ibi suas quemque partes, suum munus, suum officium & intelligere & facere, & ueram ac durabilem æqualitatem esse. Et ex hac deinde mutuam inter ciues concordiam & beneuolentiam gigni, necesse est. Quia ἰσορροφία est, id quod equidem in Repub. maximè efficit proportio Geometrica: & ob hanc causam maximi facienda est Geometria etiam ad Reipub. gubernacula accessuris. Vnde non sine magnis & grauibus causis existimandum est, Platonem fecisse, ut à sua schola rudes & imperitos huius artis omnes, ipsa etiam inscriptione, arcēdos duxerit. Notus est enim uersiculus, quem scholæ suæ uestibulo inscriptum proposuit:

Α Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ο Σ Ο Υ Δ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Ι Τ Ω.

Cum enim se non eos tantum, qui remoti ab administratione Reip. rationem doctrinæ & ueritatis in umbra & ocio exquirerent, sed illos etiam qui quæsitæ, & inuentas sapientiæ rationes in lucem ac solem proferrent, & rebus humanis agendo consulere, institutione sua formare intelligeret, uidit nimirum uir diuinus, ad neutram institutionem idoneos, qui non Geometriæ disciplina excolti accederent. Quare huiusmodi barbara & monstrosa ingenia, quæ ab hac, maximè propria naturæ hominum, disciplina abhorrent, tanquam inepta percipiendæ doctrinæ suæ, meritò à se repulit. Quod ipsius prudens & necessarium consilium, utinam etiamnum in scholis publicis sequeremur: non minor modo studiorum perturbatio esset, sed ex his ipsis etiam longè maiores fructus Respub. caperet, ad cuius administrationem multo melius instructi homines uenirent. Porro constat, inter omnia scripta eorum, qui quidem in hoc genere artium elaborauerunt, præcipuo semper loco fuisse Euclidea: è quibus tanquam inexhausto fonte, ferè omnia mathemata profluxere. Itaque & nos huic authori pro uirili nostra illustrando, operæ aliquid attribuendum duximus: qua in re ab usitata hæctenus in scholis uia, non sine grauibus causis (ut nos quidem opinamur) discessimus. Multos fuisse demonstratores geometriæ Euclidis Megarensis, philosophi ac mathematici, certū est: inter omnes tamen, Græcorū quidē Theonis & Hypsicles Alexandrinorū philosophorū, Latinorū uerò, Campani Galli & Zamberti Veneti, explicationes in geometriam Euclidis, ut omnium perfectissimæ celebrantur. Quæ sanè tales sunt, ut nihil ferè in illis ad plenam huius authoris intelligentiam desiderari possit. Ita enim singularum propositionum cōclusiones ex suis hypothefibus colligunt, ut animum suum ad utramque rem diligenter aduertenti, nihil prorsus dubitationis relinquatur. Sed cum literarum figuras in designandis demonstrationum momentis usurpant, id mihi & facere præter ipsius Euclidis institutum uidentur, qui suas in his elementis geometriæ propositiones nudè, & absque illis literarum figuris scriptas reliquit: & præterea fieri uide-

detur, ut quod doctissimorum hominum pace dixerim, non solum ijs
 qui docent & labor & molestia augeatur, sed etiam impediatur intelli-
 gentia discipulorum. Idcirco ipse non solum docendis his elementis quotidie
 experior, sed etiam de eorum querelis non semel cognoui, qui in cogno-
 scendis his ipsis Euclidis nostri elementis, tyrocinium quoddam posue-
 runt. Nam & hi se tam longa saepe & multiplici literarum inculcacio-
 ne, ueluti remoris quibusdam intelligentiae suae turbari & impediri con-
 fessi sunt: & ego ipse sentio quam molestum sit, & omnino plenum fasti-
 dii, ad eum modum subinde literas, aut in sermone repetere, aut adscribe-
 re ad figuras. His igitur de causis, usurpatam ab alijs rationem demon-
 strandi per literas omittendam, & aliam quandam uiam, magis, non mo-
 do huius nostri authoris tractationi consentaneam, sed ad intelligendum
 etiam tyronibus planam & expeditam, ingrediendum mihi, in his quidem
 prioribus sex libris explicandis duxi. In qua & illas literarum ambages
 remoueo, & quae sunt demonstrationibus ostendenda, suis quaeque pro-
 prijs appellationibus, ut ipse etiam Euclides solet, designo. In quo eo non
 compendium modo me consequi, sed etiam magis uitare obscuritatis
 difficultatisque incommodum arbitror: id quod de subiunctis exemplis qui-
 uis facile intelliget. Nam angulus rectus uel maior in operatione seu figu-
 ra oblati, nulla certe appellatione conuenientiori exprimi poterit, quam
 ut rectus, ut maior, non autem angulus a b c, uel $\gamma \delta \epsilon$ uocetur. In his
 namque proluxa literarum inter se collatione res demonstranda opus ha-
 bet cum priore illa nostra uia & ratione rem non modo breuius, sed, ut
 ego quidem existimo, clarius, per suam ipsius appellationem designare
 possim, quae significatam rei notionem, absque ulla longiore collationis
 mora, animo auditoris statim cum ipsa proprii nominis uoce affert. An
 non etiam apertius absque notis literarum sic aliquis loquatur, Angulus
 igitur angustior ad aequalitatem amplioris, per propositionem 23, augea-
 tur: uel, describatur a data recta quadratum, ducatur etiam in eo diame-
 ter, & eius generis infinita alia: quam si eadem literis appositis reddat ma-
 gis implicata & obscura, sic pronuncian-do, Angulus igitur a b c ad aequa-
 litatem anguli d e f, per propositionem 23, augeatur. Vel, ἀναγκαστικῶς
 ἀπὸ γ' α β τετραγώνου γ δ α β γ δ, καὶ ἐπεξετάχθω ἡ β δ, ἢ τὰ λοιπὰ.
 Quid obsecro his ambagibus literarum a solida & erudita demonstra-
 tionis explicatione magis est alienum? Nam hic primum discipuli recur-
 rendum ad figuram est, & in illa multiplici ac inter se implicata literarum
 uarietate diu quaerendum, ubi sint illae ipsae literarum notae a b c, d e f,
 & ubi his ipsis designati anguli. Nec minore cura id quoque quaeren-
 dum, ubi in quadrato β δ literae, & ab his ipsis ducenda linea cuiusmo-
 di futura sit. His & consimilibus ambagibus in illa nostra ratione nihil
 opus est, cum scilicet singula suis proprijs nominibus enuncientur. Quod
 quidem ut in explicando Euclide facerem, non meo tantum iudicio, sed
 eorum

N V N C V P A T O R I A .

eorum quoque hortatu adductus sum, quos in hac demandata mihi ab amplissimo scholæ Tubingensis senatu functione docēdos susceperam. Hi enim hunc modum docendi & sibi pergratum, & mihi minus molestum fore confirmabant. Quibus equidem gratificandum hac in parte fuit, partim ut huius nostræ rationis aliquod periculum in docendis geometricis faceremus: partim uero, ne opinione difficultatis eius quam esse in illa altera ratione quærentur auditores nostri, prorsus auocarentur à studio Geometriæ, quam alioquin hoc nostro tam iniquo literis seculo nimium à plerisque negligi sentiebam. Atque id nostrum consilium discen- tibus in hac nostra schola non parum profuisse animaduerti. Nec defue- runt boni & docti uiri, qui me ad consilium editionis operæ nostræ in hac parte nauatæ hortarentur: quibus ipsis acquiescendū duxi. nec ideo quidem, ut me propter hanc ipsam ambitiose apud eruditos ostētare: sed ut rem literariā, & in primis huius honestissimæ disciplinæ studium, pro mea quoque uirili iuuarem. Hos igitur labores qualescunque, nobilissi- mi uiri, domini & Mœcenates mei omnibus modis colendi, in commu- nem omnium studiosorum utilitatē iam olim susceptos, atque nunc etiam Dei auxilio perfectos, in lucem editurus, clarissimo nominis & authori- tatis uestre patrocinio commendatos & defensos, exire uolui. Nam cum multa sint, & non uulgaria liberalitatis in me uestre beneficia, hoc etiam laboris & operæ nostræ patrocinium non grauatē suscepturos speraui. Quod quidem ut pro uestra uirtute, sapientia, & in omnes studiosos lite- rarum amore, ac studio singulari mihi in hac parte tribuatis, atque me cla- rissimæ dignitati uestre commendatum habeatis, etiam

atque etiam rogo. Valete. Datae Calend. April.

Anno post Christum natum

M. D. L.

De Euclidis cum tempore quo uixit, tum libris editis, nemo est, quod sciam, inter ueteres scriptores, qui plenius tradiderit, quam Proclus Diadochus. Is enim libro Cōmentariorum secundo, super primum Euclidis, enumeratis aliquot non paucis, qui ætate Euclidē præcessissent, claris Mathematicis, ueluti sunt (ut nomina tantum eorū breuiter percurrā) Thales, Ameristus Stesichori poetæ frater, Pythagoras, Anaxagoras Clazomenius, Oenopides Chius, Theodorus Cyrenæus, Hippocrates, Plato, Leodamas Thasius, Architas Tarentinus, Theætetus Atheniēsis, Neoclides, Leon, Eudoxus Cnidius, Amyclas, Menæchmus, Denostratus, Theudeus Magnes, Cyzicinus Atheniensis, Hermotimus Colophonius, & Philippus Metensis: postea subiungit, ὁ πολὺ δὲ βύτων νεώτερός ἐστιν Εὐκλείδης, ὁ τὰ σοιχεῖα σωσαγαγών, καὶ πολλὰ μὲν τῶν εὐδύξεω σωτάξας, πολλὰ δὲ τῶν θρασύτητος τελευσάμενος. ἐπὶ δὲ τὰ μαλακώτερον διακνήμματα τοῖς ἐμπροσθεν εἰς ἀνελέγκτους ἀρδείξεις ἀναγαγών. Nunc quando uixerit, sequitur: γέγονε δὲ (inquit) οὗτος ὁ ἀνὴρ ὑπὸ τοῦ πρώτου πτολεμαίου (Lagihic filius fuit, qui, ut tradunt Historici, post mortem Alexandri Macedonis, Aegypto, Aphrica, & magna Arabia parte potitus, regnauit) Et paulo post: νεώτερός μὲν οὖν ἐστὶ τῶν πρὸς πλάτωννα, προσεβύτητος δὲ ὄρατοδγῆους καὶ ἀρχιμήδους. οὗτοι γὰρ σύγχρονοι ἀλλήλοις, ὡσαύτως ἔφησιν ὄρατοδγῆος. Sed & professionis, qua fuerit, meminit idem, dicens: καὶ τῆς προαρέσει δὲ πλατωνιῆος ὄρα, καὶ τῆς φιλοσοφίας ταύτης οἰκῆτος, ὅθεν δὴ καὶ τῆς συμπύκνωσης σοιχειώσεως τέλος προεσίσατο, τὴν τῶν καλομύλων πλατωνικῶν χημάτων σύστασιν. Dehinc alios eius autoris libros mathematicos, magna industria conscriptos, commemorat, subiiciens: πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα τοῦ ἀνδρός τούτου μαθηματικὰ συγγράμματα, θαυμαστῆς ἀκριβείας καὶ ὑψημονικῆς θεωρίας μεσά. τοιαῦτα γὰρ καὶ τὰ ὀπτικά, καὶ τὰ κατοπτρικά. Ἰσαῦτα δὲ καὶ αἱ τῆς μουσικῆς σοιχειώσεις, ἐπὶ δὲ τὸ πρὸς διαίτησιν βιβλίον. Qui autem ex omnibus his libris eius præcipuam laudem merentur: respondet idem Proclus, dicens: ὁ ἀφρόντως δὲ ἂν τις ἀντὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὴν γεωμετρικῶν σοιχειώσιν, καὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν πρὸς τὰ σοιχεῖα πεποιημένων θεωρημάτων τε καὶ προβλημάτων. καὶ γὰρ ὀχρεῖα γενεῶν λέγειν, ἀλλ' ὅσα σοιχειώσιν ἠδωῶτο πρὸς ἀληθειάν. Sed & alia quedā huius autoris præter mathematica, recenset idem, subiungens: ἐπὶ δὲ τῶν συλλογισμῶν παντοίους τρόπους, τῶν μὲν ἀπὸ τῶν ἀπείρων λαμβάνοντας τὴν πίσιν, τῶν δὲ ἀπὸ τεκμηρίων ὠρημύλων, πάντως δὲ ἀνελέγκτους καὶ ἀκριβεῖς, καὶ πρὸς ὑψηλῶν οἰκῆσιν. πρὸς δὲ τούτοις τὰς μεθόδους ἀπάτας τὰς ὁρατικῆς, τὴν μὲν διαίτητικῶν γὰρ τῶν εὐρέσεων, τὴν δὲ ἀναλυτικῶν γὰρ τῶν ἀπὸ τῶν ζητημύλων ὑπὸ τῶν ἀρχαῖς ἀναστροφῶν. Et paulo post: ἐπειδὴ δὲ πολλὰ φαντάζει μὲν ὡς τῆς ἀληθείας ἀντεχόμενα, καὶ τῶν ὑψημονικῶν ἀρχαῖς ἀπολυτοῦτα, φέρειται δὲ εἰς τὴν ἀρχῶν πάλιν, καὶ τῶν ὑποπλασιῶν ἀπατάς, μεθόδους πρὸς ἀδιδωκῆν καὶ τῆς τούτων διαίτητικῆς φρονήσεως, ἃς ἐχοντοῦν γυμνάσειν διωρησόμεθα τῶν ἀρχαῖς καὶ τῆς θεωρίας ταύτης, πρὸς τὴν εὐρίσιν τῶν πρὸς ἀλογισμῶν, ἀνεπατάτοι δὲ ὁρατικῶν. καὶ τούτων δὲ τὸ σύγγραμμα, δι' οὗ τὴν πρὸς ἀσπιδὸν ἡμῶν ταῦτα τὴν γνῶσιν, ἡδυσταρίων ἐπέγραψε, τρόπους τε αὐτῶν ποικίλους γὰρ τάξει ὁρατικῶν ἀμετάμελος, καὶ καθ' ἑκάστην γυμνάσας ἡμῶν τὴν διάνοιαν παντοίως θεωρήμασι. Ἰσὲ δὲ ἡδιδειτὸ ἀληθὲς πρὸς ἀλήθειαν, καὶ τῆς πείρας ἡμῶν ἐλεγχῶν καὶ ἀπάτης συναρμόσων. ὡσαύτως μὲν οὖν τὸ βιβλίον καθαρτικῶν ὄρα, καὶ γυμνασιῶν. ἡ δὲ σοιχειώσιν αὐτῆς καὶ τῆς ὑψημονικῆς θεωρίας τῶν γὰρ γεωμετρίας πραγματῶν ἀνελέγκτων ἔχει, καὶ τελείων ὑφήγησιν. Hæc de

Euclide & libris eius, ex Proclo.



BREVIS REGVLARVM ALGEBRAE DESCRIPTIO, VNA CVM DEMONSTRATIONIBVS GEOMETRICIS, AVTORE IOANNE SCHEVBELIO.



VVM, ut in absolutis numeris naturali quodam ordine maior sequitur minorem, ita quoque in denominatis proportione aliqua (quorum computationem hoc libro explicare institui) fieri consentaneum sit: primum ostendam quae uocabula & signa, & qui ordo talium numerorum, deinde quae & cuiusmodi sint regulae Algebrae, rationum ualde artificiosarum, planum facere, ac quoad eius fieri potest, breuissimè & perspicuè docere aggrediar. Porro harum regularum inuentionem ascribunt Diophanto Graeco scriptori, qui, ut autor est Re-

giomontanus in praefatione Alphragani, libris tredecim eas descripsit, atque ut Latini REI ET CENSUS sit Arabes regulas illas uocabulo suo appellare solent ALGEBRAS, id quod obiter indicandum erat.

NUMERATIO. CAPVT I.



Characteres uocabulorum seu appellationum, quibus in his regulis numeri naturali quodam ordine proportionis denominantur, sunt, $\vartheta, 2\varrho, 3, \varrho, 33, 13, 3\varrho, 133, 333, \varrho\varrho, 313, 113, 33\varrho, \&c.$ Signa praeterea, $+$ & $-$

CHARACTERVM EXPLICATIO.

ϑ . Primus character, habet appellationem numeri, sic, ut cuiuscumque numero appositus sit, pro simplici is habeatur. Vt 4, appposito characterè ϑ , sic, 4 ϑ , effertur quatuor numeri, hoc est, quatuor unitates simplices. Ac praeterea 13 ϑ , 49 ϑ , 486 ϑ , tredecim, quadraginta nouem, quadringenta & octoginta sex, item ceteri numeri, unitates simplices significabunt.

2ϱ . Secundus ordine character, appellationem habet Radicis uel Rei, sic, ut cui numero appositus sit, hac ille appellatione exprimat. Vt 4 2ϱ , denotant quatuor radices uel res. Sic 8 2ϱ , sunt & exprimuntur octo radices.

3 . Tertius character, appellationem obtinet Censur uel Quadrati, sic, ut numerus cui sit ascriptus talis character, hac appellatione appelletur. Vt 4 3 , exprimuntur quatuor censur uel quadrati. Sic 8 3 , sunt octoginta septem censur uel quadrati.

ϱ . Quartus character, repraesentat nobis numerum cubicum, sic, ut numerus hac nota insignitus, cubi appellationem habeat. Vt 4 ϱ , exprimuntur quatuor cubi. Sic 49 ϱ , sunt quadraginta nouem cubi. Haud longè secus exprimendos reliquos characteres, si quibus erunt adiuncti numeris, censendum. Quare eorum tantum appellationibus, quid nimirum singuli significant, figura quadam repraesentatis, uel deinde aut significatione signorum $+$ & $-$ expressa, quorum nimirum illud, Plus & additionem: hoc uerò, Minus & diminutionem significet, quod ad numerationis descriptionem attinet, per haec quae hoc loco proponuntur, nunc satis manifestum erit.

A Significat

BREVIS REGVLARVM

SIGNIFICANT AVTEM CHARACTERES,

9 quidem,	Numerum	2e,	uerò Radicem.
3,	Quadratum	ce,	Cubum.
33,	Quadratū de quadrato.	f3,	Surfolidum.
3ce,	Quadratum de cubo, uel contrà,		Cubum de quadrato
Bf3,	Bissurfolidū significat.		
333,	Quadratum de quadrati quadrato, uel contrà,		Quadratum quadrati de quadrato
		ce,	Cubum de cubo
3f3,	Quadratum de surfolido, uel contrà,		Surfolidum de quadrato.
		Tf3,	Terfurfolidum
33ce,	Quadratum quadrati de cubo, uel contrà,		Cubum quadrati de quadrato.

Quia uerò hæ numero rum appellationes in infinitum sese extendunt, cum ex multiplicatione (ut que semper cōtinuari possit) ipse proueniant, ne imponendis nominibus tandē infinitio nobis faciat negociū, per numeros naturali ordine positos, cum & ipsi in infinitum crescant, singulas appellationes nominabimus, sic, ut primus character. 9: Numeri, Secundus uerò, 2e: Radicis nomē habeat. Tertius de de, 3. qui cū ex multiplicatione radicis in se producat, & primo quidem: Prima quantitas, & Pri etiam syllaba notata, appelletur. Quartus uerò ce quia ex multiplicatione eiusdem radicis cum quadrato, hoc est, cum prima quantitate, secundo producit: Se syllaba notata, Secunda quantitas dicitur. Sic character quintus, 33, quia ex multiplicatione radicis cum secunda quantitate tertio nascitur: Ter syllaba notata, Tertia etiam quantitas dicitur. Sextus eadem ratione, syllaba quar: Quarta. Denique reliqui omnes, quo ordine singuli nascuntur, eo etiam suæ initialis syllabæ numero appellantur.

TYPVS QVO HAEC QVAE IAM DICTA SVNT, suis figuris ordine depinguntur.

Numerus	Radix	Census uel Quadratus	Cubus	Quadratus de quadrato	Surfolidus	Quadratus de cubo, uel contra.	Bissurfolidus.	Quadratus de quadrati quadrato.
	2e	3	ce	33	f3	3ce	bf3	333
Numerus	Ra.	Pri.	Se.	Ter.	Quar.	Quin.	Sex.	Sep.
	Radix	Prima	Secunda	Tertia	Quarta	Quinta	Sexta	Septima
								quantitas.

EXEMPLA NUMERATIONVM PROPO- nuntur sic.

$$44 \left\{ \begin{array}{l} f3 \\ \text{quar.} \end{array} \right. + 11 \left\{ \begin{array}{l} 3 \\ \text{pri.} \end{array} \right. + 31 \left\{ \begin{array}{l} 9 \\ \text{N.} \end{array} \right. - 53 \left\{ \begin{array}{l} 2e \\ \text{ra.} \end{array} \right.$$

Exprimitur, uel 44 surfolidi, plus (id est 8) 11 quadrati, plus 31 numeri, minus 53 radices, Vel 44 quartæ, plus 11 primæ plus 31 numeri, minus 53 radices. Similiter

$$25 \left\{ \begin{array}{l} bf3 \\ \text{sex} \end{array} \right. + 13 \left\{ \begin{array}{l} f3 \\ \text{quar.} \end{array} \right. + 9 \left\{ \begin{array}{l} ce \\ \text{se.} \end{array} \right. - 48 \left\{ \begin{array}{l} 3 \\ \text{pri.} \end{array} \right. - 11 \left\{ \begin{array}{l} 2e \\ \text{ra.} \end{array} \right.$$

Exprimit

ALGEBRAE DESCRIPTIO.

Exprimitur 25 biffurfolidi, plus 13 furfolidi, plus 9 cubi, minus 48 quadrati, minus 11 radices. Vel 25 sextæ, plus 13 quartæ, plus 9 secūda, minus 48 primæ, minus 11 radices.

Proinde harum regularum exempla, cum eodem modo, quo in communi negociatione aliàs monetarum, mensurarum & ponderum, atq; etiam quarumlibet aliarum rerum numeri, enuncientur, his duobus exemplis positis, puto iam facile omne propositum exemplum exprimi posse, quare de enunciatione iam satis.

ADDITIO. CAPUT II.



In additione scribantur numeri cum suis characteribus & signis, non aliter atq; in communi numerorum uel physicalium minutiarum tractatione fieri consuevit, linea deinde sub ordinibus ducta, omnes unius characteris, seu appellationis numeri in unum colligantur. Quod si horum summæ tandem, unà cum characterē & signo cuiusq; sub linea, eo quo maxime collectæ sint loco, scriptæ fuerint, additio peracta erit.

EXEMPLA.

Ter.	ra.	N	Quar.	N	Pri
7	+ 8	— 5	7	+ 8	— 3
3	+ 9	— 8	4	+ 11	— 5
10	+ 17	— 13	11	+ 19	— 8

Quod si in uno ordine numerus fuerit, cuius characteri uel appellationi similis in reliquis ordinibus non reperitur, ille cum suo characterē & signo summæ sub linea ascribendus erit. ut,

7	quar.	+	8	ra.	—	5	N		Item	9	ter.		
4	quar.	+	9	ter.	+	6	ra.			8	ra.		
11	quar.	+	9	ter.	+	14	ra.	— 5	N	9	ter.	+ 8	ra.
	Item		4	primis	+	9	N						
	addendæ sunt		3	primæ	—	4	ra.						
	ueniunt 7 pri.			+ 9	N	—	4	ra.					

Quòd si in signis fuerit aliqua diuersitas, sic quòd numerorum unius appellationis alter +, alter uero signū — habuerit: maioris super minorem numerū excessu per subtractionem cognito, is cum maioris numeri signo & characterē sub linea, quemadmodum alia, scribatur. ut,

Pri.	ra.		Pri.	ra.
6	— 8	Item	6	+ 8
4	+ 12		4	— 4
10	+ 4		10	+ 4

PROBATIONE VEL EXAMEN.

— 2		+ 40
	+ 2 ⁴ / ₉	+ 48
+ 4 ⁴ / ₉		+ 8
	+ 2 ⁴ / ₉	+ 48

COMPROBATIO VEL EXAMEN OPERATIONIS.

Vt nunc comprobetur rectè ne an secus in additione operatum sit, necesse erit ut primò præparetur tabula huic negotio deseruiens, hoc modo. Accipiatur ad placitum numerus, integer uel fractus, eo deinde radicis loco posito, eius, prout quidem exemplorum quæ comprobari debeant characteres requirunt, singulæ quantitates ordine designentur, atq; notatis tandem his, unà cum radice posita, tabula, ut sequitur parata erit.

BREVIS REGVLARVM
TABVLA COMPROBATIONIS.

Radix posita.	Prima,	Secun.	Tertia,	Quarta,	Quinta,	Sexta,	Septi.	Octava quantitas.
2	4	8	16	32	64	128	256	512
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{512}$
$3\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{4}$	$42\frac{7}{8}$	$150\frac{1}{16}$	$525\frac{7}{32}$	$1838\frac{17}{64}$	$6433\frac{119}{128}$	$22518\frac{193}{256}$	$78815\frac{327}{512}$
7	49	343	2401	1687	117649	823543	5764801	40353607

Et quia tabula iam est confecta, exemplorum examen, recte an secus computatio sit facta, hoc modo cognoscetur. Resoluantur numeri denominati in singulis ordinibus, secundum unius numeri ex radicibus positis (eius nimirum per quem probatio instituitur) quantitates, in numeros absolutos, sumptis interim & ijs in singulis ordinibus, qui proprie numeri, nempe simplices, appellantur. Proinde qui ex additis proveniunt simplices numeri, in unum tamen prius collecti, si id collectum, siue totus is numerus, ei qui ex inferiori, hoc est ex summa colligitur, equalis fuerit: recte te operatum scias, at contra si inequalis: reiterandam esse nimirum operationem ipso errore admoneberis. Atque in hunc modum, ultimum quidem per radicem positam 2. quod uero exemplum ipsum precedit, per $\frac{1}{3}$ comprobatum esse scias.

SEQVITVR EXEMPLVM ALIVD.

$$\begin{array}{r}
 7 \text{ quint.} + 8 \text{ ter.} - 4 \text{ ra.} + 8 \text{ N} \\
 7 \text{ quint.} + 5 \text{ quar.} - 11 \text{ ter.} - 11 \text{ se.} \\
 \hline
 14 \text{ quint.} + 5 \text{ quar.} - 3 \text{ ter.} - 11 \text{ se.} - 4 \text{ ra.} + 8 \text{ N}
 \end{array}$$

Probatur hoc exemplum per 2.
Numeri ordinis

Primi 576 Secundi 344.

Summa 920. Atque tot etiam unitates simplices, uel tantus numerus ueniet, ubi summa sub linea posita simili modo resoluta fuerit.

Idem exemplum probatum per

$$\begin{array}{r}
 + 6\frac{65}{729} \left. \vphantom{\frac{65}{729}} \right\} + 6\frac{101}{729} \\
 - 3\frac{74}{729} \left. \vphantom{\frac{74}{729}} \right\} \\
 \hline
 + 6\frac{101}{729}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 3\frac{1}{2} \\
 14062\frac{23}{64} \left. \vphantom{\frac{23}{64}} \right\} \\
 13368\frac{57}{64} \left. \vphantom{\frac{57}{64}} \right\} \\
 \hline
 2743\frac{1}{4}
 \end{array}$$

SUBTRACTIO CAP. III.

IN subtractione id quod subtrahitur, sub eo a quo subtractio fieri debet, ordine scribatur, subducta deinde linea, singularum in subtrahendo appellationum numeri a numeris appellationum similium, eius a quo subtractio fieri debeat, auferatur. Quod si tandem residui, una cum cuiusque caractere & signo, sub linea suo loco positi fuerint, subtractio perfecta erit. Hic tamen maxime respectus habeatur signorum + & —, nam per illa quid subtrahendum sit, & quid non, quantum deinde illud sit, de quo subtractio fieri debeat, quantum fuerit initio, & quantum subtractione nunc ei desit, cognoscitur. quae certe omnia nisi animaduertantur: difficilis erit omnis subtractio, contra uero: nulla non facilis, si obseruentur.

EXEMPLA.

Pri.	ra.	N	Ter.	ra.
7	+	8	+	14
3	+	5	+	7
4	+	3	+	7

8	+	7
5	—	4
3	+	11

Primum

Primum exemplum est facile, secundum autem, quia in eo non 5 tertiae totae & integre, sed hae, quatuor radicibus minus subtrahendae sunt. postquam igitur 5 tertiae integrae a superioribus subtractae fuerint, 4 radices residuo reddendae erunt. Quo fit, ut 11, & non 3 radices, ultra 3 tertias in residuo conspiciuntur, ut

Ter.		pri		pri	•	N
14	+	9		19	—	5
9	+	12		14	+	14
5	—	3		5	—	19

In his duobus exemplis superiorum memori nulla difficultas occurret. Nam cum aliquid totum & integre subtrahi non possit, nihilominus id quod maxime potest, de summa est detrahendum. quod reliquum deinde est, per diminutionum signum, —, ut communi apprehenditur notione, in debitum ponendum est, quod ipsum in priori exemplo cognosci potest. In posteriori, cum 14 exponi debeant, prius uero 8 eiusdem appellationis, de summa exposita sint, 22 iam per signum — notanda erunt.

Pri.		N		Pri.		N
12	—	9		12	—	4
8	—	4		8	—	9
4	—	5		4	+	5

In his duobus exemplis, cum in utroque non 8 quantitates primae, sed hae in uno quidem minus 4, in altero uero, minus 9 numeris subtrahendae sint, 8 primis integre subtractis, residuis tandem id quod plus aequo subtractum est, iure accedere debet. Quare in priori quidem exemplo, loco — 9, cum 4 accedant, tantum — 5, in posteriori uero loco — 4, cum 9 accedant, + 5 N positum est.

ALIVD EXEMPLVM.

A	1056	primis	—	696	secund.
subtra.	4032	primae	—	1008	secund.
manent	312	secundae	—	2976	pri.

Proba, sumpto radicis ualore

— 1344	— 1344	— 9288	— 9288
+ 8064	— 1344	+ 9072	— 9288
— 9408		— 18360	

Vel facta subtractione

— 1344	— 9408	— 9288	— 18360
+ 8064		+ 9072	
— 9408	— 9408	— 18360	— 18360

Haec tenus quae in signis animaduertenda, ostendimus.

Quod si in uno ordine, uel in eo qui subtrahitur, uel in eo a quo subtrahitur, numerus fuerit, cuius characteri in altero similis non reperitur, in subtrahendo quidem numerus ille cum suo characteri, signo tamen opposito, in altero uero ordine, omnia, hoc est, numerus, character & signum, sub linea scribantur,

EXEMPLVM.

A	4	quar.	—	5	radi.
subtrahantur	2	quar.	+	9	N
manent	2	quar.	—	9	N — 5 ra.

A 3 Alia

BREVIS REGVLARVM
ALIA DVO.

8 pri.	4 quar.	+ 8	ra.
4 ter.	3 quar.	- 8	N
8 pri. - 4 ter.	1 quar + 8 ra.	+ 8	N

ALIVD EXEMPLVM.

Sep.	sex.	quin.	Ter	se.	prime	quan.
8	+ 9	+ 11	+ 14 quar.	- 4	- 8	- 4
5	+ 12	- 9	+ 10 ra.	+ 8	- 4	- 9 - 6 N
3 sep. - 3 sex. + 20 gn. + 14 quar. - 10 ra.			- 12	- 4	+ 5	+ 6 N

PROBAE NUMERVM, AC RADICIS VALOR,
esto 2

+	4208	+	1894
+	2314		
		+	1694

COMPROBATIO, VEL EXAMEN OPERATIONIS.

In examine subtractionis utere tabula in additione a nobis proposita, contrario tamen usu, nam quod illic additur, hic subtrahitur. Necesse igitur, ut quantum fuerit numerorum subtrahendi, secundum suorum characterum appellationem resolutione facta, tantundem de alterius ordinis numeris, eodem modo resolutis, subtrahatur. Quod si tandem quod relinquitur residui numeri sub linea solutioni responderit, ut in hoc ultimo praemisso exemplo apparet, non est quod te hallucinatum fuisse subtractione existimes.

Idem ultimum exemplum examinatum, radice ualore
existente $3\frac{1}{2}$

Singulorum characterum numeri, pro ualore radice positae soluti, sunt, in ordi-

[quidem a quo subtrahitur,	+	$\frac{512}{6561}$	-	$\frac{64}{81}$
ne < subtrahendo uero	+	$3\frac{2876}{6561}$	-	$7\frac{17}{81}$
[residuo deinde	+	$6\frac{4206}{6561}$	-	$3\frac{460}{729}$

hoc est,

-	$\frac{4672}{6561}$	+	$3\frac{66}{6561}$
-	$3\frac{4738}{6561}$	-	$\frac{4672}{6561}$
+	$3\frac{66}{6561}$		

Potest proba subtiliori etiam modo institui, ijs nimirum, qui post illud, quo dicitur, Hoc est, ponuntur, numeris neglectis. Sed per hanc iam satis.

MULTIPLICATIO. CAP. III.

Multiplicatione, scriptis ordinibus, linea item sub ijs ducta, ut solet, multiplicentur numeri singulorum characterum superioris, cum singulis characterum numeris ordinis inferioris, atque productis posthac singulis legitime in unum collectis, si cuique producto tandem suus proprius character & signum, quae sic multiplicando sortiuntur numeri, adscripta sint, multiplicatio perfecta erit. In hac autem numerorum collectione animaduertendum est, qualem characterem, quale item signum, quilibet productus numerus sortiatur. Quantum igitur ad characterem pertinet, hoc est, ut sciat, qui character sit ascribendus procreato ex multiplicatione numero, ex hac subiecta tabula intelligi poterit.

TABVLA MULTIPLICATIONIS, QVANTVM
ad characteres.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	Ra.	Pri.	Secun.	Ter.	Quar.	Quin.	Sex.	Sep.	Octa.	No.	De

cima & cæ. quantí.

COMPOSITIO TABVLAE.

Scribantur characteres singulí ordine quo ipsi proveniunt & numerantur, sic, ut character N. primus, locum primū: Radix uerò character secundus, secundum: reliqui deinde omnes naturali ordine sua loca occupent. Super primo deinde characterē, N scilicet, figura nihilí 0 posita, reliquis omnibus naturali numerorum ordine, ab unitate incipiendo, signatis, tabula confecta erit, cuius usus talis est.

VSVS TABVLAE.

In multiplicatione, duobus duorum characterum numeris inter se multiplicatur, qui super horum numerorum characteribus in præscripta tabula reperiuntur numeri, hi simul aggregati, summa sua characterem producti in tabula ostendent.

Porrò quod ad signa + & — attinet, quale scilicet unicuique producto sit adnotandum, communis notitia atque intelligentia, ex sequentium exemplorum descriptione, expeditam nobis & promptam rationem suppeditabit.

SEQVUNTVR EXEMPLA.

8 pri.	8 N	9 se.	29 quar.
4 N	8 N	8 ra.	9 quar.
32 pri.	64 N	72 ter.	261 No.

Initium ordinis numerorum semper representare plus admonendus est lector.

ALIA EXEMPLA.

8 pri. + 9 N	8 pri. + 9 N
7 pri. + 4 N	8 pri. + 9 N
32 pri. + 36 N	72 pri. + 81 N
56 ter. + 63 pri.	64 ter. + 72 pri.
56 ter. + 95 pri. + 36 N	64 ter. + 144 pri. + 81 N

In his duobus exemplis nulla est difficultas, in utroque enim omnes superioris cum omnibus numeris ordinis inferioris multiplicandi sunt. Quare sicut signum + ad omnes, tam multiplicandi quam etiam multiplicantis ordinis, numeros est positum, ita etiam singuli ex multiplicatione producti numeri ex quo eodem signo + notentur. Hinc regulam colligunt in Algebraicis exercitiis, Quod + cum + multiplicatum, + producat, quæ est notanda.

ADHVC ALIA EXEMPLA.

7 pri.	+	4 ra.
		9 ra.
63 se.	+	36 pri.

ALIA EXEMPLA.

2 pri.	—	4 ra.	9 ra.
		9 ra.	7 pri. — 4 ra.
63 se.	—	36 pri.	63 se. — 36 pri.

Primū exemplum est facile, cū in eo tam 7 primæ quantitates quam 4 radices, cum 9 radicibus multiplicari debeant. Secundū autē, & tertij exemplorū ratio, cū sit paulò inuolutior, explicanda communi quadam (quæ uersatur in huiusmodi rebus) notitia esse uidetur. In secundo, 7 primæ solidæ ac integræ cum 9 radicibus, in tertio,

tertio, 9 radices cum 7 itidem integris primis multiplicentur: hæ tamen integræ cū non sint, sed quandam decessionem perpeffe sint priuatiuo signo —, necesse est, ut in multiplicatiōe tantum decedat, quantum non legitimè accessit, priori summæ procreatæ ex multiplicatiōe: atq; hic quidem, quantum 9 radices cum 4 radicibus: illic uerò, 4 radices cum 9 radicibus multiplicatę producunt, id quod per signū diminutionis — fieri debet, sic, — 36 pri. — 36 pri. Ex quo ratio intelligi potest, propter quam, si multiplicetur + cum —, uel contrā — cum +: non plus, sed minus producat, quod & ipsum regula quadam proposuerunt in Algebraicis exercitati, quæ est notanda.

ALIUD EXEMPLVM.

8 pri. — 9 N	
8 pri. — 9 N	
64 ter. — 72 pri.	
— 72 pri. + 81 N	
64 ter. — 144 pri. + 81 N	

	3 8 3	
cum	3 8 3	produ.
1 4 6 6 8 9		
	.nba	
	1 4 6 6 8 9	

Quomodo 8 primæ cum 8 pri. ut totum cum toto multiplicari debet, item quomodo 8 primæ — 9 N. cum 8 primis, Postremò 8 primæ etiam cum 8 primis — 9 N. suprâ ostendimus. At uerò cum in hoc exemplo multiplicandi ratio minus sit perspicua, eam explanare obiter hoc loco uolui, ut intelligatur scilicet caussa etiam, propter quam, signo — notatis numeris, non minus, sed plus procreetur, hoc quod diuersum quid, quàm in superioribus hætenus est habitum, esse solet. Multiplicentur igitur 8 primæ — 9 N. ut dictum est, cum 8 primis, & producentur 64 ter. — 72 pri. Sed quia non cum 8 primis integris, uerum cū ijs, detractiōe, 9 N. imminutis, multiplicatiō institui debet, plus quàm par erat, priore multiplicatiōe est procreatum, quare ut conueniens producat, ratione defectus in multiplicante, 8 primæ nouies ex hoc producto subtrahendæ erunt. Atqui rursus, cum non 8 primæ, sed hæ minus 9 N. multiplicari debeant, 9 N. rursus nouies addendæ sunt. quod cum fit, quando minus multiplicatur per minus (id quod tertio ratione signorum, + & — in multiplicatiōe obseruari debet) Quo demum reddito, uerus productus numerus apparebit.

Tribus igitur regulis his suprâ propositis, omnis multiplicatiō, ratione quidem signorum + & — absoluitur: quæ tamen, quia prima & ultima coincidunt, ad duas regulas reduci possunt.

Prima.

Si fuerint eadem signa multiplicantis & multiplicandæ quantitatis, procreatus ex multiplicatiōe numerus notatur signo affirmatiuo +.

Secunda.

Si fuerint signa diuersa: notatur productus ex multiplicatiōe numerus signo priuatiuo uel negatiuo —.

POTEST ETIAM ALITER HVIVS EXEMPLI PRÆCEDENTIS multiplicatiō institui.

Multiplicentur primò 8 pri. — 9 N. cum 8 primis una, postea etiam cum 9 N. altera quantitate. Subtrahatur deinde, per caput præcedens, posterius productum à priori, & relinquatur uerus ex multiplicatiōe productus numerus, ut sequitur.

8 pri.

ALGEBRAE DESCRIPTIO.

$$\begin{array}{r}
 8 \text{ pri.} - 9 \text{ N} \\
 \text{cum } 8 \text{ pri.} \\
 \hline
 64 \text{ ter.} - 72 \text{ pri.} \\
 \text{Productorum subtractio,} \\
 64 \text{ ter.} - 72 \text{ pri.} \\
 72 \text{ pri.} - 81 \text{ N} \\
 \hline
 64 \text{ ter.} - 144 \text{ pri.} + 81 \text{ N}
 \end{array}$$

SEQVITVR HVIVS REI EXEMPLVM IN NVME-
ris rationalibus.

$$\begin{array}{r}
 17 - 6, \quad \text{hoc est } 11 \\
 \text{cum } 9 - 4 \quad \text{cum } 5 \\
 \hline
 153 - 54 \\
 - 68 + 24 \\
 \hline
 153 - 122 + 24 \\
 \text{hoc est, } 55. \text{ Et tantum etiam sunt } 11. \text{ quinquies, uel undecies} \\
 \text{quinq;, ut quidem multiplicatione patet,} \\
 \text{quod erat ostendendum.}
 \end{array}$$

ALIVD MVLTIPPLICATIONIS EXEMPLVM.

$$\begin{array}{r}
 9 \text{ pri.} + 8 \text{ N} - 3 \text{ ra.} \\
 7 \text{ se.} - 4 \text{ ter.} - 8 \text{ pri.} \\
 \hline
 63 \text{ quar.} + 56 \text{ se.} - 21 \text{ ter.} \\
 - 36 \text{ qu.} - 32 \text{ ter.} + 12 \text{ quar.} \\
 - 72 \text{ ter.} - 64 \text{ pri.} + 24 \text{ se.} \\
 \hline
 75 \text{ quar.} + 80 \text{ se.} - 36 \text{ qui.} - 125 \text{ ter.} - 64 \text{ pri.}
 \end{array}$$

PROBAE NVMERVS AC RADICIS VALOR.

$$\begin{array}{r}
 \text{fit } \frac{1}{3} \\
 + \quad 8 \\
 - \quad \frac{55}{81} \\
 \hline
 - \quad \frac{55}{81} \\
 - \quad 5 \frac{35}{81} \\
 \hline
 - \quad 5 \frac{35}{81}
 \end{array}$$

Potest etiam, cum iam sciatur, quale signum cuius productio sit ascri-
bendum, multiplicatio ad vulgarem modum sic institui.

$$\begin{array}{r}
 9 \text{ pri.} + 8 \text{ N} - 3 \text{ ra.} \\
 7 \text{ se.} - 4 \text{ ter.} - 8 \text{ pri.} \\
 \hline
 - 72 \text{ ter.} - 64 \text{ pri.} + 24 \text{ se.} \\
 - 36 \text{ quin.} - 32 \text{ ter.} + 12 \text{ quar.} \\
 63 \text{ quar.} + 56 \text{ se.} - 21 \text{ ter.} \\
 \hline
 75 \text{ quar.} + 80 \text{ se.} - 36 \text{ quin.} - 125 \text{ ter.} - 64 \text{ pri.}
 \end{array}$$

PROBAE NVMERVS AC RADICIS VALOR.

$$\begin{array}{r}
 \text{fit } 2 \\
 + \quad 38 \\
 - \quad 40 \\
 \hline
 - \quad 1520 \\
 \hline
 - \quad 1520
 \end{array}$$

COMPROBATIO VEL EXAMEN OPERATIONIS.

Proba hic non aliter instituitur atq; in superioribus, nempe per resolutionem
denominatorum numerorum. Nec à superiori differt, nisi quòd hic numerus ab-
solutus unus cum altero multiplicetur, cū illic simul additi, usi unus ab altero sub-
tractus sit. Tabula igitur, quam in additione præscripsimus, huc etiam assumenda
erit, & ad multiplicationis resolutionem adhibenda.

B

Divisio



In numeri diuidendi character semper maior esset caractere sui diuisoris, uno item caractere diuisor ipse signaretur, simplicissima & facillima esset omnis diuisio. Etenim numero uel numeris diuidendi singulis in numerum diuisoris diuisis, characteris deinde diuisoris numero (quo scilicet in multiplicationis tabula signatur) à numero, uel numeris characteru diuidendi singulis subtracto, diuisio utiq; peracta esset. Diuisio enim sic per exeutes ipsos numeros, subtractio uero numeroru, quibus signantur in tabula characteres, ubi residuus, uel residui numeri singuli in tabulam multiplicationis missi fuerint: horum numeroru denominationes seu characteres offeret.

In signis porrò nulla fit planè mutatio. Quæ enim signa habet ipse diuidendus, illa eadem etiam in exeute ponuntur.

EXEMPLA SVNT.

Diuidantur 9 ra. (exe. 3 ra Item 10 se. (exe. 3 1/2 N
in 3 N in 3 se.

ALIA EXEMPLA.

8 ra. in 9 ra. Item 10 se. in 3 ra.
exeunt 8/9 N exeunt 3 1/3 pri.

ADHVCAIA.

9 pri. + 4 ra. in 3 ra. Item 18 ter — 12 pri in 4 ra.
exeunt 3 ra + 1 1/3 N exeunt 4 1/2 se. — 3 ra.

Sed quia non rarò contingit, quòd diuisoris character maior quàm diuidendi character sit, pluribus etiam characteribus quàm uno, signetur. Alia ratione igitur numerus qui proponitur, diuidendus erit. Nam tum diuisor numerus diuidendo subscribi, ac uirgula interponi atq; interduci oportet.

Vt diuidere uolens, 8 quar. in 2 pri. — 4 N
Item 8 pri. — 9 ra. in 4 ra. + 3 N.

Diuisores suis diuidendis tantum, ut præcipitur, subscribat: ac uirgulis deinde interiectis, diuisionem absolutam esse sciat.

EXEMPLA.

Diui- den.	Diuisor		Diui- den.	Diuisor
8 quar.	in 2 pri. — 4 N	Item	8 pri.	in 4 ra + 3 N
	Exiens		Exiens	
	8 quar		8 pri. — 9 ra.	
	2 pri. — 4 N		4 ra. + 3 N	

ALIA EXEMPLA.

9 N in 3 ra. 8 ra. in 4 pri.
exeunt 3 N exeunt 8 ra. uel 2 N
 1 ra. 4 pri. 1 ra.

Afferri autem huc necesse est tabulam, in multiplicatione, pro characteribus productorum habendis, expositam. Nam quemadmodum in multiplicatione, numeri characterum eorum qui inter se multiplicantur, pro characteribus productorum habendis, addendi: sic in diuisione iam, ut habeatur character exeutis unius, diuisoris scilicet character de numero characteris ipsius diuidendi subtrahi debet. Per residuum enim numerum statim, in tabula illa, exeutis character manifestabitur: cum is nimirum sit, cui est numerus residuus suprà positus. Et hæc de integris hætenus pro instituto nostro satis nos dixisse opinor.

Sequuntur

SEQVUNTUR REGVLAE QVAS OBSERVARI IN FRACTIONIBVS oportet.

ENUNCIATIO. CAP. I.

Quantum ad enunciationem fractionum seu minutiarum, nulla est hic difficultas, cum hæ non aliter atq; in communi minutiarum tractatione enuncientur, nisi quòd etiam uocabula seu characteres suis appellationibus efferantur, & horum quidem primus, si duo fuerint, numeratorem: alter deinde, ipsum denominatorem sequatur. Quod si unus tantum fuerit minutiae character, ad minutiae numeratorem illum pertinere scias. Vt minutia $\frac{3}{8}$ N. ra. enunciatur, tres numeri diuisi in octo radices. Item $\frac{7}{9}$ pri. sunt septem primæ diuisæ in 9. Similimodo alias minutas omnes efferri oportet.

ADDITIO ET SVBTRACTIO.

Caput II.

Pro additione, addantur fractiones, prout communis earum tractatio requirit. Qui deinde characteres numeratoris & denominatoris collectæ minutiae sint, ostendet tabula in multiplicatione de integris exposita. Idem usuuenit etiam in subtractione, in qua itidem una minutia de alia subtracta, characteres residuæ minutiae tabula integrorum supra proposita offeret.

EXEMPLA ADDITIONIS.

$$\begin{array}{r} 31 \text{ pri.} \\ \hline 15 \text{ pri.} \\ 3 \text{ N} \text{ ad} \\ \hline 4 \text{ ra.} \\ \hline 20 \text{ se.} \end{array}$$

Item

$$\begin{array}{r} 15 \text{ pri.} + 14 \text{ ra.} \\ \hline 15 \text{ pri.} \\ \frac{5}{6} \text{ pri.} \text{ ad} \\ \hline 18 \text{ N} \\ \hline 14 \text{ ra.} \\ \frac{7}{8} \text{ ra.} \end{array}$$

ALIUD EXEMPLVM.

$$\begin{array}{r} 48 \text{ N} \\ 7 \text{ pri.} \end{array} \text{ ad } \begin{array}{r} 48 \text{ N} \\ 12 \text{ ra.} - 3 \text{ pri.} \end{array} \text{ uenit } \begin{array}{r} 192 \text{ pri.} + 576 \text{ ra.} \\ 84 \text{ se.} - 21 \text{ ter.} \end{array}$$

ADHVC ALIUD.

$$\begin{array}{r} \frac{4}{9} \text{ N} \\ \hline \end{array} \text{ ad } \begin{array}{r} \frac{1}{9} \text{ pri.} \\ \hline \end{array} \text{ ue. } \begin{array}{r} 1 \text{ pri.} + 4 \text{ N} \\ \hline 9 \end{array}$$

ALIUD.

$$\begin{array}{r} 9 \text{ ra.} + 2 \text{ pri.} \\ 36 \text{ se.} \end{array} \text{ ad } \begin{array}{r} 21 \text{ ter.} - 8 \text{ pri.} \\ 36 \text{ se.} \end{array} \text{ ue. } \begin{array}{r} 21 \text{ ter.} + 9 \text{ ra.} - 6 \text{ pri.} \\ 36 \text{ se.} \end{array}$$

Vel in minimis, quantum ad numeros & characteres, ueniunt,

$$\begin{array}{r} 7 \text{ se.} + 3 \text{ N} - 2 \text{ ra.} \\ \hline 12 \text{ pri.} \end{array}$$

B 2

Exempla

BREVIS REGVLARVM
EXEMPLA SVBTRACTIONIS.

15 quar.		14 ra.
16 quar.	de	15 pri. + 14 ra.
4 ra.		15 pri. + 14 ra.
5 pri.		18 N
20 quin.		18 N

Vel in minimis, &cæ.

$$\frac{3}{4} \text{ N}$$

$$\frac{7}{9} \text{ ra.}$$

ALIVD EXEMPLVM.

48 N	de	232 ra. + 576 N	uel de	48 N
12 ra. - 3 pri.		84 pri. - 21 fe.		7 pri.

Sunt duæ subtractiones, manent autem, ratione quidem prioris

6912 ra. + 312 fe. - 2976 pri.	poste.	576 ra. - 480 pri.
63 qr. + 1008 le. - 504 ter.	uerò	84 fe. - 21 ter.

Vel manet ratione prioris

$$\frac{576 \text{ N} - 104 \text{ ra.}}{84 \text{ pri.} - 21 \text{ fe.}} \text{ quod probari potest.}$$

OPERATIO SVBTRACTIONIS PRIORIS.

6912 ra. + 312 fe. - 2976 pri.		1056 pri. + 6912 ra. - 696 fe.
4032 pri. - 1008 le.	de	232 ra. + 576 N
48 N		84 pri. - 21 fe.
12 ra. - 3 pri.		63 quar. + 1008 fe. - 504 ter.

Posterioris subtractionis calculus quia est facilis, ideo etiam relinquitur.

ALIVD EXEMPLVM.

8 pri. + 4 ra.	de	9 fe.	ma.	81 quin. - 64 ter. + 16 pri.
9 le		8 pri. - 4 ra.		72 quar. - 36 ter.

ADHVC ALIVD.

9 pri. + 8 ra.	de	11 fe. + 16 pri. + 8 ra.	ma.	11 fe. + 7 pri.
2 fe. - 6 N.		2 fe. - 6 N		2 fe. - 6 N

MVLTIPPLICATIO ET DIVISIO.

Caput III.



Ro multiplicatione, multiplicentur numeri, numeratores scilicet & denominatores, prout in communi tractatione id fieri solet, inter se: productorum deinde characteres, quem quisq; sortiatur, dabit tabula superius pro hacre exposita. Idem fit etiam in diuisione, ubi itidem una minutia in aliam primò, ut moris est, diuisa, numerorum excurrentium characteres ex superioribus petendi erunt.

EXEMPLA MVLTIPPLICATIONIS

2 ra.	cum	8 N	Item	6 pri. + 8 N	cum	15 ra.
5 pri.		9		9 ra.		8 N
produ.		16 ra.	pro.	15 pri. + 20 N		
		45 pri.		12 N		

ALIVD EXEMPLVM.

7 fe. - 8 pri.	cum	4 ter. + 5 ra.
3 ra. + 4 N.		7 fe. - 8 pri.

produ

producuntur $\frac{4 \text{ ter.} + 5 \text{ ra.}}{3 \text{ ra.} + 4 \text{ N.}}$

ADHVC ALIVD.

$$\frac{28 \text{ sex.} + 35 \text{ ter.} - 32 \text{ quín.} - 40 \text{ se.}}{7 \text{ se.} - 8 \text{ pri.} \quad \text{de} \quad \frac{4 \text{ ter.} + 5 \text{ ra.}}{3 \text{ ra.} + 4 \text{ N.}} \quad \frac{5 \text{ se.} - 8 \text{ pri.}}{15 \text{ ter.} - 4 \text{ se.} - 32 \text{ pri.}}$$

ALIVD.

$$\frac{7 \text{ ter.} + 12 \text{ N}}{8 \text{ pri.}} \quad \text{cum} \quad \frac{7 \text{ ter.} - 12 \text{ N}}{8 \text{ pri.}}$$

$$\text{produ.} \quad \frac{49 \text{ sep.} - 144 \text{ N}}{64 \text{ ter.}}$$

ADHVC ALIA.

$$\frac{7 \text{ pri.}}{8 \text{ ter.}} \text{ cū } 4 \text{ ra. } 8 - \text{N. Item } \frac{7 \text{ pri.} + 8 \text{ ra.}}{5 \text{ se.} - 12 \text{ N}} \text{ cum } \frac{4 \text{ ra.}}{5 \text{ pri.}} - 8 \text{ N.}$$

$$\text{produ.} \quad \frac{7 \text{ se.} - 14 \text{ pri.}}{2 \text{ ter.}} \quad \text{pro.} \quad \frac{32 \text{ pri.} - 280 \text{ ter.} - 292 \text{ se.}}{25 \text{ quar.} - 60 \text{ pri.}}$$

Est huius secundæ multiplicationis duplex operatio. Vna quidem, ut ante multiplicationem, -8 N in multiplicante, ad eandem cum 4 radicibus reducatur de nominatione. Eritq; tum multiplicationis huius modus, qui est superiorum exemplorū. Altera uerò, ut sicut duę sunt in multiplicante diuersæ inter se quantitates, sic etiam duę instituantur multiplicationes. Vna quidem cum $\frac{4 \text{ ra.}}{5 \text{ pri.}}$, altera deinde cū -8 N , & quod secūdò producet, id à priori subtrahatur, & residuum producti ex multiplicatione minutiam manifestabit: id quod quiuis ex communi notitia deprehendere potest.

EXEMPLA DIVISIONIS.

$$\text{Diuidan.} \quad \frac{2 \text{ N}}{3 \text{ ra.}} \text{ in } \frac{8 \text{ ra.}}{9 \text{ pri.}} \text{ uel cont. } \frac{8 \text{ ra.}}{9 \text{ pri.}} \text{ in } \frac{2 \text{ N}}{3 \text{ ra.}}$$

exeunt in minimis $\frac{2}{4} \text{ N}$, exit $1\frac{1}{3} \text{ N}$

ALIVD EXEMPLVM.

$$\frac{15 \text{ se.} + 20 \text{ ra.}}{12 \text{ ra.}} \text{ diuidantur in } \frac{6 \text{ pri.} + 8 \text{ N}}{9 \text{ ra.}}$$

exeunt $\frac{45 \text{ se.} + 60 \text{ ra.}}{24 \text{ pri.} + 32 \text{ N}}$

ALIVD EXEMPLVM.

$$\frac{7 \text{ se.} - 14 \text{ pri.}}{2 \text{ ter.}} \text{ in } \frac{7 \text{ pri.}}{8 \text{ ter.}} \text{ exe. } 4 \text{ ra.} - 8 \text{ N}$$

$$\text{Sic } \frac{7 \text{ se.} - 14 \text{ pri.}}{2 \text{ ter.}} \text{ in } 4 \text{ ra.} - 8 \text{ N}$$

$$\text{exe.} \quad \frac{7 \text{ se.} - 14 \text{ pri.}}{8 \text{ qr.} - 16 \text{ ter.}} \text{ hoc est } \frac{7 \text{ se.}}{8 \text{ ter.}} \text{ uel in minimis } \frac{7 \text{ N}}{8 \text{ pri.}}$$

REGVLA PROPORATIONVM.

Regulam de proportionibus, quæ nunc recto ordine sequi deberet, cum quiuis partim ex communi ipsius descriptione, partim ex ijs quæ hæcenus sunt commemorata, quomodo hæc in integris atq; etiã in fractionib. tractari debeat, facile cognoscat. Lectori satis me facturū uno duntaxat atq; altero exemplo sum opinatus.

BREVIS REGULARVM
EXEMPLA AVTEM SVNT
huiusmodi.

$$\begin{array}{r} \text{Primum,} \\ \text{rum,} \end{array} \begin{array}{l} 6 N \text{ alicuius rei ualent 3 primis aureo-} \\ \text{quanti 7 ra. + 1 pri. eiusdem rei.} \\ \\ \text{Facit} \end{array} \frac{7 \text{ se.} + 1 \text{ ter.}}{2 N}$$

$$\begin{array}{r} \text{Secun.} \\ \\ \\ \text{Facit} \end{array} \begin{array}{l} 6 \text{ ra. ualent 9 pri. aureorum, quantum emi-} \\ \text{tur 4 se.} \quad - \quad 2 \text{ ra. au.} \\ \\ \frac{8 \text{ pri.} - 4 N}{3 N} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Tertium,} \\ \text{quanti} \\ \\ \text{Facit} \end{array} \begin{array}{l} 3 \text{ ra. + 4 N ualent 8 se. + 4 pri.} \\ 8 \text{ ter.} - 4 \text{ ra.} \\ \\ \frac{64 \text{ sex.} + 32 \text{ quin.} - 32 \text{ ter.} - 16 \text{ se.}}{3 \text{ ra.} + 4 N} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Vel quantum emitur 8 ter.} - 4 \text{ ra. aure.} \\ \\ \text{Facit} \end{array} \frac{6 \text{ ter.} + 8 \text{ se.} - 3 \text{ ra.} - 4 N}{2 \text{ pri.} + 1 \text{ ra.}}$$

HVIVS EXEMPLI EXAMEN.

Quantitates proportionales, quantum ad partem priorem,

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Prima,} & & \text{secunda,} & & \text{tertia,} & & \text{quarta,} \\ 3 \text{ ra.} + 4 N, & 8 \text{ se.} + 4 \text{ pri.,} & 8 \text{ ter.} - 4 \text{ ra.,} & 64 \text{ sex.} + \text{8ca} \\ & & & & & & 3 \text{ ra.} \end{array}$$

RESOLVTAE SECUNDVM VALORES QVANTITATVM.


$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 9600 & & \\ & & & & \text{-----} & & \\ 2) & 10 & & 80 & & 120 & 960 \\ & & & \text{-----} & & \text{-----} & \\ & & & & 9600 & & \\ & & & & \text{-----} & & \\ & & & & 2000 & & \\ & & & & \text{-----} & & \\ & & & & 2187 & & \\ & & & & \text{-----} & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ 3) & + & \int & + & \frac{20}{27} & - & \frac{100}{81} & - & \frac{400}{2187} \\ & & & & \text{-----} & & \text{-----} & & \text{-----} \\ & & & & & & 2000 & & \\ & & & & & & \text{-----} & & \\ & & & & & & 2187 & & \end{array}$$

Quant.

Quantitates proportionales, quantum ad partem posteriorem.

Prima, secunda, tertia, quarta,
 $3 \text{ se.} + 4 \text{ pri.}$, $3 \text{ ra.} + 4 \text{ N}$, $8 \text{ ter.} - 4 \text{ ra.}$, $6 \text{ ter.} + 3 \text{ se.} \frac{8 \text{ ca.}}{2 \text{ pri.}}$

RESOLVTAE SECUNDVM VALORES QVANTITATVM.



PROBATIO SEV EXAMEN.

Probantur huius regule exempla per numerũ loco radicis pro arbitrio sumptũ. si per eius quantitates, singulæ propositi exempli quantitates solutæ fuerint. Hoc autem apparet in exemplo præmissõ ultimo, cuius quidem numeros characterum singulos, primò per numerum binarium, secundò deinde per tertiam unitatis partem solutos fuisse uides.

SIMILI MODO ET IN FRACTIONIBVS EXEMPLA proponi possunt.

$\frac{3}{4}$ ra. ualent $\frac{4}{7}$, quanti $\frac{1}{3}$ se. Facit $\frac{16 \text{ N}}{45 \text{ pri.}}$
 $\frac{2}{3}$ ra. ualent $\frac{4}{9} \frac{\text{pri.}}{\text{N}}$ quan. $\frac{9}{13} \frac{\text{N}}{\text{te.}}$ Facit $\frac{6 \text{ N}}{13 \text{ pri.}}$

NUNC DE AEQVATIONIBVS,
 QVAE IN SOLVENDIS EXEMPLIS, MULTIFARIAM sese offerunt, dicendum erit.



Equatio, ut hoc loco sumitur, prout etiam ipsius uocabuli $\epsilon\tau\upsilon\mu\omicron\upsilon\pi$ indicat, est, ubi duæ res uel quantitates inter se æquales esse proferuntur. Et quoniam per has Algebrae regulas obscura numerorum explicantur ænigmata, quæ quidem ubi secundum conditiones suas atq; hypotheses, per has regulas examinata fuerint, accidit tandem, ut aliquot quantitates, unà cū suis numeris, inter se æquentur. Quæ quantitarum collatio

collatio, cum prima fronte obscura & minus perspicua appareat, ut planius, & clarioribus uerbis, tanquam ob oculos, ponatur, necesse erit.

Proinde multæ licet sint æquationes ac infinitæ quodammodo, cum diuersæ propositorum ænigmatum supputationes subinde aliam atq; aliam postulent, tres nihilominus tamen ex his, priores atq; etiam præcipuas (cum quod nostra tractatio non plures requirat, tum etiam quod tribus ijs perceptis ac cognitis, facile reliquas etiam constituere, & ijs cõmodè uti quispiam possit) in præsentia ordine describemus. EST ITA QVÆ PRIMA AEQVATIO in qua unius quantitatis uel characteris numerus unius characteris numero æquatur. SECUNDA VERO ET TERTIA AEQVATIONES sunt, ubi tribus characteribus consignatis numeris, illic quidẽ naturali eorũ ordine, hic uerò iam uno, iam duobus uel pluribus, obseruato ordine interrupto, omiſſis characteribus, numeri duorum unius, uel contrà, unius characteris numerus duobus æquatur. Et de his tribus nunc deinceps ordine dicemus, & primò quidem de processu æquationis primæ.

AEQVATIO PRIMA.



Prima æquatio est, ubi duæ quantitates uel duo numeri, diuersis characteribus signati, inter se æquales esse proferuntur. Diuiditur in hac, ut regula de proportiõibus præcipit, minoris uel debilioris characteris numerus, in numerũ characteris maioris seu potentioris. Quia autẽ numerus exiens modò ipsius radicis, modò quantitatis cuiusdã ualorem exprimit, ubi radicis ualorẽ expresserit, quæstioni tũ statim satisfactũ erit, atq; omnia peracta. Quod si fuerit ualor cuiusdã quãtitatis, numeri exeuntis radix inuestiganda, atq; per inuestigatam illam tandem quæstioni respondendum erit. Huius autem æquationis demonstratio & fundamentum est ipsa de Proportioni- bus regula, Radicum deinde inuentionis tractatio, ut quæ ambo in communi numerorum supputatione plerumq; demonstrari solent.

SEQUUNTUR EXEMPLA.

8 radices		16 N.		2
9 primæ		18 ra.	quot unitatibus æquatur	2
6 secundæ	æquantur	24 pri.	una radix. Facit	4
4 quintæ		12 quar.		5
quantitates.				

Hæc nunc per resolutionem examinari poterunt.

ALIA EXEMPLA.

8 primæ		32 N		2
9 se.	æquantur	36 ra.	Facit una radix	2
6 ter.		384 ra.		4
4 sex.		108 ter.		3

ADHVC ALIA.

8 $\frac{1}{2}$ pri.		34 N		2
9 $\frac{1}{2}$ se.	æquantur	38 ra.	Facit una radix	2
6 $\frac{3}{4}$ ter.		432 ra.		4
4 $\frac{2}{3}$ sextæ.		126 ter		3

Sic alia huius æquationis exempla præscribi possunt atq; solui etiam, ut præcipitur.

Sequuntur

SEQUENTUR NUNC QVAEDAM

AENIGMATA SEU QVAESTIONES, QVORVM

solutiones tandem hanc primam æquationem requirunt.

Primum. Inueniendus est numerus, à quo primò eius $\frac{1}{4}$, de resi-
duo deinde $\frac{2}{5}$ subtractis, 13 tandem, uel 27 maneant.

Facit $28\frac{8}{9}$ uel 60

PRO HVIVS ATQVE ETIAM OMNIUM SEQUEN-
tium, ac aliorum quæ fortè proponi possunt, exemplorum
tractatione, sequitur Canon quidam generalis.

In omnibus exemplis quæ per has Algebrae regulas solui debent, ὡς καὶ βολον, loco eius qui quæstioni satisfacere debeat numeri, Radix seu una res, tanquam ali-
quid id esse de quo quæritur significans, ponenda est: ea deinde, ac si uerus solutio-
nis numerus esset, secundum exempli hypotheses examinata, in fine tandem id
quod uenire debeat, numerus scilicet quæstionis uerus, sese offeret, quare duo
æqualia inter se. Sed quia hoc quod ultimò uenit, cum propter inusitados huius
regulæ characteres quibus exprimitur, non tam perspicuum sit, ut promptè intel-
ligi possit, ulteriori operatione opus erit, quæ nimirum per diuersos operationum
canones absoluitur. Cuius rei exemplum esto tale.

Quis est numerus, cuius una tertia quater sumpta, 11 faciat?

Hoc exemplum talem habet supputationem. Loco numeri, ut dictum est, cui-
us una tertia, & reliqua, ponatur 1 radix. Et quia exemplum habet, cuius una ter-
tia quater sumpta, 11 faciat, de radice posita una tertia accipienda, atq; accepta, mox
ea quater sumenda erit. Veniunt autem sic $\frac{4}{3}$ ra. quæ cum ex hypothesi 11 esse de-
beant, erit unum alteri æquale, ex quo dicta est æquatio. Cadit autem in æquatio-
nem illam quæ iam descripta à nobis est. Numerus igitur characteris debilioris in
numerum significantioris diuidendus, ac per exeuntem tandem quæstioni respon-
dendum erit. Veniunt autem $8\frac{1}{4}$, numerus de quo quærebatur. Quod nunc exami-
nari potest in hunc modum.

EXEMPLI EXAMEN.

Numerus ille de quo quæstio erat, sunt $8\frac{1}{4}$. Et quia eius una tertia, $2\frac{3}{4}$ scilicet
quater sumpta, 11 faciunt, operatio bona est, uerus etiam numerus inuentus.

PROCESSV IGITVR NVNC, QVI GENERALITER
in omnibus exemplis seruari debet, præmissis, primò positi exempli
operatio sic se habebit.

Ponatur numerum illum de quo quæritur, esse	1.	ra. cuius nunc $\frac{1}{4}$,
nimirum	$\frac{1}{4}$.	ra. subtracta
manent	$\frac{3}{4}$.	ra. atq; de his tandem
$\frac{2}{5}$ eius, quæ sunt	$\frac{3}{10}$.	ra. subtractis
manent	$\frac{9}{20}$ ra.	
13 uel 27 N		æquales.

Facta igitur diuisione, ut præceptum est, debilioris characteris numeri in nu-
merum characteris significantioris, ueniunt radicum ualores ut positi sunt, $28\frac{8}{9}$
scilicet respectu 13, 60 deinde respectu numeri 27. Quod nunc quidem de utroq;
probari seu examinari poterit.

C

Exemplum

Diuidantur 40 in tres partes secundum rationem Subsuperbipartientem tertias continuatas.

Facit $7\frac{17}{49}$ $12\frac{12}{49}$ $20\frac{20}{49}$.

O P E R A T I O.

Esto	1 ra.	prima		
quare	$1\frac{2}{3}$ ra.	secunda		
ac	$2\frac{7}{9}$ ra.	deinde, tertia pars erunt.		
Summa igitur	$5\frac{4}{9}$ ra.	æquales	40.	N

POTEST OPERATIO ETIAM INSTITVI, INCIPIENDO A NUMERO seu parte proportionali media, uel ultima etiam, si placeat, ut sequitur.

Prima	$\frac{3}{5}$ ra.		$\frac{2}{25}$ ra.	
Secunda	1 ra.		$\frac{3}{5}$ ra.	
Tertia pars	$1\frac{2}{3}$ ra.		1 ra.	
Summa	$3\frac{4}{15}$ ra.	uel	$1\frac{24}{25}$ ra.	æqua. 40 N

Tertium, Diuidantur 40 in tres partes,

Vt cum has, primam quidem in 4, secundam uerò in 5, ac tertiam deinde in 6 diuisero, exeuntes numeri in Subsuperbipartiente tertias ratione continuentur.

Facit partes quidem $5\frac{15}{29}$ $11\frac{43}{87}$ $22\frac{86}{87}$
numeri uerò rationis $1\frac{11}{29}$ $2\frac{26}{87}$ $3\frac{217}{87}$

Vel, ut cum has, primam quidem per 4, secundam uero per 5, ac tertiam deinde per 6 multiplicauero, producti numeri in Subsuperbipartiente tertias, seu si mauelis, in Dupla ratione continuentur.

Facit quantum ad ratio-

nem	{	3	partes quidem	$9\frac{63}{113}$	$12\frac{84}{113}$	$17\frac{79}{113}$
		5	numeri uerò ra.	$38\frac{26}{113}$	$63\frac{81}{113}$	$106\frac{22}{113}$
		2	partes quidem	$25\frac{25}{47}$	$10\frac{10}{47}$	$4\frac{12}{47}$
		1	numeri uero ra.	$102\frac{6}{47}$	$51\frac{3}{47}$	$25\frac{25}{47}$

OPERATIO EXEMPLI QUANTVM AD DIVISIONEM.

	Diuisionis	Rationis	Diuisionis	Rationis partes,
Prima	1 ra.	$\frac{1}{4}$ ra.	$\frac{6}{25}$ ra.	$\frac{3}{50}$ ra.
Secunda	$2\frac{1}{12}$ ra.	$\frac{5}{12}$ ra.	uel $\frac{1}{2}$ ra.	$\frac{1}{10}$ ra.
Ter. pars.	$4\frac{1}{8}$ ra.	$\frac{25}{30}$ ra.	1 ra.	$\frac{1}{6}$ ra.
	$7\frac{1}{4}$ ra.	uel	$1\frac{37}{30}$ ra.	Æquales 40 N. & cæ.

OPERATIO EXEMPLI QUANTVM AD MULTIPLICATIONEM.
Ratio

	Ratio $\frac{3}{5}$		Ratio $\frac{2}{1}$
Prima	1	4	4
Secun.	$1\frac{1}{2}$ ra.	$6\frac{2}{3}$ ra.	2 ra.
Ter.pars	$1\frac{2}{27}$	$11\frac{1}{9}$	1

Et ueniunt

$4\frac{5}{27}$ ra. æqua. 40 N. uel $1\frac{17}{36}$ ra. æqua. 40 N.

4. Grossus ualet 10 nummulis, 24 uerò grossi florinum constituunt. Aliquis nunc florinum permutans, tot pro eo grossos, quot nummulos cupiens, quæritur quantum utriusq; recipiat.

Facit, utriusq; recipiet & habebit $21\frac{9}{11}$

OPERATIO.

Vna radix gross. & 1 ra. num. & cæ.

Veniunt, facta operatione, $1\frac{1}{10}$ ra. æqua. 24 N.

5. Est area quædam quadrangularis, continens in superficie 588 areolas, inter se & toti similes. Quia autem huius areæ longitudo ad latitudinem est, ut 4 ad 3: quanta ipsius longitudo, latitudo item sit, quæritur.

Facit longitudo quidem 23, latitudo uerò 21.

OPERATIO.

Longitudo	1 ra.	uel	$1\frac{1}{2}$ ra.
Latitudo	$\frac{3}{4}$ ra.		1 ra. & cæ.

ueniunt $\frac{3}{4}$ pri. uel $1\frac{1}{2}$ pri. æqua. 588 N.

6. Dux in castris suo sub imperio habet aliquot mille milites. Quoniam autem exercitum quadrata figura tantę amplitudinis, quanta fieri possit, instruere conatur, primaq; instructione specie quadrata perfecta, residui manent 284 milites: quòd si in singulos ordines unum duntaxat militem adiecisset, tum ei 25 ad absoluendam quadratam aciem defuissent. Quæritur igitur, quot sub se dux ille milites habuerit.

Facit 24 mille milites.

OPERATIO.

1 ra.	1 ra. + 1 N
1 pri.	1 pri + 2 ra. + 1 N
+ 284 N	- 25
1 pri. + 284 N	æquales 1 pri. + 2 ra. - 24 N.

ADMONITIO.

Hic, licet duorum characterum numeri, tribus trium characterum numeris æquentur, sed quia characteres in diuersis ordinibus unius sunt appellationis, per illas duas communes notitias, quarum una quidem est: Si æqualibus æqualia adijciantur, quòd & tota æqualia sint. altera uerò: Si ab æqualibus æqualia auferantur, quòd & reliqua sint æqualia: per additionem & ablationem huic succurritur. Erit itaq; hoc factò, huius æquationis exemplum, ut sequitur.

308 N æquales 2 ra.

Vna igitur radix, numerus scilicet militum unius ordinis in prima acie, 154. quare uniuersus militum numerus 24000, qui erat inueniendus.

Potest huius exempli operatio, si placet, etiam sic institui.

$\begin{array}{r} 1 \text{ ra. in se.} \\ 1 \text{ pri.} \\ \hline - 25 \text{ N} \\ \hline \text{quare } 1 \text{ pri.} - 25 \text{ N} \end{array}$	æqua.	$\begin{array}{r} 1 \text{ ra.} - 1 \text{ N in se.} \\ 1 \text{ pri.} + 1 \text{ N} - 2 \text{ ra.} \\ + 284 \text{ N} \\ \hline 1 \text{ pri.} + 285 \text{ N} - 2 \text{ ra.} \end{array}$
--	-------	---

7. Est numerus unus ad alterum sesquiquartus. Quoniam autem de maiori 8 ablatis, minori uerò numero 8 uel 4 additis, collectum ad residuum $2\frac{1}{2}$ rationem constituit, quoniam sint illi duo numeri, queritur.

Facit, ubi quidem adduntur

$\left\{ \begin{array}{l} 8, \\ 4 \text{ uerò,} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 16\frac{8}{17} \text{ maior,} \\ 14\frac{2}{17} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 13\frac{3}{17} \text{ uerò minor} \\ 11\frac{5}{17} \end{array} \right.$
--	--	--

OPERATIO.

Numeri rationis	residuum	colle.
$1 \text{ ra. } \frac{4}{7} \text{ ra.}$	$1 \text{ ra.} - 8 \text{ N.}$	$\frac{4}{7} \text{ ra.} + \left\{ \begin{array}{l} 3 \\ 4 \end{array} \right. \text{ N}$

Quantitates proportionales,

$$\frac{4}{7} \text{ ra.} + \left\{ \begin{array}{l} 8 \\ 4 \end{array} \right. \text{ N, } 1 \text{ ra.} - 8 \text{ N ut } 5, \quad 2. \text{ Quare}$$

$$1\frac{3}{7} \text{ ra.} + \left\{ \begin{array}{l} 16 \\ 8 \end{array} \right. \text{ N equal. } 5 \text{ ra.} - 40 \text{ N}$$

8. Numerus in tres partes diuisus est. Quoniam autem prima pars respectu diuisi, subsequialteram: secunda uero, subduplam: ac tertia deinde, & ipsa respectu diuisi, postquam tamen 4 aliunde acceperit, subsequitertiam rationem constituit, quantus sit ipse totus numerus, quantæ etiam singulæ partes, queritur.

Facit, Impossibile, cum tertia pars nihil sit, propterea quòd duabus prioribus totum & plus etiam conueniat.

Vel facit	Totus quidem numerus	
	Partes uerò	
	prima	secun.
	$2\frac{10}{11}$	$2\frac{2}{11}$
		tertia
		$4\frac{4}{11}$
		$-\frac{8}{11}$

Id quòd examinari potest in hunc modum:

Totus diuisus	prima	Partes uerò
		secunda
		tertia
$4\frac{4}{11}$	$2\frac{10}{11}$	$2\frac{2}{11}$
Pars prima	totus diuisus	pars secun.
$2\frac{10}{11}$	$4\frac{4}{11}$	$2\frac{2}{11}$
cum 3	cum 2	bis
$\frac{3}{8\frac{8}{11}}$	$\frac{2}{8\frac{8}{11}}$	$\frac{2}{4\frac{4}{11}}$

Aequales numeri, bene igitur.

Totus diuisus, bene igitur.

		— $\frac{8}{11}$	Tertia pars,		
		+ 4			
sunt	3	$3\frac{3}{11}$	4	$\frac{4}{11}$	Totus diuifus,
cum	4		cum	3	
produ.	$13\frac{1}{11}$		produ.	$13\frac{1}{11}$	Aequales numeri.

Igitur bene operatum.

Quod si loco rationis quam habet secunda pars ad totum, Subduplae scilicet, Subquadrupla posita fuerit.

Veniet facta operatione,

Totus quidem numerus	6		
Partes uero	4	secun.	tertia,
		$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

OPERATIO PARTIS PRIORIS.

Totus diuifus,	Prima	secunda	tertia pars.
1 ra.	$\frac{2}{3}$ ra.	$\frac{1}{2}$ ra.	$\frac{3}{4}$ ra. — 4 N
Quare	$1\frac{11}{12}$ ra. — 4 N	æquales	1 radici.
Vel additis & subtractis, ueniunt $\frac{11}{12}$ ra. æqua. 4 N, &cæ.			
Potest etiam operatio aliter institui, si radix una loco alicuius partis ponatur, sic.			

Partes		Partes	
1 ra.		$1\frac{1}{3}$	
$\frac{3}{4}$ ra.	Totus	1 ra.	Totus
$1\frac{1}{8}$ ra. — 4 N	$1\frac{1}{2}$ ra.	$1\frac{1}{2}$ ra. — 4 N	2 ra.
Aequatio.			
$1\frac{3}{8}$ ra.	æqua.	4 N.	Item $1\frac{5}{8}$ ra. æqua. 4 N.

OPERATIO PARTIS POSTERIORIS.

Totus diuifus	$\frac{2}{3}$ ra.	1 ra.	Totus diuifus
1 ra.	$\frac{1}{4}$ ra.	Vel	$1\frac{1}{2}$ ra.
	$\frac{3}{4}$ ra — 4 N		$1\frac{1}{8}$ ra. — 4 N.

9. Sunt tres numeri, quorum primus & tertius noti, 48 & 11, medius ignotus, Quia uero, quam rationem habent primus & tertius inter se, illa eadem est & excessus primi super medium, ad excessum medij super numerum tertium, quantus ergo medius numerus sit, quaeritur.

Facit $17\frac{53}{59}$ quod probari potest.

OPERATIO.

Primus	medius	tertius.
48	1 ra.	11
$48 N - 1 ra.$	$1 ra. - 11 N.$	

Considerato iam, quæ sint quantitates proportionales, quæ deinde proportionalium quantitatum proprietas, ueniunt ultimò.

59 ra. æqua. $1056 N$, &cæ.

Sicinter $\left\{ \begin{array}{l} 42 \\ 8\frac{2}{3} \\ \frac{8}{9} \\ 21 \end{array} \right. \quad \& \quad \begin{array}{l} 30 \\ 6 \\ \frac{2}{5} \\ 14, \end{array} \quad \text{medius est} \quad \begin{array}{l} 35 \\ 7 \\ \frac{16}{29} \\ 16\frac{4}{5} \end{array}$

Sunt autem numeri medietatis Harmonicæ.

10. Sunt tres numeri, quorum primus & tertius noti, 48 & 11, uel 24 & 12, medius ignotus. Quia uerò, quam rationem habent primus & tertius inter se, illa eadem est differentiæ mediæ & tertij ad differentiam primi & mediæ, quantus ergo medius numerus sit, quæritur.

Facit $41\frac{6}{59}$ uel 20. quod probari potest.

11. Diuidantur 61 in 9 uel 6 partes Arithmeticæ progressionis, & esto quòd prima pars, uel primus ac minimus numerus sint 6, qui sunt octo, uel quinque reliqui.

Facit respectu quidem diuisionis

in $\left\{ \begin{array}{l} \text{nouem} \\ \text{sex uerò} \end{array} \right. \begin{array}{l} 6\frac{7}{36} \quad 6\frac{7}{18} \quad 6\frac{7}{12} \quad 6\frac{7}{9} \quad 6\frac{15}{36} \quad 7\frac{1}{8} \quad 7\frac{13}{36} \quad 7\frac{5}{9} \\ 7\frac{2}{3} \quad 9\frac{1}{3} \quad 11 \quad 12\frac{2}{3} \quad 14\frac{1}{3} \end{array}$

OPERATIO.

$\begin{array}{l} 6 \text{ N} \quad \text{minimus nu.} \\ 1 \text{ ra.} \quad \text{excessus communis} \\ 6 \text{ N} + 8 \text{ ra.} \quad \text{numerus ul.} \\ \quad \& \text{cæ.} \end{array} \quad \text{uel} \quad \begin{array}{l} 6 \text{ N} \quad \text{minimus} \\ 1 \text{ ra.} \quad \text{max. nu.} \\ 1 \text{ ra} + 6 \text{ N} \quad \text{aggrega-} \\ \quad \quad \quad \text{ti dimidium.} \end{array}$

Sic numerus 49 diuisus, facta operatione ueniunt, respectu quidem diuisionis eius in partes.

$\begin{array}{l} \text{nouem} \\ \text{in sex uerò} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Impossibile} \\ 6\frac{13}{15} \quad 7\frac{11}{15} \quad 8\frac{3}{5} \quad 9\frac{7}{15} \quad 10\frac{1}{3} \end{array}$

12. Est quidam rex, sunt & principes, comites & milites, quot autem rex sub potestate sua habet principes, in duplo plures sub se comites habent singuli principes: in quadruplo uerò plures sub se habent milites singuli comites. Quia uerò militibus numeratis, inuenitur, quòd ducentesima eorum pars nouencuplam rationem ad numerum principum constituat: quot igitur nunc principes fuerint, quot item comites ac milites deinde, in dubium uocatur.

$\begin{array}{l} \text{Principes} \\ \text{Facit} \quad 15 \\ \text{Comites} \\ \quad 450 \\ \text{Milites.} \\ \quad 27000 \end{array}$

Quod secundum ænigmatis hypotheses examinari poterit.

OPERATIO.

$\begin{array}{l} \text{Principum} \\ \text{Ponatur} \quad 1 \text{ ra.} \\ \quad \frac{1}{25} \text{ se.} \end{array} \quad \& \text{ erunt} \quad \begin{array}{l} 2 \text{ pri.} \\ \text{Comi.} \\ \text{atq; tandem} \\ \text{æqualis} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Mili.} \\ 8 \text{ uerò secundæ} \\ 9 \text{ ra.} \end{array}$

13. Est ædificium quoddam παραλλήλωσ secundum quatuor eius latera extructum,

ra extractum, cuius altitudo cum ad suam longitudinem Superbipartientem tertias, ad latitudinem uero, Duplam sesquialteram constituat rationem, altitudine deinde cum longitudine, ac producto tandem cum latitudine multiplicato, numerus 39930. ulnarum producat, quantæ huius ædificij singulæ dimensiones fuerint, queritur,

Facit 55 Altitudo, 33 Longi. & 22 Latitudo.

OPERATIO.

Altitudo 1 ra. $1\frac{2}{3}$ $2\frac{1}{2}$
 Longi. $\frac{2}{3}$ uel 1 ra. $1\frac{1}{2}$
 Latitu. $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ Vel 1 ra.

Facta multiplicatione ut præcipitur, ueniunt

$\frac{6}{25}$ se. uel $\frac{10}{9}$ se. uel $\frac{15}{4}$ se. æquales 39930 N.

14 Murus, cuius longitudo quidem in $3\frac{1}{2}$ ad latitudinem, altitudo uero in quincupla ratione ad longitudinẽ cõstructus est, ab Artifice tandẽ 980 coronatis redimitur. Quoniã autẽ, cũ pro singulis uirgis, ut dicitur, extruẽdis, tot coronati, quot ipse murus in latitudine uirgas habet, expositi sint, quẽ nã huius muri altitudo sit, lõgitudo itẽ, ac latitudo etiã, queritur.

Facit 35 Altitudo, 7 Longi. & 2 Latitudo.

OPERATIO.

Altitudo 5 uel 1 ra. $17\frac{1}{2}$
 Longi. 1 ra. $3\frac{1}{2}$
 Latitudo $\frac{2}{7}$ uel $\frac{1}{4}$ ra. $\frac{245}{4}$
 $\frac{10}{7}$ se. $\frac{17\frac{1}{2}}{17\frac{1}{2}}$

Nunc quantum ad solutionem, dicendum est

Corona.

Vlra $\left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{7} \\ \frac{2}{35} \text{ ra.} \\ 1 \end{array} \right.$ quanti $\left\{ \begin{array}{l} \frac{10}{7} \\ \frac{2}{17\frac{1}{2}} \text{ se.} \\ \frac{45}{4} \end{array} \right.$ Facit $\left\{ \begin{array}{l} \frac{20}{49} \\ \frac{4}{6125} \text{ ter. æ.} \\ \frac{245}{4} \end{array} \right.$ 980 N

15. Diuidantur 72 in quatuor partes, quarum prima sit una septima secundæ & tertiæ, secunda uero $\frac{1}{3}$ tertiæ & quartæ, tertia autem $\frac{1}{2}$ quartæ & primæ, queritur de partibus.

Facit.
 Prima secunda tertia quarta pars,
 $4\frac{1}{2}$ $11\frac{1}{4}$ $20\frac{1}{4}$ 36

OPERATIO.

Ponatur primam partem esse 1 radicem, erunt ergo secunda & tertia partes simul 7 radices, ac quarta deinde id quod est reliquum, nimirum 72 N — 8 ra. sic.

Prima secunda & tertia quarta,
 1 ra. 7 ra. 72 N 8 ra.

Et quoniam ex hypothesi, secunda pars est tertiæ & quartæ partium una quinta: partes coniungendo, erit hæc eadem secunda omnium trium, hoc est secundæ tertiæ & quartæ partium, una sexta. Ex harum igitur aggregato, quod est 72 N — 1 ra, una sexta sumpta, per eam quanta secunda pars sola sit, manifestabitur.

Quæ

Quæ quidem cum sit iam nota, & tertia per subtractionem nota erit. Partes igitur singulæ, ut sequitur.

Prima	secunda	tertia	quarta.
1 ra.	$12 N - \frac{1}{6} \text{ra.}$	$7 \frac{1}{6} \text{ra.} - 12 N$	$72 N - 8 \text{ra.}$

Rursus quoniam etiam, & id ex hypothesi, tertia pars ipsarum quartæ & primæ partium dimidium est: sequitur hanc eandem tertiam bis sumptam, quartæ & primæ partibus simul sumptis, uel si mauis, hanc tertiam solùm, eius quod ex quarta & prima colligitur dimidio, æqualem esse. Aequatio igitur, ut sequitur.

$$\begin{array}{l}
 14\frac{1}{2} \text{ra.} - 24 N \quad \text{æqual.} \quad 72 N. - 7 \text{ra.} \\
 \text{in minimis } 21\frac{1}{2} \text{ra.} \quad \text{æqual.} \quad 96 N. \\
 \text{uel } 7\frac{1}{6} \text{ra.} - 12 N \quad \text{æqual.} \quad 36 N - 3\frac{1}{2} \text{ra.} \\
 \text{in minimis } 10\frac{2}{3} \text{ra.} \quad \text{æqual.} \quad 48 N.
 \end{array}$$

Sic 90, unitas, ac quilibet numeralij, Fractiones etiam, eadem ratio, nediuidi possunt.

Sunt autem partes, respectu quidem

Prima	secunda	tertia	quarta.
90	$5 \frac{5}{8}$	$14 \frac{1}{16}$	$25 \frac{5}{16}$ & 45
Unitatis uero, $\frac{1}{16}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{9}{32}$	& $\frac{1}{2}$

16. Tres negociatores societate ineuntes, contulerunt 170 aureos. Primus itaq; cum sua pecunia collata huic contractui interesse uult 3 mensibus, secundus 6, tertius 8. Nunc si hac communi pecunia, tantum hoc temporis spacio lucrifecerint, ut fors cum lucro perficiat summam 375 aureorum, atque primo 75, secundo uero 200 aurei, & tertio deinde quod reliquum est tribuatur, quæritur quantâ nam uniuscuiusq; fors, siue à singulis collata pecunia fuerit. Facit

Primi 60, secundij 80, tertij 30. aurei.

OPERATIO.

	Tempus	accepta	collata pecunia.
Primi	3.	75	1 ra.
Secundi	6.	200	$8 \frac{1}{2}$ ra.
Tertij	8.	100	$\frac{1}{2}$ ra. atq;
		tandem $2 \frac{5}{6}$ ra.	æquales 170 N.

17. Propositum est diuidere 91, 27 uel 118 in quatuor partes.

Primò, secundum rationes $1 \frac{1}{2}$, duplam & subsesquiterciam, quæritur quæ nam sint partes futuræ.

OPERATIO

1ra.	Facit	$\frac{91}{11}$	$\frac{27}{11}$	$\frac{118}{11}$
$\frac{2}{3}$		$37 \frac{5}{22}$	$11 \frac{1}{22}$	$48 \frac{3}{11}$
$\frac{1}{3}$		$24 \frac{9}{11}$	$7 \frac{4}{11}$	$32 \frac{2}{11}$
$\frac{4}{9}$		$12 \frac{9}{22}$	$3 \frac{15}{22}$	$16 \frac{5}{11}$
2^4ra.		$16 \frac{6}{11}$	$4 \frac{10}{11}$	$21 \frac{5}{11}$
	æqua,	91, 27	uel	118 N.

Vel

Vel secundo, secundum rationem $1\frac{1}{2}$ seu $2\frac{1}{2}$ continuatam,

	<u>91</u>	<u>27</u>	<u>118</u>	
Facit secundum ratio- nem.	$37\frac{4}{5}$	$11\frac{14}{5}$	$49\frac{2}{5}$	
	{ $1\frac{1}{2}$ quidē	$25\frac{1}{5}$	$7\frac{31}{5}$	$32\frac{44}{5}$
		$16\frac{4}{5}$	$4\frac{64}{5}$	$21\frac{51}{5}$
		$11\frac{1}{5}$	$3\frac{21}{5}$	$14\frac{34}{5}$
	$58\frac{18}{803}$	$17\frac{172}{803}$	$75\frac{191}{803}$	
	{ $2\frac{2}{3}$ uerò	$21\frac{609}{803}$	$6\frac{366}{803}$	$28\frac{172}{803}$
		$8\frac{128}{803}$	$2\frac{338}{803}$	$10\frac{466}{803}$
		$3\frac{48}{830}$	$0\frac{729}{803}$	$3\frac{777}{803}$

OPERATIO

1 ra.

$\frac{2}{3}$
 $\frac{4}{9}$ ra.
 $\frac{8}{27}$

$\frac{3}{8}$
 $\frac{6}{64}$ ra.
 $\frac{27}{512}$

$2\frac{11}{27}$ ra.

AEQVATIO

uel $1\frac{291}{512}$ ra. æqua. 91

27 N.

Vel tertio, ut primæ parti 4, secundæ deinde 3 additis, à tertia uero parte, 2, ac quarta deinde, unitate subtracta, aggregati tandem & residui numeri subduplam rationem continuatam, uel subduplam, subquadruplam, & $1\frac{1}{2}$ rationes habeant. Queritur &cæ. Facit

quantum ad rationem subduplam continuatam,

Respectu quidem <u>91</u>	<u>27</u> uerò,	ac <u>118</u> deinde
Prima pars $2\frac{1}{3}$	— $1\frac{14}{15}$	$4\frac{2}{15}$
Secunda $9\frac{2}{3}$	Impossibi-	$13\frac{4}{15}$
Tertia $27\frac{1}{3}$	le, uel	$34\frac{8}{15}$
Quarta deinde $51\frac{2}{3}$	$17\frac{8}{15}$	$66\frac{1}{15}$

Quantum ad rationes subduplam, subquadruplam, & $1\frac{1}{2}$

Respectu quidem <u>91</u>	<u>27</u>	<u>118</u>
Prima pars $1\frac{10}{17}$	— $2\frac{3}{17}$	$3\frac{2}{17}$
Secunda $8\frac{2}{17}$	Impossibile	$11\frac{6}{17}$
Tertia $46\frac{12}{17}$	uel	$59\frac{7}{17}$
Quar. deinde $34\frac{9}{17}$	$+ 11\frac{16}{17}$	$44\frac{1}{17}$

OPERATIO.

Sit prima pars	1 ra.	Vel	1 ra.
secunda igitur	2 ra. + 5 N		2 ra. + 5 N
tertia uerò	4 ra. + 18 N		8 ra. + 34 N
ac quarta deinde	8 ra. + 33 N		6 ra. + 25 N

Æquatio igitur quantum ad
primum 15 ra. + 56 N
secun. 17 ra. + 64 N
æqual. 91. 27. 118 N.


D Æquatio

ÆQVATIO SECVNDA.



Secunda æquatio est, ubi tres numeri tribus diuersis, continuatis tamen, characteribus signati, duo unī, uel unus item duobus equalis esse profertur. Hæc æquatio quia tripliciter uariari potest, cum aut duo maiores minimo, aut duo minores maximo, aut uerò maximus & minimus, medio characteri, ut præsens figura habet, æquentur.

FIGVRA ÆQVATIONVM.



Tertia æquatio.

Ideo ne in generali huius descriptione confundi lectorem contingat, pro eo ut tripliciter uariatur, ita etiam triplici eam regula uel canone ordine describemus.

CANON HVIVS ÆQVATIONIS PRIMVS.

Vbi nimirum maiores duo, minimo characteri æquentur, utpote prima quantitas & radix, numero, sic.

$$\text{Pri.} + \text{ra.} \quad \text{æquales.} \quad \text{N.}$$

Huiusmodi exēplo proposito, erit maxime quātītatis numerus, aut unitas, aut nō. Quod si unitas fuerit, tū ad quadratū dimidiij numeri characteris mediij, numerus characteris minimi addi, à radice deinde huius collecti quadrata, dimidiū characteris mediij subtrahi debet. quo facto, quæsiti numeri cōpos aliquis erit, cū uide licet per id quod relinquitur, radicis ualor exprimat. Quòd si uerò nō sit unitas maximi characteris numerus in exēplo aliquo proposito, quia nō pluriū, sed unius tantum radicis ualor desideratur, in maximi characteris numerum, aut fractionem, uel quicquid tandem fuerit, singuli singulorum trium characterum numeri diuidendi, & diuisorum loco exeuntes, ut eorum submultiplices, sumendi & ponendi sunt. Erīt autē sic exemplū æquationis aliud, quod licet dissimile uideatur priori posito, nihilominus tamen, cum multiplicium & submultiplicium una & eadem sit ratio, non ab eo diuersum erit. Reductione igitur hac ad unitatem maximi characteris numeri, procedendum deinde, prout supra canone est traditum.

CANON HVIVS ÆQVATIONIS SECVNDVS.

Vbi nimirum duo minores, radix scilicet & numerus, æquentur primæ characteri maximo, sic.

$$\text{Ra.} + \text{N} \quad \text{æquales} \quad \text{pri.}$$

Et in huiusmodi exemplis maximi characteris numerus, aut unitas erit, aut non. Quod si fuerit unitas, tum ad quadratum dimidiij numeri characteris mediij, ut in præcedenti canone factum, numerus characteris minimi addi: ad radicem deinde huius collecti quadratam, dimidiū characteris mediij summi debet, & perfecta erit æquatio. Quod si uerò non sit unitas maximi characteris

ra. characteris numerus in exemplo aliquo proposito, huic tum (quemadmodum in praecedenti traditum) diuisione, ut ad unitatem redigatur, succurrendum erit.

CANON HVIVS AEQVATIONIS TERTIVS.

Vbi nimirum maximus & minimus, ut est prima quantitas & numerus, medio characteri, radici scilicet, aequentur, sic.

$$\text{Pri.} + N \text{ Aequales ra.}$$

In huiusmodi exemplis, ubi maximi characteris numerus unitas fuerit, statim à quadrato dimidij numeri characteris medij, contra ut iam in praecedentibus est factum, numerus characteris minimi subtrahi: radix deinde huius residui quadrata, ut libuerit, ac prout rationi magis consentaneum fuerit, uel à dimidio numeri characteris medij subtrahi, uel eidem addi oportebit. atq; utrum horum factum fuerit, cum tam per id quod hic colligetur, quam etiam quod illic relictum fuerit, radicis ualor indicetur, exemplo satisfactum erit.

SEQVVTVR NVNC HVIVS SECVNDAE AEQVATIONIS secundum praescriptos tres canones exempla.

CANONIS PRIMII.

$$\begin{array}{r} 1 \text{ pri.} + 8 \text{ ra.} \quad 65 N. \\ \hline 4 \text{ in se.} \quad 16 + 65 \\ \hline \text{ueniunt si. Huius radix,} \\ \text{sunt 9, minus 4,} \\ \text{manent 5.} \end{array}$$

SECVNDI.

$$\begin{array}{r} 13 \text{ ra.} + 1\frac{3}{4} N \quad 1 \text{ pri.} \\ \hline \frac{3}{2} \text{ in se.} \quad \frac{9}{4} + 1\frac{3}{4} \\ \hline \text{ueniunt 4. Huius radix,} \\ \text{sunt 2 plus } 1\frac{1}{2} \\ \text{ueniunt } 3\frac{1}{2} \end{array}$$

Atq; tantus est radicis ualor: quod quidem resolutione facta nunc probari potest.

EXEMPLVM CANONIS TERTII.

$$\begin{array}{r} 1 \text{ pri.} + 12 N \quad \text{equales} \quad 8 \text{ ra.} \\ \hline 4 \text{ in se.} \quad 16 \quad \text{minus} \quad 12 \\ \hline \text{manent 4.} \quad \text{Huius radix quadrata} \\ \text{sunt 2 } \left\{ \begin{array}{l} \text{de} \\ \text{ad} \end{array} \right. 4, \text{ \& manent 2, uel proueniunt 6.} \end{array}$$

Vterq; radicis ualor, ac probationi conueniens numerus.

SEQVVTVR EXAMINA.

Primum autem numerorum canonis primi, radicis ualore existente 5.

$$\begin{array}{r} 1 \text{ pri.} + 8 \text{ ra.} \quad \text{æquales} \quad 65 N \\ \hline 5 \text{ in se,} \quad \text{cum } 5 \\ \hline 25 \quad 40 \\ \hline 65 \end{array} \quad \text{Atq; tot sunt etiam numeri, ut apparet: bene igitur.}$$

Examen numerorum canonis secundi, radicis ualore existente $3\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r} 3 \text{ ra,} + 1\frac{3}{4} N \quad \text{æquales} \quad 1 \text{ pri.} \\ \hline \text{cum } 3\frac{1}{2} \\ \hline 10\frac{1}{2} + 1\frac{3}{4} \\ \hline 12\frac{1}{4} \end{array} \quad \text{æquales} \quad \begin{array}{r} 3\frac{1}{2} \\ \hline \text{in se.} \\ \hline 12\frac{1}{2} \end{array} \quad \text{bene igitur.} \\ \text{D } 2 \quad \text{Examen}$$

Examen numerorum canonis tertij, radicis ualore existente 3.

$$\begin{array}{rcll} 1 \text{ pri} & + & 12 \text{ N} & \text{\ae}quales \quad 8 \text{ ra.} \\ 2 \text{ in se.} & & & \text{bis} \\ \hline 4 & + & 12 & \\ & & 16 & \text{\ae}quales numeri \quad 16: \text{ bene igitur.} \end{array}$$

Eodem modo instituaturnunc examinis operatio, radicis ualore existente 6

$$\begin{array}{rcll} 1 \text{ pri} & + & 12 \text{ N} & \text{\ae}quales \quad 8 \text{ ra.} \\ 6 \text{ in se} & & & \text{sexies} \\ \hline 36 & + & 12 & \\ & & 48 & \text{\ae}quales numeri \quad 48 \text{ \&c}\text{\ae.} \end{array}$$

ALIVD EXEMPLVM.

PRIMI CANONIS.			SECUNDI CANONIS.		
Pri.	ra.	N	ra.	N	pri.
4	+	3	3	+	175
		\aequales			\aequ. 4
		217			

Hic, quia maximi caracteris numerus non est unitas, diuisione, ut dictum est, ei succurri debet. Veniunt autem facta diuisione,

pri.	ra.	N	ra.	N	pri.
1	+	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	+	$\frac{175}{4}$
		\aequ.			\aequ. 4
		$\frac{217}{4}$			
$\frac{3}{8}$	in se,	$\frac{9}{64}$	+	$\frac{217}{4}$	
ueni.	$\frac{3481}{64}$	Huius ra.	ueni.	$\frac{2809}{64}$	Huius ra.
	sunt $7\frac{3}{8}$	minus $\frac{3}{8}$		sunt $6\frac{5}{8}$	plus $\frac{3}{8}$
	manent	7		ueniunt	7
		radicis ualor.			radicis ualor.

ALIVD TERTII CANONIS EXEMPLVM.

$$3 \text{ pri.} + 217 \text{ N} \text{\ae}quales \quad 52 \text{ ra.}$$

Ethic, quia maximi caracteris numerus non est unitas, diuisione ei succurrendum erit. Veniunt autem hoc facto,

$$\begin{array}{rcll} 1 \text{ pri.} & + & \frac{217}{3} \text{ N} & \text{\ae}quales \quad \frac{52}{3} \text{ N} \\ \hline \frac{26}{3} \text{ in se.} & & \frac{676}{9}, \text{ minus } \frac{217}{3}, \text{ manet } \frac{25}{9} & \\ \text{Huius ra. qua. est } 1\frac{2}{3} & \left\{ \begin{array}{l} \text{de} \\ \text{ad} \end{array} \right. & 8\frac{2}{3}, & \text{\& manent 7, uel prouen-} \\ \text{niunt } 10\frac{1}{3}, & & & \text{niunt } 10\frac{1}{3}, \text{ Vterq; radicis ualor, quod examinari potest.} \end{array}$$

Porro ne quis opinetur huius equationis tractationem rationibus ac demonstrationibus carere, is sciat: Primi quidem canonis operationem ex propositione 4 libri Euclidis secundi, Secundi uero ex sexta, ac tertij deinde canonis ex quinta propositione eiusdem secundi libri desumptam esse. Eo itaq; cum peruentum fuerit, horum demonstrationes ac similitudines quas cum rationibus illarum propositionum habent, indicabimus.

SEQUVNTVR NVNC QVAEDAM
AE N I G M A T A, S E V Q V A E S T I O N E S, Q V O R V M
solutiones tandem hanc aequationem requirunt.

Primum. Quærantur duo numeri in ratione $3\frac{1}{4}$, ut si unus cum altero

altero multiplicatus, producto deinde ambo numeri additi fuerint, $142\frac{1}{2}$ colligantur.

$$\text{Facit } 19\frac{1}{2} \quad \& \quad 6$$

HUIUS EXEMPLI OPERATIO HAEC EST.

Esto primus numerus, & maior quidem, 1 radix, Et quia ratio, ex hypothesi, constituta est Tripla sesquiquarta, hoc obseruato, Regula Proportionum (dicendo 13 dant 1 ra. quid 4) erit numerus secundus $\frac{4}{13}$ ra. Quia uero multiplicatio huiusmodi numerorum, unius cum altero, unâ cum his ipsis numeris simul additis, $142\frac{1}{2}$ consti- tuere debet, & id ex hypothesi: 1 radix igitur cum $\frac{4}{13}$ ra. multiplicari, producto de- inde ambo numeri, 1 radix scilicet $\& \frac{4}{13}$ ra. addi debent, & colliguntur tandem

$$\frac{4}{13} \text{ pri.} \quad + \quad 1\frac{4}{13} \text{ ra.} \quad \text{æquales} \quad 142\frac{1}{2} \text{ N}$$

Quoniam autem est huius secundæ æquationis exemplum primum, hæc uero ipsa æquatio cum proximam habeat aliquanto quam præcedens prima difficiliorem, ne alicui fortè hac descriptione nõ satis me fecisse uidear, quod descriptione regule proposuimus, illius eiusdem etiam iam calculum subiungere uisum fuit. Esto itaq;

$$\begin{array}{l} \text{numerus Maior } 1 \text{ ra.} \quad \text{Minor } \frac{4}{13} \text{ ra.} \quad \text{Produ. } \frac{4}{13} \text{ pri.} \\ \text{Numerorum additione facta,} \end{array}$$

ueniunt $\frac{4}{13}$ pri. $+ 1\frac{4}{13}$ ra. æquales $142\frac{1}{2}$ N.
uel diuisione, secundum superiorem regulam, maximi characteris numero ad uni- tatem reducto,

$$\text{ueniunt } 1 \text{ pri.} \quad + \quad 4\frac{1}{4} \text{ ra.} \quad \text{æquales} \quad 463\frac{1}{8} \text{ N.}$$

Est autem exemplum canonis primi. Facta igitur nunc operatione, ut præci- pitur, ueniunt numeri $19\frac{1}{2}$ & 6, ut supra indicatum.

ALIA HUIUS EXEMPLI OPERATIO.

Vt in præmissa operatione radix posita numerum rationis maiorem signifi- cabat, ita nunc, initio sumpto à minore, esto quòd radix posita significet numerum rationis minorem, cum sic regula proportionum (dicendo 4 dant 1 ra. quid 13) ma- ior numerus sit $3\frac{1}{4}$ ra. multiplicatione & additione peractis, ueniunt

$$3\frac{1}{4} \text{ pri.} \quad + \quad 4\frac{1}{4} \text{ ra.} \quad \text{æquales} \quad 142\frac{1}{2} \text{ N.}$$

Vel, reductione facta, & cæ.

$$1 \text{ pri.} \quad + \quad \frac{17}{13} \text{ ra.} \quad \text{æquales} \quad \frac{970}{13} \text{ N.}$$

Secundum. Proficiscitur aliquis peregrè, uadit autem primo die $1\frac{1}{2}$ mi- liare, secundi deinde die atq; deinceps sequentium ordine omnium itinera, arithmetica medietate absoluit, iter cuiusq; sequentis super præ- cedentis diei iter in miliaris una sexta augens. Nunc uero cum ille secun- dum hanc medietatem iter quoddam 1370 uel 2955 miliariorum absoluen- dum & perambulandum sibi instituerit, in quanto tempore id facere pos- sit, quæstio erit.

Facit quantum ad $\left\{ \begin{array}{l} \text{primum quidem, in 17 septimanis, \& 1 die.} \\ \text{secundum uerò, in semestri, minus 2 diebus.} \end{array} \right.$

OPERATIO.

Ponatur 1 radix dierum, quo illud iter absoluat, et erit 1 ra. — 1 N, excessuū nu- merus. Et quia $\frac{1}{2}$ miliaris, excessus communis, erit 1 ra. — 1 N, excessuū sum- ma. Et quia etiam $1\frac{1}{2}$ miliaris, primus numerus,

6

D 3 1 ra.

$$\frac{1 \text{ ra.} + 8 \text{ N}}{6} \text{ igitur, ultimus numerus erit}$$

Atq; sic $\frac{1 \text{ ra.} + 17 \text{ N}}{6}$, ex primo & ultimo aggregatū, & tandem multiplicatione facta, $\frac{1 \text{ pri.} + 17 \text{ ra.}}{12 \text{ N}}$ æquales 1370 uel 2955 N, &cæ.

3 Numerus in duo diuisus est, in 4 scilicet, partem notam, & alium deinde numerū, partē scilicet ignotam. Quoniā autem parte ignota multiplicata primò in se, deinde cum parte etiam illa nota, 117 colliguntur, quantus fuerit totus numerus? Facit 13
 quanta item ignota pars? 9

OPERATIO.

Ponatur 1 ra. numerus diuisus. Et quia 4, una & nota pars, atq; sic 1 ra. — 4 N, pars ignota, ultimò tandem, multiplicatione scilicet facta, 4 ra. + 117 N uni primæ æquales erunt, Est autem exemplum canonis secundi, &cæ.

ALIA OPERATIO.

4 pars data ex hypothesi,
 1 radix, non data, quare tandem
 1 pri. + 4 ra. æqual. 117 N. Exemplum canonis primi.

4. Sunt tres numeri continuè proportionales, unus autem extremorum cum sint $20\frac{1}{4}$, alter uerò & duplum mediij, 22 faciant, quantus uterq; sit, medius scilicet & alter extremorum, quæritur.

Facit medius quidem 9
 alter uerò extre. 4

OPERATIO.

$$22 \text{ N} - \frac{20\frac{1}{4}}{1 \text{ ra.}} \text{ uel } 11 \text{ N} - \frac{20\frac{1}{4}}{1 \text{ ra.}} \frac{1}{2} \text{ ra.}$$

Facta multiplicatione, ueniunt ultimò

$$445\frac{1}{2} \text{ N} \text{ æquales } \frac{\text{pri.}}{1} + 40\frac{1}{2} \text{ ra.} \quad 125 \text{ ra.} \text{ æqua. } \frac{\text{pri.}}{1} + 484 \text{ N}$$

Exemplum canonis primi

Canonis tertij.

5. Propositum est diuidere numerum 8 in duas partes, quarum secundæ quantitates, unā cum primis, & his ipsis numeris, 199 faciant, quæritur, &cæ.

Facit 5 & 3.

OPERATIO.

$$8 \text{ N} - 1 \text{ ra.} \quad 64 \text{ N} - 16 \text{ ra.} + 1 \text{ pri.} \quad 512 \text{ N} - 192 \text{ ra.} + 24 \text{ pri.} - 1 \text{ se.}$$

$$584 \text{ N} - 208 \text{ ra.} + 26 \text{ pri.} \quad \text{æquales} \quad 194 \text{ N}$$

Vel additis & subtractis æqualibus,

$$\text{ueniunt } 26 \text{ pri.} + 390 \text{ N} \quad \text{æquales} \quad 208 \text{ ra.}$$

Est

Est autem exemplum canonis tertij, atq; radicis ualor 3 uel 5, ut lubet, prior pars. Quare posterior 3 minus, &cæ.

6. Duo habent mercis cuiusdam libras uel ulnas n. Quoniam autem, cum quot ulnas primus habet, tot secundus uno coronato uendere soleat, primus deinde, quia uno coronato tantum exponit, quanta est $\frac{1}{2}$ earum ulnarum quas secundus habet, atq; cum sic ambo 6 coronatos, uno sextante minus, acceperint, quot ulnas seorsim uterq; habuerit, quot deinde ulnas uno coronato uendiderit, quæritur.

$$\text{Facit } \begin{cases} \text{primus} & 2 \text{ ul.} \\ \text{secund.} & 9 \text{ ul.} \end{cases} \quad \text{Vendidit autem uno corona.} \begin{cases} 1 \frac{1}{2} \text{ ul.} \\ 2 \text{ ul.} \end{cases}$$

OPERATIO.

Primus	1 ra.		Accipiunt	$\frac{6 \text{ ra.}}{11 \text{ N} - 1 \text{ ra.}}$
secundus	11 N — 1 ra.		autem	$\frac{11 \text{ N} - 1 \text{ ra.}}{1 \text{ ra.}}$
Quare	$\frac{121 \text{ N} + 7 \text{ pri.} - 22 \text{ ra.}}{11 \text{ ra.} - 1 \text{ pri.}}$		æqua.	$5 \frac{5}{6} \text{ N}$
	In integris deinde & ultimo			
ueniunt	77 pri. + 726 N	æqual.		517 ra.

Est autem exemplum canonis tertij, atq; facta operatione, radicis ualor 2 pro negociatore primo. Quantum nunc secundus habuerit, quot deinde uterq; ulnas uno coronato uendiderit, facili calculo hæc ex ipsa positionis solutione, seu exempli huius hypothefibus haberi possunt.

Esto nunc quod ambo acceperint 7 coronatos, ulnæ uero $24 \frac{1}{2}$ fuerint, ceteris manentibus.

Operatione igitur instituta, ueniunt quod primus habuerit $3 \frac{1}{2}$ ulnas. Quare sic secundus reliquas 21. & quod uterque uno coronato ulnas $3 \frac{1}{2}$ exposuerit.

7. Habent duo sericum, unus quidem 40, alter uero 90 ulnas. Quoniam autem, cum primus in triente ulnæ plus, uno coronato det quam ipse secundus, atq; deinde in medium collatis pecunijs, 42 coronatos numerent, quot uterq; ulnas uno coronato exposuerit, quæritur.

$$\text{Facit } \begin{cases} \text{primus} & 3 \frac{1}{2} \\ \text{secundus} & 3 \end{cases}$$

OPERATIO.

in triente	+	40 Pri.	1 ra.	+ $\frac{1}{3} \text{ N}$	Accepta pec.	$\frac{120 \text{ N}}{3 \text{ ra.} + 1 \text{ N}}$
42 coro.		90 se.	1 ra.			$\frac{90 \text{ N}}{1 \text{ ra.}}$

Ad regulam proportionum quantitates positæ.

$\frac{3 \text{ ra.} + 1 \text{ N}}{3}$	coro. uno uno	ulnæ. 40 90
1 ra.		Facit &cæ.

Facta

Facta additione, ueniunt

$$\frac{390 \text{ ra.} + 90 \text{ N}}{3 \text{ pri.} + 1 \text{ ra.}} \quad \text{æquales} \quad 42 \text{ N}$$

Sub una denominatione deinde atq; ultimò, in minimis item

$$58 \text{ ra.} + 15 \text{ N} \quad \text{æquales} \quad 21 \text{ pri.}$$

Est autem exemplum canonis secundi, atq; operatio sic instituenda,

$$\frac{\frac{58}{21} \text{ ra.} + \frac{15}{21} \text{ N}}{\quad} \quad \text{æquales} \quad 1 \text{ pri.}$$

$$\frac{29}{21} \text{ in se, } \frac{841}{441} + \frac{15}{21}, \text{ ueniunt } \frac{1156}{441}$$

cuius radix qua. $\frac{34}{21}$ & $\frac{29}{21}$ (quæ simul, 3 constituunt) numerus est ulnarum, quot secundus pro uno coronato exposuit.

$$\text{Primi igitur } 3\frac{1}{3}$$

ALIA HVIVS EXEMPLI OPERATIO.

Esto quòd uno coronato uendat

uln.		uln.		coro.
40.	Primus quidem	1 ra.	accepta pecunia	$\frac{40 \text{ N}}{1 \text{ ra.}}$
90.	quare secun.	1 ra. — $\frac{1}{3}$ N		$\frac{270 \text{ N}}{3 \text{ ra.} - \text{N}}$

Facta additione acceptorum, ueniunt

$$\frac{390 \text{ ra.} - 40 \text{ N}}{3 \text{ pri.} - 1 \text{ ra.}} \quad \text{æquales} \quad 42 \text{ N}$$

In integris ueniunt

$$390 \text{ ra.} - 40 \text{ N} \quad \text{æquales} \quad 126 \text{ pri.} - 42 \text{ ra.}$$

Ultimo uerò & in minimis.

$$216 \text{ ra.} \quad \text{æquales} \quad 63 \text{ pri.} + 20 \text{ N}$$

Est autem exemplum canonis tertij, unde operatio sic instituenda,

$$\frac{\frac{216}{63} \text{ ra.} \text{ uel } \frac{24}{7} \text{ ra.}}{\quad} \quad \text{æqua.} \quad 1 \text{ pri.} + \frac{20}{63} \text{ N}$$

$$\frac{24}{7}, \quad \frac{12}{7} \text{ in se, } \frac{144}{49}, \quad \text{minus } \frac{20}{63}$$

$$\text{manent } \frac{1156}{441}. \quad \text{Huius radix } \frac{34}{21} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{de} \\ \text{ad} \end{array} \right. \quad \frac{12}{7} \text{ uel } \frac{36}{21}$$

manent $\frac{2}{21}$, non uerus: uel ueniunt $3\frac{1}{3}$, uerus numerus. Id quod nunc examinari potest.

ÆQUATIO TERTIA.



Tertia æquatio est ferè eadem cum secunda: nam & hæc tres numeros tribus diuersis characteribus signatos requirit. Sunt tamen in hac numerorum characteres non continui, uerum semper inter quosq; duos sibi proximos, iam unus, iam uerò duo uel plures omissi: ac duo tandem uni, uel unus character cum suo numero duobus æqualis esse profertur. Quapropter ut secundæ, ita & huius tertiæ æquationis est operatio, nisi quod postquam ad finem operationis peruentum fuerit, ubi iam radicis ualor expectandus esset, cum non radicis, uerum alterius cuiusdam characteris ualor sese offerat, illius characteris secundum sui exigentiam (prout quidem unus uel plures characteres sint omissi) radix, ut in prima æquatione factum quærenda, atq; per eam

eam tandem inuentam, radicis ualor exprimendus erit. Hæc nullam requirit demonstrationem, cum ex præcedentibus duabus (quarum demonstrationes unde peti debeant, indicauimus) composita sit.

SEQVUNTUR EXEMPLA.

Primum. $9 \text{ Ter.} + 5 \text{ pri.} \text{ æquales } \frac{294 \text{ N}}{\frac{5}{9}}$

$\frac{5}{18}$ in se, $\frac{25}{324}$, plus $2\frac{24}{9}$, ueniunt $\frac{10609}{324}$. Huius radix $10\frac{3}{18}$ minus $\frac{5}{18}$ manent $\frac{98}{18}$ uel $4\frac{2}{9}$. Atq; is esset numerus solutionis. sed quia utrinq; unus character negligitur, huius igitur numeri, ut primæ quantitatis, radix, $2\frac{1}{3}$ scilicet, numerus solutionis erit.

Secundum. $14\frac{7}{8} \text{ sec.} + 1200\frac{1}{2} \text{ N} \text{ æqua. } 1 \text{ Quin.}$

$7\frac{7}{16}$ in se, $1\frac{49}{256}$ plus $1200\frac{1}{2}$, ueniunt $32\frac{1489}{256}$. Huius ra. $5\frac{76}{16}$, plus $7\frac{7}{16}$ ueniunt $6\frac{86}{16}$ uel $3\frac{43}{8}$. Atq; is esset numerus solutionis. sed quia utrinq; duo characteres negliguntur, huius igitur numeri secundæ quantitatis radix, $3\frac{1}{2}$ scilicet, numerus solutionis erit.

Tertium. $1 \text{ sep.} + 2401 \text{ N} \text{ æquantur } 2402 \text{ ter.}$

1201 in se, 1442401 , minus 2401 , manent 1440000 . Huius radix quadrata,

sunt 1200 , $\left\{ \begin{array}{l} \text{de} \\ \text{ad} \end{array} \right.$ 1201 , & colliguntur hic quidem 2401 , illic uero

1 manet, uterq; solutionis numerus. Sed quia utrinq; omittuntur tres characteres, non ij igitur numeri, sed horum numerorū, ut tertiarum quantitatum, radices, quæ sunt 1 & 7 , solutionis numeri erunt.

His certe tribus exemplis uidere Lector poterit, quàm planè idem sit huius ac præcedentis secundæ æquationis processus. nisi quòd in hac ultimò, prout quidem characteres plures uel pauciores intermissi fuerint, radix quærenda sit. Vno igitur atq; altero pro hac æquatione exemplo posito, ad alias huius regulæ præceptiones pergendum erit.

SEQVUNTUR NVNC QVAEDAM

AE N I G M A T A, SE V Q V A E S T I O N E S, Q V O. rum solutiones tandem hanc æquationem requirunt.

Primum. Propositum est inuenire duos numeros, quorum multiplicatio quidem unius cum altero 24 , secundæ uero illorum quantitates simul iunctæ 280 , uel 539 constituent; queritur, qui nam sint illi duo numeri.

Facit 4 & 6 , uel 3 & 8 .

OPERATIO.

<p>Numeri 1 ra $\frac{24 \text{ N}}{1 \text{ ra}}$</p>	<p>Secundæ quantitates, primi 1 se, secundi numeri. $\frac{13824 \text{ N.}}{1 \text{ se,}}$ E</p>	<p>Quan-</p>
---	--	--------------

Quantitatibus secundis simul iunctis, ueniunt
 $1 \text{ quin.} - 13824 \text{ N}$ æquales 280 uel 539 N .

1 le.

In integris quantum ad numerum 280 .

$1 \text{ Quin.} + 13824 \text{ N}$ æquales 280 se.
 140 in se, 19600 , minus 13824 , manent 5776 . Huius radix quadrata

76 $\left\{ \begin{array}{l} \text{de} \\ \text{ad} \end{array} \right.$ 140 , medieta. mediij, manent 64 , uel proueniunt 216 , ra-

dicis quidem ualores ac quæstionis numeri, si characteres continui essent. Sed quia utrinq; duo characteres neglecti sunt, non igitur hi, sed horum numerorum, ut secundarum quantitatuum radices, 4 scilicet $\& 6$, quæstionis numeri erunt. Id quod nunc probari potest, ut sequitur.

priorem		Quantum ad numerum		posteriolem	
Numeri		280	Numeri		539
propositi		Secun.	propos.		Secundæ
		quanti.			quautitates
4	16	64	3	9	27
6	36	216	8	64	512
24		280	24		539

Secundum. Propositum est inuenire numerum, cuius quadratum postquam primò acceperit 8 , secundo uerò 3 amiserit, ut multiplicatio tandē collecti cum residuo 6942 producat.

Facit 9

OPERATIO.

1 ra. $1 \text{ pri.} + 8 \text{ N}$
 1 pri. $1 \text{ pri.} - 3 \text{ N}$

 $1 \text{ ter.} + 5 \text{ pri.} - 24 \text{ N}$ æquales 6942 N .

Vel additis quæ sunt addenda, nimirum $- 24 \text{ N}$, parti utriq; , ueniunt

$1 \text{ ter.} + 5 \text{ pri.}$ æqua. 6966 N .

Est autem in secunda æquatione exemplum canonis primij, quare secundum illius præceptionem operatio instituenda est. Veniunt autem operatione absoluta 81 , tanquam radice ualor. Sed quia unus character utrinq; inter duos proximos est neglectus, non igitur ipse numerus, sed eius radix quadrata, 9 scilicet, radice ualor $\&$ numerus quæsitus erit, id quod nunc examinari poterit.

Tertium. Propositum est inuenire numerum, cuius quadratum, postquam primò acceperit 8 , numerus uerò ipse 3 amiserit, ut multiplicatio tandem collecti cum residuo

534 producat.

Facit 9

Sequuntur

SEQVUNTUR NVNC

ALIAE HVIVS REGVLAE PRAECEPTIO-

NES, ALGORITHMI NIMIRVM, VT VOCANT, DE

SVRDIS QVADRATORVM, CVBICORVM,

& id genus, Binomiorum item & Residuorum, per

singulas species tractatio.



VMERI igitur surdi sunt, quorum radices desideratae, numero certo expressae, inueniri nequeunt. Vt numerus 3, quia non 3, sed ex ipso quantitatis cuiusdam radix expetitur, licet per se rationalis sit numerus, tamen ratione illius defectus, iam irrationalis & surdus appellatur. Eadem ratione 17. 13. 21. 346, multi item numeri alij, pro surdis haberi solent. Notantur autem, ut in sequentibus apparet, huiusmodi surdi, prout radix alia atq; alia desideratur, suis proprijs notis. Quod ipsum ideo fit, ut nimirum eorum a rationalibus numeris discrepantia (qui absq; signo & absolute proferuntur) cognosci possit. Quia autem variae sunt numerorum secundum quantitates appellationes, cum alij primae quantitatis, alij vero secundae, tertiae, quartae, uel decimae, ac deinceps quarumuis aliarum quantitarum appellationem habeant, varios etiam horum surdorum numerorum Algorithmos, seu tractationes esse, necessario sequitur. Atq; de his nunc ordine dicendum erit, & primo quidem:

DE SVRDIS NUMERORVM PRIMAE

QUANTITATIS, SEV, VT VOCANT,

Quadratorum.

NUMERATIO VEL ENUNCIATIO.

Caput I.



Nunciatio est facilis. Primo enim character, uel syllaba, quae numero praescripta est, per quam etiam numerum propositum, Surdum esse significamus, mox deinde numerus ipse exprimitur. Vt exempli gratia. ra. 29 exprimitur, Radix uiginti nouem: uel, ut sit enunciatio planior, Radix numeri uiginti nouem. Intelligitur autem radix quadrata, cum in praesentia sit quadratorum tractatio. In cubicis uero, de quibus erit tractatio sequens, cubica uel secundae quantitatis radix consideratur. Atq; in genere, cuiuscumq; sane quantitatis tractatio fuerit, eius conditio per notam radicis, Ra. significatur, ac deinde etiam exprimitur. Solent tamen multi, & bene etiam, has desideratas radices, suis punctis cum linea quadam a dextro latere ascendente, notare, atq; sic pro radice quidem quadrata, ubi haec in aliquo numero desideratur, notam $\sqrt{\quad}$: pro cubica uero, $\sqrt[3]{\quad}$: ac radicis radice deinde, $\sqrt{\sqrt{\quad}}$ praepouunt: de quo obiter admonere Lectorem uolui.

MULTIPLICATIO. CAP. II.



Multiplicatio surdorum in genere, est radicis unius surdi numeri toties, quot sunt unitates in radice surdi alterius, coaceruatio. Haec autem perficitur, multiplicatione unius numeri rationalis (neglecto character) cum numero rationali altero. Nam statim tandem radix producti, id quod ex multiplicatione radicis unius cum radice surdi alterius prouenerit, indicabit.

E z Exempla

$$\frac{\text{ra. } 7 \text{ cum ra. } 8}{\text{produ. ra. } 56}$$

Item

$$\frac{\text{ra. } 24 \text{ cum ra. } 54}{\text{produ. } 36}$$

Quod autem in his duobus exemplis, multiplicatio in uno quidem, Surdum; in altero uerò, rationalem numerum produxerit, mirandum non est. posse enim id fieri in multiplicatione surdorum, docetur propositionibus 19 & 21 decimi libri Euclidis,

SE QVVNTVR EXEMPLA ALIA.

$$\frac{\text{ra. } 6 \text{ cum ra. } 24}{\text{produ. } 12}$$

Item

$$\frac{\text{ra. } 12\frac{1}{2} \text{ cum ra. } 4\frac{1}{2}}{\text{produ. } 7\frac{1}{2}}$$

ADHVC ALIA.

$$\frac{3 \text{ cum } \sqrt{8}}{\text{produ. } \sqrt{72}}$$

Item

$$\frac{4\frac{1}{2} \text{ cum } \sqrt{14}}{\text{produ. } \sqrt{283\frac{1}{2}}}$$

In his duobus exemplis, cum unus numerus surdus, alter uerò rationalis sit, numerus rationalis, ad similem ipsius surdi quantitatis appellationem, multiplicatione reducendus erit. Nam semper unius appellationis esse numeros in surdorum tractatione, cum hac in regula, tum in sequentibus necesse est. Ex quo nunc sequitur, cum una surdorum debeat esse quantitatis appellatio: quod duplare quidem hoc loco, per 4, hoc est, per binarii quadratum: triplare uerò & quadruplare, ac præterea si quæ sint multiplicationes aliæ, per illorum numerorum quadrata, 9 scilicet & 16, atque ordine deinceps, perficiendæ sint, ac fieri debeant.

SE QVVNTVR EXEMPLA.

$$\frac{\text{ra. } 8 \text{ his}}{\text{produ. ra. } 32}$$

$$\frac{\text{ra. } 8 \text{ ter.}}{\text{produ. ra. } 72}$$

$$\frac{\text{ra. } 8 \text{ quater.}}{\text{produ. ra. } 128}$$

Est autem huius tractationis tanquam examen, ipsa diuisio, quæ iam sequitur.

DIVISIO. CAP. III.

Diuisio surdorum in genere, est inuentio numeri, cuius radix tota habeat unitates, quoties radix diuidens continetur, in ipsa radice diuidenda. Hæc autem perficitur, diuisione unius numeri rationalis (neglecto caractere) in numerum rationalem alterum. Nam statim tandem exeuntis radix id, quod ex diuisione radicis unius in radicem surdi alterius exiuerit, indicabit.

EXEMPLA SVNT.

$$\frac{\text{ra. } 56 \text{ in ra. } 8}{\text{exit ra. } 7}$$

Item

$$\frac{\text{ra. } 72 \text{ in ra. } 8}{\text{exeunt } 3}$$

ALIVD EXEMPLVM.

$$\text{ra. } 457\frac{1}{3} \text{ in ra. } 21, \text{ exit ra. } 21\frac{7}{9}.$$

ALIA.

$$\frac{\sqrt{7\frac{1}{2}} \text{ in } \frac{2}{3}}{\text{exit } \sqrt{16\frac{1}{2}}}$$

Item

$$\frac{\frac{2}{3} \text{ in } \sqrt{\frac{3}{4}}}{\text{exit } \sqrt{\frac{16}{27}}}$$

Diuidatur radix numeri 8 in

$$2, \text{ exit } \sqrt{2}$$

$$\text{in } 3, \text{ exit } \sqrt{\frac{8}{9}}$$

$$\text{in } 4, \text{ exit } \sqrt{\frac{1}{2}}$$

Id quod ex præmissis patet.

Huius tractationis tanquam examen, est ipsa multiplicatio, quæ paulo antè descripta est.

Additio

ADDITIONIO. CAP. IIII.



Aditio surdorum in genere, est radicum propositorum surdorum in unam summam collectio. Hæc autem ex 4 propositione secundi Euclidis perficitur hoc modo. Sumantur surdorum, tanquam partium alicuius totius (lineæ, seu numeri) in partes diuisi, quadrata: una deinde parte uel numero, cum altero multiplicato, is qui producitur numerus, quum allegata propositio dicat bis, duplicetur: hoc est, per 4, ut in multiplicatione dictum est, multiplicetur. Quia uerò hæc omnia, partium uidelicet totius, hoc est, numerorum surdorum, quadrata, & quod producunt illi surdi inter se multiplicati bis, ex allegata propositione, totius numeri quadrato equalia sunt: his igitur omnibus in unum collectis, radice deinde quadrata collecti quesita, per eam tandem radicem summa datorum surdorum indicabitur.

EXEMPLA SVNT.

ra. 12	ad	ra. 20	Item	ra. 15	ad	ra. 17
12		20		15		17
		ra. 240				ra. 255
		bis per 4				bis per 4.
		ra. 960				ra. 1020.

Facta additione, ueniunt

32	+	ra. 960		32	+	ra. 1020
----	---	---------	--	----	---	----------

quadratum totius.

Radix igitur huius collecti, uel totius, quadrata, quæ est

Radix collecti $32 + \sqrt{960}$ ra. col. $32 + \sqrt{1020}$
 surdorum propositorum summa radicum erit.

Adduntur huiusmodi numerorum surdorum radices commodius per particulam illam Plus, uel per eius signum +, quod idem est, sic

ra. 20 plus ra. 12 Item ra. 17 + ra. 15

Quod si uno surdo cum altero multiplicato, producti radix assignari queat, tum loco illius producti radix assumenda, ac binario deinde ea duplenda est. Quo facto, & breuior & expeditior erit operatio.

EXEMPLA SVNT.

ra. 27	ad	ra. 12	Item	ra. 18	ad	ra. 32
27		12		18		32
		ra. 324				ra. 576
		18				24
		bis				bis
		36				48
		75	Omnium productorum summa			98
		ra. 75	Radicum summa.			ra. 98

Atq; is est generalis additionis surdorum canon. Sed quia numerorum surdorum, alij compositi, seu, ut uocant, commensurabiles inter se sunt, alij deinde incompositi & incommensurabiles: Ac commensurabiles quidem sunt, qui alicuius communis numeri diuisione, ad quadratos reduci possunt, ut sunt ra. 6 & ra. 54. item ra. 27 & ra. 12: Incommensurabiles uerò, qui nullo communi numero, diuidendo, ad quadratos reduci possunt, ut sunt ra. 7 & ra. 13, itē ra. 12 & ra. 20: Qui commensurabiles inter se sunt surdi, alia & breuiori uia, quam in generali regula traditum est, addi possunt, in hunc modum.

E 3 Reducan-

Reducantur primò surdī hi commensurabiles ad numeros quadratos, quadratorum deinde radices simul addantur, & quod colligitur, huius quadratum cum communi surdorum commensurabilium numero multiplicetur. quo factō, producti radix propositorum surdorum radicum summam indicabit, quod per duo exempla præmissa sequenti calculo cernere licebit.

$$\begin{array}{r}
 \text{ra. } 27 \quad \text{ad} \quad \text{ra. } 12 \\
 \text{com.} \quad 9 \text{ quadrata} \quad 4 \\
 \text{nu. } 3 \quad 3 \text{ radices} \quad 2 \\
 \quad \quad \quad 5 \text{ in se,} \\
 \quad \quad \quad 25 \\
 \text{com. numerus} \quad 3 \\
 \hline
 75
 \end{array}$$

Summa radicū $\sqrt{75}$

$$\begin{array}{r}
 \text{Item} \quad \text{ra. } 18 \quad \text{ad} \quad \text{ra. } 32 \\
 \text{com.} \quad 9 \quad \text{quadra.} \quad 16 \\
 \text{nu. } 2 \quad 3 \quad \text{ra.} \quad 4 \\
 \quad \quad \quad 7 \text{ in se} \\
 \quad \quad \quad 49 \\
 \text{com. numerus} \quad 2 \\
 \hline
 98
 \end{array}$$

Summa radicum $\sqrt{98}$

Simili modo cum alijs exemplis omnibus, hæc, siue per numeros integros, siue per fractiones, seu per integros & fractiones exposita fuerint, procedendum erit.

EXEMPLA.

$$\begin{array}{r}
 \text{ra. } 5\frac{1}{2} \quad \text{ad} \quad \text{ra. } 6\frac{3}{4} \\
 \text{Facit ra. } 24\frac{1}{12}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Item ra. } 26\frac{2}{3} \quad \text{ad} \quad \text{ra. } 33\frac{3}{4} \\
 \text{Facit ra. } 120\frac{5}{12}
 \end{array}$$

ALIVD EXEMPLVM.

$$\begin{array}{r}
 3 \quad \text{ad ra. } 8. \quad \text{Facit radix collecti } 17 + \sqrt{288}. \quad \text{Vel } 3 + \sqrt{8}. \\
 \text{Est autem huius tractationis tanquam examen ipsa subtractio,} \\
 \text{quæ iam sequitur.}
 \end{array}$$

SVBTRACTIO. CAP. V.



Vbtractio surdorum in genere, est radice unius propositi surdi de radice alterius subtractio. Hæc autem ex propositione 7. secundi Euclidis, perficitur hoc modo. Sumantur quadrata amborum, hoc est, eius à quo debet fieri subtractio, ut totius: atq; etiam radice subtrahendæ, ut unius partis lineæ, uel numeri diuisi. Et quia hæc simul collecta, ex allegata propositione, equalia sunt numero, quem producit totum cum dicta parte, hoc est, una radix cū altera multiplicata bis, & quadrato alterius partis, hoc est, quadrato radice residuæ. Ab illo igitur quadratorum collecto, numerus quem produciunt radices inter se multiplicatæ bis, subtrahendus, residui deinde radix querenda: qua inuenta, subtractio absoluta erit, cum per hanc ipsam remanentis seu residui radix indicabitur.

EXEMPLA SVNT.

$$\begin{array}{r}
 \text{ra } 12. \quad \text{de} \quad \text{ra. } 20 \\
 \hline
 12 \quad \quad \quad 20 \\
 \text{ra. } 240 \\
 \text{bis per } 4 \\
 \hline
 \text{ra. } 960
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Item ra. } 15 \quad \text{de} \quad \text{ra. } 17 \\
 \hline
 15 \quad \quad \quad 17 \\
 \text{ra. } 255 \\
 \text{bis per } 4 \\
 \hline
 \text{ra. } 1020
 \end{array}$$

Facta subtractione manent

$$\begin{array}{r}
 32 \text{ — ra. } 960 \quad \quad \quad 32 \text{ — ra. } 1020 \\
 \text{remanentis uel residuæ radice quadratum.}
 \end{array}$$

Radix igitur huius residui quadrata, quæ est
 radix residui $32 \text{ — } \sqrt{960}$ radix residui $32 \text{ — } \sqrt{1020}$
 remanentis surdi radix quadrata erit,

Subtra

Subtrahuntur huiusmodi numerorum surdorum radices commodius per particulam illam Minus, uel per eius signum —, quod idem est, sic,

ra. 20 minus ra. 12 Item ra. 17 — ra. 15.

ALIA EXEMPLA.

<u>ra. 27 de ra. 75.</u>	Item	<u>ra. 32 de ra. 98.</u>
27 75		32 98
102		130
2025		3136
45		56
bis		bis
90		112
12	quadratum residui	18
ra. 12 igitur	radix residui.	ra. 18 igitur

Quia uerò & in hac specie, quemadmodum in præcedenti, aliàs commensurabilem, aliàs incommensurabilem surdorum fit subtractio: ubi commensurabiles fuerint propositi, hi eodem, quod in additione traditum est, compendio, unus ab altero subtrahi poterit: nisi quod hic radix à radice subtrahenda, cum illic una alteri addenda sit. Residuæ deinde radicis quadrato, ut in additione aggregati ex radicibus quadrato, cum numero, quo scilicet propositi surdi ad quadratos reducti sunt, multiplicato, ex producto tandem radice quæsitâ, subtractio peracta erit, Quod per duo exempla præmissâ sequenti calculo cernere licebit.

<u>ra. 27 de ra. 75</u>	Item	<u>ra. 32 de ra. 98</u>
com. nu.	com. nu.	
3 9 quadra. 25	2	16 quadra. 49
3 radices 5		4 ra. 7
2 in se		3 in se
4		9
communis nume. 3		com. numerus 2
12		18
Radix residua √ 12		Radix residua √ 18

Simili modo cum alijs exemplis omnibus, hæc siue per numeros integros, siue per fractiones, seu per integros & fractiones, exposita fuerit, procedendum erit,

EXEMPLA.

<u>ra. 6 $\frac{3}{4}$ de ra. 8 $\frac{1}{3}$</u>	Item	<u>ra. $\frac{3}{8}$ de ra. $\frac{2}{3}$</u>
manet ra. $\frac{1}{12}$		ma. ra. $\frac{1}{24}$

ALIUD EXEMPLVM.

ra. 26 $\frac{2}{3}$ de ra. 33 $\frac{3}{4}$ ma. ra. $\frac{5}{12}$.

ADHVC ALIUD.

ra. 6 $\frac{3}{4}$ de ra. 12 $\frac{1}{12}$, manet radix residui 18 $\frac{5}{6}$ — √ 326 $\frac{1}{4}$.
 Hæc autem est, ut quidem suo loco cognoscetur, √ 12 $\frac{1}{12}$ — √ 6 $\frac{3}{4}$
 id quod examinari potest.

Huius tractationis tanquam examen, est ipsa additio, quæ paulo ante descripta est.

Sequitur

SEQVITVR ALGORITHMVS DE SVR-
DIS NVMERORVM SECVNDÆ QVANTITATIS,
feu, ut uocant, de surdis Cubicorum.

NVMERATIO, VEL ENVMNCIATIO,
Caput I.

Nunciatio est, sicut in iam absoluta de surdis quadratorum tractatione exposita est. Vt ra. 29, hæc quantitas, quia uersatur in tractatione cubica: ideo etiam non radix quadrata, sed radix cubica, uel secundæ quantitatæ radix, numeri 29 exprimitur. Sic in cæteris exemplis agendum. Solet tamen plerumq; syllabæ, Ra. propter confusionem uitandam, addi syllaba, cu. præsertim quidem, ubi extra tractationem alibi scriptæ fuerint ac inueniantur, sic:

Ra. cu. 11. Item radix se. 11, 24, uel alterius numeri.

MVLTIPPLICATIO ET DIVISIO.
Caput II.

Multiplicatio & Diuisio eodem modo hic, quo superius in tractatione surdorum quadratorum, perficiuntur: nisi quòd ultimò, loco radicis quadratæ, quæ ex multiplicationis producto & diuisionis exeunte illic eliciebatur, in præsentia nunc, cum sit tractatio cubica, ex iisdem radix cubica quærenda sit,

SEQVNTVR EXEMPLA, ET PRIMODE
multiplicatione.

Ra. cu. 7 cum ra. cu. 11 Item ra. $7\frac{2}{3}$ cum ra. $\frac{2}{4}$
produ. ra. cu. 77. produ. ra. $5\frac{2}{4}$.

ALIA,

ra. $\frac{9}{16}$ cum ra. $\frac{16}{27}$ Item $\sqrt{\frac{2}{3}}$ cum $\sqrt{\frac{4}{9}}$
produ. $\sqrt{\frac{1}{3}}$ producuntur $\frac{2}{3}$.

ALIVD.

ra. cu. $3\frac{2}{8}$ cum 6, producuntur 9.

ALIA,

ra. cu. 9 bis $\sqrt{9}$ ter. ra. cu. 9 quater,
pro. ra. cu. 72. pro. $\sqrt{243}$ pro. ra. 576.

Hæc tria aut quatuor exempla, licet in se habeant aliquid obscuritatis, tamen qui priorum memor fuerit, nullam horum planè requireret explanationē ulteriorem.

SEQVNTVR EXEMPLA DIVISIONIS.

Diuidatur ra. cu. 16 in ra. cubicum 4, exit radix cu. numeri 4.

Item $\sqrt{24}$ in $\sqrt{3}$, exeunt 2. Similiter ra. 20 in ra. 6. exit ra. $3\frac{1}{3}$

Item diuidatur $\sqrt{240}$ in 6, uel contra 6 in $\sqrt{240}$, exeunt, hic quidem ra. cu. $\frac{2}{15}$, illic uerò ra. cu. $1\frac{1}{5}$

Medietas radicis cubicæ numeri 48, est radix cubica numeri 6.

Sic tertia pars eiusdem, numeri 48, est radix cubica numeri $1\frac{2}{3}$
ccmpro.

Comprobantur autem hæc duæ species, multiplicatio scilicet & diuisio, alteris, ut aliàs fieri consuevit.

ADDITIO ET SUBTRACTIO.

Caput III.



Vnt & hic considerandi duplices surdi, cum, quemadmodum in superiori tractatione, alij commensurabiles inter se sint, alij incommensurabiles. Ac commensurabiles quidem, ut ra. cu. 4, & ra. cu. 32, radices item cubicæ numerorū 24 & 81. Incommensurabiles uerò, ut ra. cu. 24 & ra. cu. 54, radices itē cubicæ numerorū 20 & 12, uel 21 & 13 atq; id genus. Qui igitur commensurabiles inter se sunt surdi, illorū radices non aliter adduntur, uel una ab altera subtrahitur, atq; in surdorum quadratorum tum additione, tum subtractione suprā traditum est, nisi quod illic quadratē, hic uerò cubicē omnia agantur. Quare uno atq; altero exemplo posito, res satis dilucida erit. Qui uerò incommensurabiles, & planē surdi sunt, illorum additio & subtractio percommodē signo affirmatiuo, +, & negatiuo, —, absoluuntur.

EXEMPLA PARTIS PRIORIS.

Additio			Subtractio.			
Ra. cu. 24	ad	ra. cu. 81	Item	ra. 24	de	ra. 81
3	8	27	3	8		27
	2	3		2		3
	<hr/>			<hr/>		
	5			1		
	125			1		
com. numerus 3			com. numerus 3			
	375			3		
	<hr/>			<hr/>		
	ra. cu. 375, radicum summa.			ra. cu. 3, radix residua.		

ALIA EXEMPLA.

$\sqrt[6]{10\frac{2}{3}}$	ad	$\sqrt[6]{4\frac{1}{2}}$	Item	$\sqrt[6]{4\frac{1}{2}}$	de	$\sqrt[6]{10\frac{2}{3}}$
In integris & sub una denominatione, sexta scilicet						
$\sqrt[6]{64}$	ad	$\sqrt[6]{27}$	Item	$\sqrt[6]{27}$	de	$\sqrt[6]{64}$
4		3		3		4
	<hr/>			<hr/>		
	7			1		
	343	in 6 diuisa,		1	in 8cæ,	
exeunt	$57\frac{1}{6}$.	Quare	exit	$\frac{1}{6}$.	Quare	
	$\sqrt[6]{57\frac{1}{6}}$	radicum sum.		$\sqrt[6]{\frac{1}{6}}$	ra. ra.	

EXEMPLA PARTIS POSTERIORIS.

Additio			Subtractio.			
$\sqrt[6]{24}$	ad	$\sqrt[6]{32}$	Item	$\sqrt[6]{24}$	de	$\sqrt[6]{32}$
uenit	$\sqrt[6]{32}$	+ $\sqrt[6]{24}$	ma,	$\sqrt[6]{32}$	—	$\sqrt[6]{24}$

ALIA.

$\sqrt[6]{9}$	ad	$\sqrt[6]{27}$	Item	$\sqrt[6]{9}$	de	$\sqrt[6]{27}$
uenit	$\sqrt[6]{27}$	+ $\sqrt[6]{9}$	ma,	$\sqrt[6]{27}$	—	$\sqrt[6]{9}$

SIMILITER ALIA.

$\sqrt[6]{8\frac{1}{3}}$	ad	$\sqrt[6]{9\frac{1}{7}}$	Item	$\sqrt[6]{8\frac{1}{3}}$	de	$\sqrt[6]{9\frac{1}{7}}$
uenit	$\sqrt[6]{9\frac{1}{7}}$	+ $\sqrt[6]{8\frac{1}{3}}$	ma,	$\sqrt[6]{9\frac{1}{7}}$	—	$\sqrt[6]{8\frac{1}{3}}$

Est & alia addendi & subtrahendi ratio, quæ quidem, ubi surdi commensurabiles fuerint, locum habet,

F

Surdis

Surdís commensurabilibus propositis, hi primùm communi eorum mensura uel numero, quem habent, ad cubos rationales reducendí, deinde tam euborum radices, quàm etiam radicum quadrati, ponendí sunt. Hoc factó, utriusq; radix cum triplo quadrati radicis alterius multiplicari: hæc duo producta deinde unã cū duobus cubis, si quidem additio instituitur, coniungi: uel pro subtractione absol- uenda, maioris radicis productum maiori, minoris uerò productum minori cu- bo addi, atq; ab illo deinde hoc collectum subtrahi debet. quo factó, tam quòd illic colligitur, quàm hic relinquitur, utrunq; cum communi commenturabilium surdo- rum numero multiplicatum, per radicem producti tandē cubicam cū additioni, tum subtractioni etiam satisfactum erit.

Ra. cu. 40	ad	ra. cu. 135	Item	$\sqrt{\quad}$ 40	de	$\sqrt{\quad}$ 135
5		27		5		27
8		3		8		3
2		9		2		9
4		27		4		27
12		36		12		27
54		36		54		36
	Summa omnium				Id quod relinquitur,	
	125				1	
com. numerus	5			com. numerus	5	
	625. quare				5. quare	
	ra. cu. 625 ra-				$\sqrt{\quad}$ 5 ra.	
	dicum summa				dix residua.	

SEQVITVR ALGORITHMVS DE SVR- DIS NUMERORVM TERTIAE QVANTITATIS, seu, ut uocant, de surdis quadratorum de quadratis,

NUMERATIO, VEL ENUNCIATIO. Caput I.

Nunciatio eadem est quæ in præcedentibus, nisi quòd character, qui numero ascribitur, pro suo ualore & natura exprimat. Ut ra. ra. 29 Radicis radix, uel radix tertiæ quantitatís, numeri 29, exprimitur. Sic reliqua huius generis exēpla omnia exprimi debēt. Preponitur autē huiusmodi surdis duplex ra. eo quòd bis ex eis radix quadrata elici- enda sit, semel quidem ex ijs ipsis surdis, secundo uerò ex eorum radicibus in- uentis, quod obiter annotare libuit. Breuitatis uerò, atq; compendij gratia, (ut supra etiam indicauimus) solent huiusmodi numeri notari & repræsentari du- plici puncto & cæ. sic $\sqrt{\quad}$, ut $\sqrt{\quad}$ 29, quod & ipsum notandum est.

MULTIPLICATIO ET DIVISIO. Caput II.

Efficiuntur hæc duæ species, multiplicatio & diuisio, eodem modo quo in superioribus traditum est: nisi quòd ultimò, ratione appellationis, tam de multiplicationis producto, quàm etiam diuisionis exeunte, ra- dix tertiæ quantitatís, hoc est radix quadrata de radice quadrata elici- debeat.

EXEMPLA MULTIPLICATIONIS SVNT.

ra. ra. 21	cum	ra. ra. 12	Item	$\sqrt{\quad}$ 27	cum	$\sqrt{\quad}$ 12
produ. ra. ra. 252.				produ. $\sqrt{\quad}$ 187		

Alia

ALIA EXEMPLA.

$$\frac{\sqrt{162} \text{ cum } \sqrt{32}}{\text{produ. } \sqrt{72}} \quad \text{Item} \quad \frac{\text{ra. ra. } 7\frac{1}{2} \text{ cum ra. ra. } \frac{4}{5}}{\text{produ. ra. } 2\frac{2}{5}}$$

ADHVC ALIA.

$$\frac{\sqrt{24} \text{ cum } 6 \text{ uel contra.}}{\text{produ. } \sqrt{31104}} \quad \text{Item} \quad \frac{\sqrt{45} \text{ cum } 4\frac{1}{3}}{\text{produ. } \sqrt{15867\frac{2}{3}}}$$

EXEMPLA DIVISIONIS.

$$\frac{\sqrt{84} \text{ in } \sqrt{7}}{\text{exit } \sqrt{12}} \quad \text{Item} \quad \frac{\text{ra. ra. } 48 \text{ in ra. ra. } 12}{\text{exit ra. } 2.}$$

ALIA EXEMPLA.

$$\frac{\sqrt{873} \text{ in } \sqrt{97}}{\text{exit } \sqrt{3}} \quad \text{Item} \quad \frac{\sqrt{66} \text{ in } \sqrt{8}}{\text{exit } \sqrt{8\frac{1}{2}}}$$

ALIA EXEMPLA.

$$\frac{\sqrt{5\frac{1}{2}} \text{ in } \sqrt{3\frac{1}{2}}}{\text{exit } \sqrt{\frac{28}{45}}} \quad \frac{\sqrt{12\frac{1}{2}} \text{ in } \sqrt{4\frac{1}{2}}}{\text{exit } \sqrt{1\frac{2}{3}}} \quad \frac{\sqrt{12} \text{ in } \sqrt{8\frac{1}{3}}}{\text{exit } \sqrt{1\frac{1}{3}}}$$

APPENDIX AD EA QVAE HACTENVS, CVM IN HOC, tum etiam in praemissis algorithmis, de multiplicationibus & diuisionibus surdorum commemorata sunt, cognitu necessarius.

Cum haectenus tantum, quomodo similium appellationum surdi inter se, surdus item cum rationali numero, uel contra, per has duas species tractari debet, traditum sit, haud raro autem accidere soleat, quod etiam diuersarum appellationum surdi inter se his regulis tractandi occurrant, & illorum tractatio nunc, ne quid in praemissa de surdis descriptione desiderari possit, paucis praescribetur.

Si duos igitur diuersarum appellationum surdos inter se multiplicare, aut unum in alterum diuidere propositum sit, utriusque appellationis numerus secundum appellationem numeri alterius multiplicandus est. quo facto, producuntur duo numeri alij, alia etiam, & una quidem, horum productorum appellatio: quibus postea, uel uno cum altero multiplicato, uel uno in alterum diuiso, res confecta erit. Quam uero hi producti numeri sortiuntur appellatione, in additis & diminutis, circa multiplicationem dudum iam traditum est.

EXEMPLA HVIVS SVNT.

ra. 24		ra. cu. 16
ra. 72	cum, uel in	ra. ra. 32
ra. cu. 32		ra. ra. 8

Producuntur, ratione quidem multiplicationis,

Primò, Radix quintae quantitatís, hoc est, radix quadraticubica, numeri 3538944.

Secundò, Radix tertiæ quantitatís, hoc est, radicis radix, numeri 165888.

Tertiò, Radix undecimæ quantitatís, hoc est, radix cubica de quadrati quadrato, uel contra, numeri 536870912.

Ratione uero diuisionis, exeunt hsdem quantitatibus denominati numeri,

Primò quidem 54, secundò uerò 162, ac tertiò deinde 2048. &c.

ALIA EXEMPLA IN RATIONALIBVS.

√ 4		√ 8	4	1
√ 9	cum uel in	√ 16	pro. 6 uel ex.	1½
√ 27		√ 81	9	1

APPENDICIS COMPENDIUM.

Habet hæc operatio suum quoq; compendium, in exemplis nimirum, ubi aliqua est in appellationibus numerorum convenientia & similitudo. Vt si, exempli gratia, hi duo surdi, ra. 6 & ra. 12, unus cum altero multiplicari, uel in alterum diuidi debeat, numerus 6 quadratè tantum multiplicari, 12 uerò prout sunt, ita absq; immutatione relinqui debent. Producitur autem multiplicatione quidè, ra. 432, diuisione uerò exit ra. 3. Sic radice quadrata de radice cubica, uel contra radice cubica de radice quadrata aliquis numerus notatus, si cum numeri alterius radice cubica, uel radice quadrata multiplicari, seu in eam diuidi debeat, numerus multiplicans seu diuidens, ratione quidem cubi, in se tantum quadratè, ratione uerò quadrati, in se tantum cubicè multiplicandus erit.

ADDITIO ET SVBTRACTIO. CAP. III.



Vinetiã hac tractatione surdi aliãs cõmensurabiles sunt, aliãs uerò incõmensurabiles. Qui igitur cõmensurabiles inter se sunt surdi, ad suã appellationis rationales, hoc est, ad tercię quantitatis numeros reducendi sunt, ac si quidem additio instituitur, radices horum addi: quod si uerò subtractio, una radix ab altera subtrahi debet. Quo facto, utriusq; hoc est, tam eius quod ex additione colligitur, quàm etiam eius quod per subtractionem relinquitur, tertia quantitas, cum communi numero multiplicetur, & erit eius quod producitur, Radicis radix, seu tercię quantitatis radix: hic quidem radicis radix residua, illic uerò harum summa. Quòd si incommensurabiles & planè surdi sunt, tũ illorũ additio & subtractio per cõmodè signo affirmatiuo, +, & negatiuo, —, absoluntur.

EXEMPLA PARTIS PRIORIS.

Additio			Subtractio.		
ra. ra. 32	ad	√ 162	Item	ra. ra. 32	de √ 162
2	16	81		2	16
	2	3		2	3
	5			1	
	625			1	
	2		communis numerus	2	
	1250			2	
ra. ra. 1250,	radicum summa			ra. ra. 2,	radix residua.

ALIA EXEMPLA.

√ 5 1/16 ad √ 39 1/16 Item √ 5 1/16 de √ 39 1/16
In integris sub una denominatione, sedecima nimirum.

√ 81	ad	√ 625	Item	√ 81	de	√ 625
3		5		3		5
	8	in se, & c.		2	in se	
	4096			16,	diuisa in	
	3			16.		
	283					
	4496					

Facit √ 256 idest 4

exit seu manet 1

Est autem hoc exemplum in numeris rationalibus expositum.

Sequitur

Sequitur iam simile in irrationalibus.

$\sqrt{266\frac{2}{9}}$ ad $\sqrt{1350\frac{9}{16}}$ Item $\sqrt{266\frac{2}{9}}$ de $\sqrt{1350\frac{9}{16}}$

In integris sub una denominatione, ¹⁴⁴

$\sqrt{38416}$ ad $\sqrt{194481}$ Item $\sqrt{38416}$ de $\sqrt{194481}$

$\frac{16}{2}$ $\frac{81}{3}$

$\frac{16}{2}$ $\frac{81}{3}$

⁵
in se, &cæ.

¹
in se

625

1

cum 2401

cum 2401

pro. 1500625 in 144 diuisa,
exeunt $\sqrt{1500625}$

pro. 2401 in 144 diuisa,
exeunt $\sqrt{2401}$

144

144

Radicum igitur summa,
radix quadrata numeri $102\frac{1}{12}$

Radix igitur residua,
ra. quadrata numeri $4\frac{1}{12}$

EXEMPLA PARTIS POSTERIORIS.

$\sqrt{18}$ ad $\sqrt{24}$ Item $\sqrt{18}$ de $\sqrt{24}$

ueniunt $\sqrt{24} + \sqrt{18}$

ma. $\sqrt{24} - \sqrt{18}$

ALIA.

$\sqrt{7\frac{2}{3}}$ ad $\sqrt{12\frac{1}{2}}$ Item $\sqrt{7\frac{2}{3}}$ de $\sqrt{12\frac{1}{2}}$
ueniunt $\sqrt{12\frac{1}{2}} + \sqrt{7\frac{2}{3}}$ ma. $\sqrt{12\frac{1}{2}} - \sqrt{7\frac{2}{3}}$

SEQUITUR ALGORITHMVS DE BINOMIIS ET RESIDVIS.

Est autem Binomium seu ex binis nominibus linea, ut eã Euclides, per 36 decimi libri propositionem, definit, linea irrationalis, quã duæ rationales, potentia tantum cõmensurabiles, in directum sumptæ, constituunt. ut $4 + \sqrt{7}$, $\sqrt{12} + 3$, $\sqrt{27} + \sqrt{15}$, $4 + \sqrt{8}$, $\sqrt{12} + 2$, $\sqrt{27} + \sqrt{18}$. & si quæ sunt alia. Residuum uero seu Apotome, ut idẽ Euclides id per 73 decimi propositionẽ definit, linea irrationalis, quã duæ rationales, potentia tantum commensurabiles, quarum una ab altera si ab lata fuerit, tandem relinquunt. ut $4 - \sqrt{7}$, $\sqrt{12} - 3$, $\sqrt{27} - \sqrt{15}$, $4 - \sqrt{8}$, $\sqrt{12} - 2$, $\sqrt{27} - \sqrt{18}$, & id genus alia multa.

ENUNCIATIO. CAP. I.



Abet hæc Binomiorum & residuorum tractatio, nihil ferẽ difficultatis, cum illorum operationes omnes suis regulis superius descriptæ sint. Et quia Enunciatio est facilis, cum ex præcedentibus constet & intelligatur: Sequitur igitur

ADDITIO. CAP. II.



Nadditione binomiorum & residuorum, qui unius sunt appellationis numeri, addantur simul, absoluti scilicet absolutis, & denominatis, & denominatis, ut superius traditum est, ratione interim signorum + & - habita.

SEQUUNTUR EXEMPLA, ET PRIMO DE BINOMIIS.

$4 + \text{ra. } 7$

$\text{ra. } 27 + \text{ra. } 15$

$4 + \text{ra. } 8$

$\text{ra. } 27 + \text{ra. } 18$

8 plus radix binomij

ra. 108 plus radix binomij

$15 + \sqrt{224}$

$33 + \sqrt{1080}$

Vel 8 plus $\sqrt{7} + \sqrt{8}$

Vel $\sqrt{108}$ plus $\sqrt{15} + \sqrt{18}$.

F 3

Alia

BREVIS REGVLARVM
ALIA EXEMPLA.

$$\begin{array}{r} \text{ra. } 12 + 3 \\ \text{ra. } 12 + 2 \\ \hline \text{ra. } 43 + 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 + \text{ra. } 28 \\ 4 + \text{ra. } 7 \\ \hline 12 + \text{ra. } 63. \end{array}$$

SEQVITVR SECVNDQ EXEMPLVM DE RESIDVIS.

$$\begin{array}{r} 4 - \text{ra. } 7 \\ 4 - \text{ra. } 8 \\ \hline 8, \text{ minus radix binomij. } 15 + \text{ra. } 224 \\ \text{Vel } 8, \text{ minus radix } 7, \text{ minus item ra. } 8 \end{array}$$

ALIA EXEMPLA.

$$\begin{array}{r} \text{ra. } 48 - 6 \\ \text{ra. } 3 - 1 \\ \hline \text{ra. } 75 - 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{ra. } 3 - \text{ra. } 2 \\ 3 - \text{ra. } 5 \\ \hline 3 + \text{ra. } 3 - \text{ra. } 2 - \text{ra. } 5 \end{array}$$

ALIVD EXEMPLVM.

$$\begin{array}{r} \text{ra. } 1620 - 18 \\ 54 - \text{ra. } 1620 \\ \hline \text{Summa } 36. \end{array}$$

SEQVVTVR TERTIO EXEMPLA DE BINOMIJS & residuis.

$$\begin{array}{r} 4 + \text{ra. } 7 \\ 4 - \text{ra. } 8 \\ \hline 8, \text{ minus radix residui} \\ 15 - \text{ra. } 224 \\ \text{Vel ma. } 8 + \sqrt{7} - \sqrt{8} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 + \text{ra. } 8 \\ 4 - \text{ra. } 7 \\ \hline 8, \text{ plus radix residui} \\ 15 - \text{ra. } 224 \\ \text{Vel ma. } 8 + \sqrt{8} - \sqrt{7}. \end{array}$$

ALIA DVO EXEMPLA.

$$\begin{array}{r} \text{ra. } 12 + 3 \\ \text{ra. } 12 - 3 \\ \hline \text{ra. } 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 - \text{ra. } 7 \\ 3 + \text{ra. } 28 \\ \hline 7 + \text{ra. } 7 \end{array}$$

SVBTRACTIO. CAP. III.



Vemadmodum in additione, unius appellationis numeri addendi: ita nunc, ut subtractio perficiatur, unus ab altero, absolutus scilicet numerus ab absoluto, & denominatus à denominato subtrahendus est, Quòd si interea, quid cum signis + & - fieri debeat, non oscitanter obserues, nihil est quod ultra desiderare possis.

SEQVVTVR EXEMPLA, ET PRIMQ DE Binomijis.

$$\begin{array}{r} \text{ra. } 12 + 3 \\ \text{ra. } 12 + 2 \\ \hline \text{manet } 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 + \text{ra. } 63 \\ 8 + \text{ra. } 28 \\ \hline 4 + \text{ra. } 7 \end{array}$$

ALIVD EXEMPLVM.

$$\begin{array}{r} 4 + \text{ra. } 8 \\ 4 + \text{ra. } 7 \\ \hline \text{manet radix residui } 15 - \sqrt{224}, \text{ uel ma. } \sqrt{8} - \sqrt{7}. \end{array}$$

Exempla

ALGEBRAE DESCRIPTIO.
EXEMPLA SECUNDO DE RESIDUIS.

647

$\begin{array}{r} 4 - \text{ra. } 7 \\ 4 - \text{ra. } 8 \\ \hline \text{manet} \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 - \text{ra. } 8 \\ 4 - \text{ra. } 7 \\ \hline \text{Impossibile, uel ma.} \end{array}$
ra. residui 15 — $\sqrt{224}$	minus radix resi. 15 — $\sqrt{224}$

ALIA DVO EXEMPLA.

$\begin{array}{r} \text{ra. } 60 - \text{ra. } 20 \\ \text{ra. } 20 - \text{ra. } 15 \\ \hline \text{ma, ra. } 135 - \text{ra. } 80 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{ra. } 12 - 6 \\ 6 - \text{ra. } 12 \\ \hline \text{ma. ra. } 48 - 12 \end{array}$
--	---

ALIA EXEMPLA.

$\begin{array}{r} 6 - \text{ra. } 24 \\ 3 - \text{ra. } 6 \\ 3 - \text{ra. } 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{ra. } 108 - 9 \\ \text{ra. } 48 - 4 \\ \text{ra. } 12 - 5 \end{array}$
---	--

SEQUUNTUR TERTIO EXEMPLADE BINOMIIS ET RESI.

$\begin{array}{r} 4 + \text{ra. } 7 \\ 4 - \text{ra. } 7 \\ \hline \text{ma. ra. } 28 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{ra. } 27 - 8 \\ \text{ra. } 3 + 4 \\ \hline \text{ma. ra. } 12 - 12 \end{array}$
--	--

ALIVD EXEMPLVM.

$\begin{array}{r} 24 + \text{ra. } 24 \\ 16 - \text{ra. } 12 \\ \hline \text{manent utrobique, 8 plus radix bino. } 36 + \sqrt{1152} \end{array}$	<p style="text-align: center;">Vel</p> $\begin{array}{r} 24 + \text{ra. } 12 \\ 16 - \text{ra. } 24 \\ \hline \end{array}$
---	--

ADHVC ALIVD EXEMPLVM.

$\begin{array}{r} 24 - \text{ra. } 24 \\ 24 + \text{ra. } 12 \\ \hline \text{manent utrobique, 8 minus radix bino. } 36 + \sqrt{1152} \end{array}$	$\begin{array}{r} 24 - \text{ra. } 12 \\ 24 + \text{ra. } 24 \\ \hline \end{array}$
--	---

MULTIPLICATIO. CAP. IIII.



Uti multiplicetur singularū appellationū numeri multiplicātis, eū singularū appellationū numeris ipsius multiplicādi, pductis deinde singulis cū suis signis debito modo additis, multiplicatio absoluta erit. Hoc rānē curabitur sēper, ut singuli duo numeri, qui inter se multiplicari debēt, unius sint denominationis. quōd si sic, facilis erit omnis multiplicatio. Sin minus, multiplicatione, ut una & eadē sit eorū denominatio, efficiendū est.

SEQUITUR EXEMPLVM.

$\begin{array}{r} 4 + \text{ra. } 7 \\ 4 + \text{ra. } 8 \\ \hline \text{pro. } 15 + \text{ra. } 128 + \text{ra. } 112 + \text{ra. } 56. \end{array}$

ALIA DVO EXEMPLA.

$\begin{array}{r} 12 + \text{ra. } 20 \\ 12 + \text{ra. } 20 \\ \hline 164 + \text{ra. } 11520 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{ra. } 12 + 3 \\ \text{ra. } 12 + 2 \\ \hline 18 + \text{ra. } 300 \end{array}$
---	--

ALIVD EXEMPLVM.

$\begin{array}{r} 6 - \text{ra. } 5 \\ 6 - \text{ra. } 5 \\ - \text{ra. } 180 + 5 \\ + 36 - \text{ra. } 180 \\ \hline \text{produ } 41 - \text{ra. } 720 \end{array}$

ALIA DVO EXEMPLA.

$\begin{array}{r} \text{ra. } 12 + 6 \\ 6 + \text{ra. } 12 \\ \hline \text{ra. } 1728 + 48 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{ra. } 12 - 6 \\ 6 - \text{ra. } 12 \\ \hline \text{ra. } 1728 - 48 \end{array}$
---	---

Adhuc

$$4 + \text{ra. } 7$$

$$\underline{4 - \text{ra. } 7}$$

$$\text{produ. } 9$$

$$\text{ra. } 12 + 6$$

$$\underline{6 - \text{ra. } 12}$$

$$\text{produ. } 24.$$

DIVISIO. CAP. V.



N diuisione binomiorum & residuorum, cum diuisor aut numerus absolutus, aut denominatus, aut binomium seu residuum esse possit, ad diuisionem commodius absoluendam, distinctione quadam opus erit. Diuisor itaq; si numerus absolutus uel denominatus fuerit, in eum singuli ipsius diuidendi numeri, ut dictum est, diuidantur, etenim exeuntibus deinde cum suis signis simul collectis, diuisio perfecta erit. Quod si fuerit binomium, seu residuum: tunc tam diuisor, quam etiam diuidendus, per diuisoris contrarium nomen, hoc est per residuum, si binomium ipse fuerit: uel per binomium, si residuum fuerit, multiplicari debet: nam productis deinde (cum hac ex 17 propositione Euclidis lib. septimi, eandem quam ipsi multiplicati, hoc est, diuidendus & diuisor propositi, rationem custodiant) illo scilicet quem diuidendus dederit in alterum, diuisis, diuisio perfecta erit.

EXEMPLA PARTIS PRIORIS.

$$\begin{array}{r} 8 + \text{ra. } 20 \quad \text{in } 2 \\ \hline \text{exeunt } 4 + \text{ra. } 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Item} \quad \text{ra. } 24 - 8 \quad \text{in } 3 \\ \hline \text{exit ra. } 2\frac{2}{3} - 2\frac{2}{3} \end{array}$$

ALIA PRIORIS PARTIS EXEMPLA.

$$\begin{array}{r} 8 + \text{ra. } 20 \quad \text{in ra. } 5 \\ \hline \text{exit ra. } 12\frac{4}{5} + 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Item} \quad \text{ra. } 24 - 8 \quad \text{in } \sqrt{6} \\ \hline \text{exeunt } 2 - \text{ra. } 10\frac{2}{3} \end{array}$$

EXEMPLVM PARTIS POSTERIORIS.

$$\text{Diuidatur ra. } 72 + \text{ra. } 32 \quad \text{in } \sqrt{10} + \sqrt{8}$$

Multiplicetur igitur uterq; numerus per $\sqrt{10} - \sqrt{8}$, diuisoris residuum, contrarium scilicet nomen, & producuntur ra. 2000 — 40, diuidendus. 2 uero, numerus diuisor, diuisione deinde facta, erit exiens ra. 500 — 20, quod quidem multiplicatione eius cum diuisore primo posito, ut sequitur, probari poterit.

$$\text{ra. } 500 - 20$$

$$\text{ra. } 10 + \text{ra. } 8$$

$$+ \text{ra. } 4000 - \text{ra. } 3200$$

$$\text{ra. } 5000 - \text{ra. } 4000$$

produ. ra. 5000 — ra. 3200, atq; tantus est etiam diuidendus primo positus, ra. 72 + ra. 32, id quod subtractione tandem & additione patebit.

SEQVVTVR ALIA EXEMPLA.

Diuidantur 9 in residuum 4 — ra. 7, uel in binomium 4 + ra. 7

Exeunt hic quidem 4 — ra. 7, illic uero 4 + ra. 7.

Diuidatur binomium 23 + ra. 448 in 4 + ra. 7

Exeunt 4 + ra. 7.

Quaritur

Quæritur autem huius diuisionis diuidendus numerus sic,

$$\begin{array}{r}
 \text{Multiplicentur} \\
 23 + \sqrt{448} \\
 \text{cum } 4 - \sqrt{7} \\
 \hline
 92 - \sqrt{3136} \\
 - \sqrt{3703} \\
 + \sqrt{7168} \\
 \hline
 \text{produ. } 36 + \sqrt{567} \\
 \text{diuidendus}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Subtrahatur} \\
 \sqrt{3703} \text{ de } \sqrt{7168} \\
 \hline
 7 \quad 529 \quad 1024 \\
 \quad 23 \quad \quad 32 \\
 \quad \quad 9 \text{ in se} \\
 \quad \quad \quad 81 \\
 \hline
 \quad \quad 7 \\
 \sqrt{567}. \text{ Cætera} \\
 \text{nunc sunt facilia.}
 \end{array}$$

Diuidantur $48 + \text{ra. } 432 + \text{ra. } 384 + \text{ra. } 72$, in binomium $8 + \text{ra. } 12$.
 exeunt $6 + \text{ra. } 6$, id quòd multiplicatione diuiso-
 ris cum exeunte probari potest.

Diuidatur $\text{ra. } 448 + \text{ra. } 336$ in $\text{ra. } \text{ra. } 252 + \text{ra. } \text{ra. } 28$.
 Exit $\text{ra. } \text{ra. } 252 + \text{ra. } \text{ra. } 28$.

DE EO QUOMODO DISCREPANTIA


BINOMIORVM ET RESIDVORVM COGNO-
 scatur, quomodo deinde ex eis radices quadratae elici
 debeant. Caput 6.

Quid sit Binomium in genere, quid item Residuum, ab initio huius Algo-
 rithmi dictum est. Et quia sex sunt tantum binomiorum uarie-
 tates seu species, quæ sit cuiuscq; propria definitio, nunc
 subiungere uilum est.

G


Est

EST IGITUR BINOMIVM, SEV EX BINIS NOMINIBVS
 Prima, secunda, tertia, quarta, quinta vel sexta,
 irrationalis quadam, ex duabus rationalibus, potentia tantum commensurabilibus composita, recta linea, qua-
 rum longior breuiori maius potest in quadrato linea, longiori longitu.



Et tantum eundem de binomiorum definitionibus.

Residuum seve apotome Residua porro per apherein eodem modo se habent, quare



Ex his nunc patet, tam binomia quam etiam residua, licet aliquid commune habeant, nimirum quod omnia in genere irrationales sint lineae, duas item rationales, potentia tantum commensurabiles, rectas lineas ad earum constitutionem requirant, in triplici esse differentia, quarum prima quidem est. Quod licet in omnibus binomijs, longioris portionis quadratum, quadrato brevioris portionis maius sit, tamen in prioribus tribus, primo scilicet secundo & tertio, binomijs, quadratum longioris brevioris portionis quadrato maius est, in quadrato lineae, longiori longitudine commensurabili: in posterioribus uero, maius est in quadrato lineae, longiori longitudine incommensurabili. ut, $12 + ra. 23$, $ra. 45 + 5$ & $ra. 20 + ra. 15$. Item $12 + ra. 24$, $ra. 45 + 6$ & $ra. 20 + ra. 14$.

Secunda uero, quod binomium primum & quartum, longiorem portionem rationalem, breviorem uero irrationalem: & contra, binomium secundum & quintum, breviorem rationalem, longiorem uero irrationalem habeant. ut, $18 + ra. 35$, est binomium primum, $18 + ra. 38$, quartum. Sic $ra. 48 + 6$, secundum, sed $ra. 48 + 5$, quintum. Ad tertiam deinde, quod binomium tertium & sextum, neutram portionem rationalem, sed utramque irrationalem habeant. ut $ra. 60 + ra. 45$, quod est tertium, at, $ra. 60 + ra. 35$, sextum binomium est. Atque secundum has differentias nunc facile erit cuius, quaecumque binomium propositum fuerit, cuiusnam ordinis binomium sit, indicare.

ET QVIA IAM VNVMQVODQVE BINOMIVM, PER CONSEQVENS ETIAM VNVMQVOD, que residuum, cuiusnam ordinis binomium uel residuum sit, intelligi potest, ad alterum huius capituli punctum, quomodo scilicet ex eis radices quadratae elici debeant, accedendum erit.



Vod omne binomium possit esse radix quadrata alterius cuiusdam binomij, ex eo perspicui potest, quod alias in absolutis numeris accidere consuevit, multiplicatione scilicet sui in se. Quod item contra, omne binomium sit quadratum, seu radicem quadratam habeat, cum Euclides in senario decimilibrum quarto, cuius initium est propositio 54: finis uero 59, singulorum binomiorum radicibus propria nomina imponat, nisi haec inueniri possent, inepte fecisset, si rebus, quae non sunt, nomina & appellationes imposuisset. Ex hoc igitur quarto decimi Euclidis senario, commode & uere inferatur, omnia binomia quadrata esse, atque sic etiam radices quadratas habere, licet de numero absoluto illud idem non concedatur. Dicit autem Euclides in prima huius senarii propositione, quod Areolam, hoc est, spaciū sub rationali, atque ex binis nominibus prima comprehensum, potens, Irrationale sit, Ex binis item nominibus linea una uocetur. Vnde nunc, cum rationale id Unitas etiam esse possit, unitas insuper in quemcumque numerum, uel quantitatem ducta, eandem producat: rectam lineam, ex binis nominibus primam potentem, hoc est, primi binomij tragonicum latus, binomium esse, facile colligitur. Eodem modo ex sequentibus huius senarii propositionibus ordine habetur. Secundi binomij radicem quadratam, esse lineam irrationalem, atque Ex binis medijs primam, Tertij: lineam irrationalem, atque Ex binis medijs secundam, Quartij: lineam irrationalem, atque Maiorem, Quintij uero: lineam irrationalem, atque Rationale & medium potentem. Sextij deinde: lineam irrationalem, atque Duo media potentem. Haec ille. Et quia iam satis constat, singula binomia radices quadratas habere, haec quomodo nunc ex singulis elici debeant, per canonem quendam generalem tradetur.

PRO ELICIENDIS BINOMIORVM RADICI

bus quadratis, canon quidam generalis.

Binomio proposito, subtrahatur minoris quadratum de quadrato nominis maioris, atq; in residui quarta parte, ubi radix quadrata quaesita ac inuenta fuerit, ea medietati maioris nominis adijciatur: & erit eius quod inde colligetur radix quadrata, una inueniendae radiceis portio. Porro si collectum hoc, de toto maiori nomine subtrahatur, tum radix residui quadrata, alteram portionem ostendet. Vtrisque igitur portionibus per signum + copulatis, tota binomij propositi radix quadrata, sese exhibebit.

SEQVNTVR NVNC PRO SINGVLIS BINOMIJS singula exempla.

	23 +	ra. 448 binomium primum,		
	529	maioris nominis quadratum,		
	448	minoris nominis quadratum,		
	81	reliquum,	$\frac{81}{4}$	residui quarta pars
	$4\frac{1}{2}$	quarta partis radix,	ad $11\frac{1}{2}$	medietatem maioris,
ueniunt	16,	collectum: 4 deinde collecti radix, &		una inueniendae radiceis portio,
	23	totum maius nomen,		
	16	collectum,		
	7	reliquum: ra. 7 deinde,		
		residui radix, & altera inueniendae radiceis portio.		

Tota igitur binomij propositi radix quadrata,
4 + ra. 7, quae erat inuenienda.

Est autem, ut habet propositio huius iam commemorati senarij prima, linea irrationalis, & Ex binis nominibus una. Quod porro sit vera binomij radix, id multiplicatione sui in se probari potest.

ALIA DVO EXEMPLA, DE BINOMIO

secundo,	tertio,
ra. 448 + 14	ra. 448 + ra. 336
443	448
196	336
252	112
63	28
ra. 63 ad ra. 112, ueniunt	ra. 28 ad ra. 112, ueniunt
ra. 343, de ra. 448, ma. ra. 7	ra. 252 de ra. 448, ma. ra. 28
ergo $\sqrt{343} + \sqrt{7}$	ergo $\sqrt{252} + \sqrt{28}$
radix quadrata est binomij propositi.	

Linea ite irrationalis, & respectu quidem binomij secundi, Ex binis medijs prima, ut habet propositio secunda. Consideratione uero binomij tertij, linea irrationalis, & Ex binis medijs secunda, ut habet propositio tertia. Quod porro uere binomiorum radices quadratae inuentae sint, id multiplicatione, ut sequitur, examinari potest.

EXAMEN

binomij secundi,	binomij tertij,
ra. ra. 343 + ra. ra. 7	$\sqrt{252} + \sqrt{28}$
ra. ra. 343 + ra. ra. 7	$\sqrt{252} + \sqrt{28}$
ra. 343 + ra. 7	$\sqrt{252} + \sqrt{28}$
ra. ra. 2401 uel 7	$\sqrt{7056}$
ra. ra. 2401 uel 7	$\sqrt{7056}$
Summa productorum.	
ra. 448 + 14	$\sqrt{448} + \sqrt{336}$
binomia	proposita

Aliud

ALIVD EXEMPLVM DE BINOMIO QVARTO.

24	+	ra. 448
<hr/>		
576	maioris nominis quadratum,	
448	minoris nominis quadratum,	
<hr/>		
12	Residuum,	
32	residui quarta pars,	

ra. 32, quartæ partis radix, ad 12, medietatem maioris, colliguntur
 12 + ra. 32, cuius radix quadrata, Radix binomij 12 + ra. 32, una & cæ. portio.

24	Totum maius nomen,	
12	+	ra. 32, id quod collectum est,
<hr/>		
manēt 12	-	ra. 32, cuius radix quadrata, quæ est, Radix
residui 12	-	√ 32, portio altera.

Tota igitur binomij propositi radix quadrata est, Radix utriusq;
 tam scilicet binomij 12 + √ 32, quàm etiam residui 12 - √ 32

Est autem linea irrationalis, & Maior uocatur, ut dicit propositio huius senarij
 quarta. Quòd porrò sit uera propositi binomij radix, multiplicatione, ut sequi-
 tur, probari potest.

Radix binomij	12 + √ 32,	et	radix resi. 12 - √ 32	
Radix binomij	12 + √ 32,	et	radix resi. 12 - √ 32	
<hr/>		+	<hr/>	
12 + √ 32,			12 - √ 32	
		ra.	112	
		ra.	112	

Summa productorū 24 + ra. 448, binomium scilicet propositum, bene igitur.

ALIA DVO EXEMPLA DE BINOMIO

quinto,

ra. 448	+	12
<hr/>		
448	ma. nominis qua.	
144	mi. nominis qua.	
<hr/>		
304		
76		
<hr/>		
ra. 76	ad ra. 112,	
colligitur ra. 112 + ra. 76.		

sexto,

ra. 448	+	ra. 352
<hr/>		
448	ma. no. quadratum	
352	mi. no. quadratum	
<hr/>		
96		
24		
<hr/>		
ra. 24	ad ra. 112,	
colligitur ra. 112 + ra. 24.		

Huius nunc radix quadrata, nimirum radix bino-
 mij ra. 112 + ra. 76, una portio.

mij ra. 112 + ra. 24
 una portio

ra. 448	Totum ma. no.
ra. 112	+ ra. 76. Id quod col.
ma. ra. 112	- ra. 76.

ra. 448	Totum & cæ.
ra. 112	+ ra. 24 Id
ma. ra. 112	- ra. 24.

Huius nunc radix quadrata, nimirum Radix re-
 sidui ra. 112 - ra. 76.
 pars altera.

sidui ra. 112 - ra. 24
 pars altera.

Binomij igitur propositi radix est

Radix utriusq;
 binomij scilicet √ 112 + √ 76
 & residui √ 112 - √ 76

Radix utriusq;
 bino. scilicet √ 112 + √ 24
 & residui √ 112 - √ 24

Est autem linea irrationalis, & uocatur
 Rationale mediumq; potens, Duo media potens,
 ut quidem dicit propositio huius senarij
 quinta sexta

$$\begin{array}{r}
 \text{Radix binomij } \sqrt{112} + \sqrt{76} \quad \text{et ra. residui } \sqrt{112} - \sqrt{76} \\
 \text{Radix binomij } \sqrt{112} + \sqrt{76} \quad \text{et ra. residui } \sqrt{112} - \sqrt{76} \\
 \hline
 \sqrt{112} + \sqrt{76} \quad \& \quad \sqrt{112} - \sqrt{76} \\
 \quad \quad \quad + 6 \\
 \quad \quad \quad + 6
 \end{array}$$

Summa productorum ra. 448 + 12, & bene.

$$\begin{array}{r}
 \text{Radix binomij } \sqrt{112} + \sqrt{24} \quad \text{et ra. residui } \sqrt{112} - \sqrt{24} \\
 \text{Radix binomij } \sqrt{112} + \sqrt{24} \quad \text{et ra. residui } \sqrt{112} - \sqrt{24} \\
 \hline
 \sqrt{112} + \sqrt{24} \quad \& \quad \sqrt{112} - \sqrt{24} \\
 \quad \quad \quad \text{ra. } 8 \\
 \quad \quad \quad \text{ra. } 88
 \end{array}$$

Summa productorum ra. 448 + ra. 352 &, bene.

Et hec quidem de binomiorum radicibus inueniendis dicta sufficiant. Simili modo iam agendum est cum Residuis, cum & ipsa quadrata esse, atq; ita radices quadratas habere, ex propositione 91, & ordine sequentibus quinque eiusdem decimi Euclidis manifeste pateat. Quare pro ijs eodem modo operatione instituta.

Primi residui, quod est $23 - \text{ra. } 448$, radix quadrata inuenitur esse, $4 - \text{ra. } 7$. Est autem & ipsa Residuum, & irrationalis linea, ut habet propositio huius senarij prima. Secundi uero, quod est $\text{ra. } 448 - 14$, radix quadrata inuenitur, $\text{ra. } 343 - \text{ra. } 7$. Quæ est linea irrationalis, & Mediæ residua prima, ex propositione 92. Tertij autem, quod est $\text{ra. } 448 - \text{ra. } 336$, radix quadrata inuenitur, $\text{ra. } 252 - \text{ra. } 28$, quæ est linea irrationalis & Mediæ residua secunda, ex propositione 93. Quartij deinde, quod est $24 - \text{ra. } 448$ radix quadrata inuenitur, Radix binomij $12 + \text{ra. } 32$, minus, radix residui $12 - \text{ra. } 32$. quæ est linea irrationalis, & Minor uocata, ex propositione 94. Quintij ite, quod est $\text{ra. } 448 - 12$, radix quadrata inuenitur, Radix binomij $\text{ra. } 112 + \text{ra. } 76$, minus radix residui $\text{ra. } 112 - \text{ra. } 76$. quæ est linea irrationalis, & Cum rationali medium totum conficiens linea, ex propositione 95. Sextij tandem, quod est $\text{ra. } 448 - \text{ra. } 352$, radix quadrata inuenitur, Radix binomij $\text{ra. } 112 + \text{ra. } 24$ minus radix residui $\text{ra. } 112 - \text{ra. } 24$. quæ est linea irrationalis, & Cum medio mediũ totum conficiens linea, ex propositione huius senarij ultima 96.

Et licet satis iam superque, quomodo ex binomijs, residuis item, radices quadratæ inueniri debeant, traditum sit, ne quid tamen huius artis studiosi habeant, quod conquerantur unius atq; alterius exempli praxim, pro utroq; subiungere placuit. Sit itaq; propositum inuenire radicem quadratam.

ex binomio	ex residuo
$ \begin{array}{r} 72 - \sqrt{2880} \\ \hline 5185 \\ 2880 \\ \hline 2304 \\ 576 \\ 24 \quad \text{ad } 36 \\ \hline \text{ueniunt } 60 \text{ de } 72 \\ \text{manent } 12 \\ \text{ergo } \sqrt{60} + (\text{quia bino.}) \\ \sqrt{12}, \text{ propositi binomij} \\ \text{radix quadrata erit.} \end{array} $	$ \begin{array}{r} 72 + \sqrt{2880} \\ \hline 5188 \\ 2880 \\ \hline 2304 \\ 576 \\ 24 \quad \text{ad } 36 \\ \hline \text{ueniunt } 60 \text{ de } 72 \\ \text{manent } 12 \\ \text{ergo } \sqrt{60} - (\text{quia resi.}) \\ \sqrt{12}, \text{ propositi residui} \end{array} $

SIT NUNC PROPOSITUM HARUM INVENTARUM radicum, ut quæ sunt binomium & residuum sextum, radices quadratas inuenire.

ra. 60 + ra. 12	ra. 60 — ra. 12
60	60
12	12
48	48
12	12
√ 12 ad √ 15	√ 12 ad √ 15
ueniunt √ 15 + √ 12	ueniunt √ 15 + √ 12
de ra. 60	de ra. 60
ma. √ 15 — √ 12.	ma. √ 15 — √ 12.
Propositi igitur binomij	Propositi igitur residui
radix quadrata est	
Radix utriusq;	Radix bino-
binomij scilicet √ 15 + √ 12	mij √ 15 + √ 12, minus
& residui √ 15 — √ 12.	radix re. √ 15 — √ 12.

SEQVITVR PROBA, INSTITVTA PRO residuo.

radix bi. √ 15 + √ 12	minus	ra. re. √ 15 — √ 12
radix bi. √ 15 + √ 12	minus	ra. re. √ 15 — √ 12
√ 15 + √ 12	plus	√ 15 — √ 12
	minus √ 3	
	minus √ 3	
Summa pro. √ 60 — √ 12 Residuum		
propositum, bene igitur operatum.		

EST PORRO QUIDAM CANON GENERALIS ALIVS, per quem iuxta Algebrae regulas binomiorum & residuorum radices inueniuntur, qui sic se habet.

Binomio uel Residuo aliquo proposito, recipiatur dimidium portionis, uel nominis minoris, maiore deinde portione iuxta Algebrae regulas in duas partes sic diuisa, ut harum multiplicatio, unius scilicet cum altera tantum, quantum nimirum quadratum medietatis minoris fuerit, producat, res perfecta erit, cum tandem binomij uel residui propositi radix, per harum partium radices simul collectas, ratione binomij: uel una ab altera subtracta, si residuum propositum fuerit, significetur. Hunc autem canonem infra, ubi res & similitudo postulauerint, tractabimus.

Haecenus de radicibus, binomiorum & residuorum inueniendis. Ne quis autem terreatur, quod in hac tractatione decimi libri Euclidis subinde mentionem facimus, cum uidelicet illa sine decimi libri cognitione intelligi nequeant, ac prius cognosci librum hunc oporteat, quam harum explicatio regularum suscipiatur. Quod ipsum sane uerum esset, si perfectam & integram horum quis cognitionem requireret, sed tantum de eis intelligere, ut quæ iam sequuntur, planiora sint, etiam si nullas plane adduxissemus propositiones, res satis descripta esset. Quare eas hanc ob causam solum propositas a nobis esse existimet quispiam, ut nimirum earum operationes certis rationibus fundari persuasum sibi haberet: ansam deinde etiam, his nunc perceptis, arriperet, subtilius ista exquirendi, cum iam sint aliquo modo descripta, & quodammodo primis lineamentis adumbrata,

Sequuntur

SEQVNTVR NVNC AD AEQVA
TIONES SVpra TRADITAS, AD EA ETIAM
quæ hætenus de surdis expoſita ſunt, commodius exercenda,
exempla alia.


Primum. Eſto triangulum reſtangulum, atq; cathetus eius $8 - \sqrt{32}$
bafis uerò & hypotenuſa ſimul, $16 - \sqrt{128}$, quanta erit utraq; bafis ſcili-
cet & hypotenuſa, linea ſeorſim, queritur. Facit

$$\begin{array}{r} \text{Bafis quidem} \quad 6 - \sqrt{18} \\ \text{Hypotenuſa uerò} \quad 10 - \sqrt{50} \end{array}$$

OPERATIO.

$$\begin{array}{r} \text{Cathetus ex hypoteſi, ſunt} \quad 8 - \sqrt{32} \\ \text{ſit autem nunc bafis} \quad 1 \text{ ra.} \\ \text{Hypotenuſa igitur, erunt} \quad 16 - \sqrt{128} \text{ N minus } 1 \text{ ra.} \end{array}$$

Et quia quadratum hypotenuſæ in triangulo reſtan-
gulo, ex propoſitione 47 primi, quadratis catheti & ba-
ſis linearum æquale eſt. Singularum igitur linearum qua-
dratis acceptis, de eo etiam quod ab hypotenuſa deſcri-
bitur, catheti uel bafis, utro uoles, quadrato, ſubtracto, id
quod relinquitur, ex communi illa notitia, ſi ab æquali-
bus æqualia ſubtrahantur, &cæ. alterius, bafis quidem,
ubi catheti, catheti uerò, ubi bafis quadratum ſubtra-
ctum fuerit, quadrato æquale erit.

SEQVITVR NVNC DICTORVM
calculus.

$$\begin{array}{r} 8 - \sqrt{32} \text{ N Cathetus} \quad 1 \text{ radix Bafis} \\ 8 - \sqrt{32} \quad 1 \text{ ra.} \\ \hline 96 - \sqrt{8192} \text{ quadratum} \quad 1 \text{ pri. quadratum} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 - \sqrt{128} \text{ N minus } 1 \text{ ra. Hypotenuſa,} \\ 16 - \sqrt{128} \text{ N minus } 1 \text{ ra.} \\ \hline 256 + 128 \text{ N plus } 1 \text{ pri,} \\ - \sqrt{32768} \text{ N bis} \\ \text{minus } 16 - \sqrt{128} \text{ radi. bis} \end{array}$$

$384 - \sqrt{131072} \text{ N, plus } 1 \text{ pri. minus } 32 - \sqrt{512} \text{ ra.}$
quadratum hypotenuſæ. A quo primò quadratum catheti, deinde etiam qua-
dratum bafis ſubtrahendum eſt, & relinquuntur tandem,
ratione quidem ſubtractionis prioris,

$$288 - \sqrt{73728} \text{ N plus } 1 \text{ pri. minus } 32 - \sqrt{512} \text{ ra.}$$

æquales uniprimæ,

ratione uerò ſubtractionis poſterioris,

$$384 - \sqrt{131072} \text{ N minus } 32 - \sqrt{512} \text{ ra.}$$

æquales $96 - \sqrt{8192} \text{ N}$

Et

Et ultimo, iuxta illam communem notitiam, Si æqualibus æqualia adiciantur, &cæ. Si item ab æqualibus æqualia subtrahantur &cæ. ueniunt.

$$288 - \sqrt{73728} \text{ N } \text{æqua.} \quad 52 - \sqrt{512} \text{ ra.}$$

Est prima æquatio. Diuisione igitur numeri quantitatis debilioris in numerum quantitatis potentioris, radicis ualor cognoscendus: per eum deinde, Basis quantitas exprimenda est.

Quoniam autem huius diuisionis diuidens quantitas est residuum, per suum igitur binomium, quod est $32 + \sqrt{512}$, alia diuidenda, alia item quantitas diuidens, multiplicatione, inuenienda est, ut sequitur.

$\begin{array}{r} 288 - \sqrt{73728} \\ \text{cum } 32 + \sqrt{512} \\ \hline 9216 - \sqrt{6144} \\ - \sqrt{73728} \\ + \sqrt{41472} \\ \hline 3072 - \sqrt{4608} \end{array}$	$\begin{array}{r} 32 - \sqrt{512} \\ \text{cum } 32 + \sqrt{512} \\ \hline 1024 - 512 \end{array}$
<p>Quantitas diuidenda</p>	<p>hoc est, 512 diuidens</p>

millies
uicies
quater

INSTITVATUR NUNC DIVISIO.

	4		4				
	0		224				
Diuidantur	3072	-	$\sqrt{4608}$	millies uicies &cæ.			
exeunt	6	+	$\sqrt{18}$,	& tanta est basis quantitas.			
in	512		522,	quingages deci-			
	256			es bis.			

Et quia iam basis quantitas nota est, quanta hypotenusæ sola fuerit, cum hæ duæ quantitates simul, ex hypothesi, $16 - \sqrt{128}$ sint, subtractione manifestabitur

ALIUD EXEMPLVM simile.

Triangulũ esto rectangulum, atq; cathetus eius $8 + \sqrt{128}$, basis uerò & hypotenusæ simul, $16 + \sqrt{512}$, quanta erit utraq; basis scilicet & hypotenusæ, linea seorsim, queritur. Facit

Basis quidem	$6 + \sqrt{72}$
Hypote, uerò	$10 + \sqrt{200}$


OPERATIO.

Cathetus, ex hypothesi sunt	$8 + \sqrt{128}$
Sit autem nunc basis	1 radix
Hypotenusæ igitur erunt	$16 + \sqrt{512}$ minus 1 ra.
Multiplicatione querantur quadrata laterum, & erunt	
Catheti quidem	$192 + \sqrt{32768}$
Basis uerò	1 pri.

ac hypotenusæ deinde,

$$768 + \sqrt{524288} \text{ N, plus 1 pri. minus } 32 - \sqrt{2048}$$

Quare



Quare, iuxta penultimam propositionem primi,

$$768 + \sqrt{524288} N, \text{ plus } 1 \text{ pri. minus } 32 - \sqrt{2048}$$

$$\text{æquales } 192 + \sqrt{32768} N. + 1 \text{ pri.}$$

Atq; ultimò tandem, iuxta communes notitias additione & subtractione facta, ueniunt

$$576 + \sqrt{294912} N \text{ æqua. } 32 + \sqrt{2048} \text{ ra.}$$

Est autem prima æquatio. Numerus igitur characteris N, tanquam debilioris, in numerum characteris potentioris, ra. diuidendus est, ut sequitur.

Quæratù primò nouus diuidendus, nouus item diuisor, per multiplicationem utriusq; cum diuisoris contrario nomine, residuo nimirum $\sqrt{2048} - 32$,

$\begin{array}{r} \sqrt{294912} + 576 \\ \text{cum } \sqrt{2048} - 32 \\ \hline 24576 - 18432 \\ - \sqrt{301989888} \\ + \sqrt{679477248} \\ \hline 6144 + \sqrt{75497472} \\ \text{Diuidendus} \end{array}$	$\begin{array}{r} \sqrt{2048} + 32 \\ \text{cum } \sqrt{2048} - 32 \\ \hline 2048 - 1024 \\ \hline \text{hoc est} \\ \hline 1024 \\ \text{Diuisor.} \end{array}$
--	--

$$\begin{array}{r} + \sqrt{75497472} \\ \hline 6 + \sqrt{72} \text{ basis. } \text{Quæ si a.} \\ \hline 1024 \end{array}$$

basis & hypotenusæ aggregato subtrahatur, relinquuntur 10 + $\sqrt{200}$, hypotenusæ quantitas, ut supra.

Calculus porrò subtractionis præcedentis sic instituatùr.

	$\sqrt{301989888}$	de	$\sqrt{679477248}$
8	37748736		8493466
4	9437184		21233664
	3072	de	4608
	manent 1536	in se	
	produ. 2359296		
	communis nu. 32		
	<u>75497472</u>		

Porrò triangulorum areae sunt, prioris quidem $36 - \sqrt{1152}$, posterioris uerò $72 + \sqrt{4608}$. Id quod ex propositione 41 primi, & canone quodam generali, in eodem primo libro exposito, facile colligetur.

OPERATIO TRIANGVLI PRIORIS per canonem.

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Latera</th> <th></th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>$-\sqrt{50}$</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>$-\sqrt{32}$</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>$-\sqrt{18}$</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>$-\sqrt{288}$</td> </tr> </table>	Latera		10	$-\sqrt{50}$	8	$-\sqrt{32}$	6	$-\sqrt{18}$	24	$-\sqrt{288}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Excessus</th> <th></th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$-\sqrt{2}$</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>$-\sqrt{8}$</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>$-\sqrt{18}$</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>$-\sqrt{72}$</td> </tr> </table>	Excessus		2	$-\sqrt{2}$	4	$-\sqrt{8}$	6	$-\sqrt{18}$	12	$-\sqrt{72}$
Latera																					
10	$-\sqrt{50}$																				
8	$-\sqrt{32}$																				
6	$-\sqrt{18}$																				
24	$-\sqrt{288}$																				
Excessus																					
2	$-\sqrt{2}$																				
4	$-\sqrt{8}$																				
6	$-\sqrt{18}$																				
12	$-\sqrt{72}$																				
<p>12 $-\sqrt{128}$ primum,</p> <p>2448 $-\sqrt{5971968}$</p>	<p>Medietas</p> <p>108 $-\sqrt{10368}$ secundum,</p> <p>tertium productum,</p>																				

Huius igitur radice ut sequitur quaesita,

	<u>2448</u>	—	$\sqrt{5971968}$	
	5992704		maioris quadratum,	
	<u>5971968</u>		minoris quadratum,	
	20736		residuum,	
	5184		residui quarta pars,	
	72		quartae partis radix, ad 1224,	
ueniunt	1296,		unius portionis quadratum, de 2448	
manent	1152,		alterius portionis quadratum,	

Radix igitur, ac per consequens trianguli propositi
area, $36 - \sqrt{1152}$

OPERATIO TRIANGULI ALTERIVS.

Latera	Excessus
$10 + \sqrt{200}$	$2 + \sqrt{8}$
$8 + \sqrt{128}$	$4 + \sqrt{32}$
$6 + \sqrt{72}$	$6 + \sqrt{72}$
<u>$24 + \sqrt{1152}$</u>	Medietas $12 + \sqrt{288}$

24 + $\sqrt{512}$ primum 216 + $\sqrt{41472}$ secundum
Porro $9792 + \sqrt{95551488}$, tertium productum. Atque area deinde trian-
guli $72 + \sqrt{4608}$, id quod sequenti calcu-
lo manifestabitur.

<u>9792</u>	+	$\sqrt{95551488}$	
95883264	maioris	95551488	minoris quadratum,
331776	residuum,	82944	residui quarta pars,
288	quartae partis radix,	ad 4896,	
ueniunt 5184	unius portionis, &cæ.	de 9792,	
manent 4608,	alterius portionis quadratum,	quare	
$72 + \sqrt{4608}$	radix binomij, &cæ.		

EXEMPLVM SECVNDVM.

Sunt 12 diuisa in duas partes. Quoniam autem partium multiplicatio,
unius quidem cum altera, 20 uel 28 producit, quanta erit utraq; pars?

		minor		maior
Facit quantum ad	{	2		10
			sunt	
	}	$6 - ra. 8,$		$6 + ra. 8$
		28		

Tertium. Sunt 12 diuisa in partes duas. Quoniam autem partium qua-
drata simul 90 uel 100 faciunt, partes igitur quantae sunt?

Respondetur respectu

		minor		maior
quidem	90	3		9
			sunt	
uerò	100	$6 - \sqrt{14},$		$6 + \sqrt{14}$
		H 2		Sequitur

BREVIS REGVLARVM
SEQVITVR OPERATIONIS EXAMEN.

Sumantur numeri secundò inuenti,

$$\begin{array}{r} 6 - \sqrt{14} \text{ minor} \\ 6 - \sqrt{14} \\ \hline 36 + 14 \\ \hline 100. \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 + \sqrt{14} \text{ maior} \\ 6 + \sqrt{14} \\ \hline 36 + 14 \\ \hline \end{array} \quad \& \text{ bene.}$$

Quartum. Numerus in duo diuisus est, quoniam autem partium differentia sunt 6, qui uerò ex multiplicatione unius cum altera producitur numerus, 27 uel 36, quantus sit ipse diuisus, quantę deinde etiam partes, quaeritur.

Facit

diuisus quidem 12 uel ra. 180

Partes deinde, respectu

	minor	maior
quidem 27	3	9
uerò 36	ra. 45 — 3	ra. 45 + 3

Vel, qui uerò ex partium quadratis colligitur numerus, 50 sunt, uel 72, quantus & cę.

Facit diuisus quidem 8 uel ra. 108

Partes uerò, respectu.

	minor	maior
quidem 50	1	7
uerò 72	ra. 27 — 3	ra. 27 + 3

OPERATIO PARTIS PRIORIS, QVANTVM
ad multiplicationem partium,

ponatur	1 ra.	totus diuisus.
Et quia	6 N,	partium differentia, ex hypothesi,
erit	$\frac{1}{2}$ ra. — 3 N	minor,
&	$\frac{1}{2}$ ra. + 3 N	maior pars.

Quare quantum ad multiplicationem, uenit

$\frac{1}{4}$ pri. — 9 N æqual. 27 uel 36 N.

Quantum uerò ad partium quadrata, uenit

$\frac{1}{2}$ pri. + 18 N æqual. 50 uel 72 N.

ALITER INSTITVTA HVIVS EXEM.
pli operatio.

Quaerantur primò partes, deinde etiam ipse totus numerus.

Sit itaque

1 ra. maior,	uel	1 ra. minor,
1 ra. — 6 N pars minor,		1 ra. + 6 N maior,

uenit

uenit, multiplicatione facta,

ratione quidem	{	productorum,	1 pri. — 6 ra.	æqual. 27, uel 36 N.
			1 pri. + 6 ra.	
		quadratorum uerò,	1 pri. æqua. 6 ra. + 7 N,	uel + 18 N.
			1 pri. + 6 ra.	æqual. 7, uel 18 N.

EXEMPLVM QVINTVM.

Sunt 12, uel 19 diuisa in duas partes.

Quoniam autem una parte cum altera multiplicata, producto deinde in partium differentiam diuiso: $17\frac{1}{2}$ exeunt, quantę partes sint, queritur.

	maior	minor pars.
Facit	7	5
	ra. $396\frac{1}{2} - 8$	27 — ra. $396\frac{1}{2}$

Vel, Quoniam autem partium quadrata simul iuncta, atq; id quod colligitur, in partium differentiam diuisum: 37 exeunt, quantę partes sint queritur.

	maior	minor pars
Facit	7	5
	28 — ra. 252,	ra. 252 — 9

OPERATIO PARTIS PRIORIS.

1 ra.	Maior,	uel	1 ra.	Minor,
$\frac{12 N - 1 ra.}{12 ra. - 1 pri.}$	minor.		$\frac{12 N - 1 ra.}{12 ra. - 1 pri.}$	maior.
$\frac{2 ra. - 12 N}{12 N - 2 ra.}$	productum,		$\frac{12 N - 2 ra.}{12 N - 2 ra.}$	differentia.

AEQVATIO IGITVR

$\frac{12 ra. - 1 pri.}{2 ra. - 12 N}$	æqua.	$17\frac{1}{2} N$	$\frac{12 ra. - 1 pri.}{12 N - 2 ra.}$	æqua.	$17\frac{1}{2} N$
--	-------	-------------------	--	-------	-------------------

SIC ETIAM INSTITVATVR OPERATIO cum numero 19, & uenit

1 pri. + 16 ra.	1 pri. + $332\frac{1}{2} N$
æquales $332\frac{1}{2} N$	æquales 54 ra.

Posterioris partis operatio ex priore nunc est facilis.

EXEMPLVM SEXTVM.

Sunt tres numeri, quorum primus cum aliquo alio, quarto scilicet, ad reliquos duos simul sumptos, sit $\frac{2}{3}$. Secundus uerò cum eodem quarto, ad reliquos, sit in ratione $\frac{3}{5}$. Ac tertius deinde, & ipse cum eodem quarto numero, reliquis duobus æqualis sit. cum sic ille quartus numerus, ex hypothesi, 8 esse ponatur, quanti nunc hi tres numeri esse debeant, queritur.

	Primus,	secundus,	tertius numerus.	
Facit	24	40	& 56	
			H 3	Operatio

OPERATIO.

Primus secundus & tertius. Quartus alius,
Ponatur 1 radix, & erunt 3 ra. + 24 N, atq; 8.

Et quoniam secundus cum dato, tertij & primi numerorum tres quintæ sunt: tota igitur omnium summa ad eosdem, tertium & primum, numeros, in ratione, ut 8 ad 5, uel octo quintæ erunt. Per regulam ergo proportionum, dicendo 8 dant 5, quid 4 ra. + 32 N: primi & tertij numerorum summa manifestabitur. Quoniam autem primus numerus notus est, cum is sit 1 radix posita, eodem primo de hac summa subtracto: tertius, hoc tertio deinde de tertij & secundi numerorum summa subtracto: secundus etiam numerus manifestabitur. Ponuntur itaq; numeri singuli seorsim sic.

Primus	secundus	tertius	quartus.
1 ra.	$1\frac{1}{2}$ ra. + 4 N	$1\frac{1}{2}$ ra. + 20 N	8

Et quoniam etiam tertius cum quarto numeris primo & secundo æqualis est, tertius igitur quarto, secundus uero numero primo additus, quæ colliguntur,

$1\frac{1}{2}$ ra. + 28 N & $2\frac{1}{2}$ ra. + 4 N

inter se æquales erunt. Radix igitur, hoc est, primus numerus 24, secundus 44, & tertius 56 uenient, quod probari potest.

Septimum. Sunt tres numeri, quorum primus cum aliquo alio, quarto scilicet, ad reliquos duos simul sumptos: sesquialteram, secundus uero cum eodem quarto ad reliquos: ut 3 ad 5. ac tertius deinde, & ipse cum eodem quarto numero: equalitatis rationem constituit, cum ille quartus numerus iuxta propositum 9 uel 24 aut unitas esse ponatur, quanti hi tres numeri esse debeant, queritur.

Facit, quantum ad nume-

			Primus	secundus	tertius
rum	}	9 .	$13\frac{14}{19}$	$5\frac{4}{19}$	$9\frac{8}{19}$
		24 .	$36\frac{12}{19}$	$13\frac{17}{19}$	$26\frac{10}{19}$
		unitatē .	$1\frac{10}{19}$	$0\frac{11}{19}$	$1\frac{2}{19}$

Octauum. Diuidantur 132 in tres partes sic, ut prima multiplicata per 3, producat tres quartas minus 3, secundæ partis diuisæ in 2, Et iterum prima multiplicata per 4, producat tres quintas minus 1, tertię partis diuisæ in 7, queritur, &c.

	prima	secunda	tertia pars
Facit	2	24	105

OPERATIO.

Esto prima pars 1 radix, hæc multiplicata per 3, producuntur 3 ra. Et quoniam hæc ex hypothesi, in ternario minus sunt, quam tres quartæ partis secundæ, diuisæ in duo, hoc est, quam tres quartæ dimidij secundæ partis, ad 3 ra. igitur 3 N addendi, eius deinde quod colligitur, (cum illud tres quartæ tantum sint) integram regulam proportionum, dicendo $\frac{3}{4}$ sunt 3 ra. + 3 N, quid unum, quarendum est. Veniunt autem sic 4 ra. + 4 N, ipsum integrum, ac per consequens, secunda pars in duo diuisa, eodem igitur integro bis sumpto, secunda pars, 8 ra. + 8 N erunt. Non

Non aliter iuxta exempli hypothesen, & tertia pars quaerenda erit. Quo facto, partes erunt.

Prima 1 ra. secunda 8 ra. + 8 N
 Tertia $46\frac{2}{3}$ ra. + $11\frac{2}{3}$ N, Atq;
 ultimò tandem $55\frac{2}{3}$ ra. æqua, $111\frac{1}{3}$ N.

Nonum. Diuidantur 36 in tres partes sic, ut prima multiplicata per 6, producat sesquialterum plus 9, secundę partis diuise in 5. et secunda diuisa in 8, statuat sesquiquartum minus 4, tertię partis multiplicatę per 3, queritur &c.

Facit $3\frac{14}{25}$ $30\frac{56}{25}$ $2\frac{31}{25}$

PONITVR AD OPERATIONEM SIC.

Prima 1 ra.
 secunda 20 ra. — 30 N
 tertia 10 ra. + 1 N

Summa partium $21\frac{2}{3}$ ra — $29\frac{14}{25}$ N ¹⁵ æqua, 36 N.

Eodem modo 45 in tres partes diuisa,

Prima secunda tertia
 exeunt partes $3\frac{149}{25}$ $39\frac{11}{25}$ $2\frac{121}{25}$

Id quod probari potest, ut sequitur.

Prima
 $3\frac{149}{25}$
 cum 6

 $20\frac{244}{25}$
 minus 9

 $11\frac{244}{25}$ Dic
 3 dant $11\frac{244}{25}$, quid 2,
 Facit $25\frac{46}{25}$
 cum 5

 produ. $39\frac{11}{25}$, le-
 cunda

secunda pars
 $39\frac{11}{25}$
 in 8

 $4\frac{233}{250}$
 plus 4

 $8\frac{233}{250}$ Dic
 5 dant $8\frac{233}{250}$, quid 4
 Facit $23\frac{13}{25}$
 in 3

 exeunt $2\frac{121}{25}$, tertia
 pars. bene igitur.

Decimum. Propositum est, numerum 6, 12, 8 uel 21, seu quemcunq; alium numerum, diuidere in duas portiones, quarum maioris quadratum tantum faciat, quantum numerus ipse, cum sua portione minore multiplicatus, producit.

Facit ratione numeri

	Maior	minor portio
6,	ra. 45 — 3	9 — ra. 45
12	ra. 180 — 6	18 — ra. 180
8	ra. 80 — 4	12 — ra. 80
21	ra. $551\frac{1}{4}$ — $10\frac{1}{2}$	$31\frac{1}{2}$ — ra. $551\frac{1}{4}$

Similem

Similem diuisionem lineæ alicuius datæ proponit Euclides in secundo, per undecimam: in sexto deinde, per propositionem 30, quod obiter indicare libuit,

OPERATIO NUMERI VNIVS, 6 SCILICET,
sit instar omnium. Esto itaq;

erunt $6N - 1$ ra. minor, uel $6N - 1$ ra. maior,
 1 ra. maior, 1 ra. minor,

Quadrata deinde portionum maiorum,
 1 pri. $36N - 12$ ra. + 1 pri.

Producta uerò, &cæ.

$36N - 6$ ra. 6 ra.

Atq; tandem æquatio ultima,

1 pri. + 6 ra. æqua. $36N$, uel 1 pri. + $36N$ æqua. 18 ra.

Procedatur nunc secundum canones secundæ æquationis primum
& tertium, & ueniet ut positum

SEQVITVR PROBAINSTITVTA PRO
numero primo 6,

$54 - \sqrt{1620}$

Totus	Maior portio	minor
6	ra. 45 — 3	9 — ra. 45

in se
 $54 - \sqrt{1620}$

PROPONVNTVR HVIVSMODI EXEMPLA
etiam sic.

Diuidantur 24 in duas portiones inæquales, ut, cum maiorem in seipsam, totum uerò numerum 24 cum minore portione multiplicauero, æquales numeri producantur, Facit

Maior	&	Minor portio
ra. 720 — 12		36 — ra. 720

In hunc modum radice numeri 48 diuisa,
exeunt partes, Maior quidem ra. 60 — ra. 12, minor uerò
ra. 108 — ra. 60, quod probari potest.

Vndecimū. Et quia numero in duas portiones diuiso, quarū maioris quadratū tantū faciat, quantū totus diuisus numerus cū minori sua portione multiplicatus producit, quantus fuerit ipse totus numerus, minor item portio, cum maior portio ex hypothesi sit ra. 80 — 4, uel ra. 45 — 3

quæritur. Facit	8 } 6 }	totus	12 — ra. 80	} minor portio,
			9 — ra. 45	

OPERATIO.

Totus	Maior	Minor portio,
$\sqrt{80} - 4$	$\sqrt{80} - 4$	$\sqrt{80} - 4$
1 ra,	quare 1 radix, minus	$\sqrt{45} - 3$
$\sqrt{45} - 3$		$\sqrt{45} - 3$

Atq;

Atq; facta multiplicatione, ueniunt

$$\begin{array}{rcl} 96 - \sqrt{5120} & N, \text{ æqua. } & 1 \text{ pri. minus } \sqrt{80} - 4 \text{ ra.} \\ 54 - \sqrt{1620} & & \sqrt{45} - 3 \end{array}$$

Vel ex communi quadam notitia,

$$\begin{array}{rcl} \sqrt{80} - 4 \text{ ra.} & + & 96 - \sqrt{5120} \\ \sqrt{45} - 3 & & 54 - \sqrt{1620} \end{array} \quad N, \text{ æqua. } 1 \text{ pri.}$$

Est autem exemplum canonis æquationis secundæ secundi, atq; eius solutio talis.

Quantitates æquationis quantum ad primum, sunt

$$\begin{array}{rcl} \text{Media} & & \text{minima} & & \text{maxima quantitas} \\ \sqrt{80} - 4 \text{ ra.} & + & 96 - \sqrt{5120} & N & \text{æqua. } 1 \text{ pri.} \\ \hline & & \sqrt{20} - 2, \text{ in se, } 24 - \sqrt{320}, & \text{plus } 96 - \sqrt{5120} & \\ & & \text{ueniunt } 120 - \sqrt{8000}. & \text{Huius radix} & \\ & & \text{sunt } 10 - \sqrt{20} & & \\ & & \text{plus } \sqrt{20} - \sqrt{2} & \text{\&cæ.} & \end{array}$$

Cum quantitatibus æquationis secundi, eodem modo operatione instituta, æquè etiam feliciter succedet.

EXEMPLVM DVODECIMVM.

Duobus numeris inæqualibus, 34 & 30 datis, propositū est, maiorem in duas portiones ita diuidere, ut inter eas medietas minoris sit medio loco proportionalis, uel, quòd idē est, ut qui sub portionibus, una cum altera multiplicata, continetur numerus, æqualis sit quartæ parti quadrati, numeri minoris,

Facit 25. & 9.

OPERATIO.

Maior	Minor	Medietas minoris
34	30	15
Quantitates ex hypothese proportionales		
1 ra.	15	34 N — 1 ra.
quare 34 ra. — 1 pri.	æqua.	225 N &cæ.

ALIA HVIVS DIVISIONIS EXEMPLA.

Numeri propositi		Medietas minoris	Partes diuisionis	
maior,	minor			
117	108	54	81	36
65	56	28	49	16
49	27	13½	24½ + √418	24½ — √418
30	18	9	27	3
25	24	12	16	9
13	12	6	9	4
5	4	2	4	1
8½	8	4	5½	3
¾	⅔	⅓	⅔ + √(17/36)	⅔ — √(17/36)

Posuimus huius diuisionis exempla plura, cum eorum usus in decimo Euclidis libro requiratur.

I Nunc

NUNC PRO RADICIBVS BINOMIO-

RVM ET RESIDVORVM INVENIENDIS, CVM eadem sit illas eliciendi, quæ est propositæ diuisionis, operatio, unum atq; alterum exemplum subiiciemus.

Sit binomium ra. $448 + 14$, uel residuum ra. $448 - 14$, atq; propositum, radicem eius quadratam elicere.

OPERATIO.

Duæ huius binomij uel residui portiones, seu nomina inæqualia,

maius	minus	medietas, mi.
sunt ra. 448	& 14,	atq; 7.

Quantitates proportionales,

1 radix	7	$\sqrt{448} N - 1$ ra.
---------	---	------------------------

Facta multiplicatione, uenit

$\sqrt{448}$ radicem $- 1$ pri. æqua. $49 N$

Vel, ex communi illa notitia, Si æqualibus æqualia addantur,

$\sqrt{448}$ radí. æqua. 1 pri. $+ 49 N$.

Est autem exemplum canonis tertij æquationis secundæ, atq; eius solutio, ut sequitur.

Numerus characteris mediij $\sqrt{448}$, huius dimidium $\sqrt{112}$, dimidij uerò huius quadratū 112 , minus 49 , manent 63 , cuius radix quadrata, $\sqrt{63}$, de medietate radicū, $\sqrt{112}$, subtracta, uel ei addita, colligitur hic quidē $\sqrt{343}$, una desideratæ radicis portio, manet uerò illic $\sqrt{7}$, portio altera. Et quia est binomiū propositū: per radices portionum aggregatas, ut $\sqrt{343} + \sqrt{7}$, Binomij, uel, quia est residuum propositum: per id quod relinquitur, postquam minoris radix de radice portionis maioris subtracta est, nimirum $\sqrt{343} - \sqrt{7}$, residui propositi radix indicabitur, id quod examinari poterit.

SEQUUNTUR HVIVS REIDVO EXEMPLA

alia, unum quidem pro binomio tertio, alterum uerò pro sexto residuo expositum.

Binomium tertium $\sqrt{448} + \sqrt{336}$

Maius	minus nomen	Minoris me.
-------	-------------	-------------

$\sqrt{448}$	$\sqrt{336}$	$\sqrt{84}$
--------------	--------------	-------------

Quantitates proportionales

1 radix	$\sqrt{84}$	$\sqrt{448} N - 1$ radice.
---------	-------------	----------------------------

Facta multiplicatione, uenit ultimò

$\sqrt{448}$ radicem æqua. $84 N + 1$ pri.

$\sqrt{112}$ in se, 112 , minus 84 , manent 28 . Huius radix quadrata, $\sqrt{28}$, de $\sqrt{112}$ subtracta, uel ad $\sqrt{112}$ addita, manet $\sqrt{28}$, uel uenit $\sqrt{252}$. Harum partium radices simul iunctæ, ut $\sqrt{252} + \sqrt{28}$. Binomij, radice uerò unius de alterius portionis radice subtracta: per id quod relinquitur, nimirum $\sqrt{252} - \sqrt{28}$, Residui propositi radix indicabitur.

Residuum

Residuum sextum $\sqrt{448} - \sqrt{352}$
 Maius minus nomen $\sqrt{448}$ Minoris medietas $\sqrt{352}$
 $\sqrt{448}$ $\sqrt{352}$ $\sqrt{89}$
 Quantitates proportionales,
 1 radix $\sqrt{89}$ $\sqrt{448} N - 1 ra.$
 Facta multiplicatione, uenit ultimo
 $\sqrt{448}$ radicem $\sqrt{89} N + 1 pri.$
 atq; partes deinde,
 maior quidem $\sqrt{112} + \sqrt{24}$ minor uero $\sqrt{112} - \sqrt{24}$
 Totius tandem residui radix,
 Radix binomij $\sqrt{112} + \sqrt{24}$ minus ra. residui $\sqrt{112} - \sqrt{24}$
 Nominis uero contrarij, Binomij scilicet, radix est
 Radix utriusq; hoc est,
 & binomij $\sqrt{112} + \sqrt{24}$, atq; etiam residui $\sqrt{112} - \sqrt{24}$.

EXEMPLVM DECIMVM TERTIVM.

Diuidantur 10 in duas portiones, quarum una cum altera multiplicata, 15, 20, 24, 1 uel $\frac{3}{4}$, &c. producantur.

Facit ratione nume.

	maior	minor portio	
{	15,	$5 + \sqrt{10}$	$5 - \sqrt{10}$
	20,	$5 + \sqrt{5}$	$5 - \sqrt{5}$
	24,	6	4
	1,	$5 + \sqrt{24}$	$5 - \sqrt{24}$
	$\frac{3}{4}$,	$5 + \sqrt{24\frac{1}{4}}$	$5 - \sqrt{24\frac{1}{4}}$

OPERATIO.

Sit 1 radix, una, & $10 N - 1 ra.$ altera portio.
 Et ueniunt facta multiplicatione,
 $10 ra. - 1 pri.$ $\sqrt{15, 20, 24, \&c.} N.$

Decimum quartum. Sint tres numeri, & esto quod primus cum 6, secundi $\frac{2}{3}$; secundus uero cum 4, ipsum tertium bis, & eius $\frac{1}{4}$; ac tertius deinde minus 9, primi numeri tres quartas contineat, queritur de numeris.

	Primus	secundus	tertius
Facit	$48\frac{1}{3}$	$81\frac{1}{2}$	38

OPERATIO.

1 ra. Pri. $3 ra. + 91 N$ secun. $6 ra. + 52 N$ Ter.
 $\frac{2}{3}$
 quare $6 ra. - 29 N$ $\sqrt{\frac{2}{3}}$ $\frac{3}{2} ra.$

Decimum quintum. Detur numerus quadratus, cuius radicis quadruplo 21 additis, quod inde colligitur, ad ipsum quadratum se habeat in ratione $3\frac{2}{3}$ uel $2\frac{1}{4}$, uel equalitatis, &c. queritur.

Facit 9, uel $10\frac{24}{31} + \sqrt{31\frac{6529}{6561}}$, uel 49.

OPERATIO.

1 radix 1 pri. $4 ra. + 21 N.$ 1 2 Propor.

Proportionalitates.

$$4 \text{ ra.} + 21 \text{ N} \text{ ad } 1 \text{ pri. ut } \begin{cases} 9 & \text{ad } 3 \\ 1 & \text{ad } 4 \end{cases}$$

Multiplicatione facta, ueniunt

$$\begin{array}{l} 12 \text{ ra.} + 63 \text{ N} \\ 16 \text{ ra.} + 84 \text{ N} \\ 4 \text{ ra.} + 21 \text{ N} \end{array} \quad \text{æquales} \quad \begin{cases} 11 \text{ pri.} \\ 9 \text{ pri.} \text{ \&cc.} \\ 1 \text{ pri.} \end{cases}$$

SEQVITVR HVIVS EXEMPLI EXAMEN.

Sumatur ad examinandum numerus secundus.

$$10 \frac{74}{81} + \sqrt{31 \frac{6529}{6561}}$$

Huius radix quadrata, $\sqrt{820 \frac{8}{81} + \frac{8}{9}}$ quater sumpta, uenit $\sqrt{161 \frac{29}{81} + 3 \frac{8}{9}}$

Additis 21, colliguntur $\sqrt{161 \frac{29}{81} + 24 \frac{8}{9}}$. Et quoniam hæc summa ad ipsum quadratum, $10 \frac{74}{81} + \sqrt{31 \frac{6529}{6561}}$, se, ut positum est, habere debet, sicut 9 ad 4. Facta igitur multiplicatione primæ cum quarta, secundæ deinde cum quantitate uel numero tertio, cum idē numerus, nimirum, $\sqrt{2591 \frac{49}{81} + 98 \frac{8}{9}}$, utrinque producat: quod hoc inuento numero, exemplo satisfactum sit, ex posteriori parte propositionis decimæ sextæ sexti Euclidis tandem infertur. Vel, facta igitur diuisione utriusque antecedentis in suum consequens, cum æquales inter se sint numeri exeuntes: similes etiam rationis numeros, summam scilicet, quadratum, 9 & 4, esse constabit. Est autem communis exiens $2 \frac{1}{4}$.

Decimum sextum. Sunt tres numeri, primus quidem ad ipsum tertium, triplus: secundus uerò ad eundem tertium, ut 3 ad 4. Quoniam autem 6 de primo subtractis, tribus uerò secundo numero additis, ac residuo deinde cum collecto multiplicato: nouencuplus, uel quadruplus sesquitertius, ad tertium numerum producit. Quanti igitur illi tres numeri singuli seorsim sint, in dubium uenit.

Facit, quantum ad rationem

	Primus	secundus	tertius,
nouen.	12	3	4
$4 \frac{1}{3}$ uerò,	$\sqrt{\frac{5833}{81}} - \frac{1}{9}$,	$\sqrt{\frac{5833}{1296}} - \frac{1}{36}$,	$\sqrt{\frac{5833}{729}} - \frac{1}{27}$.

OPERATIO.

Primus	1 ra.	1 ra. — 6 N	residuum
secun.	$\frac{1}{4}$ ra.	$\frac{1}{4}$ ra. + 3 N	collectum
tertius	$\frac{1}{3}$ ra.	Facta multiplicatione,	
producitur $\frac{1}{4}$ pri. + $1 \frac{1}{2}$ ra. — 18 N æqua. 3 uel $1 \frac{4}{9}$ ra.			

Et ultimò tandem in integris

$$1 \text{ pri.} \quad \text{æquales} \quad 6 \text{ ra.} + 72 \text{ N.}$$

$$9 \text{ pri.} + 2 \text{ ra.} \quad \text{æquales} \quad 648 \text{ N.}$$

Quare radicis ualor, & primus numerus 12. uel $\sqrt{72 \frac{1}{81}} - \frac{1}{9}$, ut dictum est. Secundum porrò & tertium dat ipsa positionis solutio.

SEQVITVR ALIA HVIVS EXEMPLI POSITIO.

Primus	4	4 ra. — 6 N	residuum
secundus	1 ra.	1 ra. + 3 N	collectum
tertius	$1 \frac{1}{3}$ ra.		

Facta multiplicatione ueniunt ultimò

$$4 \text{ pri.} \quad \text{æquales} \quad 6 \text{ ra.} + 18 \text{ N}$$

$$4 \text{ pri.} + \frac{2}{9} \text{ ra.} \quad \text{æquales} \quad 18 \text{ N}$$

Adhuc

ALGEBRAE DESCRIPTIO.
ADHVC ALIA POSITIO.

Primus	3		3 ra.	- 6 N	residuum
secun.	$\frac{3}{4}$		$\frac{3}{4}$ ra.	+ 3 N	collectum
tertius	1 ra.	Facta multiplicatiōe,	veniunt ultimò,		
$2\frac{1}{4}$ pri.		æquales	$4\frac{1}{2}$ ra.	+ 18 N	
$2\frac{1}{4}$ pri.	+ $\frac{1}{6}$ ra.	æquales	. 18 N		

SEQUITVR NVNC OPERATIONIS EXAMEN.
Sumantur ad examinandum numeri inuenti secundo, qui sunt

$$\sqrt{\frac{5833}{81}} - \frac{1}{9}, \quad \sqrt{\frac{5833}{1296}} - \frac{1}{36}, \quad \sqrt{\frac{5833}{729}} - \frac{1}{27}$$

Primò diuidatur numerus primus in 3, uel si placet, multiplicetur tertius cum 33 & apparebit, primum numerum ad tertium triplum esse, id quod est ex hypothesibus primum. Quæritur deinde tres quartæ tertij, uel ad ipsum secundum addatur sui una tertia. Et quoniã hic, tertius: illic uero, numerus secundus apparet: & id quod in exemplo dicitur, nimirum, secundum ad tertium tres quartas esse, apparebit. Subtrahantur ultimò 6 de primo, 3 uerò ad secundum numerum addantur. Et quoniam residuo cum collecto, tertio deinde numero cum $4\frac{1}{2}$ multiplicato, æquales numeri producantur, cum sic tandem omnes exempli hypotheses hi numeri habeant, eos ueros esse nemo dubitet.

DECIMUM SEPTIMUM.

Desideratur quadratus numerus, cuius $\frac{2}{3}$ ducte in se, producant duodecuplum radicis, uel radicis uigincuplum.

Facit 9, uel ra. cubica 2025.

OPERATIO:

1 ra. 1 pri. $\frac{2}{3}$ pri. in se, producantur $\frac{4}{9}$ tertiæ quantitatis
æqua. 12 uel 20 radicibus.

Decimum octauum $\frac{1}{24}$ quadrati ducta in se, producit triplum, uel septencuplum radicis, quæritur &cæ.

Facit numerus 12 uel $\sqrt{4032}$
quadra. 144 $\sqrt{16257024}$

Examen numeri secundi.

Numerus uel quadrati radix est	$\sqrt{4032}$
quadratum uerò ipsum	$\sqrt{16257024}$
Porro huius quadrati $\frac{1}{24}$ pars	$\sqrt{1176}$
in se multiplicata, producantur	$\sqrt{1382976}$

Atq; tantundem etiam producit, ipsa radice, $\sqrt{4032}$, cum 7 multiplicata. Quare bene operatum.

Decimum nonum. Sunt duo numeri. Quoniam autem quadratum prioris ad posteriorem, $1\frac{1}{3}$: posterioris contra ad numerum priorem: $4\frac{1}{2}$ rationem constituit, qui nam illi duo numeri sint, quæritur.

Facit, 2: numerus prior, 3 uerò: posterior.

VICESIMUM.

Numerus 12 in duo diuisus est,

Quoniam autem ex multiplicatione totius cum differentia, & minoris quadrato: 64 colliguntur, Vel,

Quoniam autem ex multiplicatione totius cum differentia, & maioris quadrato: 112 colliguntur, Vel,

I 3 Quoniã

Quoniam autem quadrata partium, & quod ex multiplicatione totius cum differentia colligitur: 128 constituunt, Vel

Quoniam autem hæc duo simul, quod scilicet ex multiplicatione totius cum differentia, quodq; ex una parte cum altera multiplicata producitur: 80 constituunt, &c.

Partes diuisionis quantæ erunt? Facit 8 & 4

OPERATIO.

Totus numerus 12

1 ra. maior	uel	1 ra. minor
12 N — 1 ra. mi.		12 N — 1 ra. ma.
2 ra. — 12 N differentia.		12 N — 2 ra. diffe.

Productum ex toto cum diff.	24 ra. — 144 N.	144 N — 24 ra.
Minoris quadratum	144 N + 1 pri. — 24 ra.	1 pri.
Maiores quadratum	1 pri.	144 N + 1 pri. — 24 ra.
Productum ex una parte, cum altera multiplicata,		12 ra. — 1 pri.

Aequationes,

Prima	uel
1 pri. æqua. 64 N	1 pri. + 80 N æqua. 24 ra.
Secunda	uel
1 pri. + 24 ra. æ. 256 N.	1 pri. + 176 N æqua. 48 ra.
Tertia	uel
1 pri. æqua. 64 N	1 pri. + 80 N æqua. 24 ra.
Quarta	uel
1 pri. + 224 N æqua. 36 N	1 pri. + 12 ra. æqua. 64 N

ARITHMETICA PROBLEMA

TA EX I LIB. GRAECORVM EPIGRAM.

Πρώτη.

Παλλὰς ἐγὼ τελέθω σφρηλάτης, αὐτὰρ ὁ χρυσοῦς
 Αἰζηῶν πέλετ' ἰδωροῦ ἀκοῖδοπόλων.
 ἡμισυ μὲν χρυσοῖο χαρίσιθ', ὀγδοάτῳ δὲ
 Θέσπιδ', ἕκκατῳ μοῖρα μ' ἔθηκε Σόλων.
 Αὐτὰρ ἐφίσην Θεμισῶν, τὰ δὲ λοιπὰ τέλαντα
 Εὐνία, καὶ τέχνη, δωροῦ Ἀριστοδίκου.

DE PALLADIS STATVA, QUOTNAM ILLA AV-
 ri talenta appendit.

Pallas ego sum, malieo hunc in modum fabrefacta: sed aurum munus est iuuenum, qui in studio uersantur poetices. dimidiã quidem auri partem: contulit Charisius, octauam uerò: Thespis, decimam dehinc: Solon, & uigesimam: Themison. Reliqua autem nouem & mercedem item quæ artifici debebatur pro opera, contulit Aristodicus.

Quæstio hinc oritur de toto ipsius statuæ pondere.

Facit 40 talen.

Quantum etiam auri ad hanc fabricandam singuli tribuerint.

Facit	Charisius	20,	Thespis	5
	Solon	4	Themison	2 talenta.

Præterea 9 talenta reliqua, ut ponitur, munus est Aristodici.

Operatio

OPERATIO.

Ponatur pondus auri,

fuisse,		radix talentorum
cuius	Charilius	$\frac{1}{2}$ ra.
	Theſpis	$\frac{1}{8}$ ra.
	Solon	$\frac{1}{10}$ ra. dedit
	Themison	$\frac{1}{20}$ ra.
	Aristodicus	9 talenta.

Summa partium & 9 talentorum,

sunt $\frac{31}{40}$ ra. + 9 N, æquales radici positæ,

Est prima æquatio, hinc radicis ualor, pondus scilicet auri, 40 talentorum. Porro quantum singuli, ad hanc statutam extruendam, contulerint, ex ipsa positionis solutione, iuxta radicis ualorem, facile cognoscitur.

Δύτερον.

Αυγείηρ ἐρέεινε μέγα δένος Αλκείδαιο.
 Πληθὺν βουκολίωρ δὲ γήμινθ', ὅς δ' ἀπάμειπτο,
 Ἀμφὶ μὲν Ἀλφειοῖο ῥοᾶς φίλθ' ἤμισυ τῆν',
 Μοίρη δ' ὀκθῶατι ὄχθου κρόνου ἀμφνέμονται.
 Δωδεκάτη δ' ἀπάνδυθε Ταραξίπποιο παρ' ὄνυρον,
 Ἀμφὶ δ' ἄρ' Ἠλιδάδιαιρ ἐφυσήνε μέθοντ'.
 Αὐτὰρ ἐν Ἀργαδίῃ τῆντος ἴμ πολέλοιπα,
 Λοιπὰς δ' αὐ λεύσας ἀγέλας τόδε πεντήκοντα.

DE ANGEAE ARMENTIS, QUOTNAM
 boues fuerint.

Augeam interrogauit generosus Hercules, de multitudine armentorum. cui ille respondit: Media horum pars, amice, circa fluuium Alpheum pascitur: octaua autem, circa Saturni collem: Ceterum duodecima, procul hinc iuxta loca Taraxippi extrema: at uigesima eorum pars, circa Elidem pascitur: trigessimam uerò in Arcadia ego reliqui: reliqua autem, quinquaginta numero armenta, uideas ipse. Quæritur:

Facit 240.

OPERATIO.

Ponatur boues fuisse		radix
circa	Alpheum igitur fluuium sunt	$\frac{1}{2}$
circa	collem Saturni	$\frac{1}{8}$
iuxta	Taraxippi extremum	$\frac{1}{12}$
circa	Elidem montem	$\frac{1}{20}$
in	Arcadia	$\frac{1}{30}$

Summa partium unâ cum 50 bobus

sunt $\frac{19}{24}$ ra. + 50 N æqua. radici positæ.

Est prima æquatio, atq; radicis ualor, armentorum scilicet numerus, 240.

Porro quot nunc in singulis locis uagentur boues, quiuis ex positionis solutione facile cognoscet.

Τρίτορ.

Χάλκεός εἰμι λίωρ, κρουνοὶ δέ μοι ὄμματα δὶα
 Καὶ σῶμα (ὡ δὲ θέναρ δεξιόροιο πόδος.
 Πλήθ' ἢ κρατῆρα δ' ἡμασι δεξιὸν ὄμμα,
 Καὶ λαίον τρισσοῖς, ἐπισύρασι θέναρ.
 Ἀρκίον ἐξ ὥραις πλῆσαι σῶμα. ἐν δ' ἅμα πάντα,
 Καὶ σῶμα, καὶ γλῆναι, καὶ θέναρ, ἐπὶ πόδω.

LEONIS CANALES.

Æneus ego sum Leo, canales uerò mihi sunt oculi duo, & os cū palma dextri pedis. Implent autem craterem eundem: dexter quidem oculus, duobus; sinister uerò, tribus diebus: & quatuor, palma. Porro sex horis, os implere eum potest. Hæc igitur simul omnia, & os & oculi & palma, dic quanto tempore eundem craterem impleant.

Facit $\frac{12}{61}$ diei, uel 4 horis $\frac{44}{61}$ & cæ.

OPERATIO.

	dies	uel	horæ
Oculus	dexter	2	48
	sinister	3	72
	Palma	4	96
	Os	$\frac{1}{4}$	6

Ponatur tempus, intra quod omnes canales, simul aqua fluentes craterem impleant, quòd sit una radix, uel diei, uel horarum, atq; dicatur

dies	horæ		die.	horarum
2 uel	48		$\frac{1}{2}$	ra. uel $\frac{1}{48}$
3	72	dant 1 impletionem,	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{72}$
4	96	quid 1 ra. Facit	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{96}$
$\frac{1}{4}$	6		4	$\frac{1}{6}$
Summa partium			$5\frac{1}{12}$	uel $\frac{61}{288}$

Quare $5\frac{1}{12}$ ra. dierum uel $\frac{61}{288}$ ra. horarum radici positæ hoc est, 1 N, æqualis.

Est prima æquatio, atque radicis ualor ut supra positum, quod probari potest.

Τέταρτορ.

Ἀμφω μὲν ἡμεῖς ἑικοσι μνᾶς ἔλκομεν,
 Ζῆθος τε χ' ὠξύναιμος, ἡρ δέ μου λάβη
 Τρίτη, ἢ τέταρτορ τε τοῦδ' Ἀμφιόνος
 Ἐξ πάντ' ἀνευρώρ, μητρὸς ἐυρήσοις σαθμόρ.

DE STATVIS ZETHI, AMPHIONIS AC MATRIS IPSORUM ANTIOPES.

Ambo quidem nos uiginti minas appendimus, Zethus pariter & meus consanguineus. At si de mea, tertiam; Amphionis uerò, quartam partem

partem sumpturis: sex in summa inuentis, matris pondus inuenies.

Quanti igitur nunc ponderis & Zethi & Amphionis statua fuerit, quaeritur.

Facit Zethi quidem 12 Amphionis uero 8 minarum.
Antiope autem mater, ut habet hypothesis, pondus obtinet 6 minarum.

OPERATIO.

Zethus	} 20 mi.	1 ra.	uel	20 N — 1 ra.
Amphion		20 N — 1 ra.		1 ra.

Collectis nunc partibus ueniunt

uel 5 N + $\frac{1}{12}$ ra. uel $6\frac{2}{3}$ N — $\frac{1}{12}$ ra. aequales 6 N & ca.

Ultimo tandem per communes noticias, Si ab aequalibus aequalia & ca.

Si item aequalibus aequalia,

$\frac{1}{12}$ ra. aequales 1 N uel $\frac{2}{3}$ N aequales $\frac{1}{12}$ ra.

Εὐκλείδου Γεωμετρικόν.

Ἡμίονο καὶ ὄνου φορέουσαι οἶνον ἕβαινον,
 Αὐτὰρ ὄνου σενάχιβερ ἐπ' ἄχθει φόρτου ἰοῖο.
 Τὴν ἕβαρ σενάχουσαρ ἰδοῖο ἐρείνερ ἐκείνη.
 Μῆτορ τί κλαίουσ' ὀλοφύρεαι ἤντε κούρη,
 Εἰ μέτρον ἐρ μοι δόησ'· δὴ πλάσιον σέθερ ἦρα.
 Εἰ δ' ἐμ ἀνπλάβοις, πάντως ἰσότητα φυλάξεις.
 Εἰπὼν γὰρ μέτρον ἄρισε Γεωμετρῆις ἐπιῖσορ.

EVCLIDIS GEOMETRICVM.

Ibant mulus & asina uinum portantes, asina autem ex dolore ponderis sui ingemiscebat. Qua re uisa, mulus grauiter ingemiscentem asinam sic interrogauit: Mater, cur ita lamentaris, cur puellę instar lachrymas fundis? Mensuram mihi unam si dederis, duplo quam tu plus sustulero: sin uero tu a me unam acceperis, idē planē quod ego pondus feres. Mensuram itaque peritissime Geometer dicas uolo.

Facit Mulipondus, 7 : Asinae uero tantum 5 mensurarum.

OPERATIO.

Mulus	1 ra.		Mulus	1 ra. + 2 N
Asina	1 ra. + 3 N	uel	Asina	1 ra.

Et ueniunt tandem

$\frac{1}{2}$ ra. + 5 N aequa. 1 ra. — 1 N Vel 1 ra. + 3 N aequa. 2 ra. — 2 N.

Hactenus ex Græcis epigrammatibus.

SEQUITVR EXEMPLVM IN ORDINE uicesimum primum.

Est qui peregrinationē instituit hoc modo, ut uidelicet plures abesse dies nolit, quam aureos secū domo efferat: eo nimirū consilio, ut si fortē minus prosperē cedit, in singulos dies singuli suppetant ipsi aurei. Et quoniam

K niam

niam Mercurio duce, singulis diebus tot aurei accedunt illi, quot eo mane cum domo egrederetur, habuerat, tandem reuersus domum ac numerans pecuniam, 52 aureos & $\frac{1}{2}$, uel 63 inuenit. Queritur ergo, quot initio profectiois aureos habuerit.

$$\text{Facit } \left\{ \begin{array}{l} 3 \text{ \& dodrantem} \\ 3 \text{ \& } \sqrt{8\frac{7}{8}} - 2. \end{array} \right.$$

EXPLICATIO.

Si commune & uulgi quispiam in huius exempli computatione iudicium sequi uoluerit, inueniet certe, quarto die hominem illū reuertentem domū, non integros quatuor aureos habuisse antequam iter ingrederetur: & tertio die idem si reueri dicatur, tres aureos in ea summa quam primo die secum tulerat desiderari. Et quia plus tribus, minus autem quam quatuor aureos secum primo die habuit, ponendum igitur, quòd ultra 3 aureos adhuc 1 radicem, hoc est, in summa, 3 N + 1 ra. aureorum habuerit. Et quoniam, iuxta exempli hypothelīm, tot dierum iter confecit, atq; singulis diebus, & id ex hypothesi, illam quam tunc secum habet pecuniam, duplicauit: tertio tandem finito die domum rediens, 24 N + 8 ra. aureorum habet, quod est notandum.

Rursum quandoquidem quartum quoq; diem non integrum, sed eius partem tantum aliquam, nimirum 1 radicem positam, perambulat: non igitur 24 N + 8 ra. aureorum, sed huius summæ partem proportionalem illa radice dierum acquirit. quare dicendum,

dies	aureorum	diei
1 integer	acquirit 24 N + 8 ra.	quid 1 ra.
Facit 24 ra. + 8 pri.	Quæ nunc, si pecuniæ tertiæ diei addita fuerint, ueniunt	

$$8 \text{ primæ} + 32 \text{ ra.} + 24 \text{ N, æqua. } \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{52\frac{1}{2}} \\ 63 \end{array} \right. \text{ N. \&cæ.}$$

Radici igitur ualor, facta operatione æquationi conueniens: dodrans, uel $\sqrt{8\frac{7}{8}} - 2$ aurei erunt. Tres igitur aureos & dodrantem, uel 3 aureos & $\sqrt{8\frac{7}{8}} - 2$ aure. initio profectiois habuit. Atq; tot etiam dierum iter confecit, quod nunc probari potest.

Instituatur probari seu examinari numerus irrationalis

$$\text{Numerus aureorum quos primò ille habuit, sunt } 3 \text{ plus } \sqrt{8\frac{7}{8}} - 2$$

Atq; tot etiam diebus peregrè profectus fuit

$$3 \text{ plus } \sqrt{8\frac{7}{8}} - 2 \text{ Initio profectiois,}$$

6 plus $\sqrt{35\frac{1}{2}} - 4$	bis	primi	}	dici aurei.
12 plus $\sqrt{142} - 8$	bis	secundi		
24 plus $\sqrt{568} - 16$	bis	tertij		

Iam dicendum

die inte.	aurei	die.
1 acquiruntur 24	plus $\sqrt{568} - 16,$	quid $\sqrt{8\frac{7}{8}} - 2,$

Facit, ut quidem sequenti multiplicatione ostendetur 55 — $\sqrt{568}.$

Quibus summa, uel aurei, quos tertio die noctu secum tulerat, ut sequitur, additi, 63 aurei colliguntur, quod erat ostendendum.

Sequitur

$$\begin{array}{r}
 24 \text{ plus } \sqrt{568} - 16 \\
 \hline
 \sqrt{8\frac{7}{8}} - 2 \\
 \hline
 \sqrt{512} \quad + 71 + 32 \\
 \hline
 \sqrt{2272} \\
 \hline
 \sqrt{2272} \\
 \hline
 55 - \sqrt{568}
 \end{array}$$

SEQVITVR ADDITIO,

$$\begin{array}{r}
 24 \text{ plus } \sqrt{568} - 16 \\
 \hline
 55 - \sqrt{568} \\
 \hline
 \text{Summa } 63 \text{ aurei, ut supra.}
 \end{array}$$

Alia additio, quae in hoc exemplo locum habet.

	+ ra. 5112	ad , -	ra. 9088
4	1278		2272
2	639		1136
71	9		16
	+ 3		- 4

$$\begin{array}{r}
 - 1 \text{ quater} \\
 - 4 \text{ bis} \\
 - 8 \text{ septuagies semel} \\
 - 567
 \end{array}$$

Summaradicum $-\sqrt{567}$ &cæ.

EXEMPLVM VIGESIMVM SECVNDVM.

Quidã certa aureorũ summa negociatus, huius trientẽ, uno aureo & minus, lucratus est, quare deinde cũ sorte & lucro negocians, huius alterã partem, plus 8 aureis lucratur. Id nunc tertio faciens, similem, aut meliorem fortẽ, fortunam speraturus, eius quod habet iacturam facit in quadrante. Vel si placet, eius quod habet quadrantẽ lucrificat. Quia autem nunc retentã cũ numeret pecuniã, uel aureos, inuenit, hic quidẽ 232 plus $\frac{2}{15}$, illic uerò $100 - \frac{1}{15}$, queritur quõtnã aureos ipse primò habuerit.

Facit, quantum ad $\left\{ \begin{array}{l} \text{lacturam quidem } 61 \text{ aure. \& dodrantem} \\ \text{Lucrum uerò } 90 \text{ aureos.} \end{array} \right.$

OPERATIO.

Ponatur		i radix, quam primò habuit,	
quare $\frac{1}{3}$ ra.	$-\frac{1}{2} N$	Id quod lucratur primò	
atq; sic $1\frac{1}{3}$ ra.	$-\frac{1}{2} N$	Sors & lucrum simul	
Huius $\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$ ra. $-\frac{3}{4} N$	Lucrum	
	+ 8	Lucrum & id	
	$\frac{2}{3}$ ra. $+ 7\frac{1}{4} N$	quod lucratur secundo	
	2 ra. $+ 5\frac{3}{4} N$	Sors & lucrum simul	
Huius $\frac{1}{3}$,	$\frac{1}{2}$ ra. $+ 1\frac{7}{15} N$	lactura uel lucrum	
manent	$1\frac{1}{2}$ ra. $+ 4\frac{5}{15} N$	aqua.	$100 - \frac{1}{15} N$
uel uen.	$2\frac{1}{2}$ ra. $+ 7\frac{3}{15} N$	aqua.	$232 + \frac{2}{15} N$ &cæ.

23. Sit unus numerus notus, nimirũ 28, 63 uel 42, quatuor deinde alij ignoti; & esto quod ignotorum primus cũ reliquorũ trium altera parte, secundus uerò cum reliquorum tertia partẽ, tertius autem cum reliquorum quarta, ac quartus deinde cum reliquorum parte quinta, ipsum notum positum æquent: Queritur de numeris ignotis,

K a

Facit



Facit ratione nume-

	Primus	secundus	tertius	quartus numerus,
ri	29	$14\frac{14}{37}$	$18\frac{34}{37}$	$21\frac{7}{37}$
	63	$1\frac{26}{37}$	$32\frac{13}{37}$	$47\frac{25}{37}$
	42	$1\frac{5}{37}$	$21\frac{21}{37}$	$31\frac{29}{37}$

SEQVITVR HVIVS EXEMPLI EXAMEN.

Sumantur ad examinandum numeri primi,

qui sunt $\frac{28}{37}$, $14\frac{14}{37}$, $18\frac{34}{37}$, $21\frac{7}{37}$ & 28

	Numerus	Partes requisitæ			Summa singulorum cum suis partibus,	æquales	
primus	$\frac{28}{37}$	$7\frac{7}{37}$	$9\frac{17}{37}$	$10\frac{22}{37}$			28
secun.	$14\frac{14}{37}$	$6\frac{34}{111}$	$7\frac{7}{111}$	$\frac{28}{111}$			
tertius	$18\frac{34}{37}$	$5\frac{11}{37}$	$\frac{7}{37}$	$3\frac{22}{37}$			
quar.	$21\frac{7}{37}$	$\frac{28}{185}$	$2\frac{162}{185}$	$3\frac{29}{37}$			

EXEMPLVM VLTIMVM, ET SIMILE
præcedenti.

Fundus quidam inscribitur 375 coronatis, quod ubi unus resciscit, ipsius autem fortunæ multo minores quàm ut eum emere possit, re igitur infecta, discedit. Hoc idem & alij cuidam, ac deinde etiam tertio accidit. Veruntamen si is qui primo loco fundū est licitatus, dimidiā pecuniæ partem à reliquis; is uerò qui secundo, dodrantē à reliquis; is autē qui tertio, bessē à reliquis acciperet, singulorum tandem pecuniæ eo modo auctę, sufficerent ad emendum fundum. Quare nunc quæstio oritur, quot coronatos seorsim quisq; habuerit.

Facit

Primus	Secundus	Tertius.
$267\frac{6}{7}$	$53\frac{4}{7}$	$160\frac{5}{7}$

Quod examinari poterit.

Et hæc quidem sunt optime Lector, quæ paucis tibi pro regularum Algebrae declaratione communicare uoluimus. Cæterum qui plura requirit, his nunc instructus, ab alijs harum regularum scriptoribus petat. Nunc uerò ad Euclidem ipsum.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ-⁷⁷ ΧΕΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

EVCLIDIS ELEMENTORVM GEO- metricorum liber primus.




St hic liber primus totus ferè elementarius, non tantum ad reliquos sequentes huius Operis libros, sed etiam ad aliorum Geometrarum scripta intelligenda necessarius. Nam in hoc libro communium uocabulorum, quæ subinde in geometria uersanti occurrunt, definitiones continentur. Præceptiones deinde ducendi perpendicularem, quomodo item Trilateræ figuræ, secundum latera uel angulos diuersæ, & Quadrilateræ, formari debeant. Figura item aliqua proposita, quomodo illa in alterius formæ figuram permutanda sit, præceptiones, ut diximus, traduntur. Cum igitur talia doceantur, & plura etiam alia, quàm hoc loco commemorare uoluimus, facile erit cuiuis, non solum quàm sit necessarius, sed etiam ad reliqua perdiscenda liber iste quàm utilis, perspicere.

ΟΡΟΙ.


Σημεῖοις, οὐ μέρϑ οὐθέρ. Γραμμὴ δέ, μήκος ἀπλαῖς. Γραμμῆς δέ πέρατα, σημεῖα. Ευθεῖα γραμμὴ ἴσις, ἥτις ἐξίλου τοῖς ἐφ' ἑαυτῇ σημεῖοις κείτῃ.

DEFINITIONES.

Punctum est, cuius pars nulla. 2. Linea uerò, longitudo latitudinis expers. Lineæ autem termini puncta. 3. Recta linea est, quæ equabiliter inter sua puncta iacet.




Επιφανεία ἴσις, ὁ μῆϑ καὶ πλάτϑ μόνον ἔχῃ. Επιφανείας δέ πέρατα, γραμμαί. Επίπεδος ἐπιφανεία ἴσις, ἥτις ἐξίλου ταῖς ἐφ' ἑαυτῇ ευθείαις κείτῃ.




4. Superficies est, quæ longitudinem & latitudinem tantum habet.
K 3 Super-

Superficieí uerò termini, lineæ. 5. Plana superficies est, quæ equabiliter inter suas rectas iacet lineas.



Επίπεδος γωνία ὄζειν, ἢ ἐν ὑπὸ πλάτῳ δύο γραμμῶν ἀπὸ μὲν ἄλλήλων, καὶ μὴ ἐπ' ἐυθείας κειμένων, πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσις. Ὅταν δὲ αἱ ποδὲς χουσαι τῶν γωνιῶν γραμμαὶ ἐυθεῖαι ὦσιν, Εὐθύγραμμος καλεῖται ἡ γωνία. Ὅταν δὲ ἐυθεῖα ἐπ' ἐυθείαν σταθεῖσα, τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, Ὄρθη ὄζειν ἡ γωνία τῶν ἴσων γωνιῶν. Καὶ ἡ ἐφεσηκνία ἐυθεῖα, Καθετὸς καλεῖται, ἐφ' ἣν ἐπίσηκεν. Ἀμβλῆια γωνία ὄζειν, ἢ μείζων ὀρθῆς. Ὄξεια δὲ, ἢ ἐλάσσων ὀρθῆς.

6. Planus angulus, est in plano duarum linearum se mutuo tangentium, & non in directum iacentium, mutua inclinatio. 7. Quando uerò compræhendentem angulum lineæ, rectæ fuerint, Rectilineus uocatur ille angulus. 8. Quando autem recta super rectam consistens lineam, deinceps se habentes angulos æquales inter se fecerit, Rectus est uterque æqualium angulorum. 9. Et insistens recta linea, Perpendicularum: hoc est, Perpendicularis linea uocatur, illius super quam steterit. 10. Obtusus angulus est, qui maior recto. 11. Acutus uerò, qui minor est recto.



Ὄρθη ὄζειν, ὅ πνθ ὄζειν ὠρέας. Σχήμα ὄζειν, ἢ ὑπὸ πνθ ἢ πνθῶν ὄρων ποδὲς χουμένοι.

12. Terminus est, quod cuiusque extremum est.



Vt, Lineæ termini sunt, puncta: Superficieí, lineæ: Corporum uerò, superficies, quemadmodum supra indicatum est.

13. Figura est, quæ sub aliquo aut aliquibus terminis comprehenditur.

Vt sunt omnia, quæ uel sub lineis, uel sub superficiebus comprehenduntur, spacia.

Κύκλος, ὄζειν σχῆμα ἐπίπεδον, ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς ποδὲς χουμένοι, ἢ καλεῖται Περιφέρεια, πρὸς ἣν ἀφ' ἑνὸς σημείου τῶν ἐν τῷ σχήματι κειμένων, πᾶσαι

πάσαι αὐτοῖς ἰσοπέδου ἴσους ἀλλήλαις εἶσι. Κέντρον ἢ κέντρον τοῦ κύκλου, ἢ σημεῖον καλεῖται.



14. Circulus, est figura plana, una linea comprehensa, quæ Circumferentia appellatur, ad quã ab uno quodam puncto eorum, quæ intra figurã sunt posita, omnes cadentes rectæ lineæ inter se sunt æquales.

15. Punctum uerò hoc, Centrum circuli appellatur.

Διάμετρος τοῦ κύκλου, ἐστὶν ἑνὴν ἴσην διὰ τὸ κέντρον ἡ γωνία, καὶ περὶ αὐτὴν ἑστὶν ἰσότης τὰ μέρη ὑπὸ τῇ τοῦ κύκλου περιφέρειᾳ, ἢ πῆξ καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον.




16. Diameter circuli, est recta quedam linea per centrum ducta, & ex utraq; parte in circuli circumferentiam terminata, & quæ circulum bifariam secat.

Ἡμικύκλιον δὲ ἐστὶν τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τῇ διὰ μέτρον, καὶ τῇ ἀπολαμβανομένῃ ὑπὸ τῇ τοῦ κύκλου περιφέρειᾳ.

Τμήμα δὲ κύκλου, ἐστὶν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῆς ἑνὸς ἑνὸς ἰσότητας, καὶ κύκλου περιφέρειᾳ.

17. Semicirculus, est figura, quæ sub diametro, atq; de circuli circumferentia ablata portione comprehenditur. 18. Sectio uerò circuli, est figura quæ sub recta linea, et circuli circumferentia comprehenditur.



18





Εὐθύγραμμα σχήματα δὲ ἐστὶν τὰ ὑπὸ ἑνὸς ἑνὸς ἰσότητας περιεχόμενα.

Τρίγωνον μὲν, τὰ ὑπὸ τριῶν. Τετράγωνον δὲ, τὰ ὑπὸ τεσσάρων. Πολύγωνον δὲ, τὰ ὑπὸ πλείονων ἢ τεσσάρων ἑνὸς ἑνὸς ἰσότητας περιεχόμενα.

19. Rectilineæ figuræ sunt, quæ sub rectis lineis comprehenduntur.

20. Trilateræ quidem, quæ sub tribus. 21. Quadrilateræ uerò, quæ sub quatuor. 22. Multilateræ autem, quæ sub pluribus quàm quatuor rectis lineis comprehenduntur.



Τῶν δὲ τριπλευρῶν σχημάτων,
 Ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνον ὄσιν, ἃ τρεῖς ἴσας ἔχου πλευράς. Ἰσοσκελὲς δὲ, ἃ
 πᾶς δύο μόνας ἴσας ἔχου πλευράς. Σηαλιῶν δὲ, ἃ πᾶς τρεῖς ἀνίσας ἔχου
 πλευράς.

Trilaterarum porro figurarum,


23. Aequilaterum quidē triangulum est, quod tria latera habet æqua-
 lia. 24. Isosceles uerò, quod duo tantum latera habet æqualia. 25. Sca-
 lenum autem, quod tria inæqualia habet latera.

Ἐτι τὲ τῶν τριπλευρῶν σχημάτων,

Ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνον ὄσιν, ἃ ἔχου ὀρθὴν γωνίαν. Ἀμβλυγώνιον ἢ, ἃ ἔχου
 ἀμβλείαν γωνίαν. Ὄξυγώνιον δὲ, ἃ τρεῖς ὀξείας ἔχου γωνίας.

Amplius trilaterarum figurarum,

26. Rectangulum quidem triangulum est, quod habet rectū angulum.
 27. Obtusiangulum uerò, quod habet obtusum angulum. 28. Acu-
 tiangulum autem, quod tres acutos angulos habet.




Τῶν δὲ τετραπλευρῶν σχημάτων.


Τετραγώνιον μὲν ὄσιν, ὃ ἰσόπλευρον τε ἔστι, ἢ ὀρθογώνιον. Ἐτερόμηνες ἢ,
 ὃ ὀρθογώνιον μὲν, ὄνκ ἰσόπλευρον δὲ. Ρόμβος ἢ, ὃ ἰσόπλευρον μὲν, ὄνκ ὀρθογώ-
 νιον δὲ. Ρομβοειδὲς ἢ, ἃ πᾶς ἀπεναντίας πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις
 ἔχου, ὃ ὄντε ἰσόπλευρον ὄσιν, ὄντε ὀρθογώνιον.

Figurarum autem quadrilaterarum,

29. Quadratum quidem est, quod & æquilaterum est, & rectangulum.
 30. Altera parte longius uerò, quod rectangulū quidem, at æquilate-
 rum non est. 31. Rhombus autem, qui æquilaterus, sed rectangulus
 non est. 32. Rhomboides deinde, quod ex opposito & latera & an-
 gulos æquales inter se habens, neq; æquilaterum est, neq; rectangulum.




Τὰ δὲ περὰ ταῦτα τετραπλευρά, Τραπεζίαι καλεῖσθαι.



33. Præter has uerò, quæ reliquæ sunt figuræ quadrilateræ, Mensulæ appellantur.

Παράλληλοι εἰσὶν ἑυθεῖαι, αἵ τινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὄνσαι, ἢ ἐμβαλλόμεναι ἐπ' ἄπειρον ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη, ὡδὲ μηδετέρα συμπίπτουσι ἀλλήλαις.

34. Parallelæ, sunt rectæ lineæ, quæ in eodem plano existentes, & ex utraq; parte in infinitū eiectæ, in neutram inter se mutuo coincidunt.




ΑΙΤΗΜΑΤΑ.

Ἡτέρω, Ἀπὸ παντὸς σημείου ἄδι' πᾶρ σημείον, ἑυθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν. Καὶ πεπερασμένην ἑυθεῖαν, ἢ ἄρ' ὅσως ἐπ' ἑυθείας ἐμβαλλεῖν. Καὶ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι, κύκλον γράφειν.

Postulata.

Petatur, & primò quidem, Ab omni puncto ad omne punctum, rectam lineam ducere posse. Secundò uerò, Terminatam rectam lineam, secundum continuationem, in rectum eijcere. Tertiò tandem, Omni centro & interuallo, circulum describere.




ΚΟΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ.

Τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα, καὶ ἀλλήλοισ ὅστις ἴσα.

COMMVNES NOTITIAE.

1. Quæ eidem æqualia: & inter se sunt æqualia.


13 13 13 13



Ἐὰν ἴσους ἴσα προστεθῆ, τὰ ὅλα ὅστις ἴσα. Καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῆ, τὰ ἕκαστα λεγόμενα ὅστις ἴσα.

2. Si æqualibus æqualia adijciantur: tota sunt æqualia. 3. Et si ab æqualibus æqualia auferantur: quæ relinquuntur sunt æqualia


2 { 9 9 9
3 3 3
12 12 12
3 { 7 7 7
5 5 5



L. Εὰν


Εὰν ἀνίσοις ἴσα προστεθῆ, τὰ ὅλα ὅστις ἀνισα. Καὶ ἰὰν ἀπὸ ἀνίσωμ ἴσα ἀφαιρεθῆ, τὰ λοιπὰ ὅστις ἀνισα.

4 Si inæqualibus equalia adijciantur : tota sunt inæqualia. 5. Et si ab inæqualibus equalia auferantur : reliqua sunt inæqualia.



Τὰ τῷ αὐτῷ διπλάσια, ἴσα ἀλλήλοισ ἐσί. Καὶ τὰ τῷ αὐτῷ ἡμίση, ἴσα ἀλλήλοισ ἐσί.

6 Quæ eiusdem duplicia : equalia inter se sunt. 7 Et quæ eiusdem dimidia : equalia inter se sunt.




Τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπὶ ἀλληλα, ἴσα ἀλλήλοισ ἐσί. Καὶ τὸ ὅλον τῷ μέρους μείζον ἐσί.

8 Quæ congruunt inter se : equalia inter se sunt.

9 Et totum parte sua maius est.

Πᾶσαι αἱ ὀρθαὶ γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλοισ ἐσί. Καὶ ἰὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθείαι μπίπτουσι, τὰς ἐν ἑσ, καὶ ὑπὲρ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας, δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῆ, ἐκβαλλόμεναι αἱ δύο αὐτὰ εὐθείαι ἐπὶ ἀπειρομ συμπεισοῦνται ἀλλήλοισ, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες γωνίαι.

10 Omnes recti anguli : æquales inter se sunt. 11 Et si in duas rectas recta linea incidens, internos, & in eadem parte angulos, duobus rectis minores fecerit : illas ambas productas infinite, necesse est coincidere, ea in parte, qua duo isti anguli fuerint duobus rectis minores.



Καὶ δύο εὐθείαι, χωρίον οὐ ποδεῖχουσιμ.

12 Et duæ rectæ lineæ : spacium non compræhendunt.

ΠΡΟΤΑ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΠΡΩΤΗ.

A.

Ἐπί τῆς δοθείσης ἐυθείας πεπερασμένης, τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι.


PROPOSITIONES.

PRIMA.

I.

Super data recta linea terminata, triangulū æquilaterum constituere.

Terminata recta linea data, propositum est, super ea triangulum æquilaterum constituere. Officio igitur circini, secundum intervallum rectæ datæ, ex utraq; illi-



us extremitate, per tertium postulatū, circulus describatur: atq; ubi alter alterum supra lineam secat, inde ad utranq; extremitatem data recta quædam linea demittatur, & propositioni satisfactum erit, cum hæ duæ demissæ & recta terminata data, triangulum quale petitur comprehendant: id quod facile ex structura & circuli definitione, bis usurpata, atq; illa communi noticiã, Quæ

uni sunt æqualia, & inter se sunt æqualia, demonstrari poterit. Super data igitur recta terminata linea, triangulum æquilaterum constitutū est, quod fecisse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

B.



Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ, τῆς δοθείσης ἐυθείας ἰσὺν ἐυθείαν θέσθαι.

PROPOSITIO

II.


Ad datum punctū, datæ rectæ lineæ, æqualem rectam lineã ponere.

Puncto & recta linea data, describatur primò circulus, cuius semidiameter sit recta data: altera ipsius extremitate, ultra fuerit, centri loco sumpta. Quo factò, à centro circuli iam descripti, ad punctum datum, linea quadam recta, per primum po-



stulatum ducta, super ea, per propositionem præcedentem, triangulum æquilaterum constituatur: atq; id latus, quod ad centrum tendit, ad circumferentiã usq; producat. Postea uerò secundum hanc ipsam continuatã, ex illa quoq; extremitate, quam cum latere trianguli altero communem habet, circulus describatur, & ubi tandem latus trianguli alterum usq; ad circumferentiã continuatum fuerit, confectum erit negocium. A dato enim puncto linea, datæ æqualis,educta est: id quod adiectæ figuræ indicant, atque in hunc modum demonstrari potest. Cum enim in maiori circulo, quæ ex ipsius centro egrediuntur rectæ lineæ, ex definitione, inter se æquales sint cumq; etiam super recta, quam centrum circuli minoris et

L 2 punctum



quod fecisse oportuit.

punctum datum terminant, triangulum æquilaterum constitutum sit, huius uerò trianguli duo latera duarum maioris circuli semidiametrorum partes sint, partibus illis æqualibus ab æqualibus semidiametris subtractis, & quæ relinquuntur rectæ lineæ, ex communi quadam noticia inter se æquales erunt. Sed quia una harum, ex definitione circuli, datæ rectæ est æqualis: & altera, quæ nimirum ex dato puncto egreditur, ex communi quadam noticia, eidem rectæ datæ æqualis erit. Ad datum igitur punctum, datæ rectæ lineæ æqualis recta posita est,

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Γ.

Δύο ὀρθῶν ἐπιπέδων ἀνίσωμ, ἀπὸ τοῦ μείζονος, τῆ ἑλασσονι ἴσῳ ἐπιπέδῳ ἀφελῆν.

PROPOSITIO

III.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus, à longiori, breuiori æqualem rectam lineam abscindere.

Est huius propositionis triplex operatio, seu fabrica. Prima, ut officio circini quætitas breuioris accipiatur: ea deinde in longiore, ab extremitate una incipiendo, puncto aliquo signetur: & factum erit negotiū, id quod per cōmunem illam noticia, Quæ uni sunt æqualia, et inter se sunt æqualia, de

Linea longior.




Breuior.



monstrari poterit.

Secunda est, ut lineæ propositæ duabus suis extremitatibus utcunq; coniungentur, secundum quantitatem deinde, uel interuallū breuioris, ex coniunctionis pun-




cto, per tertium postulatum, circulus, uel arcus tantum circuli loco, qui tamen longiorem rectā secat, describatur: & idem effectum erit. Huius autem demonstratio est ipsa circuli definitio supra tradita, cum lineæ à centro in circumferentiam cadentes, per eandem, inter se sint æquales.

Tertia huius operatio est, ut, per præcedentem propositionem secundam, primò ab extremitate longioris alterutra, tanquam à puncto aliquo dato, linea breuiori æqualis educatur: atq; huic deinde à longiore, prout secunda huius propositionis operatio exigit, æqualis abscindatur, & tertio, quod uolebat propositio, factum erit.

FIGURA

Linea longior.

Breuior.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Δ.


Εὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυοὶ πλευρᾶς ἴσας ἔχῃ, ἑκατέρῃ ἑκατέρῃ, καὶ τὴν γωνίαν τῆ γωνία ἴσων ἔχῃ, τὴν ὑπὸ τῆ ἴσων ἑυθειῶν πόδιε χρομένω· καὶ τὴν βάσιν τῆ βάσει ἴσων ἔξει, καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τρίγωνῷ ἴσον ἔσαι, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται, ἑκατέρῃ ἑκατέρῃ, ὑφ' αἷ αἰ ἴσαι πλευραὶ ὑπολείνουσι.

PROPOSITIO

IIII.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, utrumque utrique, habuerint uerò & angulum angulo æqualem, cum qui sub æqualibus rectis lineis comprehenditur: & basim basi æqualem habebunt, & triangulum triangulo æquale erit, ac reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, uterque utrique, sub quibus æqualia latera subtenduntur.


Sumit hæc quarta propositio suã demonstrationẽ ab impossibili. Duplex enim est, ut norunt dialectici, demonstrationis genus. Vnum, quod ex ueris & concessis procedit, & directum dicitur. Alterum uerò, quod cum directe non possit obtineri, ab impossibili aliquo & absurda cõclusionẽ suam demonstrationẽ cõfirmat, quod paucis tantum hic monere uoluimus. Nunc quantum ad propositionẽ. Prescribantur huiusmodi duo triangula, qualia hæc propositio requirit, quorum nimirum unius duo latera, duobus lateribus alterius æqualia sint: atque angulus deinde sub æqualibus lateribus unius, angulo sub æqualibus trianguli alterius comprehenso æqualis: dico quod & horum triangulorum bases, ipsa quoque triagula tota, atque reliqui anguli reliquis angulis utrinque inter se æquales sint. Huius rei nunc accedere deberet ocularis quedam demonstratio: sed quia ad sensum quasi ita sese habere res apparet, & euidentis est, tan-



rum unius duo latera, duobus lateribus alterius æqualia sint: atque angulus deinde sub æqualibus lateribus unius, angulo sub æqualibus trianguli alterius comprehenso æqualis: dico quod & horum triangulorum bases, ipsa quoque triagula tota, atque reliqui anguli reliquis angulis utrinque inter se æquales sint. Huius rei nunc accedere deberet ocularis quedam demonstratio: sed quia ad sensum quasi ita sese habere res apparet, & euidentis est, tan-

quam

quam uera atq; omnibus nota relinquatur, cum statim, hoc si quis negare uelit, oppositum eius, ad extremum, Quod duę rectę spacium comprehendant, ut sequitur, fateri cogatur, reductione ad absurdum. Superponatur triangulum unum alteri, sic ut anguli eorum æquales, unus super altero iaceat, unum etiam æqualium laterum unius, super suo æquali alterius triāguli latere ponatur. Et quia hæc duo, & reliqua etiam duo ex altera parte latera, ex hypothesi inter se æqualia sunt, ab æqualibus etiam angulis descendunt: horum applicatorum laterum extremitates, reliqua etiam ex altera parte latera omnino conuenire atq; coincidere oportet. Quia uerò iam basiū extremitates (ut quę eadem sunt quę descendentiū laterū,) conueniunt: basis igitur basi aut congruet, aut duę rectę linę cōprehendent superficiē. Posterius nō



conceditur, cum nimirum id, ex communi quadam noticia, pro absurdo habeatur. Congruēt ergo bases: æquales igitur inter se, ex cōmuni illa noticia, Quę congruunt inter se, æqualia inter se sunt. Congruet sic & triangulū triangulo: quare & ipsa æqualia inter se, per eandē. Deniq; quia etiam reliqui duo anguli reliquis duobus angulis congruunt, uterq; utriq;: & illi tandem eo modo quo conueniunt, inter se æquales erunt. Cum igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, utrunq; utriq;, habuerint uerò & angulū angulo æqualem, eum qui sub æqualibus rectis comprehenditur: & basim basi æqualem habebunt, & triangulum triangulo æquale, ac reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, uterq; utriq;, sub quibus æqualia latera subtenduntur, quod demonstrari oportuit.

A D M O N I T I O.

Per puncta in figuris, representatur ratio ducens ad absurdū, ut qui facilis nō esset in concedendo id quod uerum est, tandem cōuincatur reductione quadam ad impossibile, ut hac offensione absurditatis quodammodo resiliat ad confessionem ueri. Quod ut hoc loco, ita etiam alijs locis à me factum reperient Lectores, designatione punctorum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

E.


Ἰσῶς ἰσοσκελῶν τριγώνων, αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ. Καὶ πρὸς ἐκβληθεῖσιν τῶν ἰσῶν ἐνθειῶν, αἱ ἐπὶ τῶν βάσεων γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται.

P R O P O S I T I O

V.

Isoſcelium triangulorum: qui ad basim anguli, æquales inter se sunt. Et æqualibus rectis ulterius productis: qui sub basi anguli, æquales inter se erunt.


Sunt huius propositionis duę partes, quarum prior quidem est, quòd in triangulis duūm æqualium laterum, anguli ad basim, hoc est ad reliquum latus tertium,




sint inter se æquales. Posterior uerò, si in huiusmodi triangulis æqualia duo latera ultra triangulum producantur: quod & sub basi, qui sic fiunt anguli, inter se æquales sint. Fiant latera ultra triangulum producta, per 3, inter se æqualia, horum deinde æqualium extremitates cū basis extremitatibus, duabus rectis, quę sese mutuo secant iunctis, demonstratio ex 4 precedenti, bis usurpata, & communi tandem illa noticia, Si ab æqualibus æqualia auferantur, & quę relinquuntur, &cæ, sic colligetur. Quoniã enim infe-

rius ad

rius ad Iſoſcelis baſim poſita triangula (ſumpto tamē ad utrūq; Iſoſceli deſcripto) duo latera ex hypotheſi & ſtructura, duobus lateribus æqualia, angulum prætereā




inter æqualia latera, angulo equalē habent: per præcedentē quartā, & baſim baſi, hoc eſt, ſecantes ſeſe mutuo ſub Iſoſcelis baſi lineas, ac reliquos duos angulos reliquis duobus angulis equales habebunt: quod eſt notandum. Rurſus quoniam eadem duo inferius ad Iſoſcelis baſim poſita triangula, propter ſtructuram quidem, & ea inſuper, quæ iam demonſtrata ſunt, ex propoſitione 4 huius, inter ſe æqualia ſunt, angulos etiam equales habent: iam ſtatim poſterior huius propoſitionis pars, quod ſcilicet ſub baſi anguli inter ſe æquales ſint, manifeſta erit. Quòd deinde quantum ad partem priorē, ad baſim etiam poſiti anguli inter ſe equales ſint, ex cōmuni



illa noticia, Si ab æqualibus æqualia auferantur, & cæ. & id tandē manifeſtabitur. Conſtat itaque ſic tota propoſitio. Iſoſcelium igitur triangulorum: qui ad baſim ſunt anguli, inter ſe equales erunt. Productis item æqualibus lateribus: & qui ſub baſi anguli, inter ſe æquales erunt, quod demonſtrari oportuit.

SEQVITVR FIGVRA ALIA,



ΠΡΟΤΑΣΙΣ 6.


Εάν τριγώνου αἱ δύο γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις ᾿ωσι, καὶ αἱ ἐπὶ τὰς ἴσας γωνίας ἐπιτείνανται πλευραὶ, ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται.

PROPOSITIO VI.

Si trianguli duo anguli equales inter ſe fuerint; & ſub æqualibus angulis ſubtenſa latera, equalia inter ſe erunt.

Esto

Esto triangulum, cuius duo anguli sint inter se æquales: dico & latera illis equalibus angulis subtensa, inter se æqualia esse. Si enim non sunt equalia: erit alterum eorum longius, ab eo ergo quod est longius, breviori æquale auferatur, iuxta illum angulum, qui est alteri æqualis, incipiendo, & claudatur triangulum. Et quoniam



Vel



duo triangula, quæ nimirum latus, quod equis angulis interioret, commune habent, huiusmodi sunt, quæ lina propositio precedens quarta requirit, cum per hanc quartam, et basi basi, totum deinde triāgulum toti triangulo, ac reliqui anguli reli-

quis angulis equalis sint: partiale triangulum suo totali æquale erit, pars toti, quod est impossibile: partialis etiam angulus, ex communi illa noticia. Quæ uni sunt æqualia, & cæt. suo totali æqualis, quod & ipsum impossibile. Latus igitur unum alteri, propter hæc inconuenientia, non inæquale, sed æquale erit. Si igitur trianguli alicuius duo anguli equalis inter se fuerint, & horum equalium angulorum subtensa latera inter se æqualia erunt, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Ζ.

Ἐπί τῇ αὐτῇ ἑυθείᾳ, δυοὶ ταῖς αὐταῖς ἑυθείαις ἄλλαι δύο ἑυθεῖαι ἴσαι, ἑκατόβα ἑκατόβα, οὐ συσπθίσονται, πρὸς ἄλλω καὶ ἄλλω σημείῳ, ὑπὲρ τὰ αὐτὰ μέρη, τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσαι ταῖς ἐξ ἀρχῆς ἑυθείαις.

PROPOSITIO.


VII.

Super eadem recta, duabus eisdem rectis lineis aliæ duæ rectæ equalis, utraq; utriq; nō constituentur, ad aliud atq; aliud punctum, ad eadē partes, eosdemq; terminos cum duabus initio ductis rectis lineis habentes.

Sentētia est propositionis: Si super alicuius rectæ lineæ extremitatibus, à pūcto uno, extra lineā sumpto, duæ rectæ demissæ fuerint, quòd tū à puncto quodā alio, in eadē qua prius parte constituto, ad extremitates datæ, aliæ duæ rectæ, quæ essent priorib. ductis equalis, utraq; suæ cōterminali, demitti possint, hoc impossibile est. Si enim possibile, detur recta, à pūcto etiā extra datā sumpto, ad utranq; extremitatē recta linea ducat. Sumat deinde, ut ita aduersario, uel minus credēti, mos geratur, in eadem qua prius parte, punctum aliud, à quo & ipso duæ ad extremitates



Recta data.




Recta data.

datæ rectæ tandem demittentur lineæ. Et quia in hūc modum descripta figura, ex posterioribus una priorum unā secet aut non secet, utrum nunc contigerit, pūcta semper, per primū postulatū, recta quadā lineā coniungēda sunt. Quòd si una unā secet, cū hīc appareāt duo triāgula, quorū utrūq; isosceles, qui in isoscelium triāgulorū uno, per priorē partem quintæ, anguli sunt

inter se equalis, mox uni equalium unus angulus, quē nimirum habet à latere, additus, de altero uerò unus ablatu: qui sic ueniūt anguli inæquales, per eandem priorem quintæ partem, ratione alterius isoscelis, inter se equalis erunt. quod est impossibile. Esto autem nunc, quod non secet una unam, tum post punctorum coniunctionem, unius isoscelis triāguli equalia latera ultra basim producantur. Et quoniā qui, ex posteriore parte quintæ, anguli sunt inter se equalis, si uni unus additus, de altero uerò unus ablatu fuerit, ex priore parte eiusdem quintæ idem quod

quod prius inferri potest. Sequitur ergo nunc, quomocumq; hoc tentabitur, incassum laborari, cum nec intra nec extra demissas rectas punctū aliud sumi pos-



sit. Super eadē igitur recta, duabus eisdē rectis, & reli. quod demōstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Η.

Εὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς τῶν δύο πλευρῶν ἴσας ἔχῃ, ἑκατόβραμ ἑκατόβρα, ἔχῃ δὲ καὶ τὴν βάσιν τῆ βάσει ἴσων καὶ τὴν γωνίαν τῆ γωνία ἴσων ἔξῃ, τὴν ὑπὸ τῶ ἴσων ἐνθειῶν πόδιεχμένω.

PROPOSITIO VIII.


Si duo triangula duo latera duobus lateribus equalia habuerint, utru- que utriq; habuerint uero & basim basi equalem: & angulum angulo æ- qualem habebunt, eum qui sub equalibus lateribus comprehenditur.

Describantur huiusmodi duo triangula, qualia hæc propositio requirit: dico & angulos, qui sub æqualibus amborum triangulorum lateribus comprehenduntur, inter se equales esse. Colligit suam demonstrationem hæc propositio ex septima, ut



precedens sexta ex quinta, ab impos- sibili hoc modo. Superponat triangu- lum unum alteri, sic ut basis basim, la- tera etiam latera, unumquodq; suum equale, respiciant: ac posita basi super basi, una item extremitate unius in u- no, super una basis extremitate in tri-

angulo altero, cum ipse bases inter se sint, ex hypothesi, equales: duæ harum extre- mitates reliquæ coincident, atq; sic etiam ipsæ bases, cum alias, ubi uidelicet una ba- sis extra uel intra triangulū caderet, duæ rectæ lineæ superficiē clauderent, id quod per communem quandam notitiā fieri posse negatum est: cōgruunt igitur bases. Et quia bases congruunt: latera sic lateribus aut congruent, aut non. Si prius: & an- gulus angulo congruet, & ei equalis erit, quod erat demonstrandum. Esto uero quod non congruant latera basibus congruentibus, sed differant, hoc est, in diuer- sa puncta cadant, cum super unius rectæ extremitatibus duæ rectæ, ab uno pun-



cto deductæ, prius constitutæ sint, iam uerò aliæ duæ, su- per eisdem rectæ extremitatibus positæ, uersus eandem partem tendentes, in aliud punctum concurrant, contra propositionem præmissam septimam id agi manifestum est. id quod fieri non solet: cum uidelicet Geometre inde corum nimis atq; turpe esset, si demōstratæ antea propo- sitionis ueritatem & constantiam eandem non tueretur.

Propter illud igitur inconueniens, congruentibus basibus: et reliqua latera, cū sint, ex hypothesi, inter se æqualia, congruere; atq; sic angulos, quos dicta latera com-

prehendunt,

prehendunt, inter se æquales esse, necesse erit. Si igitur duo triàngula, duo latera duobus &cæ. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Θ.


Τὴν δοθεῖσαν γωνίαν ἐνθύγραμμον· δίχα τέμειν.

PROPOSITIO

IX.

Datum angulum rectilineum: bifariam secare.


Angulus rectilineus datus.



Sit angulus rectilineus datus, atq; propositum, eum bifariam secare. Officio igitur circini, ex rectis datum angulum continentibus, ab earum contactu incipiendo, portiones sumantur æquales: quarum fines deinde linea quadam recta, ut Isosceles triangulum fiat, iuncti, super illa, ex altera parte, triangulum æquilaterum constituant. Quod si tandem linea quadam recta alia angulus datus cum sibi opposito copuletur, propositioni iam satisfactum erit: id quod propositionis *ισοσκελων* & propositio octava manifestabunt.

ALIA DEMONSTRATIO HVIVS.

Sit angulus rectilineus datus, atq; propositum, eum bifariam secare. Signetur



igitur in uno anguli latere punctum aliquod, huic deinde portioni, que inter punctum hoc et angulum iacet, æqualis ab altero anguli latere, ab ipso angulo incipiendo, per propositionem tertiam auferatur, et connectantur harum portionum fines tertia quadam recta linea. Porro super hac tertia, ex altera parte, per primam propositionem huius, triangulo æquilatero constituto, angulis in super, quos hæc recta in diuersis triangulis subtendit, recta quadam linea alia iun-

ctis, confectum erit negocium, cum hæc ipsa recta angulum propositum bifariam secet: id quod, ut prius, ostendi poterit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

I.

Τὴν δοθεῖσαν ἐνθύγραμπεπερασμένην· δίχα τέμειν.


PROPOSITIO

X.

Datam rectam lineam terminatam: bifariam secare.

Sit recta linea terminata data, atq; propositum, eam bifariam secare. Super illa igitur triangulum æquilaterum constitutatur: angulo deinde, quem hæc recta terminata subtendit, linea quadam recta alia, per propositionem nonam præcedentem, bifariam diuiso, factum erit negocium. Nam quæ angulum, ea ipsa, continuata tamen, & terminatam rectam lineam datam bifariam secet: cuius quidem rei demonstratio, ipsa structura & propositio quarta erunt. Data igitur recta terminata linea, bifariam secata est: quod fieri oportuit.

SEQUITVR




ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΑ.

Τῆ δὲ θείσῃ ἰσθμείᾳ, ἀπὸ τοῦ πρὸς αὐτῇ δὲ θέντος σημείου, πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἐν
θείᾳ γραμμῇ ἀγαγεῖν.

PROPOSITIO XI.

Data recta linea, à puncto in ea dato, ad angulos rectos lineam rectam
excitare.


Sit recta linea data, in ea etiam punctum datum, atq; propositum, ex puncto hoc,
ipsius rectae lineae datae, lineam rectam ad rectos angulos educere. Signentur ex u-



traque parte puncti in linea, circini officio, aequales portiones. ex harum finibus dein-
de, circino prius ulterius expanso, duo circuli,
uel arcus tantum, circulorum loco, sese mutuo
secantes describantur. A' mutua tandem duo-
rum arcuum intersectione linea recta ad pun-
ctum in linea datum si demissa fuerit: illam de-
missam à puncto in linea ad rectos angulos e-
ducta esse, sic obtinebitur. Ducatur à commu-
ni arcuum intersectione ad utranque illorum cum
recta data intersectione, quaedam recta linea.

Et quoniam hic sunt duo triangula, qualia propositio octava praecedens requirit, cum
illi anguli, quos recta data, & quae ab arcuum intersectione demissa est linea, ἐφεξῆς
constituunt, per eandem octavam, aequales inter se sint, atq; ob id deinde recti, ex
definitione; haec demissa ad angulos rectoseducta erit, id quod fieri oportuit.

ALIA DEMONSTRATIO HVIVS.



Sit recta linea data, & quae sequuntur. Signentur
ex utraque parte puncti in linea aequales portiones,
una quidem ad placitum, altera uero per propositio-
nem tertiam praemissam. Super his deinde duabus
portionibus, tanquam una linea, triangulo aequila-
tero per propositionem primam constituto, ad angulum
quem haec tota subtendit, à puncto in linea sumpto,
recta quaedam linea ducatur. Erit autem haec recta, ea
quae petebatur, ad rectos scilicet angulos à puncto in

linea datoeducta: id quod, ut modo, mediante structura, ex propositione octava,
& definitione anguli recti, facile demonstrari poterit.


Ἐπὶ τῇ δοθείσῃ ἐνθεῖα ἀπειροῦ, ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου, ὃ μὴ ἐστὶ ἐν αὐτῇ, ἡθέρμινθεῖα γραμμὴ ἀγαγῆναι.

PROPOSITIO

XII.

Super datam rectam lineam infinitam: à dato puncto quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere.

Sit recta linea satis longa data, extra eam etiam punctum datum, atq; propositum, à puncto super rectam, perpendicularem rectam lineam demittere. Suscipiatur ex alterutra parte rectæ, per punctum diuisæ, punctum aliud, utcunq; ac centro quidem, puncto dato: interuallo uerò eo, quod à duobus punctis intercipitur, circulus, per 3 postulatum describatur. Vel, Ex puncto dato describatur primò circulus tātus, ut rectam datam in duobus locis intersecet, à quo eodem puncto deinde ad intersectionū loca duabus rectis lineis ductis, secetur uel angulus ad centrum, quem hæc duæ rectæ includunt: per nonam, uel latus eundem angulum subtendens, si magis placet: per propositionē




10, bifariam. Dico ergo quod hæc, uel angulū uel latus, secans linea, ea sit quæ petitur. Quoniam enim ad rectam hanc, quæ datæ rectæ insistit, angulos æquales esse ipsa κατὰ σκευή, et propositio 4, si angulus: uel & propositio 8, si linea data, seu latus bifariam diuisum fuerit, demonstrabūt. Et quoniam sunt anguli deinceps se habentes, Quando autem recta rectæ insistens, deinceps se habentes angulos

æquales inter se fecerit: uterq; æqualium angulorum ex definitione, rectus est, ac insistens, Perpendicularis uocatur, cum hæc recta ex puncto etiam dato procedat, propositioni iam satisfactū erit. Super datā igitur rectam lineā satis longā, à dato puncto quod in ea non erat, Perpendicularis educta est, quod fieri oportuit.

ALIVS MODVS DVCENDI

perpendicularem lineam,





Est & tertius modus ducendī perpendicularē lineam, ex prima parte propositionis 31, tertij libri sequentis desumptus, eò spectans, si quando fortè ab alicuius rectæ extremitate ea ducenda esset. Huius itaque delineationem huc ponere libuit, maxime ob id, quod præter hos modos, non puto præterea alium esse modum erigendī perpendicularē lineam.



APPENDIX.

Ex præmissis duabus propositionibus discetur, quomodo triangulum orthogonium formari debeat. Posteaquam enim perpendicularis ad rectam ducta est, si deinde

deinde huius extremitas, uel punctum aliquod in ea, cum data recta, uel similiter eius puncto aliquo, coniungatur: triangulum rectangulum descriptum erit, sic:



De Obtusiangulo autem & Acutiangulo, quomodo formentur, si illorum angulos, à quibus denominata sunt, quis animaduertit, non erit laboriosum facere, cum nullam singularem industriam hæ delineationes requirant, id quod ex sequenti cuiusque descriptione apparet.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΓ.


Ὡς ἂν ἑνὴν ἐπ' ἑνὴν καθέισα, γωνίας ποιῆ, ἢ ἑρὶ δύο ὀρθὰς, ἢ διὰ ἑρὶ ὀρθῶν ἴσας ποιήσῃ.

PROPOSITIO

XIII.

Cū recta linea super rectam consistens lineā, angulos fecerit: aut duos rectos, aut duobus rectis æquales faciet.


Consistat recta super rectam lineam, angulos faciens: dico illos esse, aut utrumque rectum, aut ambos simul duobus rectis æquales. Nam linea insistens rectæ aliæ, faciet deinceps se habentes angulos aut inter se æquales, aut uerò inæquales. Quod



si æquales: uterque ex definitione, rectus erit, id quod uult propositio. Sin uero inæquales, quia tamen unus tanto intervallo rectum excedit, quanto alter recto minor est (id quod linea à puncto in recta sumpto, πρὸς ὀρθὰς educta monstrabit) propter excessus & defectus æqualitatem, iam hi duo anguli, licet non recti per se, tamen duobus rectis æquales sunt, id quod & ipsum habet propositio. Vnde sic patet ipsa tota. Si recta igitur linea super rectam consistens lineam angulos fecerit, aut duos rectos, aut duobus rectis angulis æquales faciet: quod demonstrasse oportuit,

dicitur, Aut duobus rectis æquales, demonstratio.

Quòd si recta insistentes rectæ aliæ, angulos deinceps se habentes inæquales fecerit, tñ ex cõmuni linearum contactu, tanquã ex puncto in linea dato, per propositionẽ 11 huius, ad angulos rectos linea excitetur. Et quoniam ex utraq; parte semper unus



angulus, hic quidem per lineam πρὸς ὀρθῶς ductam: illic uero, per alteram insistentem, in duos angulos diuisus est: singuli duo partiales suo totali angulo æquales erunt. atq; his deinde illis æqualibus additis, sic ut duo uni, & unus duobus angulis accedat: tres anguli tribus æquales erunt, uno tandem

communi angulo, qui nimirum sub perpendiculari & alia insistente comprehenditur, hic & illic ablato: duo anguli duobus æquales erunt. Quia autem duo ex una parte recti sunt: ex altera parte duo, quos nimirum recta, non ad rectos angulos ducta, & ea cui insistit, comprehendunt, duobus rectis angulis æquales erunt. Si recta igitur linea super rectã cõsistens angulos fecerit, &cet. quod demonstrari oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΑ.



Ἐὰν πρὸς πνι ἐυθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ δύο ἐυθείαι μὴ πῶδι τὰ αὐτὰ μέρη κείμεναι, τὰς ἐφεξῆς γωνίας δυοῖν ὀρθῶς ἴσας ποιῶσιν, ἐπ' ἐυθείας ἴσονται ἀλλήλαις αὐ ἐυθείαι.

PROPOSITIO

XIIII.

Si ad aliquam rectam lineam, atq; ad eius punctum duæ rectæ lineæ, nō ad easdem partes ductæ, deinceps se habentes angulos duobus rectis æquales fecerint: in directum erunt inter se ipsæ rectæ lineæ.

Sit quædam recta linea, ad eius etiam unum aliquod punctum, duæ rectæ lineæ non ad easdem partes ductæ, sic tamen, ut cum priorī recta, angulos duobus rectis æquales faciant: dico quòd, quæ ad punctũ sunt ductæ rectæ lineæ, ad amussim una alteri iuncta sit. Colligit suam demonstrationem hæc propositio ex propositio-



ne 13 præcedenti ab impossibili, sic. Nisi enim hæ duæ rectæ, ad punctum prioris rectæ sic ductæ, una linea sint, si forte ab aliquo minus credente, atq; subtili nimis homine, una ductarũ suo modo secundum continuationem in rectum eiecta fuerit, per præcedentem 13, & illam deinde communem noticiam, Si ab æqualibus æqualia, uel aliquod commune (quod idem est) subtrahatur, &cæ. inferri posset, partiale æqualem esse angulo suo totali. Sed quia hoc est contra rationem & noticiam quãdam communem, quæ sonat. Totum esse qualibet sua parte maius. Non igitur continuari potest iuxta hoc punctũ in directũ aliter, neq; illa, cum qua iam hoc tẽtatũ est, neq; etiã ducta recta altera: quare hæ duæ in directũ iunctæ sunt, Si ad aliquã igitur

igitur rectam lineam, atq; ad eius punctum, duæ rectæ lineæ, non ad easdem partes ductæ, deinceps se habentes &cæ. quod demonstrari oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΕ.

Ἐὰν δύο ἐπιπέδαι τέμνωσι ἀλλήλας· τὰς ἐπὶ κορυφῶν γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιήσουσι.

ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ

XV.

Si duæ rectæ lineæ sese mutuo secuerint: ad uerticem angulos æquales inter se faciunt.

Sint duæ rectæ lineæ sese mutuo secantes: dico, quòd angulī ad uerticem sint inter se æquales. Est huius propositionis demonstratio, propositio 13 præcedens, cū per eam recta rectæ lineæ insistsens, semper duos angulos aut rectos, aut duobus re-




ctis æquales faciat. Quare hac propositione bis usurpata, Cum quæ unī equalia: illa & inter se equalia sint, communi angulo ab his equalibus ablato: angulī tandem ἐπὶ κορυφῶν æquales manebūt. Si duæ igitur rectæ lineæ sese mutuo secuerint: ad uerticem angulos æquales inter se faciunt, quod demonstrasse oportuit.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Ἐκ δὲ τούτου φανερόν· Ὅτι καὶ ὅσαι δὴ ποτ' οὐρ ἐπιπέδαι τέμνωσι ἀλλήλας· τὰς πρὸς τῇ γωνίᾳ τετράσιμ ὀρθαῖς ἴσας ποιήσουσι.

COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, Quotquot rectas lineas, in eodē plano sese mutuo interfecantes: angulos efficere quatuor rectis æquales.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΣ.

Πάντες τριγώνου μιᾶς τῶν πλευρῶν ἐκβληθείσης, ἢ ἐκῆς γωνία ἐξωτερῶς τῶν ἄλλων, καὶ ἀπεναντίου, μείζων ἐστίν.


ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ

XVI.

Omni triangulī uno latere producto: externus angulus utroq; interno, & opposito, maior est.

Sit triāgulum, productum etiam ulterius unum eius latus: dico, qui sic fit externus angulus, eum utroq; interno, & ex opposito constituto, maiorem esse. Secentur duo latera triangulī, quæ sunt ad angulū externū, bifariam, deinde per diuisionū puncta, ab angulis, quos hæc eadem latera subtendunt, lineæ rectæ ultra triangulū ducantur,

ducantur, sic, ut utriusque externa, suæ sit internæ portioni equalis. Extremitatibus



tandem harum rectarum cum puncto, quod est duarum diuisarum communis terminus, duabus rectis lineis cōnexis, demonstrationis figura parata erit. Quia nunc diligenter perspecta, propositionum decimæ quintæ & quartæ memor, rem ita se se habere facile perspiciet.


ADMONITIO.

Oportet autem, ut pro utroque interno & opposito angulo, quo nimirum externus maior esse demonstrari debeat, duo partialia triangula sumantur, quorum alterum quidem angulum illum, de quo agitur, integrum habet: alterum deinde, quod huic ad uerticem iunctum est, tum demum propositionibus allegatis res successum habebit, quod indicare necesse erat.

SEQVITVR GEOMETRICA FIGVRA

alia, pro triangulo

orthogonio & isos. oxygonio & æquilat. amblygonio & scaleno.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΖ.

Παίνρς τριγώνου, αι δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν ἑλασσονίς εἰσι, πάντῃ μεταλαμβανόμεναι.


PROPOSITIO

XVII.

Omnis trianguli, duo anguli duobus rectis minores sunt, omnifariam sumpti.

Proposito triângulo qualicūque: dico, quoslibet eius duos angulos, duobus rectis minores esse. Producat quoduis eius unū latus ulterius. Et quoniã ex iam præmissa 16 propositione, angulus externus utroque interno & opposito maior est, & rursus quoniam ex communi quadam notitiã, Si inæqualibus aequalia, uel aliquod commune adiectū fuerit, ipsa tota inæqualia sunt: priorū inæqualiū utriusque angulus, qui est externo

est externo $\epsilon\phi\epsilon\eta\varsigma$ adiectus, & tota tandem inter se inæqualia esse conueniet: atque illud quidem maius, ubi scilicet est externus angulus: alterum uerò, duo nimi-



rum interni anguli, minus. Maius autem, cum ex propositione 13, duobus rectis angulis æquale sit: alterum nunc, ut qui sunt duo interni anguli, propter angustiam, duobus rectis angulis minus erit. Et quoniam hoc nunc de duobus ad placitum sumptis angulis, quod ipsi duobus rectis minores sint, demonstratum est: de singulis duobus amplius nullum dubium erit, quin & ipsi duobus rectis minores sint, subinde tamen alio atque alio latere ulterius producto. Omnis igitur trianguli duo anguli, & quæ sequuntur, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΗ.


Πάντος τριγώνου, ἢ μείζωρ πλευρὰ τὴν μείζονα γωνίαν ἔπωτίνει.

PROPOSITIO

XVIII.

Omnis trianguli, longius latus ampliolem angulum subtendit.

Sententia est propositionis. Quod latus alicuius trianguli est longius: illius etiã angulum quem subtendit, breuioris subtendentis angulo ampliolem esse. Describatur igitur triangulum, duum æqualiũ, uel trium inæqualium laterum: dico quòd, cuius anguli est latus longius, illum etiã ampliolem esse. Duorum angulorũ latera, ergo amplior angulus.



cum ex hypothesi, unum eorum longius, alterũ uero breuius sit, abscindatur de longiori, per propositionẽ 3 huius, portio breuiori æqualis, ac triangulo formato, demonstratio ex propositionibus 5 et 16 præmissis sic colligetur. Quo-

niam formatũ triangulũ cum sit ex structura Isosceles: erunt ipsius ad basim anguli inter se æquales. sed quia unus horũ æqualiũ, est alterius cuiusdã triãguli externus, unde sic utroque interno eiusdẽ triãguli & opposito, maior: & alter æqualium eodẽ interno angulo maior erit. Alter autem cum sit eius, quem longius latus subtendit anguli pars, internus uerò is qui à breuiori latere subtenditur, argumento à maiori uel fortiori sumpto, si pars maior illo est: multo fortius igitur ipsum totum. Omnis igitur trianguli, longius latus ampliolem angulum subtendit: quod demonstrari oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΘ.

Πάντος τριγώνου, ἔπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ἢ μείζωρ πλευρὰ ἔπωτίνει.


PROPOSITIO

XIX.

Omnis trianguli, amplior angulus sub longiori latere subtenditur.

N Sententia

Sententia est propositionis. Qui angulus alicuius trianguli est amplior: illius etiam subtensum latus angustiorẽ angulum subtendente latere longius esse. Nam



si non fuerit longius illud, de quo dicitur, latus, erit id reliquorũ unũ aut equale, aut uno brevius. Quod si unũ equale fuerit: angulus quem subtendit, atq; amplior est, ex hypothesi, ex priore parte propositionis, si

bi alium æqualem angulum habebit: nõ ergo amplior. Quod si uerò uno brevius, cum latus longius, ex precedente, ampliorem angulum subtendat: angulus qui positus est amplior, iã uno eorũ, illo scilicet cuius longius est subtensum latus, angustior erit. Sed quia non est: neq; etiam eius latus alio brevius erit: longius ergo. In omni igitur triangulo amplior angulus longius latus requirit, seu sub longiori latere subtenditur, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Κ.


Πάντες τριγώνου · αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονος εἰσι, πάντη μεταλαμβανόμεναι.

PROPOSITIO

XX.

Omnis trianguli, duo latera reliquo longiora sunt, omnifariã sumpta.


Esto triangulum qualecunq; dico, quod eius qualitercunq; sumpta duo latera simul, tertio reliquo longiora sint. Horum duorum laterum, quæ demonstrari debent, quod tertio reliquo longiora sint, unum ad longitudinem lateris alterius, ex il-



la parte ubi est communis eorum copula, ultra triangulum continuatur, quæ deinde hæc duo æqualia, uel hæc duæ æquales rectæ lineæ comprehendunt angulum, is tertiam quadam lineam rectam, ut triagulum fiat, claudatur. Et

quoniam illi duo anguli, qui ratione trianguli isoscelis, ex priore parte quinte, inter se æquales sunt, mox ubi unũ eorum, partiali nimirum, altera pars accessit: totus nũc altero æqualiũ maior erit. Sed quoniã qui maior & amplior est in triangulo angulus, longiorẽ ex propositione 19 subtensam requirit: illa etiã quæ ex duobus dati trianguli lateribus cõtinuata est, ea linea, id est, tertio reliquo latere longior erit. Omnis igitur trianguli duo latera reliquo longiora sunt, omnifariam sumpta, quod demonstrasse oportuit.

SEQUITVR FIGVRA GENERALIS PRO
singulis binis lateribus exposita,



ΠΡΟΤΑΣΙΣ


Εὰν τριγώνου ὑπὸ μιᾶς τῶν πλευρῶν ἀπὸ τῶν πόρᾶτων δύο εὐθείαι ἐν ῥῶσιν
σταθῶσιν· αἱ συσταθείσαι τῶν λοιπῶν γῶν τριγώνου δύο πλευρῶν ἐλαττονεσ μὲν
ἴσονται, μείζονα δὲ γωνίαν ποδὲξουσιν.

PROPOSITIO


XXI.

Si super trianguli uno latere ab extremitatibus duæ rectæ lineæ interi-
us constitutæ fuerint : hæ constitutæ reliquis trianguli duobus lateribus
breuiores quidem erunt, ampliozem autem angulum comprehendent.

Esto triangulum, duæ etiã rectæ lineæ, in ipso concurrentes, super unius lateris
extremitatibus constitutæ: dico, quòd constitutæ hæ reliquis duobus trianguli la-
teribus breuiores sint, ampliozem autem angulũ
comprehendunt. Sunt huius propositionis duæ
partes. Prior, quòd interiores duæ rectæ exteri-
oribus breuiores sint, id quòd patet ex præcedenti
bis usurpata, cum per eam, duo quælibet latera
uniuscuiusque trianguli, tertio longiora sint, &
communi tandem illa notitia, Si ab æqualibus æ-
qualia, uel aliquòd commune, subtrahatur &cæ.



Oportet tamen, ut prius ex interioribus lineis alterutra in continuum et rectum, ad
latus usque exterius producat, utq; triangula illa duo partialia, quorum unius
quidem unum latus, linea exterior: alterius uero trianguli unum, alterius exteri-
oris lineæ pars, latus unum fuerit, sumantur, & suc-
cedet demonstratio. Posterior nunc, quòd angu-
lus sub interioribus eo, quem exteriores rectæ li-
neæ comprehendunt, maior sit, ex propositione
16, & illa bis usurpata, uera esse cõuincitur. Super
uno igit̃ alicuius trianguli latere ad extremitates
eius duæ rectæ interioris cõstitutæ: reliquis duobus
trianguli lateribus breuiores quidem sunt, ampli-
orem autem angulum comprehendunt, quòd demonstrasse oportuit.



ALIA PRIORIS PARTIS DEMONSTRATIO.

Vsurpatis triangulis partialibus, quæ prius. Et quoniam, ex præcedenti 20, duo
quælibet latera omnis trianguli, tertio latere longiora sunt, & quoniam etiã, In
æqualibus æqualia si adiiciantur: tota, ex communi quadã notitia, inæqualia sunt,
utroq; bis (uno tamen post alterum) usurpato, per id demũ quòd dicitur, Longo
breuius, longiore multo fortius breuius esse, argumento nimirum à maiori sumpto,
concluditur tandẽ propositum, Interiores scilicet duas exterioribus duabus, siqui-
dem secundum propositionis hypotheses constitutæ sint, breuiores esse, quòd de-
monstrari oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΚΒ.

Εκ τριῶν εὐθεῶν, αἱ εἰσιρῖσαι τρισὶ ταῖς δὲθεῖσαι εὐθείαις, τριγώνου συστήσασθαι.
Δεῖ δὲ τὰς δύο τῶν λοιπῶν μείζονας εἶναι, πάντη μεταλαμβανομένας, ὅτι
ῥῶσιν καὶ παντὸς τριγώνου τὰς δύο πλευρὰς, τῶν λοιπῶν μείζονας εἶναι, πάντη
μεταλαμβανομένας.

PROPOSITIO


XXII.

Ex tribus rectis lineis, quæ sunt tribus datis rectis lineis equales, trian-
gulum constituere.

Oportet autem duas reliqua longiores esse, omnifariam sumptas, propterea quòd uniuscuiusq; triànguli duo latera, reliquo longiora esse oporteat, omnifariam sumpta.

Datis tribus rectis lineis, quarum quæq; duæ reliqua tertia longiores sint, propositum est, ex alijs tribus rectis, quæ sunt datis tribus æquales, triangulum constituere. Ducatur igitur linea recta satis longa, ut quæ propositas rectas, ad amussim cõ-


Tres rectæ daræ.



tinuatas, longitudine excedat. Hoc facto, portiones in ea, tribus datis rectis, singulae singulis, æquales, ordine quo maxime placuerit, per 3 propositionem huius, separatim punctis signentur, ex pñctis deinde duobus intermedijs, tanquam ex duobus centris, secundum extremarum portionum quantitates seu intervalla, duo circuli describantur, atq; à puncto tandem intersectionis ad dicta centra duabus rectis lineis ductis, propositioni satisfactum erit, ut quidem hoc ex definitione circuli & illa communi notitia, Eidem æqualia, & inter se sunt æqualia, facile colligetur. Ex tribus igitur rectis lineis, quæ sunt tribus datis rectis lineis æquales, triangulum constitutum est, quod fecisse oportuit.

ALIA GEOMETRICA FIGVRA, PRO
triangulo scaleno constituendo.

Tres rectæ daræ.



APPENDIX.

Ex hac propositione addiscuntur trium triangulorū, Aequilateri scilicet, Isoscelis & Scaleni, delineationes: cum prima unius tantum, Aequilateri scilicet, formati onem nobis proposuerit. Habentur ergo sic omnium triangulorum delineationes, hic quidem.

hic quidem, eorum qui secundum diuersitatem laterum nomina sua sortiuntur: illi uerò, nimirum circa 11 & 12 propositiones, ubi de Perpendiculari ducenda sermo erat, prout considerantur hæc, & nomina sua habent ab angulis, quod obiter dicere uolui.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΓ.

Πρὸς τῆ δὲθείσῃ ἐυθείᾳ, καὶ τῷ πρὸς αὐτῆ σημείῳ, τῆ δὲθείσῃ γωνίᾳ ἐυθύγραμμῳ, ἴσῳ γωνίᾳ ἐυθύγραμμο συστήσασθαι.

PROPOSITIO XXIII.

Ad datam rectam lineam, datumque in ea punctum, dato angulo rectilineo, æqualem angulum rectilineum constituere.

Sit recta linea data, punctum etiam in ea datum: sitque deinde & angulus quidam rectilineus datus, atque propositum, ad id punctum ad hanc item rectam lineam, dato rectilineo æqualem rectilineum angulum constituere. Subtendatur primò dato angulo recta quædam linea, quomodocunque hoc fiat, ut appareat triangulum, ad



Angulus rectilineus datus

datam rectam deinde, secundum quantitatem trium rectarum, quæ sunt tribus formati iam trianguli lateribus æquales, triangulum, per propositionem 22 præmissam, constituatur, sic tamen, ut quæ datum angulum comprehendunt latera, eorum portiones uel lineæ æquales, in data recta iuxta punctum signentur, et factum erit. Colligitur autem huius rei demonstratio ex structura, communi illa noticia, Eidem æqualia, & inter se sunt æqualia, propositione tandem octaua huius, quod indicandum erat. Ad datam igitur rectam lineam, datumque in ea punctum dato angulo rectilineo, æqualis angulus rectilineus constitutus est. quod fieri oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΔ.

Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς τῶν δύο πλὴν τῆς ἰσῆς ἔχῃ, ἡγετοῦρα ἡγετοῦρα, τὴν δὲ γωνίαν ᾗ γωνίας μείζονα ἔχῃ, τὴν ὑπὸ τῆ ἴσων ἐυθειῶν περιεχομένην καὶ τὴν βάσιν ᾗ βάσεως μείζονα ἔξει.

PROPOSITIO XXIII.


Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, utrumque utriusque, habuerint uerò angulum angulo ampliolem, eum qui sub æqualibus rectis comprehenditur: & basim basi longiorem habebunt.

Sint huiusmodi qualia hæc propositio requirit, duo triagula: dico basim illius trianguli, quod sub æqualibus rectis ampliolem comprehendit angulum, alterius trianguli basi longiorem esse. Cum enim, ex hypothesi, angulus inter æqualia latera in


uno amplior sit angulo, itidem inter æqualia latera, in triangulo altero, ille qui mi-

amplior

angustior




nor est, per propositionem 23 præcedentē, ut sit ampliori angulo æqualis, augeatur, ab angulo lineam, proximæ rectæ æqualem, educendo. Huic deinde angulo



totali iam factō, recta linea subtensa: erit triangulum hoc, per propositionem 4, alijs posito æquale. Formetur nunc triangulum aliud, duas æquales rectas suis extremitatibus recta quadam linea coniungendo. Et quia triangulum, exstructura, est Isoleles: erunt anguli ad basim, ex priori parte propositionis quintæ, inter se æquales. Per additionem nunc & subtractionē angulorum qui his æqualibus angulis adherent, cum ex decima nona ampliori angulo longius latus subtendatur, propositum tandem, ubi æqualis pro æquali linea sumitur, inferri poterit: Amplioris scilicet anguli in uno, basim longiorem esse, quàm sit basis in altero triângulo anguli

angustioris, quod demonstrasse oportuit.

SEQUITVR FIGVRA PRO TRIANGVLIS TRIBUS exposita, necnon ex tertio Euclidis libro desumpta,



APPENDIX.

Potuisset etiam e contrario, maior angulus, in structura, & id per propositionem uigesimam

trigesimam tertiam præcedentem, ad æqualitatem minoris formari, & idem fuisset.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΚΕ.


Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχῃ, ἑκατέρωθεν ἑκατέρωθεν, τὴν βάσιν δὲ τῆς βάσεως μείζονα ἔχῃ· ἢ τὴν γωνίαν τῆς γωνίας μείζονα ἔξῃ, τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων ἐνθῶν περιεχμίνω.

ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ

XXV.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus equalia habuerint, utrumque utrique, habuerint uerò basim basi longiorem: & angulum angulo ampliorem habebunt, eum quem æquales rectæ lineæ comprehendunt.

Sint huiusmodi, qualia hæc propositio requirit, duo triangula: dico, cuius trian-



guli basis est longior, illius etiam angulum, quem æquales rectæ comprehendunt, ampliorem esse. Nam æquales ne sint anguli, uetat hoc propositio 4, cum sic & bases, per eam, contra hypothesis, inter se æquales esse deberent. Ampliorem deinde positum angustiore minorem, uel contra, Angustiore positum ampliorem esse maiorem, per propositionem præcedentem non admittitur. Quare ampliorem positum in uno, pro-

pter longiorē basim, illo in triangulo altero, cuius est basis breuior, ampliorem esse necesse est, quod demonstrari oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΚΣ.


Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο γωνίας ταῖς δυσὶ γωνίαις ἴσας ἔχῃ, ἑκατέρωθεν ἑκατέρωθεν, καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσω, ἢ τὴν πρὸς ταῖς ἴσαις γωνίαις, ἢ τὴν ὑποτείνουσαν ὑπὸ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν· καὶ τὰς λοιπὰς πλευρὰς ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἔξει, ἑκατέρωθεν ἑκατέρωθεν, ἔτι τὴν λοιπὴν γωνίαν τῆς λοιπῆς γωνίας.

ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ


XXVI.

Si duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habuerint, utrumque utriusque, unūque latus uni lateri æquale, siue id quod est inter æquales illos angulos, seu quod uni equalium angulorum subtenditur: & reliqua latera reliquis lateribus æqualia, utrumque utriusque, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt.

Sint huiusmodi, qualia hæc propositio requirit, duo triangula, ubi scilicet duo




latus æquale



huic

anguli unius, duobus angulis alterius sint æquales, latus item unius unū, lateri unī alterius

alterius trianguli, siue id quod equalibus angulis interijcitur, siue reliquorum alterum fuerit, æquale: dico quòd & reliqua latera reliquis lateribus, utrunq; utriq; atque etiã reliquus angulus reliquo angulo æqualis sit. Quantũ ad primum, ubi scilicet equalis latus equalibus angulis interiectum est, si alterutrum ex reliquis non concedatur suo correspondenti lateri in altero triangulo esse equalis, ut ei in equalis sit, certe concedendum erit. à longiori igitur (ut quidem suo modo fieri poterit) ex parte reliqui tertij anguli, per propositionem tertiam, portio, breviori lateri equalis, abscindatur: & à puncto tãdem sectionis ad angulum cui hoc latus subtensum est, linea recta ducatur. Describitur autem sic triangulum quoddam parziale aliud, quod, quia suo totali triangulo superponitur, per propositionem deinde quartã, alij posito triangulo equalis est, inferitur tandem per illam communem noticiã, Quæ uni equalia &c. partialẽ angulum suo totali, uel contrã, totalẽ suo partiali angulo esse equalis, quod est impossibile. Alterum igitur reliquum latus in uno, alteri reliquo lateri in triangulo altero equalis est. Quoniam autem iam duo sunt quartæ propositionis triangula, cum tertium latus, per hanc quartam, tertio equalis sit: reliqua duo latera reliquis duobus lateribus, utrunq; utriq; ut inferitur, equalia erunt. Quantum ad secundum, ubi equalis latus uni equalium angulorum subtenditur: & hic reliqua duo latera & angulus in uno, reliquis duobus lateribus & angulo in triangulo altero equalia esse colligetur. Quod si concedatur, non erit opus ullam demonstrationem adducere. Sin minus, erit alterutrum è duobus in uno, suo correspondenti lateri in altero triangulo longius: quod & ipsum, sicut in priori parte huius factũ, ad equalitatem alterius si ponatur, atq; deinde triangulũ formetur, contra propositionem decimam sextam, quarta tamen prius usurpata, angulũ externum suo



interno opposito equalẽ esse, ei qui hoc contradicit, obijciẽt. Quare qua sanẽ ratione, quantũ ad latera, contrariũ quis inferre tentauerit, irridendũ se exponet. Quòd præterea & angulus reliquus reliquo angulo sit equalis, id ex propositione 4 uel habetur. Si igitur duo triangula duos angulos duobus angulis equalis habuerint, utrunq; utriq; unumq; latus, uni lateri, & reliqua, quod demonstrasse oportuit.

A D M O N I T I O.

Necessẽ autem uidetur, ut primò quidem ea, quæ inter æquales angulos posita sunt, latera, equalia inter se esse, atq; tum demum reliquorum duorum laterum, angulos nimirum equalis subtendentium, æqualitas demonstretur. Nam aliàs, si forte hæc quæ equalis angulos subtendunt latera, primò equalia inter se esse demonstrare quis conaretur, res fortẽ tardius successura esset: id quòd obiter duxi indicandum. Idem ferè usuuenit in propositione septima libri sexti, ubi non duorum reliquorum, hoc est tertiorum in triangulis angulorum, uerũ eorum qui inter proportionalia latera positi sunt, angulorum æqualitas, primò demonstranda est.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΚΖ.

Ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπιπῆσιν, τὰς ἐναλλὰξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῆ· πρῶτῃ αὐτῶν ἴσονται ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι.


P R O P O S I T I O

XXVII.

Si in duas rectas recta linea incidens, alternatim angulos æquales inter se fecerit: parallelæ erunt inter se ipsæ rectæ lineæ.

Cadat

Cadat in duas rectas recta linea alia, esto etiam quod anguli qui sic fiunt alternatim, sint inter se æquales: dico has duas rectas inter se parallelas esse. Nam si non:



productæ hæc et continuatæ, in aliqua parte concurrent, unde sic angulus externus formati trianguli, per propositionem 16, interno opposito æqualis. Hoc autem quia est contra propositionis hypothesim, non concurrunt ergo. Quæ autem

in eodem plano existentes rectæ lineæ, in neutra parte concurrunt, si eiectæ & continuatæ fuerint, cum, ex definitione, parallelæ sint: parallelæ sunt & istæ ductæ. Si in duas igitur rectas recta linea incidens alternatim angulos æquales inter se fecerit: parallelæ erunt inter se ipsæ rectæ lineæ: quod demonstrasse oportuit.

DEFINITIO ANGVLORVM ΕΝΑΛΛΑΞ.

Porro anguli $\gamma\alpha\lambda\lambda\alpha\zeta$ positi, quos Alternatim uertimus, sunt, quos incidens recta cum rectis datis interius, in diuersis partibus, atq; ex opposito constituit & comprehendit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΚΗ.


Εὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπιπῆσῃ, πῶν ἐκῆς γωνίαρ τῆ ἐνῆς ἐῖ ἀπὸ αὐτῶν, καὶ ὑπὸ τὰ αὐτὰ μέρη ἴσω ποιῆ, ἢ τὰς ἐνῆς καὶ ὑπὸ τὰ αὐτὰ μέρη δύο σὺν ὀρθαῖς ἴσας ποιῆ· παράλληλοι ἔσονται ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι.

ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ

XXVIII.

Si in duas rectas recta linea incidens, externum angulū interno & opposito, & ad easdem partes æqualem fecerit, aut internos & ad easdem partes duobus rectis æquales: parallelæ erunt inter se ipsæ rectæ lineæ.

Habet hæc propositio duas partes, quarum utraq; ex sua propria hypothesi, duas illas lineas, in quas nimirum tertia cadit, parallelas esse infert. Prior autem patet ex precedenti, angulis, qui per propositionem 15 inter se sunt æquales, inter se mutatis. Posterioris nunc demonstratio sic habetur. Quoniam enim recta rectæ insistens aliæ, et angulos faciens, ex propositione 13 aut duos rectos, aut duobus rectis æqua-



les angulos facit, & quoniam etiam, ex presenti hypothesi, interni illi qui ad easdem partes sunt anguli, duobus rectis æquales sunt, cum: ã illi duo, quos nimirum incidens cum alterutra rectarū facit, quàm etiam hi, qui interius ex una & eadē parte appareāt anguli, duobus rectis, tanquā unī cui-dam æquales sint: ex cōmuni quadā noticia, & illi duo his duobus angulis æquales erūt: atq; de utroque deinde, eo angulo, quem hæc duo æqualia cō-

munem habent, subtractio: & qui relinquuntur anguli, ex cōmuni quadā noticia, inter se æquales erunt. Quia autem reliqui hi aut $\gamma\alpha\lambda\lambda\alpha\zeta$ anguli sunt, aut uerò ad easdem partes unus externus & alter internus oppositus, si $\gamma\alpha\lambda\lambda\alpha\zeta$ fuerint: ex precedenti 27: si uerò unus externus, alter internus, ex priore parte propositionis huius, tandem concluditur propositum, has scilicet rectas, in quas alia eo modo, ut dictum est, cadit, parallelas esse. Si igitur in duas rectas recta linea incidens, externum angulum interno, & opposito, & ad easdem partes æqualem fecerit: aut internos & ad easdem partes, duobus rectis æquales: parallelæ erunt inter se hæc duæ rectæ lineæ, quod demonstrasse oportuit.

○

ΠΡΟΤΑΣΙΣ


Ἡ εἰς τὰς παραλλήλους ἐυθείας ἐυθεία ἐμπιπύουσα· τάσ τε ζῆναλλάξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιέι· καὶ τὴν ἐνῆς τῆ ἐνῆς καὶ ἀπεναντίου, καὶ ὑπὸ τὰ αὐτὰ μέρη ἴσων· καὶ τὰς ἐνῆς, καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, δύσιν ὀρθαῖς ἴσας.

ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ

XXIX.

In parallelas rectas recta linea incidens: et alternatim angulos inter se æquales efficit: & externum interno & opposito, & ad easdem partes æqualem: & internos, & ad easdem partes, duobus rectis æquales facit.

Sunt huius propositionis partes tres, quarum singulæ parallelas rectas líneas, & rectam deinde aliam, quæ in illas parallelas utcunq; cadat, requirunt. Hinc itaq; prima quidem pars, angulos alternatim positos æquales: secunda uerò, externum interno, & opposito atq; ad easdem partes, æqualem: tertia autem, ipsos internos ad easdem partes, duobus rectis angulis æquales esse asserit. Prima pars ab impossibili sic patet. Esto enim quòd anguli $\gamma\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}\xi$ sint inter se inæquales. Et quoniã in-



æquales sunt anguli $\gamma\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}\xi$, alter nimirum altero amplior, angulo igitur eo qui ampliori est ἐφεξῆς, ex æquo inæqualibus illis angulis addito: & ipsa tota, ex cõmuni quadam noticia, inter se æqualia erunt. Quia autem unũ eorum, maius scilicet, per propositionem 13, duobus rectis est æqualis, alterum quod minus est, duobus rectis angulis minus erit: ex illa igitur parte ubi mi-

nores duobus rectis sunt anguli, hæ duæ rectæ, ex communi quadam noticia concurrent. Non concurrent autem, cum sint ex hypothesi, rectæ parallelæ: neq; anguli etiam illi $\gamma\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}\xi$ inæquales inter se erunt: æquales igitur eos esse, ut prima pars asserit, concedendum est. Quo nunc concessò, cum per propositionem 15 ad uerticem anguli sint inter se æquales, equali nunc pro equali angulo sumpto, uel illa cõmuni noticia, Quæ eidem æqualia, & inter se equalia sunt: etiam angulus externus interno opposito, atq; in eadem parte sumpto, equalis erit, quod est secundũ. Non aliter per propositionem 13, & hic equali pro equali angulo sumpto, tertie propositionis parti satisfieri poterit. In parallelas igitur rectas recta linea incidens, & quæ sequuntur, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ


Λ.

Αἱ τῆ αὐτῆ ἐυθεία παράλληλοι· ἑ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι.

ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ

XXX.

Quæ eidem rectæ lineæ parallelæ: & inter se sunt parallelæ.



Sint duæ uel plures rectæ uni alicui rectæ lineæ parallelæ: dico, illas & inter se parallelas esse. Quod quidem facile, ex propositionibus 29 & 27, uel 29 & 28, si recta prius alia in propositas rectas líneas utcunq; inciderit, demonstrari potest.


Από τῷ δθέντος σημείου, τῆ δθείσῃ ἐυθείᾳ παράλληλον ἐυθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

PROPOSITIO

XXXI.

A' dato puncto, datæ rectæ lineæ: parallelam rectam lineam ducere,

Sit punctum datum, recta etiam linea data, atq; propositum, à dato puncto educere rectam lineam, datæ rectæ parallelam. Signetur igitur in recta data punctum ubicunq; à quo deinde ad punctum datum, recta quadam linea ducta, ad hanc lineam atq; ad punctum datum, angulorum modo descriptorum uni, uter is fuerit & eligatur, per propositionem 23, angulus æqualis constituatur. Quòd si tandem hæc ultimò ducta recta linea, uersus alteram partem in rectum, prout quidem hoc propositio 14 requirit, continuata fuerit: propositioni satisfactum erit, cum hæc quæ iam ducta est linea, ipsa sit quæ quærebatur.



Demonstratio sumitur ex ipsa figuræ structura, si anguli, inter se æquales facti, ἑναλλάξ positi esse considerentur, id quod admonuisse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΛΒ.

Πάντος τριγώνου μιᾶς τῶν πλευρῶν προσεβληθείσης, ἡ ἐκτὸς γωνία δυνὶ ταῖς ἑτέρας καὶ ἀπμναντίον ἴση ὄσῃ. Καὶ αἱ ἑτέρες τῷ τριγώνου τρεῖς γωνίαι, δυνὶ ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν.

PROPOSITIO


XXXII.

Omnis trianguli uno latere producto: externus angulus duobus internis & oppositis æqualis est. Et trianguli tres interni anguli, duobus sunt rectis æquales.

Sit triangulum, productum etiam ulterius unum eius latus: dico, quòd angulus qui sic fit externus, duobus internis & oppositis angulis æqualis sit. Et quod etiam ratione corollarij, ex hac ipsa & tredecima propositione desumpti, Trianguli tres anguli interni, duobus rectis æquales sint. Ducatur per angulum externum linea, trianguli tertio lateri parallela. Et quoniã in parallelas rectas lineas recta incidens, tam alternatim positos angulos, ex prima parte propositionis 29, inter se æquales, quàm etiam externum interno opposito, atq; in eadem parte constituto æqualem

O 2 facit,


facit, ex secunda parte propositionis eiusdem, cum æqualia æqualibus additis, tota etiam, ex communi quadam noticia, inter se æqualia sint: ipsi propositio.



ni iam satisfactum erit. Corollarij uerò demonstratio, ex hac ipsa, & propositione præcedenti 13, unde nimirum illud desumptū est, intelligi potest, si interim ad horum duorum equalium utrunq; tertium angulum interiore reliquum, qui nimirum est externus $\phi\epsilon\zeta\eta\delta$, aliquis assumpserit. Omnis igitur trianguli uno latere producto: externus angulus duobus internis & oppositis equalis est. Et trianguli tres interni anguli, duobus sunt rectis equalis: quod demonstrasse oportuit.


APPENDIX.

Et quia, ut corollarium habet, tres anguli interni omnis trianguli, duobus rectis angulis sunt equalis, & quia etiam, ut quidem ex corollario propositionis 15, uel ipsa propositione 13 colligi potest, circa omne punctum, unde nimirum rectæ aliquot lineæ egrediuntur, qui apparent anguli, uniuersi simul, quatuor rectis sunt equalis, cum unumquodq; Polygonum, ubi ad punctū aliquod, in ea ubi uis sumptum, ab angulis ipsius singulis rectæ lineæ ductæ fuerint, in tot triangula quot nimirum ipsum polygonum in suo ambitu latera habuerit, subdividi possit, sequitur,




quod omnes anguli uniuscuiusq; Polygoni simul, tot rectis angulis sint equalis, quot unitates habuerit numerus, quæ quidē duplum laterū eorū, demptis inde quatuor, indicat. Hoc aut ex sequentibus figuris et cernere & intelligere licebit,

Idem in polygonis irregularibus intelligendum.



Subdiuiduntur

Subdiuiduntur etiam polygona in sua triangula, ubi ab uno propositi polygōni angulo ad omnes reliquos, præter eos quos à latere habet, angulos rectæ lineæ ductæ fuerint. Vel alio quodam modo, pro alicuius industria, in sua triangula subdiuidi polygona possunt. Primus tamen modus, cum ex demonstratione procedat, reliquis preferendus erit.



Atque hæc, de Polygonorum in sua triangula diuisione dicta, sufficiant.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΛΓ.



Αἱ τὰς ἴσας τε ἔστω παραλλήλους ὑπὸ τὰ αὐτὰ μέρη ὑπερδιγυνοῦσαι ἐυθείαι καὶ αὐταὶ ἴσαι τε καὶ παραλλήλοι εἰσίν.

PROPOSITIO

XXXIII.



Aequales & parallelas ad easdem partes rectæ lineæ coniungentes: & ipsæ æquales & parallelæ sunt.

Sint æquales & parallelæ rectæ duæ lineæ, suis etiam extremitatibus utrinque duabus rectis lineis alijs coniunctæ: dico, quòd et ipsæ rectæ lineæ aliæ, æquales inter se et parallelæ sunt.



Ducta enim in figura diametro, cum ex prima parte propositionis 29, anguli alternatim positi sint inter se æquales: quòd & coniungentes rectæ inter se æquales sint, ex propositione 4 intelligi poterit. Quòd

uerò eedem rectæ sint etiã parallelæ, cum ex allegata propositione 4, anguli qui alternatim ponuntur, inter se æquales sint: et id tandē, ex propositione 27, manifestabitur. Aequales igitur & parallelas ad easdem partes rectæ lineæ coniungentes, & ipsæ æquales & parallelæ sunt: quod demonstrari oportuit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΛΔ.


Τῶν παραλληλογράμμων χωρίων καὶ ἀπεναντίων πλευραὶ τε καὶ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλους εἰσίν. Καὶ ἡ διάμετρος αὐτὰ δίχα τέμνει.

○ 3

PROPOSITIO


Parallelogrammorum locorum. & latera & anguli opposita, æqualia inter se sunt. Et diameter ea bifariam secat.

Parallelogrammum, ut uocabuli *ἑτερομύ* indicat, est figura, sub parallelis rectis lineis comprehensa. Fit autem seu describitur parallelogrammum, per ductam rectam lineam, punctumq; extra eam sumptum, si ex hoc puncto, per propositionem 31 & 3, recte ducte parallela æqualis ducatur, utriusq; recte deinde extremitates,



duabus rectis lineis iungantur: & erit, quod sic describitur, parallelogrammum, propterea quod posteriores ductæ, eque ut priores duæ rectæ, ex propositione 33 præcedenti, parallelæ & inter se æquales

lineæ sint. Taliū igitur parallelogrammorum locorum, seu taliū figurarum, & latera & anguli opposita, æqualia inter se sunt. Ducatur in figura diameter. Et quoniam anguli alternatim positi, ex prima parte propositionis 29, inter se æquales sunt,



unde sic duo triangula, qualia propositio 26 requirit, apparent, quod latera opposita inter se æqualia sint, angulus item unus suo opposito æqualis, per hanc 26 propositionem

inferri potest. Et rursus quoniam, si æqualibus æqualia adijciantur, ex cõmuni quadam noticia, ipsa tota æqualia sunt: huius sententiæ memor, alterum etiam suo opposito angulo æqualem esse, facile concedet. Patet itaq; prior propositionis pars. Posterior nunc, quod scilicet diameter ipsum parallelogrammum bifariam secet, si quis suspicetur id nondum esse demonstratum, per propositionem quartam id deprehendet. Parallelogrammorum igitur locorum & latera & anguli opposita, æqualia inter se sunt. Et diameter ea bifariam secat, quod demonstrari oportuit.

APPENDIX.

Quoniam autem hæc propositio 34, & multe etiam sequentes, in numeris, quantitate nimirum discreta, non minus atq; in quantitate continua, ueræ esse reperiuntur, quo id ostendamus commodius, canonem quendam generalem, per quæ omnis generis triangulorum (modo latera eorum nota fuerint) area inueniri possent, subiicere necesse fuit, his uerbis.

Trianguli, cuius aream propositum est inuenire, latera primò in unum colligantur, à medietate deinde huius collecti singula trianguli latera subtrahantur. Relinquantur autem tres numeri, qui unà cum medietate collecti ex lateribus, tanquam numero quarto, si inter se multiplicati fuerint, primus scilicet cum secundo, productum hoc cum tertio, quodq; iam producet cum numero quarto (nec refert quo ordine numeri sumantur, qui uel pro primo, secundo, tertio uel quarto reputetur) tunc huius ultimi producti radice quadrata, quanta propositi trianguli area fuerit, manifestabitur.

SEQVVTVR HVIVS CANONIS EXEMPLA.

Triangulū propo.	Latera trianguli	Excessus uniuscuiusque lateris respectu medietatis, aggregati ex lateribus,
	10	2
	8	4
	6	6
	24	laterum summa,
	12	laterum mediet.
		Quatuor numeri 2 4 6 12 Instituantur

Instituantur nunc multiplicationes.

prima	secunda	tertia
12	6	24
2	4	24
<hr/> 24 primum	<hr/> 24 secun.	<hr/> 576 ultimū productū

Quadra. $\begin{matrix} * * \\ 5 7 6 \\ A \end{matrix}$ (Radix 24. Tanta igitur est trianguli, cuius latera sunt 10 8 6, area.

EXEMPLVM IN IRRATIONALIBVS.

Latera	Excessus
$\sqrt{180}$	9 — $\sqrt{45}$
12	$\sqrt{45}$ — 3
6	$\sqrt{45}$ + 3
<hr/> Sum. 18 + $\sqrt{180}$	<hr/> Medietas 9 + $\sqrt{45}$

Quatuor numeri.

9 — $\sqrt{45}$	$\sqrt{45}$ — 3	$\sqrt{45}$ + 3	9 + $\sqrt{45}$
36 primum		36 secundum	productum

Tertiò multiplicentur cum
 producuntur quadrata
 36
 36
 1296, cuius radix 36. area est trianguli.

ABBREVIATIO CANONIS PER COMPENDIVM.

Cum tertiæ multiplicationis numeri, qui nimirum ex prima & secunda multiplicatione proveniunt, inter se fuerint æquales, id quod saepe contingit, in his item duobus exemplis evidens est, eadem tertiã multiplicatio negligitur, nec etiã extractione radicis quadratæ tum opus erit. Verùm statim per alterutrum productorum, primum uel secundum, trianguli area indicabitur.

EXEMPLVM CANONIS ALIVD.

Est autem in hac 34 propositione triangulum figuræ primæ.

Latera	Excessus
$\sqrt{72}$	6 — $\sqrt{18}$
6	$\sqrt{18}$
6	$\sqrt{18}$
<hr/> Sum. 12 + $\sqrt{72}$	<hr/> Medietas 6 + $\sqrt{18}$.

Primum productum sunt 18, secundum tantundem, tertium deinde 324. huius postea radix 18, area est trianguli, atq; medietas etiã parallelogrammi uel figure primæ, quod hoc canone ostendere oportuit.

Potuisset ex cōpendio iam præscripto, tertiã multiplicatio negligi, ac statim per 18 uel 18, primum scilicet uel secundum productum, quæstioni responderi, quod idem fuisset.

SEQVITVR TRIANGVLVM FIGVRAE SECVNDÆ.

Latera	Excessus
$\sqrt{157}$	$\frac{17}{2}$ — $\sqrt{\frac{157}{4}}$
11	$\sqrt{\frac{157}{4}}$ — $\frac{5}{2}$
6	$\sqrt{\frac{157}{4}}$ + $\frac{5}{2}$
<hr/> Sum. 17 + $\sqrt{157}$	<hr/> Medietas $\frac{17}{2}$ + $\sqrt{\frac{157}{4}}$

Quatuor

Quatuor numeri.

33 primum

$$\frac{12}{2} - \sqrt{\frac{157}{4}} \quad \sqrt{\frac{157}{4}} - \frac{5}{2} \quad \sqrt{\frac{157}{4}} + \frac{5}{2} \quad \frac{12}{2} + \sqrt{\frac{157}{4}}$$

33 secundum productum

Et quia tertiae multiplicationis numeri inter se æquales sunt, ideo ea omittitur, nec etiam, extractione radicis quadratae, ut superius dictum est, opus erit. Trianguli igitur propositi, hoc est parallelogrammi medietas, area, sunt 33, quæ erat inveniēda.

SEQVITVR TRIANGVLVM FIGVRAE TERTIAE.

Latera	Excessus
6	$\sqrt{15} - \sqrt{3}$
6	$\sqrt{15} - \sqrt{3}$
$\sqrt{60} - \sqrt{12}$	6 minus $\sqrt{15} - \sqrt{3}$
Sum. 12 plus $\sqrt{60} - \sqrt{12}$	Medietas 6 plus $\sqrt{15} - \sqrt{3}$

Quatuor numeri.

$$\begin{array}{l} \sqrt{15} - \sqrt{3} \quad \sqrt{15} - 3 \quad 6 \text{ minus } \sqrt{15} - \sqrt{3} \quad 6 \text{ plus } \sqrt{15} - \sqrt{3} \\ \text{Primum } 18 - \sqrt{180} \quad \text{secundum } 36 \text{ minus } 18 - \sqrt{180} \end{array}$$

Tertium productum 144. Atque huius nunc radix quadrata, nimirum 12, area est trianguli.

SEQVITVR TRIANGVLVM FIGVRAE QVARTAE.

Latera	Excessus
radix qua. residui 157 — $\sqrt{9680}$	$8\frac{1}{2}$ minus ra. qua. re. $39\frac{1}{4} - \sqrt{605}$
11	ra. qua. re. $39\frac{1}{4} - \sqrt{605}$ minus $2\frac{1}{2}$
6	ra. qua. re. $39\frac{1}{4} - \sqrt{605}$ plus $2\frac{1}{2}$
17 plus ra. qua. re. 157 — $\sqrt{9680}$	Me. $8\frac{1}{2}$ plus ra. qua. re. $39\frac{1}{4} - \sqrt{605}$

Instituantur nunc multiplicationes.

Prima.

$$\begin{array}{l} \text{Radix qua. residui } 39\frac{1}{4} - \sqrt{605} \text{ plus } 2\frac{1}{2} \\ \text{Radix qua. residui } 39\frac{1}{4} - \sqrt{605} \text{ minus } 2\frac{1}{2} \\ \text{producuntur } 39\frac{1}{4} - \sqrt{605} \text{ minus } 6\frac{1}{4} \end{array}$$

Secunda.

$$\begin{array}{l} 8\frac{1}{2} \text{ plus radix qua. residui } 39\frac{1}{4} - \sqrt{605} \\ 8\frac{1}{2} \text{ minus radix qua. residui } 39\frac{1}{4} - \sqrt{605} \\ \text{producuntur } 72\frac{1}{4} \text{ minus } 39\frac{1}{4} - \sqrt{605} \end{array}$$

Tertia.

$$\begin{array}{l} 39\frac{1}{4} - \sqrt{605} \quad \text{minus } 6\frac{1}{4} \\ 72\frac{1}{4} \quad \text{minus } 39\frac{1}{4} - \sqrt{605} \\ \hline 2835\frac{13}{16} - \sqrt{\frac{59530205}{16}} \quad \text{item } 245\frac{5}{16} - \sqrt{\frac{378125}{16}} \\ \text{minus } 2145\frac{9}{16} - \sqrt{\frac{59650589}{16}} \\ \text{minus } 451\frac{9}{16} \end{array}$$

Summa productorum.

$$\begin{array}{l} \text{plus } 3081\frac{1}{8} - \sqrt{\frac{59650589}{16}} \\ \text{minus } 2597\frac{1}{8} - \sqrt{\frac{59650589}{16}} \end{array}$$

Facta subtractione, manent 484, cuius radix, 22, area est trianguli.

Vel,

Vel, quæsitis productis, primo scilicet & secundo, calculo exquisitiore, ueniunt

$$33 - \sqrt{605} \text{ primum}$$

$$\sqrt{605} - 33 \text{ secundum.}$$

Quibus nunc inter se multiplicatis, producuntur 484, ut prius: cuius etiam radix, ut prius, 22, trianguli aream representabit.

SIMILE EXEMPLVM PER RATIONALES, PER-
inde ac si irrationales essent numeri, expositum.

Latera,

6

Radix qua. lineæ ex binis nominib. $40 + \sqrt{576}$, hoc est, 8,

10

Excessus.

Radix quadrata binomij $10 + \sqrt{36}$ plus, hoc est 6
8, minus radix, qua. binomij $10 + \sqrt{36}$ hoc est, 4.
Radix quadrata binomij $10 + \sqrt{36}$ minus, hoc est 2.
Med. 8, plus radix qua. binomij $10 + \sqrt{36}$ hoc est, 12.

Instituantur multiplicationes.

Prima.

Radix qua. binomij $10 + \sqrt{36}$, plus 2, hoc est 6

Radix qua. binomij $10 + \sqrt{36}$, minus 2, hoc est 2

producuntur $10 + \sqrt{36}$ minus 4, hoc est 12.

Secunda.

8, minus radix qua. binomij $10 + \sqrt{36}$. hoc est, 4.

8, plus radix qua. binomij $10 + \sqrt{36}$. hoc est, 12.

64 minus $10 + \sqrt{36}$, hoc est 48.

Cruciformes multiplicationes, cum æquales sint numeri, negliguntur.
Productorum igitur summa in utraque multiplicatione, ut apparet.

Tertia multiplicatio.

$10 + \sqrt{36}$ minus 4 hoc est, 12.

64 minus $10 + \sqrt{36}$ hoc est, 48.

$640 + \sqrt{147456}$ item $40 + \sqrt{576}$

minus 136 $+ \sqrt{14400}$

minus 256

pro. $680 + \sqrt{166464}$, minus $392 + \sqrt{14400}$

Hoc est,

$288 + \sqrt{82944}$, uel 576 ultimum productum.

Huius itaq; radix quadrata, nimirum 24, area est trianguli.

EST ET ALIUD TERTIAE FIGURAE TRIANGV-
lum, ratione diametri longioris consideratum, atq; huius quidem

latera sunt 6, 6, $\sqrt{60} + \sqrt{12}$

P

Laterum

Laterum summa 12, plus $\sqrt{60}$ — $\sqrt{12}$

Excessus igitur, atq; deinceps quatuor numeri,

$$\sqrt{15} + \sqrt{3} \quad \sqrt{15} + \sqrt{3} \quad 6 \text{ minus } \sqrt{15} + \sqrt{3} \quad 6 \text{ plus } \sqrt{15} + \sqrt{3}$$

Primum secundum productum

$$18 + \sqrt{180} \quad 36 \text{ minus } 18 + \sqrt{180}.$$

Tertium productum.

$$648 + \sqrt{233280} \text{ minus } 504 + \sqrt{233280}$$

hoc est, 144. Area igitur trianguli 12, ut prius.

ALIVD ITEM TRIANGVLVM FIGVRAE
quartæ, cuius quidem

Latera sunt

Excessus igitur

$$\text{Ra. qua. bi. } 157 + \sqrt{9680}$$

$$8\frac{1}{2} \text{ minus ra. qua. bi. } 39\frac{1}{4} + \sqrt{605}$$

$$11$$

$$\text{ra. qua. bi. } 39\frac{1}{4} + \sqrt{605} \text{ minus } 2\frac{1}{2}$$

$$6$$

$$\text{ra. qua. bi. } 39\frac{1}{4} + \sqrt{605} \text{ plus } 2\frac{1}{2}$$

$$17 \text{ plus ra. qua. bi. } 157 + \sqrt{9680}$$

$$8\frac{1}{2} \text{ plus ra. qua. bi. } 39\frac{1}{4} + \sqrt{605}$$

Producta,

primum.

secundum

$$72\frac{3}{4} \text{ minus } 39\frac{1}{4} + \sqrt{605}$$

$$39\frac{1}{4} + \sqrt{605} \text{ minus } 6\frac{1}{4}$$

Inuentio producti tertij.

$$72\frac{3}{4}$$

minus

$$39\frac{1}{4} + \sqrt{605}$$

$$39\frac{1}{4} + \sqrt{605}$$

minus

$$6\frac{1}{4}$$

$$2835\frac{13}{16} + \sqrt{\frac{50530205}{16}} \text{ item } 245\frac{5}{16} + \sqrt{\frac{378125}{16}}$$

$$\text{minus } 45\frac{0}{16}$$

$$\text{minus } 2145\frac{0}{16} + \sqrt{\frac{50550589}{16}}$$

Summa productorum.

$$\text{plus } 3081\frac{1}{8} + \sqrt{\frac{50550580}{16}}$$

$$\text{minus } 2597\frac{1}{8} + \sqrt{\frac{50550580}{16}}$$

Hoc est, facta subtractione, 484.

Huius nunc tertij producti radix quadrata nimirum 22, area est trianguli.
Atq; haecenus dicta de triangulorum arcibus inuestigandis sufficiant. Sequitur

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΛΕ.

Τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ τῆ αὐτῆ βάσεως ὄντα, ἢ ἐν ταῖς αὐταῖς
παραλλήλοις ἴσα ἀμύσεις εἶναι.


PROPOSITIO

XXXV.

Parallelogramma super eadem basi constituta, atq; in eisdem paral-
lelis: æqualia inter se sunt.


Potest huius propositionis figura geometrica tripliciter variari. Aut enim paral-
lelogrammum super una & eadem basi, inter easdem item parallelas positum, alterum
unius lateris est diameter alterius, aut ea breuius, aut longius. Si primum, cum ex co-
rollario propositionis præcedentis, Omne parallelogrammum a sua ipsius diametro
bifariam

bifariam secetur, cumq; etiam ex cōmuni quadam noticia, Eiusdem duplicia, inter se æqualia sint, hoc quod propositio concludit, iam manifestum erit. Quòd si fuerit




ea breuius, cum parallelogrammorum locorum latera opposita inter se æqualia sint, hoc ipso usurpato bis: duo duorū parallelogrammorum latera; ex communi quadam noticia, inter se æqualia existant: deinde uerò communi por-

tionē ab illis æqualibus lateribus subtracta, & residuæ lineæ inter se æquales erūt. Sed quia illæ, ut quidem secunda pars propositionis 29, & ipsa propositio quarta



demonstrant, equalium triangulorum latera sunt, his equalibus triangulis cōmune trapezium si addatur: & producta, parallelogramma scilicet proposita, inter parallelas & super una eadēq; basi constituta, per communem quā-

dam noticiam, inter se æqualia erunt, quod demonstrasse oportuit. Si uerò alterum unius latus fuerit diametro alterius parallelogrammi longius, oportet ut media inter æquales lineas portio, ex æquo illis æqualibus lineis addatur, quæ productæ, cū



et ipse equalium triangulorum sint latera, illis equalibus triangulis, primò id quod commune habent, subtrahi, residuis deinde trapezijs commune quoddam triangulum aliud addi oportet: & tum etiam secundum tertiæ figure descriptionem, propositioni satisfactum erit. Quacuncq; igitur ratione parallelogramma illa, (seruatis tamen hypothēsibus) descripta fuerint, propositio uera esse cognoscetur. quod demonstrari oportuit.

PER NUMEROS HAEC NUNC, UT PRAECE-
dens, tractari potest: id quod uno tantum exemplo indicabimus.

Latera	Excessus
$\sqrt{533}$	$5\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{170}{4}} - \sqrt{\frac{533}{4}}$
$\sqrt{170}$	$5\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{170}{4}} + \sqrt{\frac{533}{4}}$
11	$\sqrt{\frac{533}{4}} + \sqrt{\frac{170}{4}} - 5\frac{1}{2}$
$\sqrt{533} + \sqrt{170} + 11$	Me. $\sqrt{\frac{533}{4}} + \sqrt{\frac{170}{4}} + 5\frac{1}{2}$

Instituantur multiplicationes.

prima	secunda
$5\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{170}{4}} - \sqrt{\frac{533}{4}}$	$\sqrt{\frac{533}{4}} + \sqrt{\frac{170}{4}} - 5\frac{1}{2}$
$30\frac{3}{4} - 42\frac{1}{2} - 133\frac{1}{4}$	$133\frac{1}{4} + 42\frac{1}{2} - 30\frac{3}{4}$
$+ \sqrt{\frac{90610}{4}}$	$+ \sqrt{\frac{90610}{4}}$
$\sqrt{\frac{90610}{4}} - 145\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{90610}{4}} + 145\frac{1}{2}$

Tertia

Tertia multiplicatio.

$$\sqrt{\frac{20610}{4}} + 145\frac{1}{2}$$

$$\sqrt{\frac{20610}{4}} - 145\frac{1}{2}$$

producuntur $\frac{5229}{4}$, tertium productum.

Area igitur trianguli, ratione Trapezij in figura prima, est $38\frac{1}{2}$. Quare trapezium integrum 77. Et quia tantum etiam faciunt 11 septies, alterum scilicet parallelogrammum: & in numeris iam propositioni satisfactum erit, quod quidem fieri oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ λς.

Τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα, ἔν ταις αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν.

PROPOSITIO XXXVI.


Parallelogramma super æqualibus basibus constituta, atq; in eisdem parallelis: æqualia inter se sunt.

Hæc propositio licet per se iam satis constare deberet, cum idem sit æqualium atq; earundem linearum intellectus, quo tamen dilucidius hæc appareat, postquam descripta fuerint parallelogramma, ut præcipitur, anguli superiores duo unius, cum



duobus inferioribus alterius parallelogrammi angulis, duabus rectis lineis, sic ut altera alteram non secet, copulentur. Describitur autem sic, ut ex pro-

positione 33 colligitur, parallelogrammum aliud, quod nunc, quia cum utroque posito, & inter lineas parallelas, & super una atq; eadem basi constitutum est: utrunq; posito huic descripto parallelogrammo alij, per propositionem præmissam, atq; illa tandem etiam inter se, per hanc communem noticiam, Quæ eidem æqualia, & inter se æqualia sunt, æqualia esse ostenduntur. Parallelogramma igitur super æqualibus basibus & in eisdem parallelis constituta: inter se sunt æqualia, quod demonstrasse oportuit.



NUNC QUANTVM AD PRAXIM NUMERORVM.

Latera		Excessus	
13		$\sqrt{1\frac{1}{2}} - 2$	
9		$\sqrt{1\frac{1}{2}} + 2$	
$\frac{\sqrt{34}}{22 + \sqrt{34}}$		$\frac{11 - \sqrt{\frac{7}{2}}}{11 + \sqrt{\frac{7}{2}}}$	
primum	secum.	ter. pro.	Area trian.
$4\frac{1}{2}$	$112\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{2038}{4}}$	$22\frac{1}{2}$

ALIVD

ALIVD TRIANGVLVM EX SECVND A FIGVRA.

Latera	Excessus
√ 208	8 — √ 52
10	√ 52 — 2
6	√ 52 + 2
<hr/>	<hr/>
16 + √ 208	8 + √ 52
Tertium pro. 576	Area trianguli 24.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΛΖ.



Τὰ τρίγωνα τὰ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει ὄντα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν.

PROPOSITIO

XXXVII.

Triangula super eadem basi cōstituta, atq; in eisdem parallelis: equalia inter se sunt.

Sint inter lineas parallelas, super una & eadem basi constituta duo uel plura triangula: dico, illa inter se esse æqualia. Continuetur ea, quæ triangulorum uertices coniungit recta linea in utranq; partem, quantum satis fuerit, fiant etiam ex propositis triangulis parallelogramma, ducendo in unoquoq; triangulo, ab eius uno angulo, eorum qui ad basim sunt, lineam, lateri quod hunc eundem angulum sub-



tendit, per propositionem 31, parallelam. Et quoniam descripta parallelogramma, cum super eadem basi, atq; in eisdem parallelis constituta sint, inter se æqualia esse, ex propositione 35 notum est. Et rursus quoniam, quæ eiusdem dimidia, ex communi quadam noticia æqualia inter se sunt: descriptorum parallelogrammorum medietates, triangula scilicet posita, inter se equalia erunt. Triangula igitur super eadem basi constituta, atq; in eisdem parallelis: æqualia inter se sunt, quod demonstrari oportuit.

NVNC QVANTVM AD NVMERORVM PRAXIM.


Latera	Excessus
12	} 6
12	
12	
<hr/>	<hr/>
Summa 36	Medietas 18
Tertium productum 3888.	Area √ 3888 uel 62 ⁴ / ₁₂₅ ferè.

ALTER VM TRIANGVLVM HABET

Latera	√ 252	12	√ 108
Exces.	√ 27 + 6 — √ 63	√ 27 — 6 + √ 63	√ 63 + 6 — √ 27
		P	Summa

Summalat. $\sqrt{252} + 12 + \sqrt{108}$ Med. $\sqrt{63} + 6 + \sqrt{27}$
 Primum secundum ter. productum
 $\sqrt{9072} - 72$ $\sqrt{9072} + 72$ 3888 &cæ.

ALIA FIGVRA.



Habet hæc figura tria trian-
 gula, quæ, ut geometricè, ita
 et per numeros sequenti calcu-
 lo inter se equalia esse
 ostenduntur.

Communis basis.

Quantum igitur ad triangulum primum, cuius quidem

Latera sunt

$$\sqrt{384}$$

$$\sqrt{192}$$

$$8$$

$$\sqrt{384} + \sqrt{192} + 8$$

Vltimum pro.

$$2048$$

Excessus igitur

$$4 + \sqrt{48} - \sqrt{96}$$

$$4 - \sqrt{48} + \sqrt{96}$$

$$\sqrt{96} + \sqrt{48} - 4$$

$$\sqrt{96} + \sqrt{48} + 4$$

Area trianguli

$$\sqrt{2048.} \text{ uel } 45\frac{23}{91} \text{ ferè.}$$

Porro triangulum secundum habet

Latera 12 12 8.

Excessus 4 4 8.

Summalat. 32.

Medietas 16.

Primum productum 16.

secun. 128,

tertium pro. 2048.

Area trian. $\sqrt{2048.}$

Sequitur triangulum tertium, cuius quidem

Latera sunt

$$\sqrt{452}$$

$$\sqrt{228}$$

$$8$$

$$\sqrt{452} \quad \sqrt{228} + 8$$

Vltimum pro. 2048.

Excessus igitur


$$4 + \sqrt{57} - \sqrt{113}$$

$$4 - \sqrt{57} + \sqrt{113}$$

$$\sqrt{113} + \sqrt{57} - 4$$

$$\sqrt{113} + \sqrt{57} + 4$$

Area trianguli ut supra.



Area utriusq; trianguli, sunt 28. Equa-
 les igitur inter se.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΛΗ.


Τὰ τρίγωνα τὰ ὑπὸ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα, ἃ ἔν ταῖς αὐταῖς παραλλή-
 λοις ἴσα ἀκμήλοις εἰσιν.

PROPOSITIO

PROPOSITIO XXXVIII.


Triangula super æqualibus basibus constituta, atq; in eisdem parallelis: æqualia inter se sunt.

Propositis triangulis, ut præcipitur, eadem huius quæ præcedentis κατὰ σκοπὸν



atq; demonstratio erit, si loco propositionis tricesimæ quintæ illic sumptæ, hîc tricesima sexta sumatur.

ALIUD HVIVS PROPOSITIONIS EXEMPLVM.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΘ.

Τὰ ἴσα τρίγωνα, τὰ ὑπὸ τῶν αὐτῶν βάσεων ὄντα, καὶ ὑπὸ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἔσιν.

PROPOSITIO XXXIX.

Æqualia triangula, super eadem basi, atque ad easdem partes constituta: & in eisdem sunt parallelis.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Μ.

Τὰ ἴσα τρίγωνα τὰ ὑπὸ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα, καὶ ὑπὸ τὰ αὐτὰ μέρη, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἔσιν.

PROPOSITIO XL.

Æqualia triangula, super æqualibus basibus, atq; ad easdem partes constituta: & in eisdem sunt parallelis.

Requirunt hæc duæ propositiones æqualia, eiusdem uel æqualium basium trian-




Basis eadem


gula, & inde tandem inter lineas parallelas (si modo ad easdem partes fuerint cōstituta) ea posita esse inferunt. Triangulis itaq; huiusmodi descriptis, propositionum demōstrationes ab impossibili illo, Partem suo toti æqualem esse, colligentur. Nam recta quadā linea triangulorum uerticibus copulatis, si quis præter hanc aliam ab unius trianguli uertice, tanquam à puncto signato, basi parallelam statueret uelit, faciat sanè hoc, si poterit. Et quoniam fit, quod hæc ducta parallela alter-

utrius

utrius trianguli, latera secet, aut non secet. Si primum, coniungatur punctum sectionis in uno latere, recta quadam linea, cum sibi opposita basis extremitate. Et quoniam duo triangula apparent, quorum unum quidem cum secundum aduersarij



structuram, ex propositione 35, uni: alterum uero, ex hypothesi, eidem triangulo equale sit: mox illi, aut per propositionem 37, si unam & eandem basim habuerint: aut uerò per propositionem 38, si separatae, æquales tamen inter se, bases illorum fuerint, inter se æqualia erunt, partiale totali, quod est impossibile. Esto igitur iam



quòd non fecerit parallela hæc alterius trianguli latera, tum huius trianguli unum latus ultra uerticem usq; ad parallelam continuari, punctum deinde contractus cum opposita basis extremitate, ut modò, coniungi debet: & idẽ quod prius, partiale scilicet triangulum suo totali æquale esse, per allegatas propositiones inferetur. Hoc



autem, quia ex communi illa noticia, Totum parte sua maius est, impossibile existit, propositionibus consentiendum erit. Aequalia igitur triangula, siue super eadẽ seu æqualibus basibus, atque ad easdem partes constituta: & in eisdem parallelis erunt, quod demonstrasse oportuit.

SEQUITUR NUMERORVM PRACTIS.

Prioris trianguli figuræ ultimæ

Laterum sunt

√ 212,

12,

√ 20

Laterum

Laterum summa $\sqrt{212} + 12 + \sqrt{20}$ Medietas $\sqrt{53} + 6 + \sqrt{5}$

Excessus igitur, ac per consequens quatuor numeri.

$\sqrt{5} + 6 + \sqrt{53}$ $\sqrt{5} - 6 + \sqrt{53}$ $\sqrt{53} + 6 - \sqrt{5}$ $\sqrt{53} + 6 + \sqrt{5}$

Instituantur multiplicationes.

Prima

Secunda

$$\begin{array}{r} \sqrt{5} + 6 - \sqrt{53} \\ \sqrt{5} - 6 + \sqrt{53} \\ \hline \text{pro. } \sqrt{7632} - 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \sqrt{53} + 6 + \sqrt{5} \\ \sqrt{53} + 6 - \sqrt{5} \\ \hline \text{pro. } \sqrt{7632} + 84 \end{array}$$

Tertia multiplicatio.

$$\begin{array}{r} \sqrt{7632} + 84 \\ \sqrt{7632} - 84 \\ \hline \end{array}$$

producuntur $7632 - 7056$, hoc est 576
tertium productum. Area igitur trianguli 24 .

Triangulum posterius habet

Latera

Excessus igitur

12		$\sqrt{52} - 6$
$\sqrt{52}$	} 6
$\sqrt{52}$		
$\sqrt{208} + 12$		$\sqrt{52} + 6$. Area 24 .

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΜΑ.


Εὰν παραλληλόγραμμοι τριγώνου βάσιν τὴν ἑξῆ τιῶν αὐτῶν, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἢ διπλάσιον ἔσται ὁ παραλληλόγραμμοι τοῦ τριγώνου.

PROPOSITIO

XLI.

Si parallelogrammum cum triangulo basim habuerit eandem, atq; in eisdem parallelis fuerit: duplum erit parallelogrammum ipsius trianguli.

Statuantur parallelogrammum & triangulum super eadem basi, esto etiā quòd sint inter lineas parallelas: dico quòd parallelogrammum ad triangulum, duplū sit. Hoc quòd ducta in parallelogrammo diametro, ex 37 & secunda parte propo-



tionis 34, cum per hanc quidem triangulorum unumquodq; sui parallelogrammi dimidium esse, per illam uerò, triangula quorū eadem est basis et eadem altitudo, æqualia esse demonstratum sit, facile colligetur.

NUMERORVM PRACTIS.

Et primo quidem trianguli, cuius latera sunt 9 $\sqrt{72}$ $\sqrt{45}$

Laterum summa $9 + \sqrt{72} + \sqrt{45}$ Medietas $4\frac{1}{2} + \sqrt{18} + \sqrt{11\frac{1}{4}}$

Excessus, ac per consequens quatuor numeri.

Primus $\sqrt{11\frac{1}{4}} + \sqrt{18} - 4\frac{1}{2}$ secundus $\sqrt{11\frac{1}{4}} - \sqrt{18} + 4\frac{1}{2}$ tertius $\sqrt{18} + 4\frac{1}{2} - \sqrt{11\frac{1}{4}}$

tertius $4\frac{1}{2}$ $\sqrt{18}$ $\sqrt{11\frac{1}{4}}$ quartus $4\frac{1}{2} + \sqrt{18} + \sqrt{11\frac{1}{4}}$
 Primum secundum tertium pro.
 $\sqrt{1458} - 27$ $\sqrt{1458} + 27$ 729 .

Area trianguli 27. Et tanta etiã est medieta parallelogrammi, cum 6 nouies, uel contra 9 sexies, 54 constituent.

Aliud triangulum.

Latera	Excessus
$\sqrt{117}$	$7\frac{1}{2} - \sqrt{29\frac{1}{4}}$
9	$\sqrt{29\frac{1}{4}} - 1\frac{1}{2}$
6	$\sqrt{29\frac{1}{4}} + 1\frac{1}{2}$
<hr/>	<hr/>
$15 + \sqrt{117}$	$7\frac{1}{2} + \sqrt{29\frac{1}{4}}$

Productum primum 27, secundum 27, Area trianguli 27.

Tertium triangulum.

Latera	Excessus
$\sqrt{205}$	$\sqrt{13} + 4\frac{1}{2} - \sqrt{20\frac{5}{4}}$
9	$\sqrt{13} - 4\frac{1}{2} + \sqrt{20\frac{5}{4}}$
$\sqrt{52}$	$\sqrt{20\frac{5}{4}} + 4\frac{1}{2} - \sqrt{13}$
<hr/>	<hr/>
$\sqrt{205} + 9 + \sqrt{52}$	$\sqrt{20\frac{5}{4}} + 4\frac{1}{2} + \sqrt{13}$

Instituantur multiplicationes.

Prima	secunda
$\sqrt{13} + 4\frac{1}{2} - \sqrt{20\frac{5}{4}}$	$\sqrt{20\frac{5}{4}} + 4\frac{1}{2} - \sqrt{13}$
$\sqrt{13} - 4\frac{1}{2} + \sqrt{20\frac{5}{4}}$	$\sqrt{20\frac{5}{4}} + 4\frac{1}{2} + \sqrt{13}$
<hr/>	<hr/>
$13 - 20\frac{1}{4} - 51\frac{1}{4}$	$51 + 20\frac{1}{4} - 13$
$+ \sqrt{4151\frac{1}{4}}$	$+ \sqrt{4151\frac{1}{4}}$
<hr/>	<hr/>
producuntur $\sqrt{4151\frac{1}{4}} - 58\frac{1}{2}$	prod. $\sqrt{4151\frac{1}{4}} + 58\frac{1}{2}$

Tertia multiplicatio.

$\sqrt{4151\frac{1}{4}} + 58\frac{1}{2}$
 $\sqrt{4151\frac{1}{4}} - 58\frac{1}{2}$

 producuntur 729. Quare Area trianguli 27

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

MB.

Τῷ δὲ θέντι τριγώνῳ, ἴσον παραλληλόγραμμον οὐσῆσαι ὄσαι, ὅν τῆς δόσει ἔυθυγράμμου γωνία.


PROPOSITIO

XLII.

Dato triangulo; æquale parallelogrammum constituere, in dato angulo rectilineo.

Petit hæc propositio triangulũ, atq; huic deinde æquale iubet formari seu describi parallelogrammum, cuius quidem unus angulus, alij cuiusdam rectilineo angulo dato, æqualis sit, quod sic fiet. Continuetur trianguli basis in utramlibet partem, huic deinde basi per trianguli uerticem, prout habet propositio 31, recta parallela ducatur. Hoc facto, diuidatur basis, per 10 propositionem, bisariam, & ad punctũ illud


illud diuisionis, atq; ipsam basim, angulus dato æqualis, ex propositione 23 constituatur, cuius deinde latus alterum, si usq; ad lineam, quæ per uerticem trianguli ducta est, continuatum, ei etiam ab alterutra basis extremitate, tanquam à puncto aliquo dato, per propositionem 31, recta parallela ducta fuerit, ubi tandem hæc usque ad lineam, per uerticem transeuntem continuabitur, res confecta erit, id quod



sic demonstrabitur. De parallelogrammo, quin dato unū angulum æqualem habeat, nullum est dubium, cum id in structura ex propositione 23 præuisum sit. Quòd uerò idem parallelogrammum dato triangulo æquale sit, postquam à trianguli uertice ad punctum basis medium linea recta ducta fuerit: & id ex propositionibus 38 & 41, atq; communi tandem illa noticia, Quæ eiusdem duplicia, &cæ. facile perspicietur. Dato igitur triangulo, æquale parallelogrammum, in dato rectilineo angulo constitutum est, quod fecisse oportuit.

ADMONITIO.

Quòd si angulus datus fuisset acutus, obtusior, uel omnino rectus, tūc linea hæc, ut latus futuri parallelogrammi, à puncto diuisionis in basi, secundum huius anguli quantitatem ducenda fuisset. Hæc enim 23, de angulo formando, propositio, in genere proposita est, sic ut nihil referat, quocunq; modo rectilineus angulus fuerit propositus.



Area trianguli figuræ ultimæ, ut sequens calculus indicat, est $\sqrt{243}$. Atq; tanta est etiam parallelogrammi constituti area. Bene igitur.

Latera	Excessus	
6	3	
6	3	Ultimum productum 243
6	3	Area igitur trianguli $\sqrt{243}$.
Sum. 18	Med. 9	

ALIUD AEQVILATERVM TRIANGVLVM, laterum irrationalium.

Latera	Excessus	
$\sqrt{48}$	} . . . $\sqrt{12}$	pro. { primum 12 secundū 36 tertium 432
$\sqrt{48}$		
$\sqrt{48}$		
$\sqrt{432}$	$\sqrt{108}$	Area trianguli $\sqrt{432}$.

ALIUD EXEMPLVM.

Latera trianguli sunt

	6		6
	8 — $\sqrt{4}$,	hoc est	6
Radix binomij 20. + $\sqrt{256}$			6
			Q 2 Summa

Summalaterum $14 - \sqrt{4}$, plus radix binomij $20 + \sqrt{256}$ hoc est 18

Huius medietas $7 - \sqrt{1}$, plus radix binomij $5 + \sqrt{16}$ 9

Excessus, ac per consequens quatuor numeri

Radix binomij $5 + \sqrt{16}$ plus $1 - \sqrt{1}$
 Radix binomij $5 + \sqrt{16}$ minus $\sqrt{1} - 1$
 $7 - \sqrt{1}$ minus radix binomij $5 + \sqrt{16}$
 $7 - \sqrt{1}$ plus radix binomij $5 + \sqrt{16}$

hoc est $\left\{ \begin{array}{l} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 9 \end{array} \right.$

Instituuntur multiplicationes.

Prima.

Radix binomij $5 + \sqrt{16}$ plus $1 - \sqrt{1}$
 Radix binomij $5 + \sqrt{16}$ minus $\sqrt{1} - 1$
 producuntur $5 + \sqrt{16}$ minus $\sqrt{4} - 2$
 hoc est 9

Secunda.

$7 - \sqrt{1}$ minus radix binomij $5 + \sqrt{16}$
 $7 - \sqrt{1}$ plus radix binomij $5 + \sqrt{16}$
 pro. $50 - \sqrt{196}$ minus $5 + \sqrt{16}$
 hoc est 27

Tertia multiplicatio est 27 secundi
 cum numero 9 producto primo.

& producuntur 243, ultimo.

Area igitur trianguli $\sqrt{243}$.

VEL ALITER.

Summalaterum 6 plus 8 $- \sqrt{4}$, plus radix bin. $20 + \sqrt{256}$ hoc est 18

Huius medietas 3 plus 4 $- \sqrt{1}$ plus radix bin. $5 + \sqrt{16}$ 9

Excessus, & per consequens quatuor numeri.

Radix binomij $5 + \sqrt{16}$ minus 3 plus 4 $- \sqrt{1}$
 Radix binomij $5 + \sqrt{16}$ plus 3 minus 4 $- \sqrt{1}$
 3 plus 4 $- \sqrt{1}$ minus radix binomij $5 + \sqrt{16}$
 3 plus 4 $- \sqrt{1}$ plus radix binomij $5 + \sqrt{16}$

Instituuntur multiplicationes.


Prima. Radix binomij $5 + \sqrt{16}$ minus 3 plus 4 $- \sqrt{1}$
 Radix binomij $5 + \sqrt{16}$ plus $\sqrt{3}$ minus 4 $- \sqrt{1}$
 producuntur $5 + \sqrt{16}$ minus 9 minus 17 $- \sqrt{64}$
 hoc est 9.

Secunda. 3 plus 4 $- \sqrt{1}$ minus radix binomij $5 + \sqrt{16}$

3 plus 4 $- \sqrt{1}$ plus radix binomij $5 + \sqrt{16}$

9 plus 17 $- \sqrt{64}$ minus $5 + \sqrt{16}$
 plus 12 $- \sqrt{9}$, bis

Summa productorum, sunt 27. &c.





ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΜΓ.

Παντός παραλληλογράμμου, τῷ πῶδι τῆς διαμέτρου παραλληλογράμμου τὰ παραπληρώματα, ἴσα ἀλλήλοις εἶσιν.


PROPOSITIO. XLIII.

Omnis parallelogrammi, eorum quæ circa diametrum sunt parallelogrammorum supplementa, inter se sunt æqualia.

Sit parallelogrammum, ducta etiam in eo diameter, puncto deinde in uno aliquo parallelogrammi latere ubiuis sumpto, ex hoc ad oppositum usq; latus reliquis



duobus parallela ducta, ubi hæc diametrum secuerit, per hoc sectionis punctum prioribus lateribus similiter parallela ducenda est, & figura parata erit: dico igitur nunc, quod ipsius parallelogrammi supplementa, hoc est, ea per quæ diameter non transit, parallelogramma, inter se æqualia sunt. Nam cum diameter parallelogrammum, ut auditum est, bifariam secet, subtractis ab æqualibus triangulis, medietatibus scilicet parallelogrammi, æqualibus triangulis bis, quæ tandem relinquuntur, ex communi quadam notitia, æqualia erunt. Quia autem reliqua hæc ea sunt, quæ circa diametrum consistunt parallelogrammorum supplementa: ergo. Omnis igitur parallelogrammi, eorum quæ circa diametrum sunt parallelogrammorum supplementa, inter se sunt æqualia, quod demonstrasse oportuit.



Diameter $\sqrt{108}$.



Diameter $\sqrt{223}$.

SEQVITVR TRIANGVLORVM CALCVLVS.

primi	
Latera	excessus
$\sqrt{108}$	$6 - \sqrt{27}$
6	$\sqrt{27}$
6	$\sqrt{27}$
<hr/>	
$12 + \sqrt{108}$	$6 + \sqrt{27}$

Primum productum 9. secun. 27
tertium 243. Area $\sqrt{243}$

secundi	
Latera	excessus
$\sqrt{223}$	$8\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{223}{4}}$
11	$\sqrt{\frac{223}{4}} - 2\frac{1}{2}$
6	$\sqrt{\frac{223}{4}} + 2\frac{1}{2}$
<hr/>	
$17 + \sqrt{223}$	$8\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{223}{4}}$

Pri. pro. $16\frac{1}{2}$ secun. $49\frac{1}{2}$
ter. $\frac{3267}{4}$ Area $\sqrt{816\frac{3}{4}}$

Q 3


ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Παρά τῷ δ' ὀθείσῃ ἀκέραιῳ, τῷ δ' ὀθείντι τριγώνῳ ἴσον πᾶσαλληλογράμμον
παραβαλεῖν, ὃν τῷ δ' ὀθείσῃ γωνία ἐκθύγραμμο.

PROPOSITIO XLIII.


Ad datam rectam lineam, dato triangulo æquale parallelogrammum
ponere, in dato angulo rectilineo.

Requirit hæc propositio rectam lineam datam, triangulum datum, atq; etiam
angulum rectilineum datū. Proponit autem, quomodo ad datam rectam lineam,
parallelogrammum, quod & triangulo dato æquale sit, angulum etiam dato angu-
lo æqualem habeat, constituendum sit. Est huius propositionis structura facilis,
propter hypotheses, quas cum propositione præcedente 42. communes habet. Pri-
mo enim parallelogrammum, quod dato triangulo æquale sit, angulum in super
angulo æqualem habeat, per eandem 42. constituendum est. Et quoniam dicit pro-
positio, ad datam rectam lineam, altero igitur iam descripti parallelogrammi late-
re, eorum quæ angulum, dato æqualem comprehendūt, ultra parallelogrammum
ad longitudinem rectæ datæ, per secundū postulatū, prolongato, secundū pro-




longatam illam portionem & parallelogrammi latus, quod cū portione prolongata
angulum facit, aliud cum sua diametro parallelogrammū describatur. Et quoniam
hæc diameter, ex una eius parte continuata, & latus parallelogrammi alterum, simi-
liter continuatum, propter incidentem lineam, quæ (ut facile ex tertia parte pro-
positionis 29 colligitur) in una & eadem parte, duos interiores angulos duobus re-
ctis minores facit, ex communi quadam notitiâ concurrunt, continuetur utrunq;
horum, diameter scilicet & latus illud alterum, donec concurrant, atq; ex triangu-
lo formato, cuius quidem latus unum est hæc tota diameter, compleatur parallelo-
grammum. Quòd si tandem partialis iuxta diametrum, linea, usq; ad oppositum
in parallelogrammo latus continuatū fuerit, cum supplementorum utrunq; dato
triangulo æquale sit, ex his uerò alterum super datam rectam constitutum: proposi-
tioni satisfactum erit, id quod ex structura facile demonstrari potest. Ad datam igitur
rectam lineam, in dato angulo rectilineo parallelogrammum dato triangulo
æquale positum est, quod fieri oportuit.

SEQUVNTVR NVNC HVIVS PROPOSITIONIS
exempla alia.




Idem



Idem exemplum, mutato tamen Ifofccli in triangulum æquilaterum.



Adhuc aliter, triangulum autem esto Scalenum, linea uerò data 3 punctorum.



ALIVD EXEMPLVM.




ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Τῷ δοθέντι ἑυθυγράμμῳ ἴσον πᾶσαλληλόγραμμον συστήσασθαι, ἐν τῇ δοθείσῃ ἑυθυγράμμῳ γωνίᾳ.


PROPOSITIO XLV.

Dato rectilineo, æquale parallelogrammum constituere, in dato angulo rectilineo.


Quod præcedens 42 de triangulo tantū proposuit, petit uel iubet hæc fieri cum omni rectilineo. Estq; hæc præsens quàm superior magis generalis, & latius patet. Sit itaq; datum rectilineum qualecumque, gratia tamen exempli, & propter faciliorem operationem, Quadrilaterum altera parte longius. Illud primò in duo trian- gula, per diametrum ductam, soluendum; parallelogrammum deinde, quod angu- lum dato æqualem habeat, tri- angulo unì æquale, per propo- sitionem 42, cõstituendum est. Quòd si iam ad unum huius parallelogrãmi latus, tanquam ad rectam lineam datã, per pro- positionem 44 præcedentem, alteri triangulo æquale paral- lelogrammum, quod & ipsum angulum dato æqualem ha- buerit, cõstituatur, satisfactum propositioni erit.




ALIA FIGVRAE DISPOSITIO.



Aliter manente eodem rectilineo & angulo.



Præterea aliter, manente rectilineo, sed mutato an- gulo in rectum.




Non aliter cum quadratis agendum erit.

Demonstratio huius cum sit facilis, præter operationem amplius quicquam ad- dere


dere nolui, copiosum tantum, propter difficilem huius praxim, in exemplis me uarijs ostendens.

DE RHOMBO.




Rhombus datus,


De eodem Rhombo, aliter tamen in triangula soluto.



SIC ETIAM QVADRILATERVM, QVOD RHOMBOIDES appellatur, uariari poterit, ut sequitur.




Idem aliter, mutato acuto in angulum obtusum.



R


EXEMPLVM

ELEMENTORVM EVCLIDIS
EXEMPLVM DE QVADRILATERO IRREGVLARI.




Proinde quemadmodum haecenus in quadrilateris, secundo triangulo aequale parallelogrammum, per propositionem 44. ad rectam datam constitutum est, ita eodem modo nunc, ubi quidem rectilineum propositum pentagonum fuerit, eo in sua triangula soluto: & triangulo tertio per eandem propositionem aequale parallelogrammum addi poterit, atque sic deinde etiam absolui triangulum quartum in Hexagonis, & quintum in Heptagonis, ac ordine deinceps. Quomodo autem unumquodque propositum polygonum, uel rectilineum in sua triangula solui debeat, id per appendicem quandam propositionis 32, iam traditum atque ostensum est.


SEQVITVR EXEMPLVM DE PENTAGONO REGVLARI.



Aliud de Pentagono exemplum.




Exemplum, de Pentagono irregulari.





Constitutio

Constitutio huius pentagoni irregularis.





EXEMPLVM HEXAGONI REGVLARIS.




Hoc nūc sexies (cum sex sint triangula inter se æqualia) hexagono parallelogrāmū æquale, in dato angulo recti lineo cōstitutum erit.

Vel sit illa hexagoni in triangula diuisio.





Constitutio hexagoni prioris in parallelogrāmū, quod dato rectilineo angulo æqualem angulum habeat.

Constitutio hexagoni posterioris, &c.




ELEMENTORVM EVCLIDIS
EXEMPLVM HEXAGONI IRREGVLARIS.




Hoc nunc totum bis, ratione alterius parallelogrammi: exoritur totū parallelogrammum, toti rectilineo æquale. quod erat faciendum.



Aliter, similis formæ hexagonum irregulare, in sua triangula solutum.




vP lic



EXEMPLVM DE HEPTAGONO REGVLARI.



Operatio figuræ primæ.



Secundæ figuræ eadem erit operatio.

Quòd

Quòd si à puncto heptagoni medio, hoc est à centro, septem ad ipsius angulos rectæ ductæ fuissent lineæ, cum sic heptagonum in septem inter se æqualia triangu-
la resolutum sit, uni eorum æquali parallelogrammo constituto, eo deinde septies sumpto, res confecta erit. Sic cum irregulari heptagono & reliquis multorum late-
rum figuris omnibus, postquam hæ in triangula resolutæ fuerint, agendum erit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΜΣ.

Από τῆς ὀρθείσης εὐθείας, τετράγωνον ἀναγράφαι.


PROPOSITIO. XLVI.

A' data recta linea, quadratum describere.

Sit data recta linea, atq; propositum, ab ea, hoc est secundum eius quantitatem, quadratum describere. Ab una igitur recte extremitate, tanquam à puncto in linea

✱ Data equalis & parallela.

Ad angulos rectos &
æqualis data.




sumpto, per propositionem 11. ad angulos rectos linea excitetur: atque hac, per propositionem 3. ad æqualitatem datae posita, ab eius extremitate altera, & libera adhuc, tanquam à puncto dato datae rectæ equalis & parallela ducatur. Quòd si tandem altera ductæ parallelæ extremitas, cum altera datae extremitate, recta linea cõiungatur, propositioni satisfactum erit. Demonstrationem huius, qui eorum quæ in structura facta sunt, eorum item quæ hæctenus tradita recordabitur, ex definitione tandẽ quadrati facile colligere poterit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΜΖ.

Εν τῆς ὀρθογωνίως τριγώνοις ἡ ἐκ τῆς πρὸς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσας πλευρᾶς τετράγωνον, ἴσον ὂσιν τοῖς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλυσῶν τετραγώνοις.

PROPOSITIO XLVII.

In rectangulis triangulis: quadratum quod à latere rectum angulum subtendente describitur, æquale est eis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur quadratis.



subtendente describitur, æquale est eis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur quadratis.

Sit triangulum rectangulum, quadrata etiã à singulis lateribus, per propositionem præcedentem, descripta: dicò, quadratum lateris subtendentis angulum rectum, tantum esse, quanta sunt quadrata, quæ à reliquis duobus lateribus, angulum rectum comprehendentibus, describuntur. Demittatur ab angulo trianguli recto, tanquam à puncto dato, super suam subtensam, per propositionem 12, linea perpendicularis, atque

R 3 hæc

hæc ad latus usq; oppositum per quadratum cōtinuetur, & erit quadratum lateris, angulum rectum subtendentis, in duo parallelogramma diuisum, quorum unum quidem uni, alterum uerò alteri reliquorum laterum quadrato æquale esse, sic demonstrabitur. Quoniam enim triangulum ex hypothesi rectangulum est, singuli etiam quadratorum anguli, ex definitione, recti sunt: angulus in orthogonio rectus cum utroq; eorum qui sunt ei ἐφεξῆς, duobus rectis angulis æquales erunt. Illud igitur utriusq; quadrati latus, quod quidem extra triangulum est positum, illi trianguli lateri, cui applicatum est, ex propositione 14, ad amissim iunctum, & cum eo una linea erit, quod est notandum. Præterea, quoniam anguli recti, ex communi quadam noticia, inter se sunt æquales, & quoniam etiam, si æqualibus æqualia, uel aliquod commune adijciatur, quæ inde colliguntur æqualia sunt: per hæc duo, bis usurpata, erunt ex utraque parte rectanguli, circa acutos angulos, duo duobus, angulis æquales, quod & ipsum notandum. His igitur nunc demonstratis, propositionis ueritas tali, ut sequitur, linearum ductu haberi potest. Demittantur ab angulo triāguli recto, ad remotiores ab eo duos quadrati iam diuisi angulos, duo rectæ lineæ. Et quoniam his duabus rectis duo triangula descripta sunt, cum hæc eadem triangula, atq; ipsorum parallelogramma, unam & eandem basim habeant, in eisdem etiam parallelis constituta sint: triangula parallelogrammorum dimidia, uel contrà, hæc ad illa duplicia esse, per propositionem 41. iam dudum conclusum est. Ducantur ultimò, etiam ab acutis rectanguli trianguli angulis duæ rectæ lineæ, quarum utraq; per latus eundem angulum subtendens, usq; ad angulum quadrati illum, cui idem acutus hæctenus non est cōiunctus, continuetur. Describuntur autem sic duo triangula alia, quæ similiter suorum parallelogrammorum, hoc est, quadratorum à lateribus duobus descriptorū, dimidia sunt, cum sic æqualia etiam sint ex propositione 4, bis usurpata, triangulis prioribus descriptis, utrunq; suo: ad illa priora triangula, eadem quadrata duplicia erunt. Sed quia ad illa priora duplicia etiam sunt, ut quidem demonstratū est, duo partialia diuisi quadrati parallelogramma: per cōmunem igitur noticiam, Quæ eiusdem duplicia, æqualia inter se sunt, parallelogramma partialia, quadratum nimirum lateris, angulum rectum subtendentis, reliquorum duorum laterum quadratis æquale erit. In rectangulis igitur triangulis, quadratum quod à latere rectum angulum subtendente describitur, æquale est eis, quæ à lateribus rectum angulū continentibus describuntur quadratis, quod demonstrari oportuit.

APPENDIX.

Porro ex Apollodoro refert Laertius, hanc olim propositionem à Pythagora, Italice philosophiæ principe, inuentam fuisse, sic inquit. *Φησὶ δὲ ἀρχιλόδωρος ὁ λαγυσικὸς, ἐκ τὸ μὲν βλῶ δῦσαι αὐτῷ, εὐρόντα ὅτι τῷ ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἢ ἑσποτίνισσα πωλευράϊσον διώαηταις πῶδε χέσους.* Καὶ ἐστὶν ἐπίγραμμα ἕτως ἔχον.

Ἦνκε Πυθαγόρης ἢ περικλῆϊς ἕνθα γράμμα

Κεῖν' ἐφ' ὅτῳ κλεινὴ ἦ γα γερβθυσίλω.

Hæc in Latinum sermonem è Græco uersa, sic sonant.

Refert autem Apollodorus supputator, hecatomben illum immolasse, cum inuenisset, quòd trianguli rectanguli hypotenusæ tantum posset, quantum ea quæ rectum angulum continerent latera. Et est epigramma sic se habens,

Postquam à Pythagora est præclara reperta figura,


Tunc centum ille boum sacra peregit ouans.

Hoc idem attribuit Pythagoræ etiam L. Vitruuius Pollio, libro nono, capite quarto suæ architecturæ: atque hunc locum uidere Lector poterit.

Citauimus autem hæc libenter, cum propter uetustatem, tum etiam propter honorificam

norificam & Pythagoræ & propositionis huius mentionem, cum illius in omnibus ferè rationibus nō sit mediocris usus. Hinc eo maiori studio & diligentia perdiscenda, memoriæq; commendanda est.

SEQVITVR HVIVS PROPOSITIONIS FIGVRA GEO. metrica alia, unâ cum numeris explicata.



OPERATIO TRIANGVLORVM QVANTVM AD areas inueniendas.

Triangulum unum, cuius

Latera quidem sunt

$\sqrt{1450}$
25
15

Summa $40 + \sqrt{1450}$

Excessus uerò

$20 - \sqrt{\frac{1450}{4}}$
 $\sqrt{\frac{1450}{4}} - 5$
 $\sqrt{\frac{1450}{4}} + 5$

Medietas $20 + \sqrt{\frac{1450}{4}}$

Quatuor numeri.

$20 - \sqrt{\frac{1450}{4}}$. $\sqrt{\frac{1450}{4}} - 5$. $\sqrt{\frac{1450}{4}} + 5$. $20 + \sqrt{\frac{1450}{4}}$.

Productum pri. $37\frac{1}{2}$,

secundum $337\frac{1}{2}$,

tertium $\frac{50625}{4}$

atq; area tandem trianguli $112\frac{1}{2}$. Et tanta est etiam medietas parallelogrammi partialis, uel quadrati, quod est à parte dextra.

Triangulum alterum, quod habet

Latera

$\sqrt{1625}$
25
20

$45 + \sqrt{1625}$

Excessus itaq;

$\frac{45}{2} - \sqrt{\frac{1625}{4}}$
 $\sqrt{\frac{1625}{4}} - 2\frac{1}{2}$
 $\sqrt{\frac{1625}{4}} + 2\frac{1}{2}$

$\frac{45}{2} + \sqrt{\frac{1625}{4}}$

Productum primum 100, secundum 400, tertium 40000, atq; tandem trianguli area, 200. medietas scilicet alterius partialis parallelogrammi, uel quadrati partis sinistrae. Quare, &c.


Εὰν τριγώνου ἡ ἀπὸ μιᾶς τῶν πλευρῶν τετράγωνον, ἴσον ᾖ τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν τριγώνου δύο πλευρῶν τετραγώνοις ἢ περιεχομένη γωνία ἐπὶ τῶν λοιπῶν τριγώνου δύο πλευρῶν, ὀρθή ἐστίν.

PROPOSITIO

XLVIII.

Si quod ab uno laterum trianguli describitur quadratum, æquale fuerit eis quæ à reliquis trianguli duobus lateribus describuntur quadratis: angulus cōprehensus sub reliquis trianguli duobus lateribus, rectus est.

Sit triangulum, cuius quadratum, quod ab uno latere describitur, reliquorum duorum laterum quadratis æquale sit: dico, angulum quem illud latus subtendit, rectum esse. id quod sic demonstratur. Ab angulo illo, qui, quod rectus sit, demonstrari debet, atq; à latere huius recti uno, tanquam à puncto in recta dato, linea, per propositionem 11, πρὸς ὀρθὰς ducatur, ea deinde, per propositionem 3, lateri circa hunc rectum alteri, æquali posita, per id quod petitione quadam permixtum est, nimirum quod ab omni puncto ad omne punctum linea recta duci possit, claudatur tandem triangulum. Et quoniam duæ lineæ, latus scilicet trianguli unum, & extra triangulum πρὸς ὀρθὰς ducta, sunt, ex structura, inter se æquales: quod quadra-



ta, ab his æqualibus descripta, inter se æqualia sint, manifestum est. Hinc æqualibus his quodam communi, quadrato scilicet lateris alterius, ad quod nimirum extra triangulum linea πρὸς ὀρθὰς ducta est, addito: & producta iam, uel collecta, inter se æqualia erunt. Quoniam autem utrunq; horum, unum quidem ex hypothesi, alterum uerò ex propositione præcedenti, unius lateris quadrato æquale est: & horum duorum quadratorum latera inter se æqualia erunt. Igìtur, cū iam duo, qualia ipsa s. propositio requirit, triangula appareāt: angulus ille quem propositi trianguli latus, quod in reliqua duo potest, subtendit, per eandem octauam, rectus erit.

Si igitur ab uno alicuius trianguli latere quadratum descriptum, à reliquorum duorum laterum descriptis quadratis æquale fuerit: angulus ille, quem hoc latus subtendit, rectus erit, quod demonstrasse oportuit.

FINIS LIBRI PRIMI.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ ΧΕΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

EVCLIDIS ELEMENTORVM GEO- metricorum liber secundus.



Vmit ex hoc libro secundo Arithmeticus pulchra sui calculi compendia, multæ item regularum Algebrae æquationes, & nonnulla etiam harum regularum fundamenta, per huius secundi libri propositiones demonstrare solet. Habet præterea is liber propositiones duas, unam quidem pro Amblygonio, alteram deinde pro Oxygonio triangulo, illæ uerò quantum utilitatis, si in reastronomica ad penultimam propositionem primi, de Orthogonio triangulo expositam, referantur, afferre soleant, norunt qui in hac disciplina aliquandiu uersati sunt. Quare si nullum alium præterea usum haberet, ob has duas saltem propositiones præsens hic liber maximopere amplectendus & perdiscendus esset.


ΟΡΟΙ.

Πᾶρ πῶαλληλόγραμμο ὀρθογώνιοι περιέχονται λέγεται, ἑὰὸ δύο, τῶ τῶ ὀρθῶν γωνίαμ ποδεχσῶμ ἐμβειῶμ

DEFINITIONES.

Prima. Parallelogrammum rectangulum quid.


Omne parallelogrammum rectangulum sub duabus, rectum angulum comprehendentibus, rectis lineis dicitur contineri.



Γαίηρ δὲ πῶαλληλόγραμμου χωρίσ, τῶ ποδε τῶ διαμέτρομ αὐτοῦ ἐμ πῶαλληλόγραμμο ὁποιοῦν ἔμ, (ὡν ῥίς δύο σὶ πῶαπληρώμασι, Γνώμωμ καλείστω.

Secunda. Gnomon quid.


Omnis parallelogrammi spacij, eorum quæ circa diametrum illius




sunt parallelogrammorum unumquodque, cum duobus supplementis, Gnomon uocetur.

S Sententia

Sententia definitionis est, Omnis parallelogrammi, quod quidem per ductam ipsius diametrum, ac duas deinde in eo rectas, quæ sese mutuò in communi quodam diametri puncto secant, lineas ductas, in quatuor partialia parallelogramma alia diuisum est, utrunq; eorum, per quæ diameter transit, cum reliquis duobus parallelogrammis, quæ extra diametrum sunt posita, atq; supplementa uocata, Gnomonem nominari.



Est hæc Gnomonis definitio generalior, quàm quæ à Vitruuio est posita, cum hæc rectum tantum angulum, illa uerò cuiuscunq; generis angulos, modo parallelogrammum fuerit spacium, consideret. Definit autem ferè his uerbis Gnomonem Vitruuius, lib. 9. cap. 7. Architecturæ, eum esse ac formari, quando ex medio planicie linea πρὸς ὀρθὰς erigitur.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΠΡΩΤΗ. Α.


Ἐὰν ᾖσι δύο εὐθεῖαι, τμηθῆ δι᾽ ἑτέρας αὐτῶν εἰς ὅσα διηκτορ τμήματα ἢ περιεχομένου ὀρθογωνίου ἕωδ τῶν δύο εὐθειῶν, ἴσον ᾖσι, τις ἕωδ τε γλῶτμήτα καὶ ἑκάστῃ τῶν τμημάτων περιεχομένοισ ὀρθογωνίοισ.

PROPOSITIONES.

PRIMA I.


Si fuerint duæ rectæ lineæ, seceturq; altera ipsarum in quotcunq; segmenta: rectangulum comprehensum sub duabus rectis lineis, æquale est eis, quæ ab infecta & quolibet segmentorum rectangulis comprehenduntur.

Sint duæ rectæ lineæ, harum etiam altera in partes quotcunq; diuisa: dico, rectangulum sub duabus datis rectis cōprehensum, eis, quæ sub indiuisa & singulis partibus rectæ diuisæ cōprehenduntur rectangulis, æquale esse. Excitetur ex alterutra alterutrius etiam lineæ extremitate, per propositionem II. primi, ad angulos rectos linea, quæ per tertiam eiusdem, ad æqualitatem alterius posita, ex eius altera extremitate, lineæ, ad quam πρὸς ὀρθὰς linea posita est, parallela, eiq; æqualis, recta linea ducatur, & claudatur superficies. Quòd si



iam


iam ex singulis diuisa linea punctis, linea recte, eis qua ab extremitatibus eiusdem diuisa modo educta sunt, per 31 primi, parallelae, ad latus usque oppositum ten-



dentes, ducte fuerint, hac structura tandem propositio sic retinebitur. Quoniam enim totale ipsis partialibus parallelogrammis, ut apparet, aequale est, totale autem cum sub duabus rectis datis, equali pro aequali linea sumpta, partialia item singula sub indiuisa & singulis partibus diuise, & hic aequali subinde pro aequali linea sumpta, contineantur: sub duabus igitur datis comprehensum rectangulum eis qua sub indiuisa & singulis partibus diuisa continetur rectangulis, aequale erit. Si fuerint igitur duae recte lineae, quarum altera quidem in segmenta quocumque secetur: rectangulum sub duabus rectis lineis comprehensum, equa-

le est eis, qua ab infecta & quolibet segmentorum rectangulis comprehenduntur, quod demonstrari oportuit.

POTEST FIGVRA ETIAM SIC INSTITVI.



Quia uero omnes huius secundi libri propositiones generaliter & de lineis & de numeris intelligi, atque per ea declarari possunt, ideo etiam, ut quaeque propositio suos proprios numeros, suas etiam convenientes & debitas lineas haberet, diligenter curauimus, id quod boni consulere Lector uelit.

APPENDIX.

Solent Arithmetici non raro in multiplicatione, numerum unum eorum, qui inter se multiplicari debent, in partes aliquot distribuere: alterum deinde, cum partibus distributi singulis multiplicare, ac multiplicationis tandem productum, per horum partialium productorum summam representare: atque id certe compendio quodam, quod ex hac propositione desumptum est, facere eos, studiosi sciant.

EXEMPLVM SIT.

Indiuisus	diuisus in par.	Alias multipli- catione sic,
74	37	74
1480	20	37
740	10	518
370	5	222
148	2	2738
2738	ijdem numeri	

Huius compendij frequens usus est circa multiplicationem in regula Proportionum.

Quod si uero numeri illi propositi aequales inter se fuerint, utuntur pro hac prima, sequenti propositione secunda, ut quae idem sub una recta linea, uel numero, bis tamen eo repetito, proponit, atque in hoc prima a secunda propositione differt.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ


B.

Εὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῆ ὡς ἔτυχεν· τὰ ὑπὸ τῆ ὅλης καὶ ἑκατέρου τῶν τμημάτων περιεχόμενα ὀρθογώνια, ἴσα ὄντι, τῷ ὑπὸ τῆ ὅλης τετραγώνῳ.

PROPOSITIO II.

Si recta linea secetur utcumq;: quæ sub tota & utroq; segmentorum re-
ctangula comprehenduntur, æqualia sunt ei quod à tota fit quadrato.


Sit recta linea in partes utcumq; diuisa: dico, quæ sub tota & utroq; segmento-
rum rectangula comprehenduntur, æqualia esse ei quadrato, quod à tota describitur.



singulis (nam & plurium segmentorum lineam hæc propositio ferre potest) ad angulos rectos lineæ, uel si magis placet, utriq; eorum, quæ diuisæ data ad rectos insistant, laterum parallelæ, usque ad oppositum latus ducantur. Et quoniam partialia per ductas parallelas descripta parallelogramma, ei quod à recta diuisa descriptum est, quadrato, per propositionem præcedentem æqualia sunt, interiores etiam à punctis ductæ rectæ lineæ, & quadrati latera singula, uel hoc solum, cui interiores ductæ insistant, omnes sunt lineæ inter se æqua-

les, æquali subinde pro æquali lineæ sumpta: hæc ut præcedens tandem manifesta erit. Si recta igitur linea secetur utcumq;: quæ sub tota & utroq;, uel quolibet segmentorum rectangula comprehenduntur, æqualia sunt ei quod à tota fit quadrato, quod demonstrari oportuit.

POTEST FIGVRA ETIAM SIC INSTITVI.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Γ.


Εὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῆ, ὡς ἔτυχεν· τὸ ὑπὸ τῆ ὅλης καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ὄντι τῷ τε ὑπὸ τῶν τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ, καὶ τῷ ὑπὸ τοῦ προειρημένου τμήματος τετραγώνῳ.

PROPOSITIO III.


Si recta linea secetur utcumq;: rectangulum sub tota & uno segmento-
rum comprehensum, æquale est ei quod sub segmentis comprehenditur
rectangulo, atq; ei quod à prædicto segmento describitur quadrato.

Sit recta linea seceta utcumq;: dico, rectangulum quod sub tota & uno eius seg-
mentorum cōprehenditur, id æquale esse rectangulo sub segmentis comprehenso,
cum


eum quadrato predicti segmenti. Descripta figura ut requiritur, demonstratio ex propositione prima sumi poterit, segmento illo in quod tota diuisa ducta est, pro altera linea sumpto. Erunt enim sic duæ rectæ, una diuisa, ipsa scilicet exposita, & altera indiuisa, dictum nimirum segmentum, de quo unumquemque admonitum esse uolui.



Alia dispositio.



Sunt hic compendio quodam, duo exempla simul iuncta.



ALIA HVIVS REI DEMONSTRATIO.

Describatur ab uno segmentorum, utrum hoc fuerit, quadratum: latere deinde quadrati eo, quod diuisæ rectæ opponitur, ad quantitatem segmenti alterius secundum continuationem in rectum eiecto, à termino illo, tanquam à puncto dato, reliquis duobus quadrati lateribus, per propositionem 31. primi, parallela ducatur. Et quoniam, quod sic descriptum est totum, duobus, quadrato scilicet descripto, & rectangulo cuidam, æquale est, totum autem cum sub tota recta & linea quadam uni segmentorum æquali comprehendatur, alia uerò duo, unum quidem sub segmentis diuisæ comprehenditur, alterum uerò ex priori segmento quadratum descriptum esse appareat, id quod uolebat propositio, iam sic se habere manifestè patet. Si recta igitur linea secetur utcumque: rectangulū sub tota & uno segmentorum comprehenditur, æquale est ei, quod sub segmentis comprehenditur rectangulo, atque ei, quod à predicto segmento describitur quadrato, quod demonstrasse oportuit.

Est autem huius textus figura geometrica ea, quæ ex superioribus est in ordine prima.

HAEC PROPOSITIO IN NUMERIS SIC SE HABET.

partes		partes	
Totus { 8		Totus { 12	
14 {	8	8	
14 { 6	6	8	
8	48	64	
112 æquales	112		
		29 {	17
		29 { 17	12
		12	204
		348 æquales	144
			348

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Δ.


Ἐὰν ὑπεῖα γραμμή τμηθῆ, ὡς ἔτυχεν ἅπασαν τὴν ὀλίγην τετραγώνου, ἴσους αἰ τοῖς τε ἀπὸ τῶν τμημάτων τετραγώνοις, ἢ ἅπασαν διὰ τῶν τμημάτων πρὸς ἑαυτῶν ὀρθογώνια.

PROPOSITIO IIII.


Si recta linea secetur utcumque: quadratum quod à tota describitur, æquale est quadratis, quæ fiunt à segmentis, & ei quod bis sub segmentis comprehenditur rectangulo.

Sit recta quædam linea data, in duo etiam segmenta utcumque diuisa: dico, quod quadratum

quadratum à tota descriptū, æquale sit quadratis quæ à segmentis fiunt, & ei quod sub segmentis comprehenditur bis. Est hæc quarta nihil aliud quàm tertia propositio repetita bis, id quod cuilibet manifestabitur, qui quadratum totius (mutato nomine) duo rectangula esse, quæ sub tota & duobus segmentis comprehenduntur, perceperit. Quare cum iam tertia demonstrata sit, hanc quartam demonstrare non erit necesse. Quia uerò non mediocris est, in Arithmeticis præsertim, huius propositionis usus, propriam eius demonstrationem adducere libuit in hunc modum. Describatur à recta data quadratum, ducatur etiam in eo diameter à puncto deinde, uel




punctis (nam ut præcedens, ita & hæc de pluribus segmentis intelligi potest) diuisionum singulis, lineis, quæ à latere sunt, parallelæ ad oppositum usque latus ducantur, ubi tandem hæc diametrum secant, per puncta illa, reliquis lateribus parallelis ductis, figura parata erit: dico ergo ut supra.



Quantum ad demonstrationem, primò demonstrandū erit, parallelogramma illa, per quæ nimirum diameter transit, quadrata esse, & hoc quidem tali modo. Ex data recta descriptum est quadratum, cuius latera cum, ex definitione, inter se sint æqualia: qui in utraq; parte ad diametrum ponuntur anguli partiales, ex priore parte propositionis 5. primi, inter se æquales erunt.

Et quia cuilibet partiali, ut interno est æqualis, ex secunda parte propositionis 29. primi alius externus, æqualibus pro æqualibus angulis sumptis, singuli duo in quolibet per quod diameter transit parallelogrammo, anguli inter se æquales erunt: quare & latera cuiusque trianguli, quæ illos æquales angulos subtendunt, ex propositione 6. primi æqualia: atque tandem æqualium laterum, ex 34. & communi illa noticia, Quæ eidem sunt æqualia, & inter se sunt æqualia, hæc ipsa parallelogramma, quod est notandum. Ad hæc, quia etiam ex parte tertia propositionis 29. primi, atque ipsa 34. eiusdem, facile rectangula esse ostenduntur, cum per illam quidem, anguli




horum parallelogrammorum interiores, ex eadem parte sumpti, duobus rectis æquales sint, per hanc uerò, angulos oppositos æquales inter se habeant: quadrata igitur ex definitione rectangula illa, atque segmentorum etiam, rectæ diuisæ quadrata erunt, quod primò demonstrandum erat. Nunc uerò, quoniam horum quadratorum, hoc est parallelogrammorum supplementa, ex propositione 43. primi, inter se æqualia sunt, atque unum quidem eorum, propter linearum æqualitatem, id quod sub segmentis diuisæ comprehenditur: & alterum quoque simili se modo habebit. Ambo igitur simul ei, quod sub segmentis comprehenditur bis, æqualia erunt. Hinc quatuor illa, duo nimirum quadrata, & duo supplementa, duorum segmentorum quadratis, atque ei quod sub segmentis comprehenditur bis, æqualia erunt. Sed quia quatuor priora, totius rectæ diuisæ quadrato, ut apparet, atque etiam ex tertia præcedenti usurpata bis, manifestum est, æqualia sunt: & posteriora tandem, ex communi quadam noticia, eidem quadrato æqualia erunt. Si recta igitur linea secetur utcumque: quadratum quod à tota describitur, æquale est quadratis quæ fiunt à segmentis, & ei quod bis sub segmentis comprehenditur rectangulo, quod demonstrasse oportuit.

Ἐτέρη δὲξις.

Aliter idem ostendere.

Maneat prior dispositio. Et quoniam quadratorum latera, ex definitione, inter se æqualia sunt: anguli ad diametrum partiales, ex utraq; parte, per priorem partem propositionis quintæ primi, inter se æquales erunt. Et rursus quoniam quadratorum anguli

anguli sunt recti, & id ex definitione: uterq; æqualium angulorum in utroq; triangulo, ex corollario propositionis 32. primi medietas recti erit. Hinc sicut partialium triangulorum unumquodq;, ex secunda parte propositionis 29. primi, angulum re-



ctum habet, ita etiam uniuscuiusq; tertium angulum medietatem recti esse, manifestum erit. Singula igitur triangula, ex propositione 6. primi, Isoscelia, Quadrilatera insuper, ex propositione 34. & illa communi noticia, Quæ eidem æqualia, &c. æquilatera erunt. Et quia unumquodq; etiam rectum angulum unum, cum totius rectæ diuisæ quadrato communem habet, unum deinde ex secunda parte propositionis 29. primi: & reliqui, illis scilicet rectis oppositi, singuli recti erunt: quadrata igitur sunt ea,

per quæ diameter transit, quadrilatera: atq; illis etiam, quæ à segmentis diuisæ fiunt, æqualia. Reliqua nunc, ut in priori, demonstrantur.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Εκ δὴ τῶν φανερόν ἐστιν, Ὅτι ἐν τῶν τετραγώνων χωρίοις, τὰ πρὸς τῶν διαμέτρων παραλληλόγραμμα, τετραγώναι ἐστίν.

COROLLARIUM.

Ex hoc sanè manifestum est, Quòd in quadratis spacijs circa diametrum parallelogramma, quadrata sint.

APPENDIX.

Hac propositione non rarò utuntur Logistici in regulis Algebrae. per eas enim numerorum irrationalium additionem, Aequationem deinde, in qua, tribus quantitatibus, naturalis ordinis uel æqualibus medijs, propositis, duæ maioris appellationis, tertix, cui minor est appellatio, adæquantur, & alia quædam demonstrare solent.

PRIMO QVANTVM AD ADDITIONEM.

Addituri $\sqrt{18}$ ad $\sqrt{32}$ uel id genus, irrationalium numerorum, addunt primò illorum irrationalium quadratos, uno deinde cum irrationali altero multiplicato, numerum qui producitur, propter duo supplementa, bis sumunt. Postremò huius quartæ propositionis memores, quæ dicit, Quadratum lineæ, uel numeri, ὡς ἐτυχῆ διuisi, tantum esse, quantum ex quadratis partium illius, cum eo quod ex una parte cum altera multiplicata bis sumpto, efficitur: omnia hæc, tam quadrata partium, quàm etiam duo supplementa, quæ nimirum ex multiplicatione unius partis diuisi numeri cum altera, bis repetita nascuntur, simul iungunt, idq; propterea quidē, ut totius compositi seu in partes diuisi numeri quadratum habeant, per huius tandem quadrati radicem, quantum sit ipsum latus uel totus numerus, enuncient.

SEQVITVR CALCVLVS.

$$\begin{array}{r} \sqrt{50} \\ \sqrt{18} \text{ ad } \sqrt{32} \\ \hline \sqrt{576}, \text{bis} \\ \sqrt{2304} \\ \text{hoc est } 48. \text{ duo} \\ \text{supplementa} \end{array}$$

Addantur nunc 50, partium quadratis
48, duo supplementa
ueniunt 98, quadratum totius
quare $\sqrt{98}$ ipsum latus,
hoc est partium seu surdorum
propositorum summa.

ALIVD EXEMPLVM.

$$\begin{array}{r} \text{Addantur } \sqrt{13} \text{ ad } \sqrt{21} \\ \hline \sqrt{273}, \text{bis} \\ \sqrt{1092}, \text{ duo supplementa} \\ 34, \text{ quadrata partium,} \\ \hline \text{quare } 34 + \sqrt{1092}, \text{ quadratum totius compositæ lineæ uel} \\ \text{numeri.} \end{array}$$

numeri. Huius igitur radix quadrata, quæ est
 Radix collecti $34 + \sqrt{1092}$, uel $\sqrt{21} + \sqrt{13}$, numerus ipse.
 Quomodo autem uera radix posita, utpote $\sqrt{21} + \sqrt{13}$, ex hoc collecto, quod
 Ex binis nominibus prima dicitur, inueniri debeat, id iam dudum traditum est.

SEQVITVR QVAESTIO.

Est numerus quidam diuisus in duas partes, partes autem cum sint
 13 & 21 , quantus ipse totus numerus sit, quæritur. Facit 34 .

Id quod per additionem partium ad se, facile deprehenditur.

Quòd si quis exercendi ingenij gratia altius hoc quærere uelit, ad quartam huius
 secundi libri propositionem confugiat necesse est, atq; sic operetur.

Partes propositæ sunt 13 & 21 , Partium quadrata 169 & 441 , Quod sit, una par-
 te cum altera multiplicata,

	273
	bis
duo supplementa	546
Partium quadrata	610
quadratum igitur totius 1156 , atq; tandem	
ipse totus numerus,	34 , qui quærebatur.

ALIA QVAESTIO.

Partes alicuius numeri sunt 49 & 36 , quantus est ipse totus.

Facit 85 .

Nam quadrata partium sunt 2401 , & 1296 . multiplicatio uerò unius partis cum
 altera bis, producit 3528 . Omnia hæc simul iuncta, ueniunt 7225 , quare huius radix
 quadrata, 85 , ipse totus numerus, qui ex additione datorum constituitur. Atq; hæc
 de additione dicta sufficiant. Sequitur

AEQVATIO.

Tradidimus in regularum Algebrae descriptione tres æquationes, tanquam po-
 tiores, quibus subinde, per has regulas ænigmata soluere cupientes opus habent.
 Quoniam uerò secundam æquationem per tres canones descripsimus, primus au-
 tem eorum ex hac quarta propositione est desumptus, atq; nihil aliud ferè esse uide-
 tur, cum id ipsum sic sese habere manifestauerimus, propositio etiã paulo ante de-
 monstrata sit, & hunc canonẽ tandẽ demonstratũ & fundatum esse, nemo dubitet.

Porrò canonis huius tractatio, est de tribus naturalis ordinis quantitatibus,
 quando uidelicet maiores duę, id est harum numeri, minimæ quantitatibus seu cha-
 racteris numero æquantur, ut est


Prima + radix Numero.

Tum ad quadratum (ut paucis repetantur priora) dimidij numeri characteris
 medij, numerus characteris minimi addi, à radice deinde huius collecti quadra-
 ta, dimidium characteris medij subtrahi debet: quo factò, quæsitum numeri compos-
 aliquis erit, cũ uidelicet per id quod relinquitur, radicis ualor exprimat. ut Esto
 quòd per alicuius exempli operationem eò peruentum sit, ut 1 prima + 4 radix
 æquales sint 45 N. huius geometrica solutio uel demonstratio talis erit.

Quoniam enim, ut canon habet, ad quadratum dimidij numeri characteris me-
 dij, numerus characteris minimi addi, à radice deinde huius collecti quadrata dimi-
 dium numeri characteris medij subtrahi debet, hoc certe si quis propositionem
 hanc quartam, ac canonem etiã altius perpenderit, unam rem esse, alijs tamen at-
 que alijs expressam uerbis, asseret. Nam ultimum quadratum, pro quadrato ali-
 cuius totius, puta numeri in partes diuisi habebit: dimidium uerò radicis caracte-
 ris medij, alteram huius diuisi partem: numeros deinde additos, cum ipsorum ad-
 ditio

ditio quadratum efficiat, Gnomonem, ut quem, ex definitione, utrunq; circa diametrum parallelogrammum, & duo supplementa cōstituunt, exponet. Hac expositione tandem, huius quartæ propositionis memor, ex toto quadrato radicem eliciet. Et quia hæc ex partialium quadratorum radicibus composita est, cum unius partialis quadrati radix, dimidium scilicet numeri characteris mediij, nota sit: & altera tandem, radix nimirum propositi in exemplo quadrati, subtractione nota erit, id quod pro declaratione huius canonis dicendum erat.

SEQVITVR HVIVS REI FIGVRA GEOMETRICA.



Est demonstratio uel expositio geometrica, puerilis quidem illa, sed quæ rem fidelissimè explicat.

SEQVITVR QVÆSTIO CVM CANONI, TVM etiam propositioni accommoda.

Diuidatur numerus in partes duas, quarum quadrata simul, unà cum numero, quem producant partes inter se multiplicatæ bis 1764 constituent. Vna autem pars cum sit 13 (atq; tantam esse medietatem quantitatis mediæ intelligendum est) quanta fuerit altera quæritur.

Facit 29.

ACCEDIT ET TERTIVS HVIVS QVARTÆ PROPOSITIONIS, quem habet in Numeris, usus.

In radicibus eliciendis cum semper inuenti numeri quadratum inuestigandum sit, ille uerò numerus subinde, quàm diu sanè durat huiusmodi operatio, una figura crescat, ne totus inuentus semper in se multiplicandus sit, ubi propositionem hanc quartam intellexerint Arithmetici, compendiosius inuentorum quadrata assequuntur, per hunc modum. Habito de numero iam inuento, tanquam de una parte totius, quadrato, recipiatur etiam quadratum de numero uel parte altera: una deinde parte cū altera multiplicata, is qui producit numerus bis sumatur. Quòd si tandem hoc duplum prioribus duobus partium quadratis cōiungatur, per id collectum tandem commodè, iuxta hanc quartam propositionem, quadratum totius inuenti numeri exprimi poterit.

Huius rei tale sumatur exemplum.

Inuenta est radix ex aliquo numero 6. cuius quadratum quidè 36. accedit autem huic radici seu inuento numero, cum nondum ad finem hæc radicis extractio perducta sit, figura alia, nimirum 4, atq; sic aucta est prior inuenta radix: creuit enim à 6 in 64, atq; huius totius iam desideratur quadratū, uel quadratus numerus. Prioris igitur figuræ uel inuenti numeri, tanquam unius partis radicis diuisæ, quadrato habito, accipiatur & quadratum alterius, secundò scilicet inuenti numeri, 4, quod erit 16. Et quia numerus primò inuentus, 6. secundum iam locum occupat, unde ratione loci sic, non sex amplius, sed sexaginta significat, ipsius igitur quadrato, 36

T scilicet,

scilicet duæ figuræ nihilî proponendæ sunt. Postremò una cum altera parte multiplicata bis, producuntur 480. Hæc omnia si in unam summam colligantur, quantum sit quadratum de 64, apparebit.

SEQUITVR PRAxis.

	Partes	partium quadra.	Aliàs multiplicati- one sic
Tota radix uel numerus	60	3600	
64		26	64
Quod producitur, una parte cum altera mul- tiplicata bis	4	480	cum 64
			256
<hr/> Summa productorum		4096	<hr/> 384
			4096

Quòd si uerò adhuc una figura accesserit, s scilicet, operatio sic instituat.

	Partes	partium quadrata	Multiplicatio- ne sic
Totus numerus 648	640	409600	648
Ex partium multiplicatione repetitum bis		8	64
<hr/> Summa omnium, & quadratum totius		10240	<hr/> 8c.
		419904	

Atq; hæcenus de propositione quarta. sequitur


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε.

Εὰν ἐνθῆια γραμμὴ τμηθῆ εἰς ἴσα καὶ ἀίγια· ἢ ἔσθ' ἡ ἀίσιωρ ᾗ ὅλης τμημάτωρ περιεχόμενον ὀρθογώνιον, μετὰ τὸ ἀκρὸν ᾗ μεταξὺ τῶν ἑμῶν τετραγώνων, ἴσων ὄσιν τῷ ἀκρὸν ᾗ ἡμισείας τετραγώνων.

PROPOSITIO V.

Si recta linea secetur in æqualia & non æqualia: rectangulum, quod sub inæqualibus segmentis totius comprehenditur, unà cum quadrato eo quod à medio sectionū fit, æquale est ei quod à dimidio fit quadrato.

Sit recta quædam linea proposita, atq; hæc primū in duo æqualia, deinde etiam in duo inæqualia diuidatur: dico, rectangulum sub portionibus inæqualis diuisionis comprehensum, unà cum quadrato excessus longioris portionis inæqualium



super medietatem lineæ, æqualia esse quadrato medietatis. Describatur à dimidia illa, in qua est punctum inæqualis diuisionis, quadratum, cuius diameter cum una datæ extremitate copuletur, atq; ab inæqualis diuisionis puncto, per diametrum ad latus usq; oppositum, reliquis duobus quadrati lateribus parallela ducatur. Et quia hæc diametrum secat, ubi ex puncto intersectionis, utrisq; hoc est, & rectæ datæ, & lateri ei opposito, altera parallela, datæ æqualis, ducta, ea deinde per tertiam parallelam, cum extremitate datæ, quæ adhuc libera est, copulata fuerit, figura parata

parata erit. Dico ergo nunc, ut supra. Quoniam enim supplementa omnis parallelogrammi inter se æqualia sunt, his nunc æqualibus quadrato brevioris portionis, tanquam communi addito: & quæ colliguntur, ex cõmuni quadam noticia, æqua-



lia erunt. Sed quia unum ex his alijs cuidam, cum quo nimirum æqualem basim habet, atq; in eisdem est parallelis, ex propositione 36. primi, est æquale: & alterum, ex communi quadam noticia, eidem æquale erit. His igitur æqualibus nunc, ut tandem concludatur, si utriq; id quod alterum æquale ad complendum medietatis quadratum requirit, addatur: & producta, hoc est rectangulum sub portionibus inæqualibus comprehensum, cum quadrato quod ab intermedia portione describitur, & quadratum medietatis, inter se æqualia erunt. Si igitur recta linea secetur in æqualia, & non æqualia: rectangulũ quod sub inæqualibus segmentis totius comprehenditur, unà cum quadrato eo quod à mediõ sectionum fit, æquale est ei quod à dimidiõ fit quadrato, quod demonstrasse oportuit,


APPENDIX.

Habet & hæc propositio suum in Numeris locum, cum per eam tertius secundæ æquationis canon, (quo nimirum maximi & minimi characterum numeri, medijs characteris numero æquales esse proferuntur) demonstrari soleat in hunc modũ.

Esto exempli gratia, quod


$$1 \text{ prima} + 32 \text{ N} \text{ æquales sint } 12 \text{ rad.}$$

Describatur igitur primò quadratum, propositæ æquationis unam primam representans. huic deinde quadrato, ex una eius parte, eiusdem altitudinis rectangulum, numeros in æquatione uni primæ



adhærentes significans applicetur. Et quoniam hoc totum rectangulum, ex hypothesi, 12 radicibus æquale est, cum brevius eius latus ratione quadrati, sit una radix: eius latus longius, 12 unitates erunt: Eo igitur longiori latere, ut



canon præcipit, bifariam diuiso, erit hoc idem longius latus, linea, qualem propositio hæc quinta requirit, *ἐξ ἑσῶ* scilicet *ἑξ ἑσῶ* diuisa, quod est notandum. Describatur nunc ab una medietate diuisæ quadratum, compleaturq; figura. Et quoniam medietatis quadrato, rectangulum numerorum cum quadrato lineæ,



portio
quæ à dimidiõ characteris medijs
subtrahi debet.

qua rectanguli longius latus medietatem diuisæ excedit, ex hac quinta, æquale est, ubi horum æqualium uni rectangulum numerorum: alteri uerò id, quod rectangulo numerorum, ex propositionibus quadragesima tertia & tricesima sexta primi, ac communi illa noticia, Si æqualibus æqualia adiiciantur, etc. æquale est, ablatum fuerit: & quæ relinquuntur tandem, ex communi quadam

noticia, inter se æqualia erunt. Quia autem ex utraq; parte unum & idem parallelogrammum, quadratum scilicet circa diametrum alterum, relinquitur, quadratum uerò illud notum est, cum uidelicet totum, hoc est quadratum medietatis, & subtractum deinde, hoc est, parallelogrammum uel rectangulum numerorum, nota sint: & eius radix nota erit. Ea igitur (ut quidem habet descriptio figurarum prima) à radice totius quadrati, quod uidelicet à medietate numeri characteris medijs descriptum est, subtracta: Vel ea, (ut habet descriptio figurarum secunda) radici eiusdem



Portio

quæ dimidio characteris medijs addi debet.

totius quadrati, addita: alterius quadrati, quod in æquatione propositum est, radicem notam relinquere necesse erit: id quod pro huius canonis demonstratione, uel pro eius ad hanc propositionem applicatione, dicendum erat.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 5.


Ἐὰν εὐθεία γραμμὴ τμηθῆ δίχα, προσεθῆ δ' ἐπὶ αὐτῆ εὐθεία, ἐπ' εὐθείας τ' ἄνω τ' ὅλης (ὡς τῆ προσκειμένης καὶ τ' προσκειμένης περιεχόμενον ὀρθογώνιον, μετὰ τὸ ἀπὸ τ' ἡμισείας τετραγώνου, ἴσον δ' εἶναι τὸ ἀπὸ τ' συγκεκλιμένης ἑπὶ τ' ἡμισείας καὶ τ' προσκειμένης, ὡς ἀπὸ μιᾶς, ἀναγρᾶ φησὶ τετραγώνου.

PROPOSITIO VI.

Si recta linea bifariam secetur, adijciaturq; aliqua ei in rectum recta linea: rectangulum comprehensum sub tota cū apposita & apposita, unā cum quadrato dimidiæ lineæ, æquale est ei quod à coniuncta ex dimidia & apposita, tanquam ab una, describitur quadrato.

Sit recta linea proposita, qua bifariam diuisa, alia ei in rectum linea iungatur, rectangulo deinde & quadratis secundum suas lineas descriptis: dico, rectangulum sub tota, ex recta data scilicet & adiecta composita, & adiecta comprehensum, unā cum quadrato quod à medietate diuisæ describitur, quadrato à medietate diuisæ

bifariam diuisa




8



& adiecta, tanquam ab una linea, descripto æquale esse. Ducatur in quadrato eo, quod à medietate diuisæ cum adiecta descriptum est, diameter, sic ut per quadratum etiam, à medietate diuisæ descriptum, tanquam diameter transeat, deinde latus quadrati eius, quod à medietate descriptum est alterum, usq; ad oppositum rectanguli latus continuetur. Et quoniam super æqualibus basibus, atq; in eisdem parallelis constituta

Constituta parallelogramma, ex propositione 36. primi inter se æqualia sunt. Et rursus, quoniam etiam parallelogrammorum supplementa omnis parallelogrammi spaci, ex propositione 43 eiusdem primi, æqualia, cum duo uni æqualia esse appareant, illa deinde inter se, ex cõmuni quadã noticia æqualia sint, horum æqualium utriq, parallelogrammo eo quod ad rectam, ex dimidia & apposita cõpositam, ponitur addito: & que fiunt rectangulũ scilicet sub tota & adiecta comprehensum, &





Gnomon, qui quadrato medietatis circumscribitur, inter se æqualia erunt. Ipsum igitur medietatis quadratum, ubi his æqualibus adiectum fuerit, iuxta propositionis tandem conclusionem, id quod sub tota, ex data scilicet & adiecta composita, & adiecta comprehenditur rectangulum, unã cum quadrato medietatis diuisæ, ei quod à linea ex medietate & adiecta, constituta descriptum est, quadrato, æquale erit. Si recta igitur linea bifariã secetur, adijciaturq, aliqua ei in rectum recta linea: rectangulum comprehensum sub tota cum apposita & apposita, unã cum quadrato dimidiæ lineæ, æquale est ei quod à coniuncta ex dimidia & apposita, tanquam ab una describitur quadrato. quod demonstrasse oportuit.

APPENDIX.

Vtuntur hac propositione Logistici in regulis Algebra, pro demonstratione canonis secundi in æquatione secunda.

Conferuntur in hoc canone duo minorum characterum numeri, cum numero characteris maximi, dicendo, 6 radices + 16 numeris, sunt æquales uni primæ, ubi tum geometricè sic agendum erit.

Describatur primò quadratum, quod propositæ æquationis primam representet. Et quoniam id ex hypothese, 6 radicibus & 16 N. æquale est, pro rectangulo numerorum parte aliqua ab eodẽ resecta, quod relinquitur tandem rectangulum, radicibus solum æquale erit. Describantur nunc duo quadrata, quorum quidem



unius latus sit propositarum radicum medietas, alterius uerò, hæc eadem radicum medietas, unã cum rectanguli numerorum latere ei in rectũ iuncto. Et quoniam rectangulum numerorũ, tanquã id quod sub tota composita et

adiecta seu apposita comprehenditur, unã cum quadrato dimidiæ lineæ, per hanc sextam propositionem, ei quod à recta ex dimidia & adiecta composita, tanquam ab una linea describitur, quadrato æquale est, unum autem horum, rectangulum scilicet numerorum cum quadrata dimidiæ, notum cum sit: & alterum, quadratum

scilicet lineæ, à dimidia & adiecta compositæ, iam notum erit: quare & ipsius la-
tus notum. Id autem cum à latere quadrati primò descripti, in dimidia diuisa lineæ
altera deficiat, per additionem igitur huius ad latus notum: & ipsius tandem primò
descripti quadrati latus, hoc est radicis ualor notus erit: id quod præcis, quæ modo
ex hac propositione geometricè is canon declarari ac retineri potest, indicare uolui-
mus. Atq; hæc quidem, pro demonstratione canonû secundæ æquationis in regu-
lis Algebra dicta, sufficiant. Quas uerò subtiliores illi demonstrationes habent,
eas suo tempore peculiari quodam libello Lectori communicabimus.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Ζ.



Ἐὰν εὐθεία γραμμὴ τμηθῆ ὡς ἔτυχε ἅνω ᾧ ᾧ ὅλης καὶ ἅφ' ἑνὸς τῶν τμη-
μάτων, τὰ συναμφοτέρω τετραγώνω, ἴσα ἔσονται τὸ δις ἅνω τῶ ὅλης καὶ τὸ
εἰρημῶν τμήματος περιεχομῶν ὀρθογωνίω, καὶ τὸ ἅνω τὸ λοιπῶν τμήμα-
τος τετραγώνω.

PROPOSITIO

VII.

Si recta linea secetur utcumq;: quod à tota, quodq; ab uno segmento-
rum, utraq; simul quadrata, æqualia sunt ei, quod bis sub tota & dicto
segmento comprehenditur rectangulo, & ei quod à reliquo segmento
fit quadrato.

Sit recta linea secuta utcumq;, hoc est, in equalia uel non æqualia: dico, quod qua-
dratum totius & quadratum alterutrius segmenti æqualia sint rectangulo sub tota



& sumpto segmento comprehenso
bis, cum alterius segmenti quadrato.
Formetur ex recta data figura, prout
ipsa propositio exigat, & prout ha-
bet propositio huius quarta: & duca-
tur diameter. per singula quadrata
transiens. Et quoniam ex proposi-
tione quarta huius, quadratū totius,

quadratis partium, & ei quod cōprehenditur sub partibus bis, æquale est, æquali-
bus nunc æquali, quadrato scilicet unius segmenti, ex æquo addito: mutatis dein-
de appellationibus, propositioni satisfactum erit.

ALIA HVIVS, ET CLARIOR DEMONSTRATIO.

Ex linea, ut quidem propositio requirit, figura formata, cum $\pi\alpha\omega\lambda\eta\omega\mu\alpha\tau\alpha$ om-
nis parallelogrammi spacij inter se sint æqualia, cumq; etiam æqualia, uel aliquod
commune, ut hoc loco est dicti segmenti quadratum, æqualibus additum, quæ in-
de colliguntur æqualia sint: hæc duo æqualia simul sumpta, ad utrunq; æqualium
dupla erunt. Sed quia ad utrunq; eorū duplum etiā est, quod sub tota & dicto seg-
mento comprehenditur bis, cum ex communi quadam noticia, Eiusdem duplicia,
inter se æqualia sint: & hæc duo, hoc est, Gnomon cum quadrato dicti segmenti,
& quod sub tota ac dicto segmento comprehenditur bis, inter se æqualia erunt. at-
que hæc tandem, si alterius segmenti quadratum ex æquo acceperint: cum sic &
collecta æqualia sint, constat tandem propositum. Si recta linea igitur secetur
utcumque, quod à tota, quodque ab uno segmentorum, utraq; simul quadrata,
æqualia sunt ei, quod bis sub tota & dicto segmento comprehenditur rectangulo,
& ei quod à reliquo segmento fit quadrato, quod demonstrari oportuit.

APPENDIX

Habet & hæc propositio suum in Arithmeticis usum, cum per eam modus subtrahendi radices quadratorum irrationales retineatur.

Quo ingenio Arithmetici radices quadratorum irrationales, unam ab altera solent subtrahere, ex hac propositione didicerunt. Postquam enim per eam quadratum alicuius rectæ diuisæ, cum quadrato alterutrius segmenti, ei quod sub tota & dicto segmento continetur bis, cum eo quod à reliquo segmento describitur quadrato, æquale esse cognouerunt, facilis illis fuit omnis subtractio. Nam mutatis numerorum appellationibus, numerum scilicet à quo subtrahitur, totum: subtrahendum deinde, unum segmentum: residuum porro, alterum diuisæ rectæ segmentum esse considerantes, statim hac propositione freti, quadrata numerorum, eius scilicet à quo subtrahitur, atq; etiam subtrahendi, in unum colligunt. Et quia collectum id ex hac propositione, tanto maius est quadrato residui, quantum sub his duobus numeris, toto scilicet & uno segmento, continetur bis, ut de quadrato residui, deq; ipso residuo illis constaret, mox illud comprehensum bis de quadratorum collecto subtrahunt, quod quidem obiter circa hanc propositionem indicandum erat.

SEQVITVR HVIVS REI EXEMPLVM.

A $\sqrt{75}$ debet subtrahi $\sqrt{27}$, instituitur ergo operatio sic,
 Numerus subtrahendus, hoc numero à quo subtrahitur,
 est, unum segmentum, hoc est, à toto,
 $\sqrt{27}$ à $\sqrt{75}$

102 Totius & subtrahendi quadratum
 90 Quod sub toto & subtrahendo bis
 12 Quadratum residui numeri

Quare $\sqrt{12}$, ipse residuus numerus.

SEQVITVR QVAESTIO.

De numero 34 subtracta sunt 13, quæritur de residuo. Facit 21.

Id quod per subtractionem 13 à toto numero,
 facile deprehenditur.

Quòd si quis, exercendi ingenij gratia, hoc altius quærere uelit; ad septimam huius secundi libri propositionem confugiat necesse est; atque sic operationem suam instituat.

	Vnum segmentum		toto
Subtrahantur	13	à	numero 34
quadrata	169		1156
Quadratorum summa	1325		
minus	884,	hoc est, eo quod sub toto, & dicto segmen-	
manent	441,	quadratum residui (to continetur bis,	
Quare	21,	numerus residuus.	

ALIA QVAESTIO.

Sunt duo numeri. Quoniam autem unius numeri quadrato 49, continentur, compositus uerò ex illis cum quadratum habeat 121, quantus sit numerus alter, quæritur. Facit 4.

	121		49
		170	
minus	154		
manent	16		
Quare	4	&c.	


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Η.

Εὰν ἑὐθεῖα γραμμὴ τμηθῆ ὡς ἔτυχῃ ἢ τετρακίς ἢ πρὸς ὅλην καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς λοιπῆς τμήματος τετραγώνου, ἴσον ὅστι, ἢ πρὸς τὴν ὅλην καὶ τὴν εἰρημγῆ τμήματος, ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφῆς τετραγώνου.

PROPOSITIO VIII.


Si recta linea secetur utcumq;: rectangulum quod sub tota & uno segmentorum comprehenditur quater, cum eo quadrato quod à reliquo segmento describitur, æquale est ei quod à tota & dicto segmento, tanquam ab una linea describitur quadrato.

Si recta linea secetur: utcumq; dico, quòd rectangulum, sub tota & uno segmentorum comprehensum, quater, unà cum quadrato alterius segmenti, æquale sit quadrato, quod à tota & dicto priori segmento, tanquam ab una recta, describitur. Describatur primò quadratum, cuius latus sit ipsa recta data, cum alterutra eius portione sibi ad amussim iuncta: à punctis deinde, coniunctionis scilicet uno, & divisionis altero, duæ per quadratum hoc tendentes ad angulos rectos lineæ excitentur, quadrati tandem diametro ducta, ubi hæc duas ad rectos ductas lineas secue-



Divisa		Vnum seg- mentorum.
9	12	3
	12	12
	3	& 3
	36	15
	quater	cum 15
	144	75
	81	15
	225	225

rit, per ea puncta, tanquã à pñctis datis, reliquis duobus quadrati lateribus, per propositionem 31 primi, parallelæ ducantur, & erit huius propositionis figura parata. quam quidem si quis diligenter inspexerit, atq; τὴν κατὰ σκοπιῆς, necnon eorum etiam quæ in propositionibus 36 & 43 primi tradita sunt, memor fuerit, facili opera propositioni, ex quarta huius, satisfacere poterit.



Divisa		Vnum seg- mentorum.
in 7	10 & 3	7
	10	10
	7	& 7
	70	17
	quater	cum 17
	280	119
	9	17
	289	289

numeri æquales.

ALIA HVIVS ET CLARIOR DEMONSTRATIO.

Sit recta data, ea etiam utcumq; diuisa: dico &c. Quoniam recta in duo diuisa est, segmento ei quod in collatione cum tota diuisa sumitur, ad partem etiam ubi ponitur, æqualis recta alia adamussim iungatur, quadrato deinde ab hac tota composita per 46 primi descripto, dupla figura describatur. Et quoniam rectæ diuisæ alia recta, unum segmentorum æqualis, adamussim iuncta est, cum parallelogrammorum latera opposita, ut in primo libro demonstratum est, inter se æqualia sint: illæ etiam quas hæc duæ rectæ, hoc est segmentum id, & recta ei æqualis, lineas sibi æquales habent, inter se æquales erunt, super ijs deinde parallelogramma posita, cum hæc etiam æque alta sint, ex propositione 36 primi inter se æqualia. Sed quoniam supplementa omnis parallelogrammi, ut iam sepe dictum, inter se æqualia sunt: & hæc quatuor parallelogramma, quæ super illo segmento & sua æquali, atq; alijs duabus, his æqualibus, rectis constituta sunt, ex communi quadam noticia, inter se æqualia erunt, atq; deinde horum quatuor aggregatũ, ad id quod super idem segmentum est positum parallelogrammum, quadruplum. Pari ratione & reliqua quatuor, circa uel extra diametrum posita parallelogramma, inter se æqualia, ac totum deinde ad id quod supra alterum diuisæ segmentum est positum, quadruplũ. Illud igitur prius cum hoc aggregato, quæ ambo simul Gnomonis figuram referunt, ad rectangulum, sub tota & uno segmentorum comprehensum, quadruplum erit. Quare alterius segmenti quadrato ex æquo illis appposito: gnomon cum illo alterius segmenti quadrato, hoc est, totius compositæ, ut unius lineæ, quadratum, ei quod sub tota & dicto segmento comprehenditur quater, cum eodem alterius segmenti quadrato, æquale erit. Si recta igitur linea secetur utcumq;: rectangulũ, quod sub tota & uno segmentorum comprehenditur quater, cum eo quadrato quod à reliquo segmento describitur, æquale est ei quod à tota & dicto segmentum, tanquam ab una linea describitur quadrato. quod demonstrari oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Θ.

Εὰν εὐθεία γραμμὴ τμηθῆ εἰς ἴσα καὶ ἀίσια· τὰ ἀπὸ τῶν ἀίσιων τῆ ὅλης τμημάτων τετράγωνα, ἀπλάσιά εἰσι τῶν ἀπὸ τῆ ἡμισείας, καὶ τὸ ἀπὸ τῆ μεταξὺ τῶν ἡμῶν τετραγώνου.

PROPOSITIO IX.

Si recta linea secetur in æqualia, & non æqualia: quæ ab inæqualibus segmentis totius fiunt quadrata, dupla sunt eius quod à dimidia, & eius quod à medio sectionum fit quadratorum.

Sit recta linea, in duo æqualia, in duo etiam inæqualia diuisa: dico, quadrata inæqualium segmentorum simul sumpta, dupla esse quadratorũ, quorum unum quidem à medietate lineæ, alterum uerò ab ea quæ diuisionum punctis interiecta est




linea, describitur. Excitetur ex puncto æqualis diuisionis in linea, per propositionem ii. primi, ad angulos rectos linea, eaq; per 3 eiusdem, ad æqualitatem medietatis diuisæ posita, ab eius altera extremitate duæ ad rectæ diuisæ extremitates lineæ demittantur. Describuntur autem sic duo triangula, rectangula, & isoscelia, ut patet ex structura. Excitetur rursus ex puncto inæqualis diuisionis, alia ad angulos rectos linea, uel si mauis, priori ad rectos ductæ linea parallela, eaq; ad latus usq; op-

positum continuata, ab huius & lateris oppositi contactu, ad priorem in triangulo πρὸς ὁρθὰς ductam linea diuisæ parallela ducatur. Et describuntur alia duo triangula,

V quæ

quæ & ipsa, ut patebit, rectangula sunt, & isoscelia. Quòd si tandem à communi horum duorum triangulorum copula, ad illam rectæ diuisæ extremitatem, quæ huic quodammodo è regione posita est, linea recta ducatur, huius propositionis figura constituta erit, cuius quidem explicatio & demonstratio talis. Quoniam ad punctum æqualis diuisionis constitutorum triangulorum utrunq; isosceles est, exstructura, & orthogonium, cum anguli eorum ad basim, per priorem partem propositionis quintæ primî, inter se æquales sint, uterq; in utroq; triangulo angulus, primò, ex corollario propositionis 32 primî, medietas recti: angulus deinde integer, quem recta diuisa subtendit: rectus erit. Ad hæc, cum linea ex communi partialium triangulorum copula ueniens, ut habet propositionis structura, diuisa rectæ sit parallela, deinde uerò alia quædam recta, quæ uidelicet ex puncto æqualis diuisionis in recta data $\pi\epsilon\upsilon\varsigma\ \delta\epsilon\ \delta\alpha\varsigma$ excitata est, in illas parallelas incidat: angulus exter-



ternus, ex secunda parte propositionis 29 primî, suo interno & opposito æqualis est. Quia uerò rectus est ipse internus, ex structura: & externus sic rectus erit. rectangulū igitur est illud parziale triangulum, atq; deinde per corollarium propositionis 32 primî, & sextam propositionem eiusdem, idem etiam isosceles. In hunc modum, & alterum parziale triangulum, ut rectangulum & isosceles sit, demonstrabitur. Nunc autem cum trianguli rectanguli & isoscelis, eius quidem, cuius latera sunt, sub-

tensa indiuisa, medietas rectæ indiuisa, & perpendicularis, medietati diuisæ equalis, quadratū lateris rectum angulum subtendentis, reliquis duorum laterum, quadratis, per propositionem 47 primî, æquale sit: erit propter æqualitatem laterum, illud ad utrunq; eorum duplum. Est itaq; quadratum hypotenusæ huius rectanguli, quadrato medietatis rectæ diuisæ duplū, quod est notandum. Pari ratione etiam in triangulo rectangulo & Isoceli partiali superiori, cuius nimirum alterū circa rectū angulū latus, pars est perpendicularis, ex æqualis diuisionis puncto excitata, quadratum subtensæ angulo recto, ad quadratum lineæ, quæ ex communi partialium triangulorum copula, medietati rectæ diuisæ est ad æque distantia ducta, duplum erit: quare etiam ad quadratum suæ equalis, lineæ scilicet, quæ inter diuisionis puncta iacet, duplum. Cum aut iam duæ lineæ sint, quarum utriusq; quadratū, ad alterius lineæ quadratum duplum est, & illarum quadrata simul sumpta, ad harū simul sumpta quadrata dupla erunt. Sed illarum linearum quadrata, quæ sunt ad alia dupla, æqualia sunt, quadrato lineæ, ex communi partialium triangulorum copula ad angulum oppositum ductæ, cuius quadrato etiam (cum hæc linea duorum orthogoniorum triangulorum rectos subtendat) si equalis pro æquali linea sumatur, segmentorum in æqualis diuisionis quadrata æqualia sint, per communem tandem illam noticiam: Quæ eidem equalia, & inter se sunt æqualia, propositum inferri poterit, nimirum. Si igitur recta linea secetur in æqualia & non æqualia: quæ ab inæqualibus segmentis totius fiunt quadrata, dupla sunt eius quod à dimidia, & eius quod à medio sectionum fit quadratorum, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

I.


Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῆ διχα, προσεβῆ δὲ τις αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείας ἢ ἀπὸ τ' ὅλης (ὡς τῆ προσκειμένη, καὶ ἢ ἀπὸ τ' προσκειμένης τὰ συναμφοτέρα τετράγωνα, διπλάσιά ἐστι τὸ τε ἀπὸ τῆ ἡμισείας, καὶ τὰ ἀπὸ τ' συγκειμένης ἢ τε τῆ ἡμισείας καὶ τῆ προσκειμένης, ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντος τετραγώνου.

PROPOSITIO

PROPOSITIO X.

Si recta linea secetur bifariam, adijciaturq; aliqua ei ad amissim recta linea: quod à tota cum apposita, & quod ab apposita, utraq; simul quadrata, dupla sunt eius quod à dimidia, & eius quod ab adiacente ex dimidia & adiecta, tanquam ab una, descriptorum quadratorum.

Sit recta linea proposita, ea etiam bifariam diuisa, atq; alia deinde ei ad amissim adiecta: dico, duo quadrata, compositæ scilicet lineæ & adiectæ, dupla esse ad quadrata linearum, unius quidem, quæ est medietas rectæ datæ, alterius uerò, quæ ex medietate altera atq; ei adiecta est composita. Erigatur ex puncto æqualis diuisionis ad angulos rectos linea; atq; ea ad æqualitatem medietatis rectæ diuisæ posita, altera eius extremitas duabus rectis, cum duabus extremitatibus rectæ diuisæ coniungantur, rectam illam, quæ per coniunctionis punctum transierit, ulterius continuando. Fiant autem duo triangula, rectangula atq; Isoscelia, in quorum utroque uterq; angulorum ad basim, ex structura & propositione 32 primi, medietas rectæ est, quod est notandum. Porro secundum quantitatem ad rectos ductæ, atq; eius quæ ex medietate rectæ diuisæ & adiecta composita est, lineæ, parallelogrammum rectangulum describatur, latus illud eius, quod ad rectos ductæ lineæ oppositum



est & parallelum, ultra adiectam rectam continuando. Et quia hanc continuatam, cum illa, quæ per coniunctionis punctum transit, propterea quod in eas alia recta cadens, ex illa parte duos angulos duobus rectis minores facit, ex cõmuni quadam noticia in libro primo exposita, concurrere necesse est, continuentur igitur ambe ut triangulum fiat: & erunt quæ sic apparēt duo triangula, tam totale quàm partiale, ex structura & secunda parte propositionis 29

primi, rectangula & Isoscelia, quod & ipsum notandum. Ultimò ducatur & alia recta, cuius termini sint reliquæ extremitates datæ & continuatæ linearum, & erit figura, unde nunc huius propositionis demonstratio elici poterit, hoc modo parata. Et quoniam quadratum lineæ ultimò ductæ, per propositionem 47 primi, quadratis linearum, compositæ nimirum ex data & adiecta, & ipsius adiectæ, equale est, idem etiam quadratum, cum ipsius latus duorum orthogoniorum triangulorum rectos subtendat, equale, per eandem 47, quadratis duarum linearum, quæ ab extremitate ad rectos ductæ altera, per extremitates rectæ diuisæ descendunt: per hanc communem noticiam, Quæ eidem æqualia, &cæ. quadrata priora, compositæ scilicet & additæ lineæ, descendentiũ linearum quadratis equalia erunt. Sed quia descendentiũ quadrata, ratione suorum triangulorum, quæ & rectangula & Isoscelia sunt, ad quadrata, medietatis diuisæ & compositæ deinde ex altera medietate & adiecta, dupla sunt: propter equalitatem quadratorum, descendentiũ scilicet linearum, compositæ deinde & adiectæ, constabit propositum. Compositæ scilicet & adiectæ linearum quadrata, dupla esse quadratorum, medietatis lineæ diuisæ, & eius quæ ex medietate & adiecta composita est. Si recta igitur linea secetur bifariam, adijciaturq; aliqua ei ad amissim recta linea: quod à tota cū apposita, & quod ab apposita, utraq; simul quadrata, dupla sunt eius quod à dimidia, & eius quod ab adiacente ex dimidia & adiecta, tanquam ab una, descriptorũ quadratorum, quod demonstrari oportuit,

ELEMENTORVM EVCLIDIS
SEQVITVR EXEMPLVM IN NVMERIS,

Totus 14		Adie- ctus	
7 7		9	
Operatio.			
Totus & adie.	Adiectus	Dimidius	Dimidius & adie.
$\frac{23}{529}$	$\frac{9}{81}$	$\frac{7}{49}$	$\frac{16}{256}$
610		305	
duplus			

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΑ.


Τὴν δὲθεῖσαν εὐθεῖαν τεμεῖν, ὡς τε ἔτι ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἑτέρου τῶν τμημάτων πρὸς ἐχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον εἶν τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνω.

PROPOSITIO

XI.

Datam rectam lineam secare, ut quod sub tota & altero segmento comprehenditur rectangulum, æquum sit ei, quod fit à reliquo segmento quadrato.

Sit recta linea data, atq; propositum eam in duo secare sic, ut quod sub tota & uno segmento, breviori scilicet, comprehenditur rectangulum, æquale sit ei, quod ab altero, hoc est longiori segmento describitur quadrato. Describatur à recta data quadratum, sicuti docet propositio in primo 46, illorum deinde laterum, quæ re-



ctæ datæ insistant, altero bifariam diviso, à divisionis puncto linea quædam recta usq; ad alteram datæ extremitatem ducatur, & describitur triangulum rectangulum. Porro medietas lateris divisi, quæ à puncto divisionis & angulo huius trianguli recto intercipitur, eousq; prolongetur, donec lateri, in triangulo rectum angulum subtendenti, æqualis fiat, & ubi deinde secundum quantitatem partis prolongatæ exterioris, quadratum ad ipsam descriptum, latus item huius quadrati, quod exteriori parti oppositum est, per quadratum primò descriptum continuatum fuerit, propositioni tandem satisfactum erit. Id quod, cum tam quadratorum, ex definitione, quam etiam parallelogrammorum opposita latera, ex propositione 34 primi, inter se equalia sint, sexta propositio huius & penultima primi, equalibus subinde pro æqualibus sumptis, ab æqualibus item eodem communi subtracto, clarè manifestabunt.

SEQVITVR.

SEQVIVR EXAMEN HVIVS DIVISIO-
nis in numeris.

<p>Totus 14</p>	<p>Longius segmen. √ 245 — 7 in se</p>	<p>Brevius 21 — √ 245</p>
<p>————— cum —————</p>		
<p>21 — √ 245 cum 14</p>	<p>Producentur</p>	<p>√ 245 — 7 √ 245 — 7</p>
<p>294 — √ 48020, Id quod continetur sub toto & breviori.</p>	<p>294 — √ 48020 Quadratum segmenti longioris.</p>	
<p>Numeri, uel producta æqualia.</p>		

APPENDIX.

Hanc lineæ diuisionem requirit propositio nona libri quarti, quæ nimirum proponit, quomodo Isoceles triangulum, cuius uterq; angulorum ad basim ad tertium reliquum duplus sit, formari debeat, id quod absq; huius diuisionis cognitione aliàs absolui nequit. Quas deinde proprietates habet hæc eadem sic diuisa linea, quid item conducat, aliquo modo ostendit liber Euclidis tredecimus, cuius obiter Lectorem admonendum esse duximus.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΒ.


Εν τῷ ἀμβλυγωνίῳ τριγώνῳ ἡ ἀπὸ τῆς τῶν ἀμβλείων γωνίᾳ ἐπιπέ-
νθεως πλὴρῶς τετραγώνου, μείζον ὅστις τῆς ἀπὸ τῆς τῶν ἀμβλείων πλάτους
σὺν πλὴρῶν τετραγώνου, τὸ πλάτους μὲν δὲς, ἐπὶ τε μίᾳ τῆς πλάτους τῶν ἀμ-
βλείων γωνίᾳ ἐφ' ἧς ἐκβληθεῖσσι ἢ κάθετος πίπτει, καὶ τῆς ἀπλάτῳ μὲν
ἐκτὸς ἐπὶ τῆς καθέτου πρὸς τῆς ἀμβλείας γωνίᾳ.

PROPOSITIO

XII.

In obtusiangulis triangulis: quod ab obtusum angulum subtendente latere fit quadratum, maius est quadratis, quæ fiunt à lateribus obtusum angulum comprehendentibus, comprehenso bis sub uno eorum quæ sunt circa obtusum angulum, in quod, cum protractum fuerit, perpendicularis cadit, atq; assumpta extra sub perpendiculari ad obtusum angulū.


Obtusiangulo triangulo exposito, uno etiam eorum quæ circa obtusum sunt angulum latere, ex parte illius anguli, adeò ultra triangulum continuato, ut in id ab



V 3

angulo

angulo trianguli acuto, opposito quodammodo, perpendicularis commodè cadere possit, atq; hæc postea ducta, figura descripta erit: dico ergo, quadratum, quod à latere obtusum angulū subtendente describitur, maius esse, quàm sunt quadrata, quæ ab ijs quæ circa obtusum angulum sunt, lateribus describuntur, eo quantum est id, quod bis cōprehenditur sub uno latere eorum, quæ circa obtusum angulum sunt, atq; eo, quod à dicto latere, si illud ultra obtusum angulum prius protractum fuerit, & demissa ab angulo, quem hoc latus subtendit, perpendiculari intercipitur. Demonstratio huius, quia est facilis, cum ex propositione penultima primi, usurpa



ta bis, quarta tamen huius, propter sumptionem æqualium pro æqualibus interposita, procedat, Lectori eam ut inde colligat commendabimus. In obtusiangulis igitur triangulis: quadratum lateris subtendentis angulū obtusum, tanto maius est reliquorū duorū laterum quadratis, quantum est id, quod bis comprehenditur sub alterutro reliquorum, & portione eidem alteri extra triangulum in directū adiecta, quæ à perpendiculari ab angulo huic lateri opposito demissa, & angulo obtuso intercipitur, quod demonstrasse oportuit.

APPENDIX.

Quomodo uerò, amblygonio triangulo, cuius tria latera nota sint, exposito, portionis exterioris quantitas, quanta deinde sit perpendicularis, in numeris inueniri debeat, sequenti calculo manifestabitur.

Quantum ad figuram priorem.

Trianguli latera	25	√ 409	12
Laterum quadrata	625	409	144


625
553 } Et tantum est quod sub latere ultra triangulum continuato, & portione exteriori comprehenditur bis. Huius igitur dimidio 36 in latus notum
72 } 12 diuiso: & portio illa exterior nota fiet. Porro perpendicularis nunc
quanta sit, penultima propositio primi sequenti calculo manifestabit.

3	√ 409	Latera
9	409	Quadrata
<hr/>		
400		Quadratum perpendicularis.

Perpendicularem igitur ipsam, huius quadrati radix, quæ est 20, manifestabit.

SEQUENTVR

LIBER SECVNDVS.
 SEQVNTVR HVIVS PROPOSITIONIS DVAE
 figurae aliae.




Calculus figurae posterioris.

Triangulilatera	25	16	√ 241
Laterum quadrata	625	256	241

Facta subtractione, manent 128, id quod sub latere ultra triangulum continua-
 to, & portione exteriori comprehenditur bis, cuius dimidio 64 in latus notum 16
 diuiso, exeunt 4, portio exterior. Perpendicularis igitur 15, quod examinari potest.

ALIA FIGVRA, IN QVA DVO EXEMPLA
 simul exposita sunt.



Examen illius in numeris.

Latera	
Subtendens angulum obtusum	Includentia an- gulum obtusum
Qua $\frac{18}{324}$	dra $\frac{9}{81}$ ta $\frac{12}{144}$
$\frac{225}{99}$	$\frac{225}{225}$

duplum rectanguli, quare $49\frac{1}{2}$, rectangulum ipsum,
 quod nimirum sub alterutro circa obtusum angulum latere, 9 aut 12, & sua exte-
 riori prolongata portione, ab eodē angulo & ipsa perpendiculari intercepta com-
 prenditur, id quod sequens calculus clarè manifestabit.

Latus alterum	9	Latus alterum	12
Intercepta portio	$5\frac{1}{2}$	Intercepta portio	$4\frac{1}{8}$
	45		48
	$4\frac{1}{2}$		$1\frac{1}{2}$
	$49\frac{1}{2}$ re	uel	$49\frac{1}{2}$ re


ctangulum comprehensum sub alterutro latere & intercepta portione, ut supra
 ostensum est. Quare &c.

Εν τῶν ὀξυγωνίω τριγώνωις ἡ ἀπὸ τῆς τῶν ὀξείων γωνίωι ὑποτεινόμενης πλοῦ-
 ρῆς τετραγώνω, ἑλάττω δὲ τῆν ἀπὸ τῆς τῶν ὀξείων γωνίωι περιεχσῶν πλοῦ-
 ρῶν τετραγώνω, τὸ περιεχομῆνός ἐστι ὑπὸ τε μιᾶς τῶν πλοῦ τῶν ὀξείων γω-
 νίωι, ἐφ' ἧν ἡ κάθετος πίπτει, καὶ τῆς ἀφλαμβανομένης ἐν τῶν ὑπὸ τῆς καθέτου
 πρὸς τῆς ὀξείας γωνίωι.

PROPOSITIO XIII.

In acutiangulis triangulis: quod ab acutum angulum subtendente latere describitur quadratum, minus est eis quæ ab acutum angulū comprehendentibus lateribus fiunt, quadratis, comprehenso bis sub uno eorum, quæ sunt circa acutum angulum in quod perpendicularis cadit, atq; assumpta interioris sub perpendiculari ad acutum angulum.

Sit triangulum acutiangulum, atq; in eo acutus angulus sumptus, ab utrovis deinde ex reliquis angulo ad suum subtensum latus, per propositionem 12 primi, recta perpendiculari ducta: dico, quadratum quod à latere rectum angulum subtendente describitur, minus esse quàm sunt quadrata, quæ à lateribus circa acutum




angulum describuntur, eo quantū est id quod sub uno latere eorum quæ circa acutum angulum sunt, in quod scilicet perpendicularis cadit, atq; sub intercepta, à perpendiculari & acuto angulo, portione comprehenditur bis. Cum enim unum circa acutum angulum latus per demissam perpendicularem utcunq; divisum sit: erunt quadrata, quæ à diviso illo latere & intercepta à perpendiculari anguloq; acuto, portione describuntur, ei quod sub tota & dicta portione comprehenditur bis cum quadrato alterius portionis, per 7 huius æqualia: atq; his æqualibus communi quodam, quadrato scilicet perpendicularis, addito: illa tria quadrata his tribus, rectangulo nimirū bis sumpto & duobus quadratis æqualia erunt. Sed quia utrobique duobus quadratis, ratione anguli recti, ex penultima primi unius lineæ quadratum æquale est, mutatione æqualium facta, loco scilicet duorum quadratorum laterum circa rectos angulos, ex utraq; parte, rectos angulos subtendentium, quæ scilicet non divisa sunt, quadratis sumptis: & quadrata laterum quæ sunt circa acutum angulum, ei quod sub diviso latere & intercepta portione comprehenditur bis, atq; quadrato lateris, angulum acutum subtendentis, æqualia erunt: quadratum igitur lateris, acutum angulum subtendentis, solum quadratis eorum, quæ circa acutum angulum sunt, laterū minus erit in rectangulo, quod sub diviso latere, atq; intercepta a perpendiculari & acuto angulo portione, comprehenditur bis. In oxygoniis igitur triangulis, quadratum lateris subtendentis angulum acutum tanto minus est reliquorum laterum quadratis, quantum est id quod bis comprehenditur sub altero illorum, in quod nimirum perpendicularis cadit, & portione a perpendiculari anguloq; acuto intercepta. quod demonstrasse oportuit.

APPENDIX:

Quam uim habeant hæ duæ propositiones, 12 scilicet de Amblygonio, & 13 de Oxygonio, unā cum penultima primi de triangulo Orthogonio, experietur is, qui aliquando in triangulorum tractationem, in qua semper ex tribus notis ad reliquorū trium noticiam, mediante arcuum & chordarū tabula, pertuenitur, incidit.


TRIA EXEMPLA VNA FIGVRA EXPOSITA.



ADMVNITIO.


Non autem est necesse, ut omnes trianguli propositi anguli acuti sint, ut quidem id Acutianguli trianguli definitio requirit. Sed generaliter (cum nullum triangulum sit, quod non acutum angulum habeat) de omnibus, cuiuscumque generis fuerint, triangulis, hæc propositio intelligi, per ea insuper declarari potest, id quod per sequentia duo exempla manifestabitur.

PRO TRIANGVLO RECTANGVLO.



In hoc triangulo rectangulo, quindecies 15, ratione unius acuti anguli, tanto minus sunt quam uicies quinquies 25, & uicies 20, quantum est quod sub 20 & 20, uel quod sub 25 & 16 continetur bis. Sic ratione alterius acuti, cuius subtensum latus sunt 20, ubi uicies 20, tanto minus sunt quam uicies quinquies 25, & quindecies 15, quantum est quod sub 15 & 15, uel quod sub 25 & 9 continetur bis, id quod multiplicatione cernere licet.

PRO TRIANGVLO OBTVSIANGVLO.




Similiter etiam in triangulo obtusiangulo, quindecies 15, ratione unius acuti anguli, minus sunt quam tricies 30 & uicies 20, quantum est quod sub 30 & $17\frac{1}{2}$ continetur bis. Sic ratione alterius acuti anguli, cuius subtensum latus sunt 20, ubi uicies 20 tanto minus sunt quam tricies 30 & quindecies 15, quantum est quod sub 30 & $12\frac{1}{2}$ continetur bis, id quod examinari potest.

Τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ, ἴσον τε ῥαβδωνομ συστήσασθαι.

PROPOSITIO XIII.


Dato rectilineo, æquale quadratum constituere.

Sit rectilineum datum qualecunque, atque propositum, quadratum ei æquale con-




stituere. Quia uerò rectilineum datum, uel triangulum, uel plurium laterum rectilineum esse potest. Igitur si triangulum fuerit, ei ex propositione 42 primi: si uerò plurium laterum rectilineum, ex 45 eiusdem primi æquale parallelogrammum constituendum est. Quòd si quadratum fuerit hoc constitutum parallelogrammum, factum erit pro-

positum. Sin minus, ex duobus huius parallelogrammi lateribus, his quidem quæ sunt



iuxta unum & eundem angulum, alterum alteri ad amussim adijciatur, utrouis scilicet huius anguli latere, secundum quantitatem alterius, longiore facto. Deinde secundum hanc totam, ex duobus lateribus compositam lineam, tanquam diametrum, ex eius medio, quod quidem per propositionem 10 primi haberi potest, semicirculus describatur. Quòd si tandem per punctum coniunctionis laterum ea, quæ ad idem punctum terminatur, linea usque ad cir-


cumferentiam continuata fuerit: propositioni satisfactum erit. Nam hæc continuata portio ea linea est, cuius uidelicet quadratum rectilineum referre debet, id quod per lineam, à centro ad intersectionem circumferentiæ cū iam inuenta, rectam du-



ctam, ex quinta huius & penultima primi, æquali interim pro æquali linea sumpta, ab æqualibus etiam deinde æquali, uel eodem communi ablato, facile demonstrabitur. Dato igitur rectilineo, æquale quadratum constitutum est, quod fieri oportuit.

SEQUITVR


SEQVITVR HVIVS PROPOSITIONIS GEO-
metrica figura alia.



PORRO CALCVLVS TRIANGVLI DATI IN
hac figura, sic se habet.

Latera	Excessus	Productum	Primum
20	$\sqrt{68} - 6$	}	32
$\sqrt{272}$	$14 - \sqrt{68}$		128
8	$\sqrt{68} + 6$		4496
$28 + \sqrt{272}$	$14 + \sqrt{68}$	atq; huius radix quadrata 64, Trian-	

guli, Parallelogrammi & Quadrati area. Quoniam autem unum parallelogrammi
latus est notum, 4 scilicet, area etiam nota, nimirum 64: & alterum latus, diuisio-
ne, notum erit. Est autem illud 16.



Inuentio areae trianguli, cuius


Latera sunt	Excessus uero
14	$\sqrt{\frac{117}{4}} + \sqrt{\frac{145}{4}} - 7$
$\sqrt{145}$	$\sqrt{\frac{117}{4}} - \sqrt{\frac{145}{4}} + 7$
$\sqrt{117}$	$7 + \sqrt{\frac{145}{4}} - \sqrt{\frac{117}{4}}$
$14 + \sqrt{145} + \sqrt{117}$	$7 + \sqrt{\frac{145}{4}} + \sqrt{\frac{117}{4}}$

X 2

Primum

Primum	secundum productum
$\sqrt{424\frac{1}{4}} + 16\frac{1}{2}$	$\sqrt{424\frac{1}{4}} - 16\frac{1}{2}$
Tertium prod. 3969	Area trianguli 63


ALIVD EXEMPLVM DE RHOMBO,



Declaratio propositionis quintæ, hoc loco allegatæ,
per numeros.

Totus numerus est 10, diuisus in partes, æquales quidem 5 & 5. in inæqua-
les uerò 6 & 4. Medium itaq; sectionum, hoc est excessus longioris portionis re-
spectu medietatis lineę uel numeri diuisi 1. Rectangulum porro sub partibus inæ-
qualibus comprehensum, sunt 24, cum quadrato unitatis, ueniunt 25. & tantum
est etiam quadratum numeri 5, hoc est medietatis diuisi. quod ostendere libuit.

ALIA ET VLTIMA HVIVS PROPOSITIONIS GEO-
metrica figuratio de Rhomboide.



Atq; hac pro declaratione huius propositionis dicta sufficiant.

FINIS LIBRI SECVNDI.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

LIBER TERTIVS. 165
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ
ΧΕΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

EVCLIDIS ELEMENTORVM GEO-
metricorum liber tertius.



Actenus Euclides profecutus demonstrationum euidentissimis rationibus, proprietates simplicissimas recti linearum figurarum, superioribus duobus libris: nunc in tertio, quæ circuli sunt propria *πάθη* (quod ad doctrinam elementorum pertinet, quæ planè Geometrica & abstracta est) explanare aggreditur. Non enim quæ cœlestium, aut quæ aliorum proprietas sit circulorum consideratur hoc loco, nam subiectis cum rebus nihil commune habet geometria sincerior, quippe cōcretione atq; adiunctione certorum subiectorum, mox in aliarum scientiarum titulos cum degeneret, ut Astronomiæ, Architectonicæ, Opticæ, & similium, quarum ipsa sibi scientiam non arrogat quidem, uerùm illas tamen absq; geometria intelligi non posse aut addisci, nemo mediocriter etiam eruditus ignorat. Liber præsens uel hoc nomine præstat præcedentibus, quòd nimirum hic de proprietatibus tractat perfectissimæ figuræ, nempe de Circulo, siquidem pro natura subiectarum rerum scientiæ aliæ alijs sunt preponendæ. Vtilis porrò est ad cognitionem Chordarum, & arcuū præcisionem in circulis, quippe cum quæ est angulorum, eadem sit quoq; arcuum & chordarum inter se ratio. Præterea de circulis cōtingentibus & sese mutuo secantibus, quòd illud quidem uno, hoc uerò duobus tantum punctis fiat. Quinetiam ostendit, Contingentiæ angulum, omniū acutorum rectilineorum angulorum esse minimū: Diametrum item, omnium rectarum linearum in circulo longissimam, & id genus multa complectitur hic liber tertius. Docet præterea, tribus punctis signatis (modo non fuerint in una recta lineâ) circulus per illa transiens, quò pacto describatur. Quomodo deinde in corpore aliquo solido, sphaericum seu parallelepipedum illud fuerit, duo puncta opposita, ut quæ in sphaericis Poli nomen habeant, inueniantur. Quæ ambo in instrumentorum compositionibus quàm summè sint necessaria, nullis non qui hoc in genere scientiæ uersati sunt, & se in eo aliquantum exercuerunt, manifestum est.

ΟΡΟΙ.


Ἴσοι κύκλοι εἰσὶν, ὧν αἱ διάμετροι εἰσὶν ἴσαι.
 ἢ ὧν αἱ ἐκ τῶν κέντρων ἴσαι εἰσὶν.

DEFINITIONES.

X 3

Aequales


1 Aequales circuli sunt, quorum diametri sunt aequales. Aut, quorum quæ ex centris, aequales sunt.



Εὐθεία κύκλῳ ἐφάπτεσθαι λέγεται, ἢ τις ἀπτόμενη τοῦ κύκλου, καὶ ἐμβαλλομένη, ὃ τέμνει τὸν κύκλον. Κύκλοι ἐφάπτεσθαι ἀλλήλων λέγονται, ὅι τινες ἀπτόμενοι ἀλλήλων, ὃ τέμνουσιν ἀλλήλων.


2 Recta linea circulum tangere dicitur, quæ tangens circulum, & eiceta, circulum non secat.

3 Circuli tangere sese mutuo dicuntur, qui sese mutuo tangentes, sese mutuo non secant.



Ἐν κύκλῳ ἴσῳ ἀπέχου τοῦ κέντρος εὐθεῖαι λέγονται, ὅταν αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπ' αὐτὰς κἀθερὶ ἀγόμεναι, ἴσαι ᾖσι. Μείζων δὲ ἀπέχει λέγεται, ἐφ' ἧρ ἢ μείζων κἀθερὶ πίπτει.

4 In circulo aequaliter distare à centro rectæ lineæ dicuntur, cum à centro in eas perpendiculares ductæ, aequales fuerint. Plus uerò distare dicitur, in quam longior perpendicularis cadit.






Τμήμα κύκλῳ, ὃ ἐστὶ τὸ πᾶσι χόμνον σχῆμα, ἐπὶ τῆ εὐθείας καὶ κύκλου περιφέρειας.

5 Sectio circuli, est figura comprehensa sub recta linea, & circuli circumferentia.




Τμήμα γωνία, ὅστις ἡ περιεχόμενη ὑπό τε εὐθείας & κύκλου περιφέρειας. Ἐν τμήματι δὲ γωνία ὅστις, ὅταν ὑπὸ τῆς περιφέρειας τοῦ τμήματος ληφθῆ τι σημεῖον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ὑπὸ τὰ πόδια τῆς εὐθείας, ἢ πρὸς τὴν βάσιν τῆς τμήματος, ἐπερὶ χθῶσι εὐθείαι, ἡ περιεχόμενη γωνία ὑπὸ τῆς ὑπὲρ χθῶσι εὐθείων. Ὅταν δὲ αἱ περιέχουσαι τὴν γωνίαν εὐθείαι ἀφ' ἀλλήλων ἀμείνωσι τινὰ περιφέρειαν, ἐπὶ ἐκείνης λέγεται βεβηκέναι ἡ γωνία.

6 Sectionis angulus est, qui sub recta linea, & circuli circumferentia comprehenditur. 7 In sectione uerò angulus est, cū in sectionis circumferentia punctum aliquod sumptum, atq; de illo ad rectę lineę fines, quę est sectionis basis, rectę lineę ductę fuerint, comprehensus sub coniunctis rectis angulus. 8 Quando autem comprehendentes angulum rectę lineę aliquam suscipiunt circumferentiam, in illa dicitur esse angulus.




in uel super circumferentia.

Τομεὺς κύκλου εἰσὶν, ὅταν πρὸς τῷ κέντρῳ αὐτοῦ τοῦ κύκλου σταθῆ ἡ γωνία, ἢ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε τῆς τὴν γωνίαν περιέχουσας εὐθείων, καὶ τῆς ἀφ' ἀλλήλων ἀμεινωμένης ὑπὸ αὐτῆς περιφέρειας.



9 Sector circuli est, cum ad centrum circuli steterit angulus, comprehensa figura sub angulum comprehendentibus rectis lineis, & assumpta sub eis circumferentia.

Ὁμοία τμήματα κύκλου, ὅστις τὰ δεχόμενα γωνίας ἴσας. ἢ, ἐμοῖς αἱ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλοις εἰσὶν.



Similes

10 Similes sectiones circuli sunt, quæ angulos æquales suscipiunt. Aut, in quibus anguli inter se æquales sunt.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.



ΠΡΩΤΗ. Α.

Τὸ δὲ βεβήτυ κύκλου, ὃ κέντρον εὐρεῖν.

P R I M A I.


Dati circuli, centrum inuenire.

Sit circulus datus, atque propositum, illius centrum inuenire. Ducatur in circulo recta quædam linea utcunq; ita tamen, ut utraq; eius extremitas in circuli sit circumferentia, hac deinde recta, per pro-



positiōem 10 primæ bifariam diuisa, à puncto diuisionis huius ad angulos rectos linea, quæ similiter utrâq; extremitatē in circumferentia habeat, per 11 eiusdem, excutetur. Quòd si tandem hæc ad rectos ducta bifariam diuisa fuerit: punctum huius diuisionis centrum cir-

culi erit. Id quod ab impossibili, ubi aliud quoddam, præter hoc, centrum signatum fuerit, demonstrari poterit, hoc modo. In hac ipsa per mediæ diuisionis punctum transeunte linea, centrum aliud nullum statui potest: alio qui sequeretur statim, ex structura, & circuli definitione, æquali pro æquali linea sumpta, Partialem sua totali linea esse longiorem: uel contrâ, Totalem sua partiali breuiorem, quod est impossibile. Statuatur ergo nunc extra πρὸς ὀρθὰς ductam punctum loco centri aliud,



à quo etiam tres lineæ rectæ, una quidem ad communem duarum linearum intersectionem, reliquæ deinde duæ ad duas primò ductæ extremitates, ducantur. Et quia triangula quæ sic fiunt, huiusmodi sunt, qualia propositio in primo octaua requirit: anguli qui à duabus semidiametris subtenduntur, per eandem, inter se æquales erunt: ex definitione igitur uterq; rectus. Quia autem, ut habet cõmunis quædam noticia. Omnes recti anguli inter se sunt æquales, ea mediante, & quia prius etiã ex hoc

communi duorum rectorum angulorum puncto πρὸς ὀρθὰς linea educta est, inferatur tandem, ampliorem angulum angustiori: uel contrâ, angustiore angulo ampliori esse æqualem, quod cum & ipsum absurdum sit: operationem constare, punctum deinde in linea πρὸς ὀρθὰς ducta, medium, centrū circuli esse, nemini dubium erit. Ομοίως δὲ δεῖξομεν: Simili modo demonstrabitur, quòd nullum punctum aliud, præter hoc quod in medio huius ductæ signatum est, centrum circuli esse possit. Dati igitur circuli centrum inuentum est, quod fieri oportuit.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Ἐκ δὲ τούτου φανερὸν, Ὅτι ἐὰν ἐν κύκλῳ τις εὐθεία εὐθεῖαν πινὰ δίχα, καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνη· ἢ ἢ τὴν μέσην ὅστις ἔκκεντρον τοῦ κύκλου.

C O R O L L A R I V M.


Ex hoc sanè manifestum est, Quòd, si in circulo recta quædam linea rectam quandam lineam bifariam, & ad angulos rectos secet: in secante sit centrum circuli.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ


Εὰν κύκλῳ ἢ ὀρθῶς ἢ ἄλλῳ ἄνῳ τυχόντῃ σημείῳ ἢ ἢ ἢ τὰ αὐτὰ
σημεία ἠδὲ ἄλλῃ ἐπιπέδῳ ἐπιπέδῳ, ἢ ἢ ἢ πᾶσι τοῖς κύκλοις.

Si in circuli circumferentia duo puncta utcumq; accepta fuerint: ad ipsa puncta ducta recta linea, intra ipsum circulum cadet.

Sit circulus, duo etiam puncta in ipsius circumferentia utcumq; signata: dico, si hæc puncta linea quadam recta coniungentur, hanc rectam intra circulum cadere oportere. Colligitur huius propositionis demonstratio ab impossibili. Nisi enim intra circulum cadat recta hæc, statim contra illam communem noticiam, quæ dicit, Totum parte sua maius esse, inferri potest, quod pars suo toto maior sit, hoc nimirum modo. Linea illa recta, qua cum puncta, in circumferentia accepta, copulantur, si intra circulum non cadat, extra cir-



culum, aut in ipsam circuli circumferentiam, cadere eam oportet. Cadat ergo primò extra, si fieri potest, & quærat per propositionem præmissam, circuli centrum, à




quo etiam duæ rectæ ad duo in circumferentia accepta puncta ducantur. Et quoniam hæ duæ rectæ, ex definitione circuli, sunt inter se æquales: triangulū igitur quod sic descriptum est, ἰσοσκελὲς erit, habens ad basim politos angulos, ex priore parte propositionis quintæ primæ, inter se æquales. Ducatur præterea & alia recta quædam linea, à centro circuli utcumq;, per circumferentiam usq; ad basim trianguli isoscelis, eam continuando. Et quia per hanc rectam isosceles triangulum in duo partialia triangula diuiditur, quorum cum utriusq; unū latus alterius

productum sit: erit ex propositione 16 primæ, utriusq; externus angulus suo interno & opposito, uno scilicet æqualium, maior: quare & altero æqualium maior erit. Cum autem iam, ut tandem concludatur, triangulum appareat, unum habens angulum reliquorum altero maiorem, maior uero angulus, ut testatur propositio in primo 19, longius latus requirat, hac ipsa propositione hic usurpata, æquali deinde linea pro æquali sumpta, infertur tandem, partialem sua totali linea esse longiorem, quod est impossibile. Non ergo extra circulum cadit puncta copulans recta linea. Similiter etiam, quod non in ipsam circumferentiam cadat, demonstrabitur: cadet itaq; intra ipsum circulum. In circuli igitur circumferentia, ad duo puncta, utcumq; accepta, linea recta ducta, in circulum eam cadere necesse est, quod demonstrasse oportuit.


Εὰν ἢ κύκλῳ ἐπιπέδῳ τῆς ὀρθῆς τοῦ κέντρου ἐπιπέδου πᾶσι μὴ ὀρθῶς διχατέμνη· καὶ πρὸς ὀρθῶς αὐτῷ τέμνη. Καὶ ἰὰν πρὸς ὀρθῶς αὐτῷ τέμνη· καὶ διχατέμνη.

Si in circulo recta quædam linea per centrum extensa, quandam non per centrum ductam rectam lineam bifariam secet: & ad angulos rectos eam secabit. Et si ad angulos rectos eam secet: & bifariam quoq; eam secabit.

Præparetur figura, qualem scilicet requirit hæc propositio, hoc est, describatur circulus, in quo etiam duæ rectæ, una quidem per centrum transiens, altera uerò præter illud, à priori tamen, uel bifariam, uel ad angulos rectos secta, ducantur: dico, si bifariam: & ad angulos rectos, si uerò ad angulos rectos: & bifariam etiam per centrum ductam alteram secare oportere. Quantum ad partem priorem, coniungantur extremitates eius quæ non per centrum transit rectæ lineæ, cum centro circuli duabus rectis. Et quoniam hæc duæ rectæ, ut duorum triangulorum latera, ex definitione circuli, inter se æquales sunt,



cum quoque reliqua duo unius ex structura, reliquis duobus alterius trianguli lateribus equalia sint: anguli etiam, quos rectæ, à centro circuli ad extremitates ductæ, subtendunt, per propositionem 8 primi, inter se æquales erunt. Quoniã uerò recta lineæ rectæ insistentis lineæ, quando deinceps se habentes angulos æquales inter se facit, uterque ex definitione quadam in primo exposita, rectus est: anguli etiam illi duo, quos scilicet propositio 8 demonstrauit esse inter se æquales, recti erunt. Præter centrum igitur ducta ab illa altera per centrum transeunte recta lineæ, cū ex



hypothesi bifariam ab ea secta sit, ad angulos etiam rectos secabitur, atque hæc pro parte propositionis priore. Posterioris uerò partis demonstratio, eadem structura manente, ex 26 primi sic colligi poterit. Cum enim duo partialia triangula, ex structura, rectangula sint, ipsum uerò totum, ex definitione circuli, isosceles: habebunt hæc partialia triangula duos angulos duobus angulis, utrumque utriusque æquales. Et quia etiam latus unum lateri uni, uel descendentes à centro rectas lineas, uel perpendicularis portionem ambobus communem, æquale habent: & reliqua, per allegatam ex primo propositionem, reliquis æqualia habebunt. Quare recta non per centrum transiens lineæ, ab altera quæ per centrum in eam ad angulos rectos cadit, bifariam diuisa est. Si in circulo igitur, recta quædam lineæ per centrum extensa, quandam non per centrum ductam rectam lineam bifariam secet: & ad angulos rectos eam secabit. Et si ad angulos rectos eam secet: & bifariam quoque eam secabit. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Δ.


Ἐὰν ἐν κύκλῳ δύο εὐθείαι τέμνωσιν ἀλλήλας, μὴ δὲ τὸ κέντρον οὖσαι οὐ τέμνωσιν ἀλλήλας δίχα.

PROPOSITIO

IIII.

Si in circulo duæ rectæ lineæ, non per centrum extensæ, sese mutuo secuerint: sese mutuo bifariam non secabunt.

Describatur circulus, ducantur etiam in eo duæ rectæ lineæ, quorum neutra per centrum transeat, altera tamen alteram secet: dico rectas has bifariam sese mutuo non secare. Sumi hæc propositio suam ab impossibili demonstrationem per præcedentis tertiæ partem priorem, bis quidem, cum duæ sint rectæ lineæ, usurpatam, & communem illam noticiam, quæ dicit, Omnes rectos angulos inter se esse æquales, cum per hæc, si mutuo una alteram bifariam secaret, statim ubi lineæ à centro ad communem



ductarum intersectionem ducta esset, minorem angulum maiori æqualem esse in-

ferretur.

ferretur. Hoc autem quia nemini intelligenti persuaderi potest: per inæqualia igitur, & non æqualia, sese huiusmodi lineæ, ut uult propositio, secabunt. Si in circulo igitur duæ rectæ lineæ, non per centrum extensæ, sese mutuo secuerint: sese mutuo bifariam non secabunt, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

E.


Ἐὰν δύο κύκλοι τέμνωσιν ἀλλήλους οὐκ ἴσαι αὐτῶν ἢ αὐτῶν κέντρα.

PROPOSITIO

V.

Si duo circuli sese mutuo secant: non erit eorum idem centrum.

Sint duo circuli sese mutuo secantes, dico quòd eorum non sit idem centrum. Et huius propositionis, ut præcedentis, demonstratio ab impossibili sumitur. Si enim centrum unum & idem habuerint illi sese mutuo secantes circuli, cum centrum non extra, sed in circulo sedem suam habeat, in nullo loco alio, quàm in portione, utriusque circulo communi, id esse poterit. eo igitur in loco illo cõstituto, inde ad communem circulorum intersectionem linea recta ducatur, & erit hæc utriusque circuli semidiameter. Ducatur & alia recta ab eodem centro posito, per communem portionem usque ad circumferentiam utriuslibet circuli cõtinuata. Et quoniam hæc tota,



unius: pars uerò eius, alterius circuli est semidiameter: erit utraq; , pars uidelicet & ipsa tota, primò ductæ rectæ, quæ & ipsa utriusque circuli semidiameter est, æqualis. unde sic etiam, per communem quandam noticiam, ipsæ inter se æquales, pars uidelicet toti, quod est impossibile. Punctum ergo id quod sumptum est, aut si aliud quoddam sumeretur, centrum circulorum esse, haudquaquam potest. Duorum igitur sese mutuo secantium circulorum, unum & idem centrum non erit, quod demonstrari oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ


S.

Ἐὰν δύο κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων ἐν ἑνὶ σημείῳ οὐκ ἴσαι αὐτῶν ἢ αὐτῶν κέντρα.

PROPOSITIO

VI.

Si duo circuli sese mutuo interiorius tetigerint: nõ erit eorũ idem centrũ.



Sint duo circuli, qui sese interiorius mutuo tangant: dico, eorum non idem esse centrum. Sed esto sanè idem, si fieri potest, & connectatur id cum circulorum contactu, atque postea ab eodem communi centro posito ad exterioris circuli circumferentiam, ubicũque hoc fuerit, alia recta linea ducta, quòd neque hoc, neque aliud ullum punctum, horum tangentium circulorum centrum esse possit, ab impossibili, ut in præcedenti, demonstrabitur. Si duo cir-

culi igitur, sese mutuo interius tetigerint: non erit eorum idem centrum. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Ζ.


Εὰν κύκλος ἢ ἄλλοι δύο κύκλοι ἔστωσαν, ὃ μὴ ἐστὶ κέντρον τοῦ κύκλου, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου προσηλωσὶν εὐθεῖαι πρὸς τὸν κύκλον· μέγιστη μὲν ἔσται, ἐφ' ἧς τὸ κέντρον ἐλαχίστη δὲ, ἢ λοιπὴν. Τῶν δὲ ἄλλων, αἰεὶ ἢ ἕγγιον, ἢ ἄλλοι δύο κέντρα, ἢ ἀπὸ τοῦ κέντρον μείζων ἔσται. Δύο δὲ μόνον εὐθεῖαι, ἴσαι, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου προσηλωσὶν πρὸς τὸν κύκλον, ἐφ' ἧς ἑκάτερα ἢ ἐλαχίστη.

PROPOSITIO

VII.

Si in diametro circuli aliquod sumatur punctum, quod non sit centrum circuli, ab eoque puncto rectæ quædam lineæ in circulum cadant: longissima quidem erit, in qua centrum: breuissima uerò, reliqua. Aliarum uerò, semper propinquior ei quæ per centrum protenditur, remotiore longior est. Duæ autem solùm rectæ lineæ æquales, ab eodem puncto in circulum cadunt, ad utraq; partes breuissimæ.

Sit circulus, in eo etiam ducta diameter, in qua præter centrum aliud sumatur punctum: dico primò, quotquot ab hoc puncto usq; ad circumferentiam rectæ lineæ ductæ fuerint, illarum omnium eam quæ per centrum transierit, longissimam, diametrum uerò perficiens, omnium breuissimam esse. Ex alijs autem, semper propinquior ei quæ per centrum transit, remotiore longior extabit. Postremò, quòd duæ tantùm inter se æquales rectæ lineæ, ab hoc puncto, ex utraq; parte breuissimæ, in circuli circumferentiam cadere possint. Habet hæc propositio quatuor partes, quæ in hunc modum ordine demonstrari poterunt. Connectantur in circulo ductarum extremitates, quas habent in circumferentia, singulæ, cum centro circuli,



singulis rectis lineis. Et quoniam duo quælibet latera omnis trianguli, ex propositione 20 primi, reliquo tertio longiora sunt, tertio porrò longiora duo latera, in præsentia, ex definitione circuli & illa communi noticia, Si æqualibus æqualia addantur, &c. uni rectæ alijs æqualia sunt, cum hæc alia centrum circuli contineat: quod in propositione primò proponitur, iam manifestum erit. Rursus quoniam ex eadẽ propositione 20 primi, quælibet duo trianguli latera reliquo tertio longiora sunt, tertium porrò latus ex definitione circuli, uni rectæ alijs æquale est: & tertio longiora duo latera eadem recta alia longiora erunt. Cum autem hæc alia per punctum, præter centrum in diametro acceptum, transeat, communi ex æquo de illis inæqualibus portione ablata: & quod in propositione secundò proponitur manifestum erit. Tertium nũc patet ex propositione 24 primi. Porrò ut quartum etiam retineatur, ducenda est, per propositionem 23 primi, ex centro recta linea, quæ

cuma

cum semidiametro per punctum transeunte, angulum faciat, illi angulo, qui ex altera parte sub eadem semidiametro, atq; ex centro ductarum linearum una conti-



netur, æqualem, eaq; ad circumferentiam usq; continuata, ab ipsius in circumferentia extremitate ad punctum recta linea ducatur. Et quoniam duo triangula, qualia propositio in primo 4 requirit, apparent: bases igitur illorum, hoc est, lineæ illæ, quæ ad utraq; partes brevissimæ sunt positæ, à puncto item in diametro præter centrum accepto egrediuntur, per hanc 4, inter se æquales erunt. Nec alia etiam, in illa eadem parte, ab hoc puncto ei quæ in altera parte est posita, æqualis educi potest. Nam si fortè ab aliquo minus credenti hoc tentaretur, qui rectam aliam

alteri æqualem duceret, dum cui hæc sic ducta ex communi illa noticia, Quæ unum sunt æqualia &c. æqualis esse deberet, mox per 3 partem propositionis huius, eadem longior esse ostendi potest: id quod fieri nequit. Potest etiam aliter hæc quarta pars demonstrari in hunc modum. Ducatur alia, si ita possibile uideatur, recta linea, ei quæ ex altera parte brevissimæ posita est, rectæ æqualis, cuius in circumferentia extremitas cum recta quadam linea iuncta, demonstratio sic colligetur. Quoniam anguli ex utraq; parte ad centrū positi, ex propositione 8 primi, inter se æquales sunt, unus uerò partialis angulus alterius trianguli totali, ut iam ex 4 primi demonstratum, æqualis: ille partialis tandem angulus, ex communi illa noticia, Quæ unum sunt æqualia &c. suo totali angulo æqualis erit, quod est impossibile. Duæ igitur solùm rectæ lineæ æquales, ab eodem puncto in circulum cadunt ad utraq; brevissimæ lineæ partes. Si in circuli igitur diametro punctum aliquod sumatur, quod non sit centrum circuli, ab eoq; puncto rectæ quædam lineæ in circulum cadant: longissima quidem erit, in qua centrum: brevissima uerò, reliqua. Aliarum uerò, semper propinquior ei quæ per centrum protenditur, remotiore longior est. Duæ autem solùm rectæ lineæ, æquales, ab eodem puncto in circulum cadunt, ad utraq; partes brevissimæ. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Η.


Εὰν κύκλου ληθῆ τι σημεῖον ἐκῆς, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον ὁμοῦ χθῶσιμ εὐθείαι πνδσ, ὡς μία μὲν ὁμοῦ τοῦ κέντρου, αἱ δὲ λοιπαὶ ὡς ἔτυχεν τῶν μὲν πρὸς τὴν κοίλῃ περιφέρειαν προσηπτήσων εὐθειῶν, μέγιστη μὲν, ἢ ὁμοῦ τοῦ κέντρου· τῶν δὲ ἄλλων, αἰεὶ ἢ ἔγγιον τῆ ὁμοῦ τοῦ κέντρου τὸ ἀπώτορον μείζων ἔσαι. τῶν δὲ πρὸς τὴν κυρτῇ περιφέρειαν προσηπτήσων εὐθειῶν, ἐλαχίστη μὲν ὄσιν, ἢ μεταξὺ τοῦ σημείου καὶ τῆ διαμέτρου. τῶν δὲ ἄλλων, αἰεὶ ἢ ἔγγιον τῆ ἐλαχίστης τῆ ἀπώτορον ὄσιν ἐλάττω. Δύο δὲ μόνον εὐθείαι ἴσαι προσηπθῶνται ἀπὸ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον ἐφ' ἑκάτορα τῆ ἐλαχίστης.

PROPOSITIO VIII.

Si extra circulum aliquod sumatur punctum, ab hoc uerò puncto ad circulum percurrant rectæ quædam lineæ, quarum una quidem per centrum, reliquæ uerò ut accidit: in concauam circumferentiam cadentium linearum, longissima quidem est quæ per centrum currit. Aliarum autem, semper propinquior ei quæ per centrum, remotiore longior erit. In conuexam uerò circumferentiam cadentium linearum, brevissima quidem est,

dem est, quæ inter punctũ & diametrum, aliarum aut, semper breuissimæ propinquior, remotiore breuior est. Duæ autem solũ rectæ lineæ, æquales, cadunt ab hoc puncto in circulum ad utraq; partes breuissimæ.

Sit circulus, extra illum etiam punctum acceptum, à quo aliquot rectæ lineæ, per circulum currentes, usq; ad concavam circumferentiam ducantur. Esto autem quòd ductarum una per centrum, aliæ uerò utcunq; transeant. Dico itaq; in concavam circumferentiam cadentium linearum longissimã esse, quæ per centrum transit. Ex alijs autem, semper propinquiorem ei, quæ per centrum transit, remotiore longiorem. Linearum uerò partialium, extra in convexam circumferentiam circuli cadentium, quæ puncto & diametro interiacet, illam omnium breuissimam. Ex alijs autem, semper breuissimæ propinquiorem, remotiore breuiorem esse. Ad hæc dico etiam, duas tantum ab hoc puncto rectas lineas, quæ ex utraq; parte breuissimæ, in circulum cadunt, æquales educi posse. Habet hæc propositio quinque partes, quarum prima & secunda, ubi prius à contactibus, præter centrum ductarum & circumferentiæ, ad centrum rectæ lineæ ductæ fuerint, illa quidem ex propositione 20 primi, per quam duo qualibet latera in triangulo, tertio longiora sunt, recta una pro duabus sibi equalibus sumpta, hæc uerò ex 24 eiusdem primi retineri poterunt. Quòd si & ab intersectionibus iam, præter centrum ductarum cum circumferentiã, rectæ lineæ ad centrum ductæ fuerint: tertiæ quoque &



quartæ partibus per easdem primi propositiones, ab inæqualibus tamen interim æqualibus subtractis, satisfieri poterit. Superest igitur nunc ut quintæ parti, quæ uidelicet duas solũ rectas lineas, ab hoc puncto æquales, ex utraq; parte breuissimæ, in circulum cadere asserit, satisfaciamus: quod quidem ab impossibili hoc modo fieri debet. Ducatur per 23 primi, ex centro recta linea, quæ cum semidiametro per circumferentiam ad punctum continuata, angulũ faciat, illi angulo, qui ex altera parte sub eadem semidiametro atq; ex centro ductarum linearum una continetur, æqualẽ, & connectatur huius ductæ extremitas quam habet in circumferentiã, per primum postulatum in primo, cum puncto extrã sumpto, recta quadam linea, quòd nunc hæc recta ei, quæ ex altera parte diametri ad punctum continuata est, equalis sit, & sola etiam, sicut nulla æqualis alia ex hoc puncto egrediatur, utrunq;

non

non aliter, quàm in precedenti quarta pars, retinebitur. Si extra circulum igitur aliquod sumatur punctum, ab hoc uerò puncto ad circulum percurrant rectæ quædam lineæ, quarum una quidem per centrum, &c. quod demonstrari oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Θ.

Ἐὰν κύκλος ληφθῆ τί σημεῖον ἔνθα, ἀπὸ δὲ τῶν σημείων πρὸς τὸν κύκλον πρὸς πῖπρωσιν πλείους ἢ δύο εὐθείαι ἴσαι ἢ ληφθῆν σημεῖον κέντρον ὄσιν τῆς κύκλου.

PROPOSITIO IX.

Si in circulo acceptum fuerit punctum aliquod, ab hoc uerò puncto ad circulum cadant plures quàm duæ rectæ lineæ æquales: acceptum punctum centrum est ipsius circuli.


Sit circulus, in eo etiam punctum signatum sic, ut plures quàm duæ rectæ lineæ inde usq; ad circumferentiam ductæ inter se æquales sint: dico, signatum punctum centrum circuli esse. Coniungantur ductarum extremitates, quas habet in circumferentia singulæ, singulis rectis quibusdam lineis, coniungentium deinde duabus, uel omnibus si placet, bifariam diuisis, à punctis harum diuisionum rectæ lineæ ad signatum in circulo punctum ducantur, continuenturq; ex utraq; parte usq; in cir-



cumferentiam. Et quoniam circa quamlibet ultimò iam ductarum linearum duo triangula sunt, quorum anguli ad illam, κατὰ τὴν κατασκευὴν & propositionem 8 primæ, inter se æquales sunt, & quia deinde ex definitione 8 eiusdem, etiam recti: erit in harum ductarum qualibet, ex corollario primæ huius, centrum circuli. Hoc autem cū ita sese habeat, nullibi potius fuerit, quàm in puncto uel intersectione omnium communi, quod scilicet est punctum signatum.

ALITER HOC IDEM AB ABSVRDO OSTENDI POTEST.

Esto circulus, in eo etiam punctum acceptum, sicut, si fortè inde plures quàm duæ rectæ lineæ usq; ad circumferentiam ductæ fuerint, illæ inter se æquales sint: dico acceptum punctum centrum circuli esse. Sed negetur sanè, non esse centrum circuli punctum id, & si placet, sumatur aliud, atq; per illud acceptumq; prius pun-



ctum recta linea ducta ea ex utraq; parte in circumferentiam continuetur. Et quoniam in circuli diametro præter cẽtrum acceptum est punctum aliud, unde etiam plures rectæ ad circumferentiam ductæ sunt, cum illa in qua est centrum circuli, ex prima parte


parte propositionis septimæ huius, omnium sit longissima, ex reliquis uerò, centro propinquior, ex 3 parte eiusdem, remotiore longior existat, contra hypothesein hoc inducitur, cum per eam, ex puncto ductæ rectæ inter se positæ sint æquales. Ομοίως δὲ δεξιόθεν, & reli. Similiter etiam ostendemus, quòd nullum aliud præter id quod acceptum fuerit, punctum, centrum circuli esse possit. Punctum igitur in circulo acceptum, unde plures quàm duæ inter se æquales rectæ lineæ ad circumferentiam ductæ sunt, centrum circuli erit, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ I.

Κύκλος οὐ τέμνει κύκλον ἢ πλείονα σημεῖα, ἢ δύο.


PROPOSITIO X.

Circulus non secat circulum in pluribus punctis, quàm duobus.



Sit circulus unus, alius deinde priorem secans: dico, quòd hæc sectio duobus tantum punctis contingat. Quòd si negetur hoc, atque affirmaret aliquis, pluribus duobus punctis, quatuor scilicet, circulum secare circuli, describatur sane si fieri potest, in hunc modum figura: una deinde harum intersectionum puncto, cū duobus collateralibus duabus rectis lineis iuncto, his postea re-

ctis bifariam diuisis, ex punctis diuisionum lineæ ad angulos rectos ducantur. Et quoniam unum & idem punctum, cōmunis nimirum ad rectos ductarum sectio,




ex corollario propositionis primæ huius, bis usurpato, utriusque circuli centrum esse demonstratur, cum id propositioni quintæ præmissæ maxime aduersetur, infertur tandem ueram esse propositionem, nimirum, Si circulus circulum secet, non in pluribus duobus locis id fieri, quod demonstrasse oportuit.

ALIA HUIVS REI DEMONSTRATIO.

Secat rursus circulus circulum in pluribus punctis quàm duobus, &c. Quæ- ratur, per propositionem primam huius, prioris descripti circuli centrum, cum eo deinde tribus rectis lineis tria intersectionum puncta copulentur. Et quoniam intra circulum, posteriorem scilicet, acceptum est punctum quoddam, à quo cum plures duabus ad illius circumferentiam rectæ egrediantur æquales: erit illud punctum, per præcedentem propositionem huius, eiusdem posterioris circuli centrum, atque sic centrum duorum, mutuo sese secantium circulorum, id quod per propositionem quintam est impossibile. Non igitur circulus circulum in pluribus punctis quàm duobus secat, quod demonstrari oportuit.

HUIVS




ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΑ.

Εὰν δύο κύκλοι ἐφαπθῶνται ἀλλήλων ἐν ῥοῖς, καὶ ληφθῆ αὐτῶν τὰ κέντρα· ἢ ὑπὸ τὰ κέντρα αὐτῶν ὑπὸ ῥυγνυμένη εὐθεῖα ἢ ἐκβαλομένη, ὑπὸ τῶν συναφῶν πῶσειται τῶν κύκλων.

PROPOSITIO XI.

Si duo circuli sese mutuo intus tetigerint, atque accepta fuerint eorum centra: ad eorum centra ducta recta linea & eiecta, in contactum circulorum cadit.

Sint duo circuli, quorum unus alterum intus tangat, & quærantur centra amborum: dico, si per hæc centra ducta fuerit recta quædam linea, atque cōtinuata ulterius, hęc in contactum circulorum cadere, id quod facile ab absurdo, ut sequitur, demonstrari potest. Recta à centro ad centrum circuli ducta, quia hęc per centrū maioris circuli continuata, subinde contra cōclusionem, magis ac magis à circulorum contactu recedit, cum ab authore non sit determinatum, ex qua parte recta continuari debeat, illa parte, tanquam frustra inde producturus lineam, posthabita, continuationem rectæ per minoris circuli centrum instituenda est. Instituatur ergo sic. Quòd si ita factum, non contingat in contactum cadere hanc rectam, in alium certè circumferentiæ locum eam cadere necessè erit. Sit sanè, & ducatur ab utriusque circuli centro ad eorum contactum recta linea. Et quoniam ex tribus rectis lineis, una



quidem, quæ à centris circulorum intercepta est, duabus uerò quæ à centris ad contactum circulorum rectæ ductæ sunt, triangulum constitutum est, cum omnis trianguli duo quælibet latera, ut iam sæpe demonstratum est, tertio latere longiora sint: & in proposito triangulo intercepta à centris linea, & ea quæ à centro interioris ad contactum ducta est, ut duo trianguli latera, reliquo tertio, ea nimirum linea, quæ à centro exterioris egreditur atque ad contactum ducta est, longiora erunt. Quare longiora


Z

giora

giora etiam ea quæ huic tertio lateri, ex definitione circuli, est linea æqualis. Atque communi ab inæqualibus ablato, intercepta scilicet à centrīs linea: remanentiū partium una, à centro scilicet interioris ad contactum ducta, reliqua, altera scilicet, quæ à centrīs per circumferentiam continuata est, longior. Sed quia illa, ex definitione circuli, huius parti æqualis est: & partialis tandem sua totali linea longior erit, quod fieri nullo modo potest. Si igitur per centra duorum circulorum, quæ sese mutuo intus tangunt, recta quædam linea ducta, atque eiecta fuerit, in circulorum contactum ea cadet, quod demonstrari oportuit.

Ὁμοίως καὶ ἐκτὸς ἢ τοῦ μικροῦ καὶ τῶν τοῦ μεγάλου κύκλου, δέξομεν αὐτὸ ἀποκρῖν.

Similiter etiam, Si extra paruum circumferentiam centrum maioris circuli fuerit, absurditatem ostendemus.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

IB.


Ἐὰν δύο κύκλοι ἀπὸ τῶν ἀλλήλων ἐκτὸς ἢ ὑπὸ τὰ κέντρα αὐτῶν ὑπὸ γωνίᾳ μὴν, ἢ ἄλλῃ ἐπαφῆς ἐλεύσεται.

PROPOSITIO

XII.

Si duo circuli sese mutuo exterius tetigerint: ad centra eorum applicata recta linea, per contactum transibit.


Sint duo circuli, quorum unus alterum extra tangat, & querantur centra amborum: dico, si per hæc centra ducta fuerit recta quædam linea, eam per circulorum



contactum transire. Quod si hoc forte negetur, aliò eam certè inclinare concedendum erit. Sit sanè, & ducatur ab utriusque circuli centro ad eorum contactum recta linea. Et quoniam quæ ex centro ad circumferentiam ducuntur rectæ lineæ, sunt, ex definitione circuli, inter se æquales, eadem definitione bis usurpata, æqualibus item lineis æqualibus additis: duæ à centrīs ad contactum ductæ rectæ lineæ, reliquis duabus, quæ & ipsæ à centrīs ad suas circumferentias ductæ sunt, rectis lineis æquales erunt. Ipsa igitur totali, quæ à centro ad centrum ducta est, ut tertio trian-

guli

guli latere, breuiore, quod est contra propositionem quandã in primo expositam, qua dicitur, quod Omnis trianguli duo qualibet latera ad amissim sumpta, reli-



quo tertio longiora sint. Si duo igitur circuli extra sese mutuo tetigerint: ad centra eorum applicata recta linea, per contactum transibit, quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΓ.

Κύκλος κύκλον οὐκ ἐφάπτεται πλείονα σημεία ἢ καθ' ἓν, ἑαυτὲ ἐνὸς, ἑαυτὲ ἐκὸς ἐφάπτεται.



PROPOSITIO XIII.

Circulus circulum non tangit in pluribus punctis uno, siue intus siue extra tangat.

Describatur circulus, dico impossibile esse alium describi posse circulum, qui descriptum priorem uel intus, uel extra etiam, in pluribus punctis quàm in uno




tangat. Quod si uideatur possibile, sit sanè: tangat autem hunc primò intus in duobus locis, & ducatur per centra circulorum recta quaedam linea: hæc autem in utranq; partem continuata, cum ex propositione 11 huius, in circulorum cōtactum cadat, quæ ex definitione circuli, lineæ sunt in-



ter se æquales, mox intercepta à centris portione, uni earum addita, ab altera uerò hæc

hac eadem ablata, quæ sic fiunt lineæ inæquales, ex eadem circuli definitione, secundò usurpata, inter se æquales erunt: id quod rationi minime est consentaneum.



Circulus igitur circulum intus tangens, uno tantum puncto hoc faciat necesse est. Quantum ad secundum. Esto quòd extrà, circulus circulum in duobus locis tangat, atq; ducta à contactu in contactum recta quadam lineâ, cum hæc, ex propositione 2 huius, intra utrunq; circulum cadat, atq; id fieri hic nullo modo possit, propterea quod nullius circuli aliqua pars in altero sit: exterius circulus circulum in pluribus punctis uno non tanget. Et quia neq; etiam interius, ut auditum est. Circulus igitur circulum tangens, in uno tantum puncto hoc fiat necesse erit, & non in pluribus, interius siue exterius

hoc accidat, quod demonstrari oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ



ΙΔ.

Ἐν κύκλῳ αἰθεῖαι εὐθεῖαι ἴσων ἀπέχουσι ἀπὸ τοῦ κέντρου. Καὶ αἰθεῖαι ἴσων ἀπέχουσι ἀπὸ τοῦ κέντρου ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.

PROPOSITIO XIII.

In circulo æquales rectæ lineæ: æqualiter distant à centro. Et æqualiter distantes à centro: æquales inter se sunt.

Describatur circulus, in eo etiam rectæ quædam lineæ æquales ducantur. Et quia æquales: pro prioris propositionis parte dico, eas etiam æqualiter à centro distare. Quòd si rectæ in circulo ductæ in æquali à centro distantia fuerint: & lineas has, ratione partis posterioris, inter se æquales esse conueniet. Quæ quidem ambæ propositionis partes sic retineri poterunt. Coniungantur extremitates ductarum




cum circuli centro quatuor rectis lineis. Et quoniam duo triangula descripta sunt, quorum anguli, quos ex una & eadem parte in circumferentia habent, quia per propositionem 8 primi, sunt inter se æquales, postquam super æquales in circulo ductas lineas, à centro, per propositionem 12 primi, perpendiculares ductæ fuerint, cum illæ per has, ex posteriore parte propositionis 3 huius, æqualiter secantur: & ipse perpendiculares tandem, ex 4 eiusdem primi, inter se æquales erunt: in quas deinde hæ cadunt rectæ lineæ, ex 4 definitione huius, æqualiter à centro distabunt: quod est primum, uel prior propositionis pars.

ALIA HVIVS PRIORIS PARTIS DEMONSTRATIO.

Maneat eiusdem dispositionis figura, nisi quod duæ, ex una parte ab extremitatibus ad centrum ductæ, rectæ lineæ possint omitti, prioris partis demonstratio etiam

etiam sic colligi poterit. Quoniam enim recta linea in circulo per centrum extensa, rectam lineam in circulo ductam aliam, quæ non per centrum transit, ad angulos rectos secans, ipsam, ex posteriore parte propositionis tertiæ huius, bifariam secat, hac eadem parte bis usurpata, & quia etiam rectæ in circulo ductæ, ex hypothesi sunt inter se æquales: quæ de his in circulo ductis æqualibus lineis per perpendiculares abscinduntur lineæ, inter se æquales erunt. Sed sunt etiam æquales inter se, ex definitione circuli à centro ductæ lineæ, quæ cum harum æqualium extremitatibus coniunctæ sunt: per penultimam igitur propositionem primi, atq; illis duabus communibus notitijs, Quæ uni sunt æqualia, &c. & item, Si ab æqualibus æqualia subtrahantur, & reliqua, res tandem cõcluditur. Lineas scilicet ad illas à centro perpendiculares, eo quod quadrata, inter se æqualia habeant, æquales esse, id quod nunc est æqualis ipsarum à centro distantia argumentũ. Sed esto iam, quantum ad par-



tem posteriorẽ, quòd recte ducte æqualiter à centro distent: dico ipsas ductas inter se æquales esse, & hac quidem demonstratione. Cadant ad æqualiter ductas à centro perpendiculares, coniungatur etiam alterutra utriusq; æqualiter distantium extremitas cum centro circuli. Et quoniam perpendiculares ductæ, ex definitione Linearũ æqualiter à centro distantium, inter se sunt æquales, cum ab æqualibus rectis non possint describi diversa quadrata: & harum æqualium rectarum quadrata æqualia erunt. His igitur perpendicularium quadratis à subtendentium rectos, quæ & ipsæ, ex de-

initione, inter se æquales sunt, quadratis subtractis: & residua quadrata, per 47 primi, inter se æqualia erunt: atq; tandem sic etiam æqualium quadratorũ latera æqualia. Sed quia utrunq; ex 2 parte propositionis 3 huius, recte ductæ est medietas: & ipsæ ducte inter se æquales erunt, quod est secundum. In circulo igitur æquales rectæ lineæ, æqualiter, & re. quod demonstrasse oportuit.

ALIA EIUS QVOD IN HAC PROPOSITIONE SECUNDÒ PROPONITUR, DEMONSTRATIO.

Cadant ad æqualiter ductas à centro perpendiculares, coniungatur etiam alterutra utriusq; æqualiter distantium extremitas cum centro circuli. Et quoniam quæ ex centro ad circumferentiam ducuntur recte lineæ, inter se æquales sunt: quadratum igitur unius quadrato alterius ex centro ducte lineæ, æquale erit. Rursus quoniam utriusq; ex centro ductæ quadrato, duarum linearum quadrata, ex 47 primi æqualia sunt: etiam quæ ab illis duabus describuntur quadrata, harum duarum linearum quadratis, ex cõmuni illa noticia, Eidem æqualia &c. bis usurpata æqualia erunt. Porro ab utroque æqualium illo quadrato quod à perpendiculari utrobique describitur, subtracto, cũ ipsæ perpendiculares (ut ex hypothesi & definitione quadam colligere licet) una alteri æqualis sit, & residua quadrata, ex communi quadam noticia, inter se æqualia erunt. Quare & horum æqualium quadratorum latera, æqualia. At uerò horum æqualium laterum, duplices sunt, ex posteriore parte propositionis tertiæ huius, recte in circulo ductæ: & ipsæ ducte tandem ex illa cõmuni noticia. Eiusdem duplicia &c. inter se æquales erunt. In circulo igitur æquales recte lineæ, æqualiter distant à centro. Et æqualiter distantes à centro, æquales inter se sunt, quod demonstrari oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΕ.


Εἰς κύκλῳ, μεγίστη μέρ ὅστις ἡ διάμετρος. τῶν δὲ ἄλλων, αἰεὶ ἡ ἕγχιον τοῦ κέντρου, τὸ ἀπὸ τοῦ κέντρου μείζων ἐστίν.

Z 3

PROPOSITIO

In circulo, longissima quidem est diameter. Aliarum uerò, semper propinquior centro, remotiore longior est.


Sit circulus, in eo etiam aliquot rectæ lineæ ductæ. Esto autem quòd una harum per circuli centrum, reliquæ uerò utcumq; transeant: dico, per centrum transcuntem ex ductis omnium longissimam, aliarum uerò quamlibet centro propinquior, remotiore longiorem esse. Vtriusq; enim omnium præter centrum ductarum exue-



mitatibus, rectis lineis cum centro copulatis, prior propositionis pars ex propositione 20 primi, una tamen recta subinde pro duabus alijs sibi equalibus sumpta, demonstrabitur. Posterior deinde ex 24 eiusdem retineri potest, quod indicasse oportuit.

APPENDIX.

Oportet autem, ut omnes rectæ ductæ ex una diametri parte appareant, & quidem ideo ut cognoscatur, quæ linea ex reliquis diametro uel centro propinquior, quæ item ab eo remotior sit. Quare si una, uel plures etiam ex altera diametri parte




conspiciantur rectæ lineæ, in qua parte pauciores fuerint, eius lineæ ad alteram partem traducendæ sunt hoc modo. Continuentur in rectum singularum ductarum, quibus in altera parte æquales ducendæ sunt, perpendiculares ad suarum ipsarum longitudinem ultra centrum: deinde ab extremitatibus harum, tanquam rectarum datarum, per 11 primi, ad angulos rectos lineæ, ex utraq; parte usq; ad circūferentiam continuatæ excitentur. Et quoniam hæ singulæ, rectis in priori parte ductis, ex definitione Rectarum in circulo æqualiter à centro distantium, æquales sunt, quæq; suæ, æquali nunc uel equalibus pro equalibus usurpatis, demonstratio ut præmissa est absoluat.

Ἡ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ ἀκρᾶς ἀγομένη, ἐκτὸς πρὸς εἶτα τοῦ κύκλου. Καὶ εἰς τὸ μὲξενὸν τόπον τῆς εὐθείας ἢ τῆς περιφέρειας, ἐτόξα εὐθεῖα οὐ πρὸς μὲξενὸν. Καὶ ἡ μὲν τοῦ ἡμικυκλίου γωνία, ἀπωσθῆς ὀξείας γωνίας εὐθυγράμμου μείζων ὅσῳ ἢ ὁ ἄλλοιων, ἐλάττω.

PROPOSITIO XVI.


Quæ à diametri circuli extremitate ad angulos rectos ducitur, extra ipsum circulum cadet. Et in locum, inter ipsam rectam lineam & circumferentiam, altera recta non cadet. Et semicirculi quidem angulus, omni acuto rectilineo angulo amplior est. Reliquus autem, angustior.

Describatur circulus, ducatur in eo etiam diameter, dico primùm, si quæ linea ab alterutra diametri extremitate ad rectos, excitetur angulos: extra circulum eam cadere oportere, neque ex angulo, sub ipsa & circumferentia comprehenso, aliam rectam



educi posse. Angulum præterea semicirculi, qui sub diametro & circumferentia continetur, omnium acutorum rectilinearum maximùm: qui uerò sub circumferentia & ad rectos excitata, omnium acutorum minimum esse. Habet hæc propositio quatuor partes, quæ ordine sic demonstrari possunt. In ipsam circumferentiam, cum sit latitudinis expers omnis linea, ad rectos excitata cadere non potest, cadet ergo intra uel extra ipsam circumferentiam. Quod si intra cadere sumptum fuerit, mox, si possibile sit, ea ducta, & ad circumferentiam usque continuata, clauso item trian-

gulo, extremitate huius ad rectos ductæ altera, recta quadam linea cum centro copulata. Et quoniam triangulum quod sic describitur ex definitione circuli, isoscelis est: duo igitur ipsius anguli quos ad basim habet, inter se æquales erunt. Quia uerò unus eorū est rectus, ratione ductæ ad rectos lineæ: & alter sic rectus erit, quod est contra propositionē in primo 17, quæ dicit, Omnis trianguli duos angulos, quomodocumque sumptos, duobus rectis minores esse. Vel contra corollarium propositionis in primo 32, quod quidem dicit, Omnis trianguli non duos tantum, sed tres eius internos angulos, duobus rectis æquales esse. Ab extremitate igitur



diametri ad angulos rectos ducta linea, intra circulum non cadet. Et quia neque in ipsam etiã circumferentiam, ut dictum est: extra circulum ergo, ut uult propositio, ea cadet, id quod primò erat demonstrandum. Quòd uerò inter ductam & circumferen-

tiam cadere nulla alia possit, impediunt propositio in primo 19, atque deinde circuli definitio. Alia enim quadam interposita, si ad ipsam deinde à centro, per 12 primi, perpendicularis ducatur, cum rectus in triangulo angulus utroque reliquo amplior sit, ex propositione etiam 19 primi, ampliori angulo longius latus subtendatur: statim ex definitione circuli, æquali tamen pro æquali linea sumpta, partialem suam tali linea longiorem esse, inferri potest: quod est impossibile. Patet itaque id quod se-

cundò

cundò demonstrandum erat. Et quia hoc nunc constat: angulum igitur illū, quem diameter & circumferentia continent, omnium acutorum rectilineorum maximū: reliquum deinde, sub circumferentia & ad rectos angulos excitata comprehensum minimum esse, sequi necesse est, cum aliās si statueretur unus angulus illo maior, alius deinde hoc reliquo minor: ex loco inter circumferentiam atq; ad rectos angulos ductam, cōtra secundam partem huius, alia recta educi posset. Hoc autem cum demonstratum sit esse impossibile: quod igitur tertio & quarto propositū est, iam demonstratum erit. Constat itaq; tota propositio, quod erat demonstrandum.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Εκ δὴ τῶν φανερῶν. Ὅτι ἡ τῆς διαμέτρου τῆς κύκλου πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ ἀκέραις ἀγόμενῃ ἐφάπτεται τῆς κύκλου. Καὶ ὅτι εὐθεῖα κύκλου καὶ ἐν μόνον ἐφάπτεται σημείον.

COROLLARIUM.

Ex hoc sanè manifestum est, Quòd à diametri circuli extremitate ad rectos angulos ducta: ipsum circulum tangat. Et quòd recta linea circulum in uno tantum puncto tangat.

Ἐπι δὴ πῶς. Quoniam rectam lineam, duobus in circuli circumferentia punctis comprehensam, intra ipsum cadere, ex 2 propositione huius ostensum est, quod admonuisse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΖ.

Ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου, τοῦ δοθέντος κύκλου, ἐφαπτομένη εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

PROPOSITIO XVII.

A dato puncto, dato circulo, contingentem rectam lineam ducere.

Sit punctum datum, circulus item datus, atq; propositū, à puncto ad circulum contingentem rectam lineam ducere. Ipsum igitur punctum cum centro circuli, (quod quidem semper, ubi ignotum id fuerit, ex propositione prima huius inueniri licet) per postulatum primum, recta quadam linea coniungatur, atq; ubi hæc recta circulum secuerit, inde per 11 primi ad angulos rectos linea excitetur. Porro hæc



eadem recta, qua cum punctum datum & centrū circuli iuncta sunt, loco semidiametri sumpta ex dati circuli cētro alius describatur circulus, atq; ubi is ad rectos angulos ductam secat, ex hoc puncto alia ad centrum recta linea ducatur, à cuius intersectione tandem cum circulo dato, postquam linea recta ad datum punctum ducta fuerit, cum hæc recta ea sit quæ maxime petitur propositioni satisfactum erit, id quod hoc modo demonstrabitur. Quoniā enim hac præparatione duo triangula descripta sunt, quorum duo

latera unius duobus lateribus trianguli alterius, ex definitione circuli, bis usurpata, æqualia

æqualia sunt, angulum etiam inter æqualia latera, angulo equalem habent, cum videlicet ille sit, qui ad centrum ponitur, bis sumptus: ex propositione igitur 4 primi, & reliquum tertium latus reliquo tertio lateri: anguli insuper reliqui angulis reliquis: ac totum triangulum toti triangulo æquale erit. Quia autem unus angulus ex reliquis in triangulo uno, is nimirum quem ad rectos ducta, & una dati circuli semidiameter comprehendunt, est rectus: & in altero qui huic, propter æqualitatē subtensarum, est æqualis, linea item ad rectos ductam secante, & altera dati circuli semidiametro includitur. rectus angulus erit. Hoc igitur cum ita sit: secans hæc, ut diximus, ex priore parte corollarij propositionis 16 huius, circulum datum tangere dicitur. Et quia hæc secans à puncto dato etiam egreditur: factum igitur quod maxime volebat propositio. A dato scilicet puncto, dato circulo contingens recta linea ducta est. quod fieri oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΗ.

Εὰν κύκλος ἐφάπῃται τῆς εὐθείας, ἀπὸ δὲ τῆς κέντρος ὑπὸ τῆς ἀφῆς ὑπὸ ῥυθμῆς τῆς εὐθείας ἢ ὑπὸ ῥυθμῆς, ἴσως ὑπὸ τῆς ἀπομοσύνης.

PROPOSITIO XVIII.

Si circulum tetigerit recta quædam linea, à centro uerò in contactum ducta fuerit recta quædam linea alia: ducta, in contingente perpendicularis erit.

Describatur circulus, eum etiam tangens recta linea ducatur: dico igitur, si à centro ad punctum contactus recta quædam linea ducta fuerit, quòd hæc recta ad contingentem sit perpendicularis. Si uerò non, ducatur per propositionem 12 primi, à centro ad ipsam contingentem recta perpendicularis alia. Et quoniam perpendi-



cularis hæc, propter æqualem & erectum situm, angulos cum contingente ἐφεξῆς, æquales inter se facit, unde sic uterque eorum, ex quadam definitione, rectus est: ratione recti huius, qui nimirum est in triangulo, uterque ex reliquis eiusdem trianguli angulis, recto angulo minor erit. Quia uerò ampliori angulo omnis trianguli, ex propositione 19 primi, longius latus subtenditur: ex definitione igitur circuli, æquali tamen pro æquali linea sumpta, partialis linea sua totali longior erit, cum tamen contra Totalis, ex cõmuni quadam

noticia, linea sua partiali longior esse debeat. Quare præter contactum à centro in contingentem ducta, ad ipsam perpendicularis non erit. Ομοίως δὲ δειξομεν ὅτι ἕξ ἄλλης τῆς πάλω τῆς & reliqua. Simili quoque ratione ostenditur, quod nulla etiam alia, præter eam, quæ à centro ad contactum tendit, ad contingentem perpendicularis esse possit. Quare hæc ipsa quæ à centro ad contactum ducitur recta linea, in cõtingentem perpendicularis erit. Si igitur circulum tetigerit recta quædam linea, à centro uerò in contactum ducta fuerit recta quædam linea alia: ducta, in contingente perpendicularis erit. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΘ.

Εὰν κύκλος ἐφάπῃται τῆς εὐθείας, ἀπὸ δὲ ἀφῆς τῆς ἐφαπτομένης πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθεία γραμμὴ ἀχθῆ ὑπὸ τῆς ἀχθείσης ἴσως ἢ κέντρος τῆς κύκλου.


PROPOSITIO XIX.

Si circulum tetigerit recta quædam linea, à contactu uerò ipsi tangenti ad angulos rectos recta linea ducta fuerit: erit in ducta centrum circuli.

Aa

Describatur

Describatur circulus, eum etiã tangens linea recta ducatur: dico, si à contactu, tanquam à puncto in contingente dato, per 11 primi, ad rectos angulos linea per



circulum ducta fuerit, in ea centrum circuli esse. Quod si non, erit id necessariò extra eam alibi. Eo igitur alibi constituto atq; signato, inde etiã recta quadam linea ad punctum contactus ducta, cum hæc, per præmissam 18, ad contingentem perpendicularis existat: angulus minor maiori, uel partialis suo totali, ex definitione, qua omnes rectos æquales inter se esse intelligitur, æqualis erit: quod est impossibile. Punctum igitur extra perpendicularem alibi constitutum, centrum circuli non erit: in ipsa ergo contingentis per circulum ducta perpendiculari id

esse necesse est. Si circulum igitur recta quædam linea tetigerit, à contactu uerò &c, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Κ.


Ἐν κύκλῳ, ἡ πρὸς τοῦ κέντρου γωνία, διπλασίωρ ὅστις πρὸς τῆς περιφέρειᾶς ὅταν τὴν αὐτὴν περιφέρειαν βάσιν ἔχωσιν αἱ γωνίαι.

PROPOSITIO

XX.


In circulo, qui ad centrum angulus, duplus est eius qui ad circumferentiam, quando eandem circumferentiam basim habuerint ipsi anguli.

Describatur circulus, in eo etiã duo ponantur anguli, unus quidem ad centrum, alter uerò ad circumferentiam, sic ut ambos unus & idem circumferentiæ arcus subtendat: dico, ad centrum positum angulum, duplum esse eius, qui ad circumferentiam ponitur. Huius propositionis figuratio quia tripliciter uariari potest, triplici etiã demonstratione hic opus erit. Aut enim ad centrũ anguli alterũ latus anguli in circũferentiã alteri lateri coniungetur, aut non. Si primum, cum ex



- definitione circuli à centro ad circumferentiam exeuntes lineæ, inter se æquales sint, unde sic triangulum isosceles appareat. qui anguli, ex priore parte propositionis 5 primi, sunt inter se æquales, hi simul sumpti, ad utrunq; æqualium dupli erunt. Sed quia his simul, ut duobus internis & oppositis trianguli angulis, æqualis est, ex propositione 32 primi, angulus ad centrum positus, ut eiusdem trianguli angulus externus: & ad utrunq; æqualium idem externus, ad centrum positus angulus duplus erit, quod ostendisse oportuit. Sed esto iam quòd nõ coniungantur latera: quia uerò tum accidit, quòd unum latus unius, latus unũ alterius anguli fecerit, aut non fecerit. Si fecerit, diametro ab angulo qui est ad circumferentiam per centrum ducta, cum

Et, cum tam totalis quàm etiam partialis ad centrum externus trianguli angulus, per easdē propositiones primi bis usurpatas, suo interno opposito angulo duplus sit, partialibus ab ipsis totalibus subtractis, cum hi & illi eodem modo sese habeant:



& residui anguli, unus ad alterum, circa centrum quidem ad eum qui est ad circumferentiam duplus erit. Quòd si unū unius, unum latus alterius anguli non fecet, ducatur ab angulo qui est ad circumferentiam, per angulum ad centrum recta quaedam linea, & demonstratio (partialibus tamen utriusq; anguli simul sumptis) ut modò succedet, angulum scilicet ad centrum eius, qui est ad circumferentiam, duplum esse. Angulus igitur qui ad centrum in circulo ponitur, duplus est eius qui ad circumferentiam, qualitercumque sanè hi, modo una & eadem circumferentia sub-


tenduntur, descripti fuerint. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΑ.

Ἐν κύκλῳ, αἱ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν.

PROPOSITIO XXI.

In circulo, qui in eodem segmento sunt anguli, æquales inter se sunt.



Describatur circulus, in eo etiam aliquot super uno & eodem segmento anguli: dico, illos angulos inter se æquales esse. Quod quidem, ductis à segmenti terminis ad centrum duabus rectis lineis, per præcedentem 20 & communem illam noticiam, Quæ eiusdem dimidia, æqualia inter se sunt, manifestum fiet.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΒ.

Τῶν ἐν γῆς κύκλοις τετραπλεύρων, αἱ ἀπεναντίον γωνίαι, δις ἢ ἑρθεῖς ἴσαι εἰσὶν.

PROPOSITIO XXII.

Quadrilaterorum in circulis anguli, qui ex opposito, duobus rectis sunt æquales.

Describatur circulus, in eo etiam quadrilaterum quaecumq; æqualium uel in-



equalium laterum: dico, angulos quosq; oppositos duobus rectis æquales esse. Ducantur in quadrilatero duæ diametri. Et quoniam omnis trianguli tres anguli interiores, ex corollario propositionis 32 primi, duobus rectis æquales sunt. Et rursus, quoniam etiam æquales inter se sunt, ex præmissa 21, qui in eodem segmento sunt anguli, eo quod prius dicitur, semel: altero uerò, bis usurpato, bis insuper angulo pro equali alio sumpto: quantum ad duos oppositos in quadrilatero angulos ratione oppositionis unius,

propositioni satisfactum erit. Porro eodē ordine, demonstratione pro alijs duobus

Aa 2

oppositis

oppositis in quadrilatero angulis instituta, quòd & illi duobus rectis angulis æquales sint, manifestè patebit. Quadrilaterorum igitur in circulis anguli, qui ex opposito, duobus rectis sunt æquales. quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΓ.

Ἐπὶ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ, δύο τμήματα κύκλων ὅμοια καὶ ἀνίστα, οὐ συσταθήσονται ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη.

PROPOSITIO XXXIII.

Super eadem recta linea, duæ sectiones circulorum similes & inæquales, non constituentur ad easdem partes.


Describatur circuli sectio: dico, quòd super eius recta impossibile sit, aliam, descriptam similem & inæqualem, ad eandem etiam partem, posse cõstitui sectionem. Quòd si uideatur hoc posse fieri, constituatur sanè super hac recta linea sectio alia,




ut quæ positæ similis sit & inæqualis, ad illam eandem etiam partem, & extendatur, per primum postulatam primi, recta quædam linea, ab una rectæ extremitate per arcus utriusq; sectionis transiens, atq; ubi hæc sectionum arcus secuerit, inde etiam, per postulatam eiusdem primi secundum, rectæ lineæ ad alteram rectæ extremitatem ducantur. Et quoniam sectiones sunt, ex hypothesi aduersarij, inæquales, atq; etiam similes, cum similitudo sectionũ circuli ab æqualitate angulorum,

quos illæ sectiones suscipiunt, definiatur: anguli illi quos secundò ductæ cum prima in sectione comprehendunt, externus & internus oppositus unius trianguli, inter se æquales erunt. Sed quia non sunt, ut quidem hoc propositio in primo 16 testatur, neq; sectiones etiam, ut ponitur, inter se inæquales & similes erunt. Super eadem igitur recta linea, duæ sectiones circulorum similes & inæquales, non constituentur ad easdem partes. quod demonstrasse oportuit.

APPENDIX.



Potest etiam figura huius propositionis describi, ut super sectionibus constitutorum angulorum uterq; sua propria latera habeat, utq; latera unius ab alterius sectionis laterib. includantur. Quòd si ad hunc modũ figura descripta fuerit, tum quia angulus interioris angulo sectionis exterioris, per propositionem 21 primi, maior est, descripti igitur arcus similes non erunt, id quod est contra propositionis hypothesim.



Item licet uterq; angulorum sua propria latera habeat, accidit tamen aliquando, ut unum latus unius, unum alterius sectionis latus secet. Quòd si sic, tum propter demonstrationem faciliorem, ab intersectione arcus interioris, & lateris unius anguli sectionis exterioris alia ad extremitatem rectæ lineæ recta ducenda est. Et quoniam in eodem segmento anguli, ex propositione 21 huius, inter se sunt

se sunt æquales, cum unus eorum alio quodam alterius segmenti angulo, ut exter-
nus suo interno, ex propositione 16 primi, maior sit: & alter, propter æqualita-
tem, eodem maior erit: non æquales igitur anguli, neq; etiã similes sectiones, quod
est contra hypothesim. Super eadem igitur recta linea, duæ sectiones circulorum
similes & inæquales, nō constituētur, ad easdē partes, quod demonstrari oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΔ.

Τὰ ἐπὶ ἴσων ὑπερὸς ὁμοία τμήματα κύκλων, ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν.

PROPOSITIO XXIII.

Super æqualibus rectis lineis similes circulorum sectiones, æquales
inter se sunt.

Sint duæ uel plures rectæ lineæ æquales, super ἧς etiam similes circulorum se-



ctiones cōstitutæ: dico,
illas sectiones inter se æ-
quales esse. Est huius
propositionis demon-

stratio præcedens 23. Nam congruente uel superposita una sectione alteri, cum
earum rectæ, ex hypothesi, sint inter se æquales, una extremitate unius super
una sectionis alterius posita, & in alteram huius altera extremitas illius coincidet,
quare sic & arcus sectionum coincidere oportet. aliàs sequeretur, Similes & inæ-




quales circulorum sectiones super una & eadem
recta describi posse, quod est contra propo-
sitionem præcedentem. Coincidunt ergo, ac propte-
rea æquales etiam inter se, ex communi quadam
noticia, quæ in primo his uerbis exposita est, Quæ
congruunt, & reliqua.

DEMONSTRATIO ALIA,

Superponatur una sectio alteri, ita ut unius extremitas una super alterius sectio-



nis unam extremitatem ac recta super rectam collocetur. Et quoniam æquales sunt
ipsæ rectæ: altera extremitas unius cum altera alterius sectionis extremitate coinci-



det: atq; hinc linea lineæ congruit. Quod si sectio
sectioni cōgruat: eas inter se æquales esse, ut uult
propositio, ex noticia quadam communi conclu-
ditur, Si igitur &cæ. Esto autem quod non con-
gruant sectiones basibus congruentibus, sed dif-

ferant, atq; in diuersa loca cadant. Quoniam enim circulus, ut uult propositio 10
huius, in pluribus punctis quàm duobus circulum alium non secat, cum hic in tri-
bus punctis fiat circulorum sectio, propositioni citatæ contrarium fieri apparet,
quod non conceditur. Quare congruente lineæ lineæ, nō potest non sectioni quo-
que sectio congruere. Super æqualibus igitur rectis similes circulorum sectiones
constitutæ: & ipsæ sectiones inter se æquales erunt, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΕ.


Κύκλα τμήματ' ὁμοίως, προσαναγρωθέντα τὸν κύκλον οὐ πὲρ ὅστι τμήμα.

Aa 3

PROPOSITIO



Circuli sectione data, describere circulum cuius est sectio.

Sit sectio circuli data, atq; propositum, circulum eius describere, hoc est, sectionem hanc, ut circulus tandē sit, perficere & complere. Diuidatur igitur recta, super quam est constituta sectio, per propositionem 10 primi, bifariam, atq; à puncto diuisionis huius ad angulos rectos linea excite-



tur, ad arcum usque, & ultra etiam lineam rectam, quantum nimirum necessarium fuerit, eam prolongando. Erit autem in ea ad rectos ducta linea, ut testatur corollarium propositionis primæ huius, centrum circuli. Ducta igitur ab huius $\pi\epsilon\delta\varsigma \delta\rho\delta\alpha\varsigma$ ductæ & arcus intersectione ad angulum sectionis alterutrum recta quadam linea, si ad hanc anguli inter se æquales



sint, ubi hæc eadem $\pi\epsilon\delta\varsigma \delta\rho\delta\alpha\varsigma$ ducta rectam arcus secat, ibi centrum circuli: ipsam uerò sectionem, Semicirculum esse pronuncies. Eo igitur ex hoc puncto circini officio completo, nona propositione huius adiuuante, propositioni satisfactum erit. Quòd si dicti anguli fuerint inter se inæquales, angulo ei qui sub recta hac, atq; ea super qua est constituta sectio, cōprehenditur, per 23 primi, ut alteri angulo æqua-



lis fiat, rectæ cuiusdam lineæ ductu succurrendum erit. Quo facto, ubi hæc ad rectos ductam tetigerit, centrum circuli ibi esse pronūciabis. id quod sic demonstrari potest. Ducatur ex hoc puncto ad alterā arcus extremitatē recta quedam lineæ. Et quoniam hæc, & alia duæ, quæ ex hoc eodem puncto ad circumferentiam concurrunt rectæ lineæ, ex propositionibus 6 & 4 primi æquales inter se sunt: quòd tandem id punctum, de quo iam agitur, eius, cuius est data sectio, circuli centrum sit, ex propositione 9 huius manifestum erit. Eo igitur nunc secundum unius æqualium linearum interuallum, per 3 postulatum primi, inde descripto, cum per reliquarum etiam æqualium extremitates transeat, proposito satisfactum erit. Circuli igitur sectioni datae, circulus ipse descriptus atq; cōpletus est: quod fieri oportuit.

EST ET ALIA HVIVS PROPOSITIONIS DEMONSTRATIO.


In data sectione, cuius circulus compleri debet, ducantur duæ rectæ lineæ. Vel, ut sit operatio certior. Sumantur tria in sectione puncta, ut cunq; hæc duabus re-



ctis lineis copulentur, & erunt, ut supra, duæ in sectione rectæ lineæ ductæ. Harum nunc


nunc utraq; bifariam diuisa, à puncto diuisionis utriusq; ad angulos rectos linea, per propositionem II primi excitetur, ubi tandem hæ duæ ad rectos ductæ sese mutuo secant, ibi per corollarium primæ huius, bis usurpatum, circuli, qui sectionē datam sua descriptione comprehendit, centrum esse pronuntiabitur.

Quod si ad rectos ductæ sese mutuo non secuerint, id quòd aliquando, ubi in circulo ductæ rectæ lineæ parallelæ sunt, accidere poterit, quia tum ad rectos ductæ coincidunt, atq; simul una recta linea sunt, ea bifariam diuidenda, per punctum deinde hoc, centrum quæsitæ circuli exprimentum erit.



APPENDIX.


Vtuntur hac propositione, qui centrū trium punctorum, cum opus sit, quærere, hoc est circulum, per data tria puncta transeuntem, describere solent. Nam cum circulus per data puncta transire debeat, sectionem quandam circuli per puncta data occultè ductam sibi imaginantur. Quòd deinde ex tribus illis punctis (uno ta-



men bis repëtito) tanquam ex tribus centris, officio circini, ultra medietatem spacij, per quod arcus describi debet, semper extensî, quatuor circulorum arcus describant, ita ut semper binî & binî sese mutuo secant, per puncta tandem inter sectionum duas rectas uersus unam & eandem partem ducant, nihil certè aliud est, quam dicta puncta duabus rectis coniungere, à mediâ deinde harum, ad angulos rectos lineas excitare. Id quod cuilibet, propositionē II primi altius intuenti, perspicuum erit. Atq; huius hoc loco Lectorem admonere uoluimus.

SEQVITVR HVIVS TRACTATIONIS PRO CEN-
tro trium punctorum inueniendo figura
geometrica alia,

ΠΡΟΤΑΣΙΣ




ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΣ.

Ἐν ἴσοις κύκλοις, αἱ ἴσαι γωνίαι ἢ ἴσων περιφερῶν βεβήκησι, ἰαίντε πρὸς τοῖς κέντροις, ἰαίντε πρὸς τοῖς περιφερείαις ὡς βεβηκνῖαι.

PROPOSITIO XXVI.

In æqualibus circulis, æquales anguli in æqualibus circumferentijs subtenduntur, siue ad centra, seu ad circumferentias deducti fuerint.

Describantur æquales circuli, quod nimirum una circini expansione fieri debet, in ijs etiam, tam ad centra quàm ad ipsas circumferentias, æquales anguli, in uno quidem primò ad placitū illis descriptis, in altero uerò uel alijs, si plures quàm duo circuli fuerint, uno cuiuscq; anguli latere ducto, per propositionem in primo 23 describendi sunt: dico igitur, quod illi anguli, tam ad centra quàm ad circumferentias positi, subtensos arcus æquales habeant. Quoniã enim angulus ad centrum unius est æqualis, ex hypothese, angulo, similiter ad centrum posito, circuli alterius, & rursus quoniam à centris ad circumferentias lineæ rectæ ductæ, propter æquales ex



hypothese circulos, inter se æquales sunt, in singulis tertio latere ducto: & hæc tertia latera

tia latera per propositionem 4 primi, circumferentię deinde uel circuloꝝ sectio-
nes, propterea quòd angulos, ex hypothesi, inter se æquales suscipiant, per defini-
tionem similium sectionum, & propositionem 24 huius, inter se æquales erunt.
Subtractis igitur nunc æqualibus arcibus ab æqualibus circulis, cum & residui ar-
cus, à quibus scilicet æquales in æqualibus circulis anguli subtenduntur, ex com-
muni quadam noticia inter se æquales sint, propositioni satisfactum erit. Æqua-
les igitur anguli in æqualibus circulis, ab æqualibus circumferentijs subtenduntur,
sive ad centra, seu ad circumferentias deducti fuerint. quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΖ.

Εἰς ἴσοις κύκλοις, αἱ ὑπὸ ἴσων περιφερειῶν βεβηκῦται γωνίαι, ἴσαι ἀλλή-
λους εἰσὶν, ἢ αὐτὴ πρὸς τοῖς κέντροις, ἢ αὐτὴ πρὸς τοῖς περιφερείαις ἢ αὐτὴ
βεβηκῦται.


PROPOSITIO XXVII.

In æqualibus circulis, qui super æquales circumferentias deducuntur
anguli, æquales inter se sunt, sive ad centra, seu ad circumferentias de-
ducti fuerint.

Describantur æquales circuli, ponantur etiam in ijs super æquales circumferen-
tias anguli: dico igitur, quòd illi anguli, tam ad centra quàm ad circumferentias po-
siti, inter se æquales sint. Quoniam enim qui ad centra ponuntur anguli, sunt aut



inter se æquales, aut non. Si æquales: & qui ad circumferentias ponuntur anguli,
cum hi, ex propositione 20 huius, sint ad centrum positus dimidia, inter se æquales
erunt, quod est propositum. Quòd si fuerint inæquales, succurratur uni ex his, per
23 primi, siue maiori siue minori angulo, ut alteri æqualis fiat, quo facto, & illorum
æqualium angulorum circumferentię uel arcus subtendentes, per præmissam, in-



ter se æquales erunt. Sed quia uni illorum æqualis etiam est, ex hypothesi, mutati
Bb anguli

anguli subtendens. per hanc igitur communem noticiam, Quæ eidem sunt æqualia & reli. infertur tandem, partialem totali subtendenti circumferentiæ æqualem esse, quod est impossibile. Inæquales igitur non sunt ad centrum positi anguli, sed æquales. Et quia æquales: etiam ad circumferentiâs positi cum sint horum dimidiâ, ut dictum est, inter se æquales erunt. Aequales igitur circumferentiæ uel arcus, in æqualibus circulis, æquales angulos subtendunt, siue ad centrum, siue ad circumferentiâs positi fuerint, quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΗ.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ ἴσας ἐὺθεῖαι ἴσας περιφέρειας ἀφαιροῦσι, τὴν μὲν μείζονα τῆ μείζονι, τὴν δὲ ἐλάττωνα τῆ ἐλάττωι.

ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ XXVIII.

In æqualibus circulis, æquales rectæ lineæ, æquales circumferentiâs auerunt, maiorem quidem maiori, minorem uerò minori.

Describantur æquales circuli, in ijs etiam æquales rectæ ducantur: dico igitur, per illas rectas æquales etiam in circulis auferri circumferentiâs, maiorem scilicet maiori, & minorem circumferentiæ minori. Nam ductis ab extremitatibus rectarum ad centra rectis lineis, cū circuli ex hypothesi sint inter se æquales, & hæ rectæ



ductæ ex definitione æqualium circulorum, inter se æquales erunt. Quare & anguli ad centrum positi per propositionem 3 primâ, æquales, atq; insuper arcus uel circumferentiæ, quæ hos æquales angulos subtendunt, per 26 huius, æquales: quod est unum. Porro quia circuli ex hypothesi sunt æquales, ab his igitur si æquales circumferentiæ ablatæ fuerint, & quæ relinquuntur circumferentiæ, ex communi quadam noticiâ, inter se æquales erunt. In circulis igitur æqualibus, æquales rectæ lineæ æquales circumferentiâs auferunt, maiorem quidem maiori, minorem uerò minori. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΘ.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις, ἐὰν τὰς ἴσας περιφέρειας ἴσας ἐὺθεῖαι ἀποτείνῃσιν.


ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ XXIX.

In æqualibus circulis, sub æqualibus circumferentijs æquales rectæ lineæ subtenduntur.

Vt præcedens 28, per æquales rectas in æqualibus circulis ductas, æquales circumferentiâs auferri asserit: sic quoq; hæc uicesima nona, ubi in æqualibus circulis per lineas quasdam rectas, æquales circumferentiæ ablatæ fuerint, illas rectas æquales esse infert. Describantur igitur æquales circuli, in ijs etiam æquales sumantur circumferentiæ: dico igitur, & illarum æqualium circumferentiârum rectæ sub-

tensæ

tenſæ inter ſe æquales ſint. Ducantur ab extremitatibus ſubtenſarum ad centra re-
ctæ lineæ. Et quoniam hæ rectæ ductæ, propter æqualitatem circuloꝝ ex hy-



potheſi, ex definitione prima huius, inter ſe æquales ſunt, anguli in ſuper ad cen-
tra, ſub illis æqualibus ductis comprehenſi ex 27 huius, æquales: & lineæ hiſ æqua-
libus angulis ſubtenſæ, quæ etiam ſub circumferentijs æqualibus ſubtenduntur,
per propoſitionem 4 primi, inter ſe æquales erunt. In circulis igitur æqualibus,
ſub æqualibus circumferentijs æquales rectæ lineæ ſubtenduntur, quod demon-
ſtraſſe oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ. Λ.

Τὴν δοθεῖσαν περιφέρειαν, δίχα τέμνειν.

PROPOSITIO XXX.

Datam circumferentiam, bifariam ſecare.

Sit circumferentia data, atq; propoſitum eam bifariam ſecare. Data igitur cir-
cūferentiæ extremitates recta quadam lineâ coniungantur, hac deinde recta bifa-
riam diuiſa, à puncto diuiſionis ad rectos angulos lineâ uerſus circumferentiam
excitetur: & erit hæc, ipſa quæ circumferentiam bifariam ſecabit, quod ſic demon-



ſtratur. Ducantur à ſectionis puncto in circumferentia ad eius extremitates duæ
rectæ lineæ. Et quoniã hæ duæ rectæ, ex propoſitione 4 primi, inter ſe æquales ſunt,
& ruruſ quoniam in circulis æqualibus æquales rectæ lineæ, per propoſitionem
28 huius, circumferentias æquales auferunt, maiorem maiori, & minorem minori:
cum quod de circulis æqualibus, illud ipſum etiam de uno & eodem dici poſſe &
uerum eſſe cōſtet, demonſtratio absoluta erit. Data igitur circumferentia bifariam
diuiſa eſt, quod feciſſe oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΑ.


Ἐρκύκλω, ἢ μὲν ἐν τῷ ὀρθῷ ἢ μικκυκλίῳ γωνία ὀρθὴ ὄσιν, ἢ δὲ ἐν τῷ μείζονι τμή-
ματι ἑλάττω ὀρθῷ. ἢ δὲ ἐν τῷ ἐλάττω μείζων ὀρθῷ. Καὶ ἔτι, ἢ μὲν τῷ
μείζονι τμήματι γωνία μείζων ὄσιν ὀρθῷ, ἢ δὲ τῷ ἐλάττω τμήμα-
τι γωνία ἑλάττω ὄσιν ὀρθῷ.

Bb 2

PROPOSITIO

In circulo, angulus qui in semicirculo est: rectus est, qui uerò in maiori segmento: minor recto, qui autem in minori segmento: maior est recto. Et insuper, angulus maioris segmenti: recto quidem maior, minoris uerò segmenti angulus: minor est recto.

Habet hæc propositio quinque partes, puta quòd in semicirculo angulus: rectus sit, in maiori segmento quàm est semicirculus: minor recto, in minori autem: maior recto. Præterea segmentorum angulos, semicirculo quidem maioris: recto minorem, quod uerò est segmentum semicirculo minus: eius angulum recto maiorem esse oporteat. Hæc nunc singula ordine sic demonstrari possunt. Describatur circulus cum sua diametro, ducatur etiam à diametri extremitatibus ad punctum aliquod,




in circumferentiâ ubiuis sumptum, duæ rectæ lineæ: dico, has duas rectas angulum rectum continere. quod quidem, si altera ductarum ultra circumferentiâ secundum continuationem in rectum eiecta, ex hoc ipso angulo deinde recta quadam linea ad centrum ducta fuerit, sic demonstrari poterit. Quoniam enim totalis in circulo trianguli unum latus ulterius productum est: externus qui sic describitur angulus, duob. internis oppositis, ex propositione 32 primi equalis erit. Sed quia his internis, ex definitione circuli & priore parte propositionis quinte primi, bis usurpatis, æqualis etiam est angulus,

quem duæ in semicirculo rectæ lineæ includunt: eidem igitur in semicirculo angulo dictus externus equalis erit. quare, ex definitione 10 primi, uterque rectus, in semicirculo igitur angulus, rectus est. quod demonstrasse oportuit.

POTEST HOC IDEM ETIAM ALITER DEMONSTRARI
in hunc modum.

Ducta ab angulo in semicirculo ad centrum recta linea, cum partialium angulorum uterque, uni totalis trianguli angulo,



ex definitione circuli & priore parte propositionis quintæ primi, sit æqualis, atque hac ratione & communi illa noticia, Si equalibus æqualia adiçantur, &c. idem totalis duobus in triangulo reliquis æqualis: utrunque æqualium, respectu totalis trianguli, ex corollario propositionis 32 primi, duorum rectorum medietas, atque tandem utrunque per se uni recto æqualis erit. id quod demonstrasse oportuit.

ΑΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΟ ὅτι ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ γωνία:

Alia demonstratio istius quod in propositione dicitur, Angulum in semicirculo rectum esse.

Cum ex propositione 32 primi, Omnis trianguli uno latere ulterius productio, externus angulus duobus internis oppositis equalis sit, cumque etiã ex priore parte
proposi-

propositionis 5 primi, isosceliū triangulorū qui ad basim sunt angulī inter se æquales sint, hac & illa bis usurpata: qui ad centrū sunt angulī, uterq; ad alterius trianguli angul, ū in circumferentiā existentem, duplus erit. Sed quia ad centrum positi angulī, ex propositione 13 primi, duobus rectis sunt æquales: eorum medietas igitur, ut est in semicirculo angulus, duorum rectorum medietati, hoc est uni recto, æqualis erit. Hinc colligitur

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Εκ δὲ τούτου φανερὸν, ὅτι ἐὰν τριγώνου ἡ μία γωνία δυοῖν ἴση ᾖ· ὀρθή ἐστίν. Διὰ τὴν αὐτὴν τῆς ἐκείνης ἐφεξῆς ταῖς αὐταῖς ἴσων εἶναι. Ὅταν δὲ αἱ ἐφεξῆς γωνίαι ἴσων ᾖσιν· ὀρθαὶ εἶσιν.


COROLLARIUM.

Ex hoc sanè manifestum. Quando trianguli unus angulus duobus, reliquis scilicet, æqualis fuerit: illum rectum esse.

Propterea quod ille deinceps se habens, eisdem duobus reliquis æqualis sit. Quando autem deinceps se habentes, angulī æquales fuerint: recti erunt ambo.

Nunc quantum ad secundam ac tertiam propositionis partem.

Describatur circulus, ducatur in eo etiam recta quaedam linea, non per centrum transiens, puncto deinde in utriusque segmenti circumferentiā sumpto, ad utrumq; eorum duæ ab extremitatibus ductæ rectæ ducantur lineæ: dico igitur, eum angulum qui est in maiori segmento, recto minorem: illum uerò qui est in segmento minori, recto maiorem esse. Ducatur in circulo diameter, quomocunq; ad huius



extremitates deinde ab angulo, qui quòd talis sit qualis proponitur, demonstrari debet, duæ rectæ lineæ, uel una tantum si suffecerit. Et quoniam angulus in semicirculo, per primam partem propositionis huius, rectus est, cum angulus qui est in maiori segmento, sit recti angulī pars, contrā uerò, angulī illius qui est in minori segmento, ipse angulus rectus pars: qui igitur in maiori segmēto fuerit angulus, ut pars, recto minor, in minori uerò, ut totum, recto angulo maior erit. Vel, probato uno, quòd aut in segmento maiori angulus, recto minor sit: aut alter, recto maior, cū Omnis quadrilateri, in circulo descripti, angulī ex opposito, per propositionem 22 huius, duobus sint rectis æquales: statim tandem & alterum inferri potest. Quare igitur iam, quòd in propositione dicitur, angulum maioris segmenti, recto maiorem: ac ultimò tandem, minoris segmenti, recto minorem esse, sic demonstratur. Descripto circulo, in eo etiam præter centrum recta quaedam linea ducta: dico, &c. Ducatur in circulo diameter sic, ut eius una extremitas uni ductæ extremitati copuletur, altera deinde ductæ cum altera extremitate diametri recta quaedam alia iun-

ετα, ubi hæc eadem recta ultra circumferentiam cōtinuata fuerit, demonstrationis




figura parata erit. Et quoniam maioris segmenti angulus, ut apparet, eo angulo qui ex prima parte propositionis huius, rectus est, maior existit, angulorum porrò in hac figura deinceps se habentiū uterq̃, ex corollario præmissò rectus est: qui igitur maioris segmenti est angulus, ut totum, recto maior: contrà, qui minoris, ut pars, angulo recto minor erit. In circulo igitur qui quidem, & reliqua, quod demonstrasse oportuit,


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΒ.

Εὰν κύκλος ἐφάπτηται πρὸς εὐθείᾳ, ἀπὸ δὲ τῆς ἀφῆς ἐπι τὸν κύκλον διεχθῆ πρὸς εὐθείᾳ τέμνουσα τὸν κύκλον· ἂς ποιῆι γωνίας πρὸς τῇ ἐφαπτομένῃ, ἴσαι ἴσονται ταῦς ἐν γῆς ἑναλλάξ τοῖς κύκλου τμήμασι γωνίαις.

PROPOSITIO XXXII.


Si circumulum tetigerit recta quædam linea, à contactu uerò extendatur quædam recta linea circumulum secans: anguli quos facit ad contingentem, æquales erunt ijs, qui alternatim in circuli segmentis consistunt, angulis.

Describatur circumulum, ducantur etiam duæ rectæ lineæ, quarum una circumulum tangat, altera uerò à puncto contactus, per circumulum transiens, cum secet: & erit circumulum per secantem quidem in duo segmenta diuisus. Statuatur nunc in utroq̃ segmento angulus, per binas & binas rectas lineas ductas. His itaque descriptis: dico, quòd à secante & contingente circumulum uterq̃ comprehensus angulus, ei, qui ex altera parte in segmento ponitur, æqualis sit. Potest in descriptione figure, uel quæ per circumulum extenditur, uel illa quæ in uno segmento angulum constituit recta linea, uel neutra harum per centrum circuli transire. Quantum ad primum, Cum in segmentis angulorum uterq̃, ex prima parte propositionis 31, rectus sit, cumq̃



etiam ipsa secans ad tangentem, ex 18, sit perpendicularis, atque ita uterq̃ angulorum qui sic fiunt, rectus: illis mediantibus, per communem illam noticiam, qua omnes recti anguli æquales inter se sunt, propositioni tandem satisfactum erit. Quantum

tum ad secundum. Cum triangulum appareat, cuius in semicirculo angulus ex prima parte propositionis 31 huius, rectus est, cumque etiam Omnis trianguli tres anguli interiores, ex corollario propositionis 32 primi, duobus rectis æquales sint: reliqui duo eiusdem trianguli anguli, uni recto æquales erunt. Sed quia unus, rectus etiam est ex 18 huius, angulus quem nimirum ex eadem parte contingens ac per centrum transiens recta linea comprehendunt: per hanc communem noticiam, Quæ uni sunt æqualia, &c. illi duo uni huic angulo æquales erunt: communi igitur illo angulo quem habent, ablato, quantum ad unum angulum iam propositio constabit. De reliquo tandem, cum tam quadrilaterorum in circulis anguli, qui ex opposito sunt, ex 22 huius, quàm etiam qui à contingente & per centrum transeunte recta linea comprehenduntur, ex propositione 13 primi, duobus rectis æquales sint: ex communi quadam noticia, duo priores posterioribus duobus angulis æquales erunt. ab æqualibus igitur his, angulis qui iam dudum æquales inter se esse demonstrati sunt, subtractis: & de altero iam angulo, quod ille ex altera parte in segmento posito angulo æqualis sit, dubium amplius non erit. Quantum ad tertium, ubi scilicet



et neutra rectarum, neque circulum secans, neque etiam illa quæ in segmento angulum constituit, per centrum circuli transeat. Quòd si hoc modo figura descripta fuerit, tum à puncto contactus, per 11 primi, ipsi tangenti ad rectos angulos linea excitanda est. Erit autem hæc, cum ex propositione 19 huius, centrum circuli contineat, diameter circuli. Coniungatur porro diametri altera extremitas cū extremitate secantis. Et quia angulus qui sic describitur, eo quòd in semicirculo existat, rectus est: reliqui duo in hoc triangulo anguli, uni recto æquales erunt.

Sed quia angulus etiam ad contactum totalis ex illa parte, ratione ad rectos angulos excitatæ lineæ, est rectus: idem totalis prioribus duobus æqualis erit. Subtracto igitur ab illis æqualibus angulo quodam illis communi, cum in omni circulo qui in eodem segmento sunt anguli, inter se æquales sint, de eo qui nimirum in illa parte sub tangente & secante comprehenditur angulo, quòd ille ex altera parte in segmento angulo æqualis sit, tandem constabit. De altero nunc angulo nullum erit dubium, quin & ipse in altero segmento angulo æqualis sit. Nam cum quadrilaterum in circulo descriptum, duos angulos oppositos duobus rectis æquales habeat, cumque insuper illi, qui à tangente & secante circulum comprehenduntur anguli, duobus rectis æquales sint, per communem illam noticiam, Eisdem æqualia &c. illis duobus in quadrilatero angulis, quos secans cum contingente facit, duo anguli æquales erunt. Quia autem unus, ut iam ostensum, est uni æqualis: & alter tandem, per subtractionem æqualium ab æqualibus, alteri angulo æqualis erit. Si circulum igitur tetigerit recta quædam linea, à contactu, &c. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΓ.

Ἐπί τῇ δὲ θείῃ εὐθείᾳ γράψαι τμήμα κύκλου, δεξιῶν γωνίαν ἴσιν τῇ δὲ θείῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμου.


PROPOSITIO XXXIII.

Super data recta linea describere sectionem circuli, capientem angulum æqualem dato angulo rectilineo.

Requiritur


Requirít hæc propositio rectam lineam datam, angulum item rectilineum datum, proponit autē, quomodo super data recta sectio, quæ dato rectilineo angulo æqualem angulum capiat, describatur. Angulus datus potest esse rectus, aut non rectus. Si rectus, data recta bifariam diuidenda, super ea deinde ex puncto diuisionis semicirculus describendus est, & factum erit propositum: id quod ex prima parte propositionis 31 huius demonstrari poterit. ALITER. Si rectus fuerit angulus propositus, constituatur ad alterutram rectæ datæ extremitatem, atq; ad ipsam rectam lineam, per 23 primi, angulus, dato angulo æqualis, recta deinde bifariam diuisa, ex puncto hoc, secundum alteram eius medietatem describatur circulus. Et

Angulus datus, rectus.



quoniam angulus quem applicata ad rectam datam constituit, ex structura, rectus est: recte datæ applicata circulum illum, ex corollario propositionis 16 huius, tanget. Et quoniam etiam, ut habet propositio præcedens, angulus quem hæc duæ rectæ comprehendunt, in segmento angulo ex aduersa parte est æqualis, illo igitur descripto, cū ex cōmuni quadā noticiā, Eidem æqualia, illa & inter se æqualia sint: de recto iam angulo constat propositū. Quod si angulus datus nō fuerit rectus, erit is maior illo, aut minor. utrum horum fuerit, ad rectam datam & ad alteram eius extremitatem, angulus dato æqua-

lis, per 23 primi, rectæ cuiusdam lineæ ductu constituatur. Recta deinde data bifariam diuisa, tam ex hoc diuisionis puncto ipsi datæ, quam etiam ex modò usurpata datæ extremitate ipsi ductæ, ad angulos rectos linea excitetur: & erit communis



harum ad rectos ductarum sectio, centrum futuri circuli. quod in hunc modum demonstrabitur. Ducatur ab hoc centro ad alteram datæ extremitatem recta quædam linea. Et quoniam hæc, ex structura & propositione 4 primi, lineæ ei, quæ ipsi ductæ ad rectos angulos insistit, æqualis est: circulus igitur ex cētro posito, ad unius æqualium interuallum, per 3 postulatum primi, descriptus, per terminum etiam alterius æqualis transibit. Describatur ergo is, altera etiam semidiametro, illa nimirum, quæ ab angulo, dato æquali, ducta est, in diametrum continuata, eius in circumferentiā extremitas cum altera datæ extremitate iungatur. Et quoniam hæc recta, quæ cum data angulum dato æqualem comprehendit, propterea quod ab extremitate diametri ad rectos angulos egrediatur, ex priore parte corollarij propositionis 16 huius, ipsum descriptum circulum tangit, cum angulus segmenti, quod ex altera parte super data recta descriptum est, angulo, ad contingentem, dato æquali

to æquali descripto, ex 32 huius æqualis sit: super data igitur recta sectio, angulo dato æqualem capiens angulum, descripta est, quod fieri oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΔ.

Από το δὲ δὲ γύρω κύκλου τμήμα ἀφελῆν, δεχόμενον γωνίαν ἴσην τῇ δὲ θείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμω.

PROPOSITIO XXXIII.

A' dato circulo segmentum abscindere, capiens angulum æqualem dato angulo rectilineo.

Sit circulus datus, angulus item rectilineus datus, atq; propositum, à circulo portionem, quæ capiat angulum dato æqualem, abscindere. Ducatur primò per 17. huius, recta quædam linea circulum tangens, à puncto deinde contactus, per 23



primi, alia recta circulum secans, quæ cum tangente angulum dato æqualem faciat, ducatur, & propositioni satisfactum erit, cum per hanc ipsam secantem huiusmodi sectio de circulo nunc sit abscissa. Puncto igitur in circumferentia, huic angulo opposita, ubiuis sumpto, si ab eo duæ rectæ lineæ ad extremitates circulum secantis ductæ fuerint, quem hæ rectæ angulum incluserint, dato rectilineo angulo æqualem esse, propositio huius 32, & communis illa noticia, Quæ eidem sunt æqualia & reliqua, commonstrabunt. A' dato igitur circulo segmentum, quod angulum dato rectilineo angulo æqualem capiat, abscissum est, quod fieri oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΕ.


Εὰν ἐν κύκλῳ δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας· ἢ ἑπὶ τῷ ᾧ μιᾶς τμημάτων ποδὲ δεχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ὅστι τῷ ἑπὶ τῷ ᾧ ἑτέρως τμημάτων ποδὲ δεχομένη ὀρθογώνια.

PROPOSITIO XXXV.


Si in circulo duæ rectæ lineæ sese mutuo secuerint: quod sub sectionibus unius comprehenditur rectangulum, æquum est ei, quod sub segmentis alterius comprehenditur rectangulo.

Describatur circulus, in quo etiam duæ rectæ lineæ, sese mutuo secantes, ducantur: dico, rectangulum comprehensum sub partibus unius, æquale esse ei, quod sub alterius rectæ partibus continetur, rectangulo. Rectarum in circulo ductarum

rum sectio fit, aut in ipso circuli centro, aut extra. Fiat igitur primò in circuli centro. Et quoniam quæ ex centro ad circumferentiam egrediuntur rectæ lineæ, ex de-



initione circuli, inter se æquales sunt, cum sub æqualibus lineis, æqualia rectangula contineri manifestum sit: & quæ sub sectionibus in circulo secantium linearum rectangula comprehenduntur, inter se æqualia erunt. Quòd si extra centrum, in circulo ductæ sese mutuo secant, tum ad utramque secantem ab ipso circuli centro, tanquam à puncto in linea minimè existente, per propositionem 12 primi, perpendicularis linea ducenda, centrum deinde cum intersectione secantium communi, atq; alterutra utriusq; secantis extremitate, tribus rectis lineis coniungendum erit, & demonstratio sic colligenda. Quoniam utraq; secantium per suam perpendicularem lineam, iam quidem bifariam seu æqualiter, ex secunda parte propositionis tertie huius, diuisa est, cum prius per punctum intersectionis communis inæqualiter etiam diuisæ sint, rectangulorum sub inæqualis sectionis portionibus comprehensorum utrunq; unà cū quadrato portionis interceptæ, per propositionem quintam secūdi bis usurpatam (sunt enim duæ secantes) quadrato medietatis æquale erit, atq; communi deinde, quod scilicet à perpendiculari secantis utriusq; describitur, quadrato adiecto: rectangulorum utrunq; cum duobus quadratis, interceptæ scilicet portionis uno, & perpendicularis suæ altero, duobus quadratis, quæ nimirum à dimidio lineæ & perpendiculari describuntur, æquale erit. Quia uerò in triangulis rectangulis id quod à latere rectum angulum subtendente describitur quadratum, reliquorum duorum laterum quadratis per penultimam propositionem primi, æquale est, hac ipsa propositione bis usurpata: utrunq; rectangulum cum quadrato lineæ, à centro ad intersectionem secantium ductæ, quadrato semidiametri æquale erit. Semidiametri autem unius circuli, cum sint inter se æquales, atque hinc etiam earundem quadrata æqualia: ipsa insuper rectangula cum suis quadratis, uel cum quadrato eo quod commune habent, inter se æqualia erunt. Illo igitur communi iam ablato: & ipsa rectangula sola, quæ sub secantium segmentis comprehenduntur, inter se æqualia erunt. Si in circulo igitur duæ rectæ lineæ sese mutuo secuerint: quod sub sectionibus unius comprehenditur rectangulum, æquum est ei, quod sub segmentis alterius comprehenditur rectangulo. quod demonstrasse oportuit.




drato portionis interceptæ, per propositionem quintam secūdi bis usurpatam (sunt enim duæ secantes) quadrato medietatis æquale erit, atq; communi deinde, quod scilicet à perpendiculari secantis utriusq; describitur, quadrato adiecto: rectangulorum utrunq; cum duobus quadratis, interceptæ scilicet portionis uno, & perpendicularis suæ altero, duobus quadratis, quæ nimirum à dimidio lineæ & perpendiculari describuntur, æquale erit. Quia uerò in triangulis rectangulis id quod à latere rectum angulum subtendente describitur quadratum, reliquorum duorum laterum quadratis per penultimam propositionem primi, æquale est, hac ipsa propositione bis usurpata: utrunq; rectangulum cum quadrato lineæ, à centro ad intersectionem secantium ductæ, quadrato semidiametri æquale erit. Semidiametri autem unius circuli, cum sint inter se æquales, atque hinc etiam earundem quadrata æqualia: ipsa insuper rectangula cum suis quadratis, uel cum quadrato eo quod commune habent, inter se æqualia erunt. Illo igitur communi iam ablato: & ipsa rectangula sola, quæ sub secantium segmentis comprehenduntur, inter se æqualia erunt. Si in circulo igitur duæ rectæ lineæ sese mutuo secuerint: quod sub sectionibus unius comprehenditur rectangulum, æquum est ei, quod sub segmentis alterius comprehenditur rectangulo. quod demonstrasse oportuit.

APPENDIX.

Facta autem est mentio duarum perpendicularium, trium deinde linearum aliarum, quæ pro huius propositionis structura ducendæ sunt. Quòd si uerò, ratione quidem ductarum

ductarum in circulo, una uel plures duci non possint, reliquis tamē ductis, demonstratio ut prius, non tamen tam sæpe singula repetendo succedet. Huius autem rei exempla sunt, ut sequitur.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Λ5.


Εὰν κύκλος ληφθῆ πσημείον ἐκῆς, ἢ ἀπὸ αὐτοῦ πρὸς τὸν κύκλον προσηπίωσι δύο εὐθείαι, καὶ ἡ μὲν αὐτὴ τέμνηται τὸν κύκλον, ἡ δὲ ἐφαπτήται· ἴσαι ἂν ἔσονται ὅλης τῆς τεμνύσης καὶ τῆς ἐκῆς ἀφ' ἀμφοτέρων μέρων τοῦ τε σημείου καὶ τῆς κυρτῆς ποδὲ φέρειας, ποδὲ χόρδου ὀρθογώνιου, ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης τετραγώνου.

PROPOSITIO

XXXVI.

Si extra circulum sumatur aliquod punctum, ab eoq; in circulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum una quidem circulum secet, altera uerò tangat: erit quod sub tota secante, & exterius, inter punctum & conuexam circumferentiam, sumpta comprehenditur, ei quod à tangente describitur quadrato, æquale.


Describatur circulus, ducantur etiam à puncto, extra circulum sumpto, duæ rectæ lineæ, una quidem circulum secans, altera uerò, per propositionem 17 huius, eum tangens: dico, rectangulum sub tota secante & eius externa portione comprehensum, æquale esse quadrato contingentis, quod in hunc modum demonstrabitur. Aut enim circulum secans per centrum transierit, aut non. Si transierit, ducatur à contactu ad centrum recta quædam linea. Et quoniam linea, ut est diameter cir-



culi uel secantis rectæ interna portio, bifariam diuisa est, eiq; alia quædam recta linea, externa nimirum eiusdem secantis portio, in rectum adiecta est: comprehensum sub tota secante & externa portione rectangulum cum quadrato medietatis diuisæ, quadrato eius, quæ ex dimidia atq; adiecta constituitur, lineæ, per propositionem 6 secundi, æquale est. Et quoniã etiam quæ ex dimidia & adiecta constituitur linea, ei in triangulo angulo, qui ex 18 huius rectus est, subtēditur, atq; hinc ab ea descriptum qua-

dratum, eis quæ à reliquis duobus trianguli lateribus describuntur quadratis, ex propositione penultima primi æquale: æqualium iam mutatione facta. loco unius scilicet lateris quadrati, duorum, contingentis scilicet, & eius quæ à contactu ad centrum ducta est, quadratis sumptis: & rectangulum cum dicto quadrato, eis quæ à reli-

quis duobus lateribus describuntur, æquale erit: æqualibus igitur quadratis, quæ nimirum à lineis, ex definitione circuli, æqualibus descripta sunt, ab his æqualibus subtractis, relinquitur tandem, sub tota secante & externa portione comprehensum rectangulum, ei quod à contingente describitur quadrato æquale esse, quod erat obtinendum. Quòd si circulum secans per centrum non transierit, tum ab eodem extra circulum sumpto puncto, recta linea circulum secans alia, quæ per centrum transeat, ducenda est. Et quia de hac nullum est amplius dubium, quin sub tota illa



& parte sua exteriori comprehensum rectangulum, lineæ contingentis quadrato æquale sit, duabus à centro rectis lineis ductis, una quidem quæ priori secanti perpendicularis sit, altera uerò ad eiusdem prioris secantis cum circulo intersectionem tendens: & de illa, quæ per centrum non transierit secante linea, cum per suam ad rectos ductam lineam, ex secunda parte propositionis 3 huius, bifariam diuisa sit, ex propositionibus sexta secundi & penultima primi, interim tamen communi quodam, ad rectos scilicet ductæ quadrato, addito, æqualibus item ab æqualibus subtractis, nemo dubitabit. Si extra circulum igitur sumatur aliquod punctum, ab eoq; in circulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum una quidem circulum secet, & reli. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΖ.


Εὰν κύκλος ληφθῆ τι σημεῖον ἐκῆς, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον προσηύψωσι δύο εὐθεῖαι, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνη ἄρ κύκλον, ἡ δὲ προσηύψωσι, ἡ δὲ ἄνω εὐθείᾳ τεμνύσῃ, καὶ εἰς ἐκῆς ἀρλαμβανομένης, μεταξὺ τούτων σημείων καὶ εἰς κεντρὴν περιφερείας, ἴσον τῷ ἀπὸ εὐθείᾳ προσηύψωσις ἢ προσηύψωσι, ἐφαίνεται τοῦ κύκλου.

PROPOSITIO XXXVII.

Si extra circulum sumatur aliquod punctum, à puncto uerò in circulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum una quidem circulum secet, altera uerò incidat, quod item sub tota secante, & exterius inter punctum & conuexam circumferentiam sumpta, comprehenditur, æquale sit ei, quod à cadente describitur: cadens ipsa circulum tanget.

Describatur circulus, ducantur etiam à puncto extra circulum sumpto, in ipsum circulum, duæ rectæ lineæ, una quidem circulum secans, altera uerò quæ in ipsum tantum cadat. Est autem quòd rectangulum, sub tota secante & eius externa portione comprehensum, æquale sit quadrato in circulum cadentis lineæ: dico igitur, ipsam cadentem rectam circulum tangere. Ducatur à puncto extra circulum sumpto, per 17 huius, linea circulum cōtingens, à centro deinde circuli ad tria puncta, quæ

quæ sunt punctum contactus, id quod extra circulum sumptum est, & tertium deinde, ea cadentis extremitas qua cum in circulum cadit, tres rectæ lineæ ducantur. Et quoniam circulum tangentis quadratum, rectangulo, sub tota secante & eius



externâ portione comprehenso, ex propositione præcedenti æquale est, cum eidem rectangulo, ex proposito, æquale etiam sit quadratum lineæ in circulum cadentis: cadens in circulum linea, & eum tangens, cum æqualia quadrata ab eis describantur, lineæ inter se æquales erunt. Præterea, quoniam etiam in circulo ex centro usque ad ipsam circumferentiã continuatæ rectæ lineæ, inter se sunt æquales, cum iam duo appareant triangula, quorum duo latera unius duobus lateribus alterius æqualia sint, bases etiam eorum, cum sit una & eadem linea illis communis, æquales: & angulus inter æqualia latera in uno, angulo, inter æqualia latera in altero triangulo, per propositionem 8 primi, æqualis erit. Sed quia unus eorum, ex 18 huius, est rectus: & alter sic, propter æqualitatem, rectus erit. In circulum igitur cadens, hypotesibus illis mediantibus, eum etiam tangere, ex priore parte corollarij propositionis 16 huius concluditur. Si extra circulum igitur punctum aliquod sumatur, à puncto etiam in circulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum una quidem circulum secet, altera uerò eum tangat, quod item sub tota secante, & exterius inter punctum & convexum circumferentiæ sumpta portione comprehenditur, æquale sit ei, quod à tangente describitur, quadrato: cadens recta linea circulum tanget, quod demonstrasse oportuit.

FINIS LIBRI TERTII.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ ΧΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

EVCLIDIS ELEMENTORVM GEO- metricorum liber quartus.




St huius libri quarti tractatio de inscriptionibus & circum-
scriptionibus figurarum rectilinearum, uel plano-
rum. Docet enim, quomodo una figura a'ij inscribi, uel
ab alia circumscribi debeat. Quia uerò alia est huius
quàm præcedentium librorum tractatio, alijs etiam in
eo uocabulis utitur: atq; ea, ut sequentia deinde planius
intelligi possint, singula ordinè definit.

ΟΡΟΙ.


Σχήμα εὐθύγραμμον εἰς σχῆμα εὐθύγραμμον ἐγγράφεται λέγεται, ἔταν
ἐκάστη τῶν τοῦ ἐγγραφομένου σχήματος ᾠγωνίων ἐκάστης πλευρᾶς τοῦ εἰς ὃ ἐγ-
γράφεται ἀπῆται.

Σχήμα δὲ ὁμοίως ποδὲ σχῆμα περιγράφεται λέγεται, ἔταν ἐκάστη πλευ-
ρὰ τοῦ περιγραφομένου ἐκάστης γωνίας, τοῦ ποδὲ ὃ περιγράφεται ἀπῆται.



DEFINITIONES.

- 1 Figura rectilinea in figura rectilinea describi dicitur, quando unus-
quisq; inscriptæ figuræ angulus, unumquodque, latus eius in qua descri-
bitur, tangit.
- 2 Figura autem similiter circa figuram describi dicitur, quando unum-
quodq; latus circumscriptæ, unumquemque angulum eius circa quam
describitur, tangit.



Ex his duabus definitionibus colligitur, Inter illas tantum figuras, posse unam
alteri


alteri inscribi uel circumscribi, quæ lineas numero equales habent. Nunquam enim triangulum quadrato, pentagono uel hexagono, inscribitur aut circumscribitur, cum illius pauciores sint anguli, quam horum latera. Et e contrario. Sed triangulum triangulo, quadratum quadrato, & quælibet suæ speciei figuræ, & inscribi & circumscribi potest.

Σχήμα εὐθύγραμμορ εἰς κύκλωρ ἐγγράφεται λέγεται, ὅταν ἐκάστη γωνία τῆς ἐγγραφομένης ἀπὸ τῆς τῶν κύκλωρ περιφέρειας.

Σχήμα δὲ εὐθύγραμμορ πρὸς κύκλωρ περιγράφεται λέγεται, ὅταν ἐκάστη πλευρὰ τῆς τῶν κύκλωρ περιφέρειας τῶν περιγραφομένης ἐφάπῃται.


3 Figura rectilinea in circulo describi dicitur, quando unusquisque angulus inscriptæ circuli circumferentiam tangit.

4 Figura uerò rectilinea circa circulum describi dicitur, quando unumquodque latius circumscriptæ, circuli circumferentiam tangit.



Requirit utraq; definitio circulum, cui deinde figura rectilinea per priorẽ quidem inscribitur, per posteriorem uerò ei circumscribitur.


Κύκλωρ ὁμοίως εἰς σχῆμα ἐγγράφεται λέγεται, ὅταν ἡ τῶν κύκλωρ περιφέρεια, ἐκάστης πλευρᾶς τῆς εἰς δὲ ἐγγράφεται ἀπὸ τῆς.



5 Circulus similiter in figura describi dicitur, quando circuli circumferentia, unumquodque latius eius in qua describitur, tangit.

Κύκλωρ

Κύκλος δὲ πᾶσι σχῆμα περιγράφεται λέγεται, ὅταν ἢ τῆς κύκλου περιφέρειας ἐκάστης γωνίας τῶν πᾶσι ὁ περιγράφεται ἀπ᾽ αὐτῆς.




6 Circulus uerò circa figuram describi dicitur, quãdo circuli circumferentia unumquemq; eius circa quam describitur, angulum tangit.

Requirunt hæ duæ definitiones figuram rectilíneam, cui deinde circulus per quintam inscribitur, per sextam uerò circulus circumscribitur.

Εὐθεῖα εἰς κύκλον ἐναρμόζομαι λέγεται, ὅταν τὰ πέρατα αὐτῆς ἢ τῆς περιφέρειας ἢ τῶν κύκλου.

7 Recta linea in circulum coaptari dicitur, quando eius extrema in circuli circumferentia fuerint.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΠΡΩΤΗ. Α.

Εἰς τὸ δοθέντα κύκλον τῆς δοθείσης εὐθείας, μὴ μείζονι ὅση τῆς κύκλου διαμέτρως, ἴσων εὐθειᾶν ἐναρμόζομαι.


PROPOSITIONES.

PRIMA I.

In dato circulo datae rectae lineae, quae minime longior ipsa circuli diametro existat, aequalem rectam lineam coaptare.


Requirit hæc propositio circulum, rectam insuper lineam datam. Monet autem expresse, ne hæc recta circuli diametro longior sit. Nam si data fuerit diametro longior, cum hæc inter ductas in circulo rectas lineas, ex præcedentis tertij propositione 15, sit omnium longissima: nunquam in circulo data illa coaptari posset, sed ipsum potius

potius suis extremitatibus excederet & secaret. Quare necesse est, ut sit diametro
 Recta, diameter æqualis.



breuior, aut ei æqualis. Sit ergo primò
 ei æqualis: erit diameter ipsa linea, id
 quod ex sua ipsius definitione satis
 manifestum est. Quòd si uerò recta
 data fuerit diametro breuior, cū iam
 duæ inæquales sint rectæ lineæ, à lon-
 giore, per 3 primi, portio breuiori æ-
 qualis abscindatur, secundum quam
 deinde ex altera sua, quam habet in
 circumferentiã, extremitate círculo
 descripto, centroq; huius cum com-
 muni circulorum interfectione recta
 linea iuncto: per hanc eandem re-
 ctam tandem propositioni satisfa-


Recta, dia. breuior.



ctum erit, quod & ipsum ex definitione circuli, communi deinde illa noticiã, Quæ
 eidem sunt æqualia &c. facile demonstrari poterit. In dato igitur círculo, datæ rectæ
 lineæ, quæ minime longior ipsa circuli diametro existat, æqualis recta linea coapta-
 ta est, quod fecisse oportuit.

ALIA ALTERIVS HVIVS PARTIS DEMONSTRATIO, in qua scilicet, recta, cui æqualis in círculo coaptanda
 est, breuior diametro esse debet,

Recta dia. breu.



Huic rectæ datæ ad alteru-
 tram ipsius diametri extrema-
 tem, per propositionem 2^a pri-
 mi, æqualis ponatur: secundum
 quam positam, ex sumpta dia-
 metri extremitate, círculo de-
 scripto, recta deinde alia ex
 hoc centro ad punctum in-
 terfectionis huius & primò de-
 scripti circuli ducta, cum hac
 tandem illa sit quæ petebatur

D d recta

recta linea, res confecta erit, id quod ex structura & definitione, ut modò factum est, demonstrari potest.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Β.

Εἰς τὸ δοθέντα κύκλον, ἅδι δοθέντι τρίγωνῳ, ἰσογώνιον τρίγωνον ἐγγράψαι.

PROPOSITIO II.

In dato circulo, dato triangulo, æquiangulum triangulum describere.


Esto circulus datus, triangulum etiam datum, atq; propositum, in circulo triangulum dato æquiangulum describere. Circulo igitur & triângulo datis, ducatur per propositionem 17 tertij, linea circulum contingens atq; à puncto contactus ducte recte, per circulum transeuntes, quarum anguli, quos cum contingente ex utraq; parte faciunt (vel quarum anguli, quos hæ ductæ, una quidem cum cõtingente, altera uerò cum priore ducta faciunt) duobus in triangulo angulis uterq; utriq; æquales sint, per propositionem 23 primi demittantur, his tandem rectis, suis quas habent in circumferentiâ, extremitatibus, tertiâ quadam recta linea copulatis: propositioni satisfactum erit. Cum enim duo anguli, qui à secantibus & contingente linea



continentur, duobus quidem in triangulo angulis, ex structura, duobus uerò in alternis sectionibus, ex propositione 32 tertij, sint æquales: duo in triangulo, duobus in sectionibus circuli angulis, ex communi quadam noticia, æquales erunt: quare & tertius angulo tertio æqualis.

VEL QUANTVM AD ALTERAM CONSTRUCTIONEM

Cum duo anguli, quorum unus quidẽ à contingente & una ductarũ, alter uerò ab ipsis ductis continetur, duobus in triangulo dato angulis, ex structura, duobus



Item

item in triangulo, circulo nunc inscripto, unus quidē, ut apparet, alter uerò, ex propositione 32 tertij, æquales sunt. Cumq̄ etiam ex corollario propositionis 32 primi, omnis trianguli tres interni anguli duobus sint rectis æquales: & tertius sic angulo tertio, in his duobus triangulis, æqualis erit. Aliàs enim, ubi inæquales essent, tres anguli in uno duobus rectis non æquiualerent, quod non conceditur: æqualis igitur tertius angulo tertio. In circulo igitur descriptum triangulū, cum dato æquiangulum erit. Quare in dato triangulo, & reli. quod fieri oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Γ.

Γὀρι τ̄ δὀθγ̄τα κύκλῳ, τ̄δ δὀθγ̄τι τ̄ριγῶνῳ, ἰσογῶνιον τ̄ριγῶνον περιγράψαι.

PROPOSITIO III.


Circa datum circulum, dato triangulo, æquiangulum triangulum describere.

Sit datus circulus, datum etiam triangulum, producat̄ur autem ipsius trianguli unum latus ulterius ex utraq̄ parte: & erunt qui fiunt anguli externi, suis internis oppositis, per propositionem in primo 32, æquales. Ducatur insuper à centro cir-



culi, quod quidē per primam tertij, si ignotum id fuerit, acquiritur, recta linea usq̄ ad circumferentiam utcunq̄, atq̄ ad huius alteram extremitatem, quod centrum circuli est, tanquam ad punctum datum, per 23 primi bis usurpatam, duo anguli, ex utraq̄ parte unus, duobus externis trianguli angulis æquales, uterq̄ utriq̄, constituentur. Ultimò, per puncta contactus, trium à centro exeuntium linearum cum circulo, tres rectæ circulum contingentes, ex utraq̄ parte eousq̄ prolongatæ, donec una cum altera concurrat, ducantur: & propositioni satisfactum erit, cum hæ tandem rectæ triangulum, quale petebat propositio, constituent. Sed ne quis forte dubitare posset, de contingentium continuatarum inter se concursu: igitur priusquam propositionis demonstrationem aggrediamur, quòd harum cōtingentium singulæ duæ lineæ cōcurrant, paucis demonstrabimus. Imaginetur ab uno puncto contactus ad alterum recta quædam linea. Et quoniã hæc imaginaria recta in alias duas, contingentes scilicet continuatas rectas, incidens, internos & in eadem parte positos angulos, duobus rectis minores facit: has cōtingētes ea in parte, qua duos angulos incidens duobus rectis minores efficit, ex communi quadam noticia, in primo exposita, concurrere necesse erit, quod erat demonstrandum. Nunc ad triangulum propositionis, circa datum circulum descriptum, quòd nimirum illud dato triangulo æquiangulum sit, hoc sic colligetur. Quoniã enim anguli, à contingentibus & ab earum contactuum punctis ad centrum deductis rectis lineis comprehensi, singuli, per propositionem libri præcedentis decimam octauam, recti sunt.

Et rursus, quoniam omnis quadrilateri quatuor anguli, quatuor rectis angulis sunt æquales, propterea quòd per ductam ab uno ipsius angulo in oppositum, rectam lineam, in duo triangula diuidatur: duobus in quolibet quadrilatero rectis



angulis, quos habet, subtractis, duo qui relinquuntur in quolibet quadrilatero anguli, duobus rectis æquales erunt. Sed quia in triangulo, cuius unum latus ulterius productum fuerit, angulus externus cum suo deinceps se habente interno, per propositionem 13 primi, similiter duobus rectis æqualis est: illi igitur duo priores, ex communi quadam noticia, his duobus æquales erunt. Quare iam subtractis æqualibus ab angulis equalibus, propositum tandem inferri potest. Circa datum igitur circulum, dato triangulo, æquiangulum triangulum descriptum est. quod fecisse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Δ.

Eis ἑκάθεμ τρίγωνον, κύκλον ἐγγράψαι.

PROPOSITIO IIII.

In dato triangulo, circulum describere.

Sit datum triangulum, atq; propositum, circulum in eo describere. Duo igitur in triangulo anguli, quomocunq; sumpti, ex prop. 9 primi, per duas rectas lineas bifariam secantur. Et quoniam hæ duæ rectæ, ex propositione 17 primi, & cõmuni illa noticia, Si in duas rectas recta linea incidens, internos, & in eadem, &c. in triangulo concurrunt: à puncto igitur illo concursus ad singula trianguli latera lineæ



perpẽdiculares, per 12 primi ducantur. Et quoniam hæ, ex propositione 26 primi, bis

bis usurpata, & illa cōmuni noticia, Quæ eidem æqualia, &c. inter se æquales sunt, ubi ex hoc puncto concursus, tanquam ex centro posito, secundum unius harum æqualium linearum interuallum, circulus describatur, propositioni tandem satisfactum erit: id quod prior pars corollarij propositionis decimę sextę tertij, & definitio huius libri quinta sic demonstrant. Quoniam enim, ut quidem demonstratum est, ductæ ad latera perpendicularares inter se æquales sunt, ex uno insuper puncto eductę: ex eodem igitur puncto circulus, secundum unius æqualium interuallum descriptus, per omnium aliarum extremitates transire necesse erit: unde sic etiam singulæ descripti circuli semidiametri existent, & tanget singula trianguli latera circulus descriptus ex priore parte corollarij propositionis 16 tertij: quare eidem etiam triangulo, ex definitione, circulus inscriptus est. In dato igitur triangulo, circulus descriptus est, quod fecisse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε.

πὸ τοῦ ῥ' ὁρθῆν τρίγωνον, κύκλον περιγράψαι.


PROPOSITIO V.

Circa datum triangulum, circulum describere.

Quemadmodum præcedentis propositionis operatio duorū angulorum æquales requirebat diuisiones, ita in hac, ut trianguli dati, duo latera, quomodocunque sumpta, sicuti docet propositio in primo 10 bifariam diuidantur, necesse erit. Hoc autem factō, à punctis mediarum diuisionum ad angulos rectos lineæ, uersus eam partem, ubi maximè uidetur esse centrum describendi circuli, educantur. Et quo-



niam hæ continuatæ, ex propositione 17 primi, & communi illa noticia, Si in duas rectas recta linea incidens, internos, & in eadem parte angulos, &c. concurrunt, ubi ex hoc puncto, tanquam ex centro posito, secundum interuallum spacij, inter hoc punctum & angulorum quemuis intercepti, circulus describatur, res confecta erit. Nam is erit circulus, propositi trianguli circumscriptioni cōueniens, quod



certè tribus rectis lineis ex hoc puncto, quod centrum esse ponitur, ad tres angulos

gulos ductis, cum hæ ex propositione 4 primi, bis usurpata, & communi illa noticia, Eidem æqualia, &c. æquales inter se esse demonstrantur, per 9. propositionem tertij facile conceditur. Circa datum igitur triangulū circulus descriptus est, quod fieri oportuit.

APPENDIX.

Est autem hic modus generalis, ad omnia triangula, quomodocumq; sanè illa, secundum latera uel angulos considerata, nominabuntur. Quare quòd nonnulli ad pleniorē huius propositionis declarationem, pro triangulorum, quantum ad angulos, uaria distinctione, uarios canones tradiderunt, cum is unus omnis generis triangulis satisfaciāt, illorum traditiones hoc loco consulto prætermisimus.

ΠΡΟΙΣΜΑ.

Καὶ φανερὸν, ὅτι ὅτε μὲν ἐντὸς τοῦ τριγώνου πίπτει τὸ κέντρον τοῦ κύκλου· ἢ ἐπὶ τῆς α γ γωνίας, ἐν μείζονι τμήματι τοῦ ἡμικυκλίου τυγχάνουσα, ἐλάττω μὲν ὄρθῃς. Ὅτε δὲ ἐπὶ τῆς β γ· ἐν ἡμικυκλίῳ τυγχάνουσα, ὄρθῃ ἴσασιν. Ὅταν δὲ ἐκτὸς τῆς β γ εὐθείας τὸ κέντρον πίπτῃ· ἢ ἐπὶ τῆς α γ ἐν ἐλάττω τμήματι ἡμικυκλίου τυγχάνουσα, μείζονι ὄρθῃς. Ὡς καὶ, ὅταν ἐλάττω μὲν ὄρθῃς τυγχάνῃ ἢ ἀδυσμῆνη γωνία· ἐντὸς τοῦ τριγώνου συμπεσῶντι, αὐτῶν δ', ε'. Ὅταν δὲ ὄρθῃς ἐπὶ τῆς β γ. Ὅταν δὲ μείζονι ὄρθῃς· ἐκτὸς τῆς β γ, ὅπως ἴδει δειξάσαι.

C O R O L L A R I V M.

Et manifestum est, quòd quando intra triangulum cadit centrum circuli: angulus in maiori quàm est semicirculus segmēto existens, recto minor sit. Quando uerò in rectam lineam, hoc est in latus, cadit, cū sic angulus in semicirculo existat: ille rectus erit. Cum uerò extra rectam lineam, hoc est extra triangulum, centrum circuli ceciderit, quia tum in maiori quàm est semicirculus segmēto angulus existit: maior recto erit. Et e contrario, cum minorem recto contingat esse angulum: ad rectos ductæ intra ipsum triangulum concurrent. Quando uerò rectum: in aliquod trianguli latus, Si uerò maiorem recto: extra ipsam rectam lineam, hoc est, extra ipsum triangulum concurrent. quod admonuisse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

5.


Eis τὸν ἀδυσμῆνα κύκλον, τετράγωνον ἐγγράψαι.

PROPOSITIO

VI.

In circulo dato, quadratum describere.

Sit circulus datus, atque propositum, quadratum in eo describere. Ducantur igitur



tur in circulo duæ diametri, ad angulos rectos sese mutuo secantes, quarum extremitates tandē si quatuor rectis lineis copulentur, per eas propositioni satisfactum erit, quod sic patet. Primò, quòd hæc quatuor linearum figura sit circulo inscripta, declarat ipsius rei definitio. Secundo, quòd sit quadratum, hoc est, æqualium laterū & rectorum angulorum, quantum ad rectos angulos, cū omnes eius anguli sint in semicirculo: ex prima parte propositionis 31 tertij hoc cōstabit. Quantū uero ad latera, potissimū hoc ex propositione 4 primi, quoties opus fuerit ea usurpata, & com-

& communi illa notitia, Quæ uni sunt æqualia, &c. colligetur. Rectangulū igitur & æquilaterum: quare & quadratū ex definitione, & describitur in circulo. In circulo igitur dato quadratum descriptum est, quod fecisse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ζ.

Πρὸς ἑνὸς κύκλου, τετράγωνον περιγράψαι.

PROPOSITIO VII.

Circa datum circulum, quadratum describere.

Sit circulus datus, atque propositum, quadratum circa ipsum describere. Quem admodum præcedens, ductis in circulo duabus diametris, harum extremitates ut quatuor rectis coniungerentur lineis requisivit, ita hæc, postquā circulus datus, in eo etiam duæ ad rectos angulos diametri ductæ fuerint, ut per harum extremitates singulas, ex 17 propositione libri præcedentis, quatuor lineæ circulū contingentes ducantur, necesse erit. Et quoniam hæc si in utramque partē continuatæ fuerint, semper duæ & duæ, ex propositione 18 tertij, & cōmuni quadam notitia, concurrunt, continguntur itaque omnes, in utramque etiā partem, donec una cū altera concurrat, & propositioni satisfactum erit, cū uidelicet sub illis ipsis lineis huiusmodi quadratum cōtineatur, quod sic patet. Primò quòd circūscriptio debita facta sit, ex definitione ha-



betur. Quòd insuper sit quadratū, id sic colligetur. Quoniam enim contingentium quælibet duæ oppositæ, suæ diametro, ex secunda parte propositionis 28 primi, ipsæ deinde inter se ex propositione 30 eiusdem, æquedistantes sunt: quod sub his contingentibus, quæque etiam sub contingentium unaquaque & diametro sua parallela cōprehenduntur, rectilinea, singula, ex definitione, parallelogramma erūt. Hæc autem quoniam ex propositione 34 primi, latera opposita æqualia habent: contingentes oppositæ primò, ex communi illa notitia, Quæ uni æqualia &c. omnes

deinde inter se, propter diametrorum æqualitatē, æquales erunt. Aequilaterum igitur est circa circulum descriptum parallelogramum. Quòd uerò sit etiam rectorum angulorum, cum qui ad centrum ponuntur anguli, singuli, ex structura, recti sint, cumque etiam, Omnis parallelogrammi latera & anguli oppositi, ut sæpe dictum, æquales sint, patet etiam illud. Factū est ergo quod fieri oportuit, descriptum nimirum circa datum circulum quadratum, quod erat propositum.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Η.


Εἰς ἑνὸς τετράγωνου, κύκλον ἐγγράψαι.

PROPOSITIO VIII.

In dato quadrato, circulum describere.

Sit datum quadratum, atque propositum, circulū in eo describere. Duo igitur circa unum in quadrato angulum latera, per propositionē 10 primi, bifariam diuidantur, à punctis deinde illis medijs, perpendiculares, ad latera usque opposita peruenientes, lineæ educantur: & erit punctum illud, quod est communis harum duarum perpendicularium sectio, centrum futuri circuli. Nam cum hæc ductæ ex suis punctis perpendiculariter egrediantur: utraq; ex posteriore parte propositionis 28 primi, suis collateralibus quadrati lateribus æquedistans erit. Omnes igitur figuræ rectilineæ, quotcunque in hac dispositione colligi possunt, parallelogramma, horum

horum deinde latera opposita, ex propositione 34 primi, æqualia inter se erūt. Sed cum linearum æqualium, æquales sint etiam medietates, ut ratione colligitur: in-



fertur tandem ex hac communi noticia, Eidem æqualia, &c. & illas quatuor in medio líneas inter se æquales esse. Punctum igitur, communis nimirum perpendicularium sectio, ut dictum est, ex propositione 9 tertij; centrum est circuli. Quare eo secundum unius harum æqualium quantitatem descripto, cum is propter linearum æqualitatem, per aliarum etiam extremitates transeat, hæ uerò extremitates singulæ in lateribus quadrati existāt, cum per propositionem 16 tertij intra circulum non cadant, per corollarium deinde eiusdem ipsum circulum tangant: ex definitione tandem, qua dicitur,

Circulus similiter in figura describi, &c. circulum in dato quadrato descriptum esse concluditur, quod fieri oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ.

Θ.


πὸ τοῦ ἑνὸς τετραγώνου, κύκλον περιγράψαι.

PROPOSITIO

IX.

Circa datum quadratum, circulum describere.

Sit datum quadratum, atq; propositum, circulum circa ipsum describere. Ducantur in quadrato duæ diametri, quæ sese mutuò secant: & erit communis illarum sectio, locus, unde circulus, ad circumscribendum quadratum propositum conueniens, describi debet. Quoniam enim sumptis duobus triangulis, quæ nimirum sunt quadrati medietates, cum anguli partiales singuli, per propositio. 8. primi, inter se æquales sint, atq; sic uterq; semper medietas anguli recti, cumq; etiam ipsi re-



cti inter se æquales: & horum rectorum medietates singulæ, partiales nimirum anguli omnes, inter se æquales erūt. Quare per propositionem 6 primi quater sumptam, & horum partialium angulorum latera, quatuor nimirum partiales diametrorum lineæ, inter se æqualia erunt. Punctum igitur illud, centrū est circuli. Potest etiā loco octauæ, propositio quinta usurpari, hoc modo. Cū quadratū per diametros in triangula quatuor resolutū sit, hæc uerò triangula omnia, æqualia crura habeant, latera nimirum quadrati propositi: infertur per proposit. 5 primi, & ipsos ad basim angulos inter se æquales esse.

quilibet igitur illorum, per propositionem 32 eiusdem primi, medietas est recti. Tertius enim angulus, ratione quadrati, per se unus rectus est. Quia autem omnes recti anguli, ex communi quadam noticia, inter se æquales sunt: sequitur, quòd etiam inter se æquales sint omnes partiales (de quibus facta est mentio) anguli. Igitur & diametrorum partes, per propositionem 6 primi, inter se æquales. unde tandem, id commune punctum, per 9 tertij, centrum circuli erit: quo nunc secundum quantitatem unius æqualium linearum descripto, cum is per reliquarum etiam æqualium extremitates transeat, propositiōni tandem satisfactum erit, circa datum nimirum quadratum circulus descriptus, quod fecisse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Ἴσοσκελὲς τρίγωνον συστήσασθαι, ἔχον ἑκατόβαν τὴν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν διπλασίονα τῇ λοιπῆς.

PROPOSITIO X.

Duum equalium laterum triangulum constituere, habens utrunque eorum, qui ad basim sunt, angulorum, duplum reliqui.

Sententia est propositionis, triangulū isosceles, cuius uterque angulorū qui ab æqualibus lateribus subtenduntur, ad tertium reliquum duplus sit, describere. Ducatur igitur linea recta, longa uel breuis, ad placitum. hac recta deinde, ut quidem habet propositio secundæ undecimæ, in duas portiones diuisa, ex puncto hoc, quod est communis terminus diuisæ & portiones longioris, secundum interuallum rectæ datæ circulus describatur. Hoc factō, longiori portioni, quæ nimirum est diametro circuli breuior, æqualis recta in circulo, per propositionem primam huius, coaptetur. Quod si tandem extremitas huius, longiori portioni æqualis, altera cum centro & diuisiōnis puncto duabus rectis lineis copuletur: propositioni satisfactum erit. Nam id demū triangulum, cuius duo latera à centro usque ad circumferentiam continuata sunt, erit quod quærebatur, cuius quidem demonstratio ut sequitur. Circa triangulū partiale, cuius unus angulus ad cētrum ponitur, per propositionē 5 huius, circulus describatur. Et quoniā tam quadrato longioris portiones ex structura, uel propositione 11 secundæ, quā quadrato rectæ in circulo coaptatæ, huic longiori portioni equali, rectangulum sub prioris circuli semidiametro & breuiori eius portione compræhensum, equale est: longiori æqualis posita recta linea, per propositionem 37 tertij, minorem circulum contingens erit. Et rursus quoniā hæc recta circulum minorem contingit, à puncto item contactus alia quædā, eundem circulum secās, ducta est, illa nimirum quæ in diametro ad punctū diuisiōnis terminatur: angulus igitur, quæ hæc duæ rectæ continent, partialis, angulo alterni segmenti, qui ad centrum ponitur, ex propositione 32 tertij equalis erit. unde totalis postea, si partialis alter ex æquo his æqualibus adiciatur, duobus æqualis. Sed quia duobus his, ut trianguli huius partialis internis, angulus ille, qui in alio partiali ad diuisiōnis punctum ponitur, externus, ex propositione 32 primæ, est æqualis: & eidē externo ille totalis, ex communi quadam notitia, æqualis erit. Et quia etiam totalis, illi qui sub diametro atque circulum minorem tangente re-



ctā linea continetur, ex definitione circuli & priori parte propositionis quintæ primæ, æqualis est: & qui sub istis lineis continetur angulus, dicto externo æqualis erit. Tres igitur anguli inter se æquales, unum etiam triangulum partiale, cum duo ex æqualibus angulis in eo sint positi, ex propositione 6 primæ, Isosceles, hoc est duum æqualium laterum erit. Sed quia uni eorum, coaptatæ scilicet in circulo lineæ, æqualis est, ex structura, longior diuisæ semidiametri portio, & alteri lateri hæc eadem longior portio æqualis erit: quare Isosceles, triangulum etiam partiale alterum. Hoc autem quia, ex propositione 5 primæ, duos ad basim angulos inter se æquales habet, & quia etiam illis æqualibus, angulus huius Isoscelis externus æqualis est, unde sic ad utrunque, ac per consequens, ad eum qui ad centrum ponitur duplus: & illorum qui huic externo æquales sunt, uterque

ad eundem ad centrum positum angulum, duplus erit, et sunt etiam in hoc ipso, in quo ille scilicet, totali triangulo. Triangulum igitur Ifosceles, cuius uterq; eorum qui basim sunt angulorum, ad reliquum tertium duplus sit, constitutum est, quod quidem fecisse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΑ.

Εἰς ἄνθρωπον κύκλου, πεντάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον περιγράψαι.

PROPOSITIO XI.

In dato circulo, pentagonū & æquilaterū & æquiangulū describere.

Sit datus circulus, atque propositum, pentagonum in eo æquilaterum & equi angulum describere. Circulo igitur dato, primò Ifosceles triangulum, cuius uterq; æqualium angulorum ad tertium duplus sit, per propositionem præcedentem 10 formari, huic deinde æquiangulum triāgulum in dato circulo, per propositionem 2 huius describi, debet. Postea utroq; eorum, qui ad tertium dupli sunt, angulorum, recta quadam linea, per prop. 9 primi, bifariam diuiso, quinque iam anguli inter se



æquales erunt. Quòd si tandem rectæ hæ, per quas ad tertium dupli anguli bifariam diuisi sunt, ad circumferentiā usq; continuatæ fuerint, cum hi quinque in una sint circumferentiā anguli, atq; æquales etiam inter se: & eorū arcus à quibus subtenduntur, per prop. 26 tertij: horū deinde arcuum rectæ lineæ, per 29 eiusdem, æquales erunt, quare pentagonū æquilaterū. Quod uerò sit etiam æquiangulum, id sic patet. Quoniā enim singuli huius pentagoni arcus, ut quidē demonstratū est, inter se sunt æquales, sumptis duob. quibus uidelicet nullus est cōmunis terminus, si utriq; eorū duo hi, quos interceptos habent, arcus additi fuerint: & collecti sic arcus, ex communi quadam notitiā, inter se æquales erunt, Quare etiam æquales, ex propositione 27 tertij, qui ab his æqualibus arcubus subtenduntur, anguli. Constat igitur sic æqualitas de angulis duobus. Quia autem sicut de duobus, ita etiam de omnibus, hoc nimirum processu toties, quot fuerint anguli, minus uno, usurpato, constare manifestum est: pentagonum igitur hoc æquiangulum esse concluditur, & quia etiam æquilaterum. In dato igitur circulo æquilaterum & æquiangulum pentagonum descriptum est, quod fecisse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΒ.


Πὸς ἄνθρωπον κύκλου, πεντάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον περιγράψαι.

PROPOSITIO XII.

Circa datum circulum, pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

Sit

Sit datus circulus, atq; propositum, pentagonum circa eum æquilaterum & æquiangulum describere. Diuidatur igitur circuli dati circumferentia, per præcedentem, in quinque partes æquales, à punctis deinde diuisionum singulis per propositionem 17 tertij lineæ, ipsum circulum contingentes ducantur, hæ tandem, si in utranq; partem, donec altera alteri occurrat, continuatae fuerint: propositioni satisfactum erit. Nam illæ ipsæ circulum contingentes rectæ lineæ pentagonum, quale propositio hæc requirit, comprehendunt, quod sic demonstrari potest. Primò à tribus quibuslibet, proximis tamen inter se, contactuum punctis demittantur ad circuli centrum tres rectæ lineæ. Et quoniam hæ singulæ ex propositione 13 tertij, ad suas contingentes perpendiculares sunt: omnes igitur illi qui sic fiunt anguli, re-



cti erunt: quod est obseruandū. Ducantur porrò à duobus pentagoni angulis ijs, qui ab his tribus lineis continentur, aliæ duæ ad centrum rectæ lineæ. Describuntur autem sic quatuor triangula, quorum quæq; duo extrema, per penultimam primi, laterum æqualium: per propositionē deinde 8 & 4 eiusdem, æqualium angulorum esse demōstrantur. Et quia sic est: tam illi igitur, qui ad cētrum sub perpendicularib. cōtinentur anguli, ad suos partiales, quàm etiā ipsius pentagoni anguli ad suos, dupli erunt. Et rursus quoniam ad cētrum anguli super æquales, circum-


ferentias deducuntur, cum ijsdem anguli, ex propositione 27 tertij, inter se æquales sint: & illorum dimidij omnes, quemadmodum & ipsi toti inter se æquales erunt. Et quia iam sunt duo triangula, quorū nimirum latus quod habent commune, perpendicularis linea est, quæ cū duos angulos duobus angulis æquales habeant, utranq; utriq;, unum item latus uni lateri æquale: & reliqua latera reliquis lateribus, atque etiam reliquum angulū reliquo angulo, per propositionem 26 primi æqualia habebunt. Circulum igitur contingentium linearum unaquæq; per suam perpendicularem bifariam diuisa est, quare & ipsæ ad utranq; partem, tanquam ad suas medietates, duplæ. Partes uero cum sint inter se æquales, ut iam dudum demonstratum est: & ipsas totas contingentes rectas lineas inter se æquales esse conueniet. Pentagonum igitur æquilaterum. Quod uerò sit etiam æquiangulum, cum ipsius pentagoni anguli æqualium sint angulorum dupli: patet & illud. Circa datum igitur circulum, æquilaterum & æquiangulum pentagonum descriptum est, quod fecisse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

II.

Εἰς τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλον ἐγγράψαι.

PROPOSITIO XIII.




In dato pentagono, quod est æquilaterum & æquiangulum, circulum describere.

Sit datum pentagonum, æquilaterum existens & æquiangulum, atq; propositum, circulum in eo describere. Pentagoni igitur dati duo quilibet proximi anguli, duabus rectis, per propositionem 9 primi, bifariam diuidantur: & erit punctum concursus harum rectarum

Ee 2 in pen-

in pentagono: centrum circuli qui petitur, cuius hæc sit demonstratio. Ducantur à tribus indiuisis pentagoni angulis, ad punctum illud concursus, tres rectæ lineæ. Et quoniam duo ipsius pentagoni anguli, suis rectis ductis bifariam diuisi sunt: quæq; duo circa illos diuisos posita triangula, inter se æqualia esse, per 4 primi, demonstrantur. Quia uerò ad unum angulum in utroq; triangulo, angulus suus totalis duplus est: propter æqualitatem, totalium quidem ex hypothesi, ac partialium deinde, ut modo ostensum est, inter se: & in utroq; triangulo angulus totalis ad suum partialem: singuli item totales, hac operationem, ad singulos suos partiales angulos. Dupli erunt. Quare unumquemq; sic bifariam diuisum esse, manifestum erit.



Porro pro ulteriori demonstratione, demittantur à puncto concursus ad singula pentagoni latera perpendicularares. Hæc autem quoniam facili opera per propositionem 26 primi, æquales inter se esse demonstrantur: punctum igitur illud concursus, ut dictum est, ex propositione 9 tertij, centrum circuli erit. Eo igitur nunc secundum unius, harum æqualium perpendicularium interuallum, descripto, cum is, propter æqualitatem, per singularum extrema puncta transeat unumquodq; insuper pentagoni latus, ex priore parte

corollarij prop. 16 tertij, circulum tangat (alias enim si scilicet unum ex his secaretur, circulum contingens in ipsum cadere contra allegatam propositionem conuinceretur) propositioni ut oportuit satisfactum erit. In pentagono nimirum æquilatere & æquiangolo circulus descriptus est, quod fieri oportuit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ.

πὸ τοῦ ἑνὸς ἑνὸς πεντάγωνου, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλον πᾶσι γράψαι.

PROPOSITIO XIII.

Circa datum pentagonum, quod est æquilaterum & æquiangulum, circulum describere.

Sit datum pentagonum quale requiritur, atq; propositum, circulum circa ipsum describere. Diuidantur, ut in præcedenti factum est, duo inter se proximi in pentagono anguli, per propositionem 9 primi, duabus rectis bifariam: & erit punctum concursus harum rectarum, centrum futuri circuli qui hoc datum pentagonum circumscribet, id quod ex propositione 4, toties quoties opus fuerit eam repetendo, atq; ex nona deinde tertij, hoc modo demonstrabitur. Ducantur à tribus indiuisis pentagoni angulis, ad punctum illud concursus tres rectæ lineæ. Et quoniam in



pentagonum

pentagono duo anguli, ex structura, bifariam diuisi sunt, cum pentagonum sit ex hypothesi æquiangulum, ubi bis aut ter duo triangula, quorum unum quidem unam, alterũ uerò alteram bifariam diuisi anguli medietatem sibi uendicat, sumpta fuerint, & reliqui tres pentagoni anguli ex propositione 4 primi, bifariam diuisi erunt. Quare, ut ipsi totales, ex hypothesi, ita nunc ex demonstratione, per allegatam quartam sumpta, partiales anguli omnes, ductæ insuper à centro hoc ad angulos pentagoni rectæ lineæ, inter se æquales erunt. Quoniam autem hæ rectæ plures quàm duæ sunt, circuli igitur per harum æqualium extremitates, ut quæ sunt in pentagoni angulis, transeuntis centrum, per propositionem 9 tertij, hoc punctum erit. Eo igitur inde descripto, propositioni tandem satisfactum erit, circa pentagonum uidelicet, æquilaterum & æquiangulum, circulus descriptus. quod fecisse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ.

ΙΕ.


Εἰς τὸ δοθέντα κύκλον, ἐξ ἁγώνου ἰσοπλευροῦ τε καὶ ἰσογώνου ἐγγράψαι.

PROPOSITIO

XV.

Indato circulo, hexagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

Sit datus circulus, atq; propositum, hexagonum in eo æquilaterum & æquiangulum describere. Circulo igitur dato, diametro etiam in eo ducta, alterutra eius extremitate loco centri sumpta, alius ad prioris dati quantitatem circulus describatur, atq; ubi hi duo circuli sese mutuo secant, ab illis sectionum punctis per centrum circuli prioris, usq; ad eius circumferentiam, aliæ duæ rectæ extendantur. Erunt au-



tem sic in circulo dato puncta sex, quæ tandem sex etiam rectis lineis continuata suis quodque punctis proximis, confectum erit negotium. Quoniam enim cum à centris circulorum, tanquam à medijs punctis, ad circumferentias deductæ rectæ lineæ, ex definitione, inter se sunt æquales: utrunq; eorum, quæ in portione circulorum communi descripta sunt, triangulorum, ex hac circuli de-

finitione bis usurpata, illa deinde communi noticia, Eidem æqualia, &c. æquilaterum, atq; mox deinde etiam, per priorẽ partem propositionis quintę primi, æquiangulum erit. Quoniam autem interni tres anguli omnis trianguli, ex corollario propositionis 32 primi, duobus rectis sunt æquales: unusquisq; horum duorum triangulorum angulus unum duorum rectorum tertium erit, duo igitur ad centrum prioris uel dati circuli positi anguli, duobus duorum rectorum tertijs sunt æquales. Quia uerò illi duo cum eo quem ex utraq; parte habent ἐφεξῆς, per propositionem 13 primi, duobus rectis angulis sunt æquales: & hunc ἐφεξῆς angulum, cum tres tertiæ unum integrum faciant, unum duorũ rectorum tertium esse necesse est, hi tres igitur anguli inter se æquales erunt. Sed quia his æquales etiam sunt, ex propositione 15 primi, anguli quos singuli ad uerticem habent: sex igitur ad centrum deducti anguli inter se æquales erunt. quare & illorum arcus à quibus subtenduntur ex propositione 26 tertij, & arcum deinde rectæ lineæ, ex 29 eiusdem, æquales erunt. Hexagonum igitur æquilaterum. Quòd uerò sit etiam æquiangulum, id sic patet. Quoniam enim singulæ huius hexagoni laterum circumferentiæ uel arcus, ut quidem demonstratum est, inter se sunt æquales, sumptis duobus quibus uidelicet nul-



Ius est communis terminus, si utriq; eorum tres illi qui ab his duobus intercipiuntur, additi fuerint: & collecti sic arcus, ex communi quadam noticia, inter se æquales erunt: quare etiam æquales, ex propositione 27 tertij, qui ab his æqualibus arcibus subtenduntur anguli. Constat igitur sic æqualitas de duobus. Quia autem sicut de duobus, ita etiam de omnibus, hoc nimirum processu toties quot fuerint anguli minus uno, usurpato, constare manifestum est: hexagonum igitur hoc æquiangulum esse concluditur, & quia etiam æquilaterum. In dato igitur circulo, æquilaterum & æquiangulum hexagonum descriptum est, quod fecisse oportuit.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Εκ δὲ τούτου φανερὸν, ὅτι τὰ ἑξαγώνια πλῆρὰ ἴση ἔσι τῆ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου. Καὶ ἰὰρ δὲ τῶν α β γ δ ε ζ σημείων ἐφαπτομένης τοῦ κύκλου ἀγώνων· πῶς γράφεται πῶς τὸ κύκλον ἑξαγώνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, ἀπολύτως ἴσιν ὑπὸ τοῦ πενταγώνου εἰρημνῶν. Καὶ ἐπὶ δὲ τῶν ὁμοίων τοῖς ὑπὸ τοῦ πενταγώνου εἰρημνῶν, εἰς τὸ δὲ ἑξάγωνον κύκλον ἐγγράφωμεν. ὅπως εἶδει ποιῆσαι.

COROLLARIUM.

Ex hoc quidem manifestum est. Quod uidelicet hexagoni latus, æquale sit ei, quæ ex centro circuli producit, rectæ lineæ. Et si per sex angularia hexagoni puncta contingentes circulum deduxerimus, quod tum circa circulum, æquiangulum & æquilaterum hexagonum descriptum sit, perinde atq; pentagonum quoq; ut antè dictum est. Insuper in dato hexagono, uel circa datum hexagonum, per ea quæ similiter de pentagono dicta sunt, circulum describemus, quod admonuisse oportuit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΣ.


Εἰς τὸν δὲ ἑξάγωνον κύκλον, πεντακταδεκάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράφωμεν.

PROPOSITIO XVI.

In dato circulo, quindecagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

Sit datus circulus, atq; propositum, quindecagonum in eo, æquilaterū & æquiangulum describere. Circulo igitur dato, primū in eo triangulum æquilaterum, deinde æquilaterum pentagonum, illud quidem ex propositione 2, hoc uerò ex 1 huius

huius describatur. Curetur tamen, ut unus trianguli & unus pentagoni angulus, unum in circumferentia punctum commune sortiantur. Et quoniam, quindecagonum æquilaterum & æquiangulum in circulo dato describere propositum est, cum circumferentia ideo in quindecim partes æquales diuidenda sit, infertur, ut qualium tota circumferentia fuerit æqualium partium quindecim: talium tertiam eius partem, quæ à trianguli latere subtenditur, quinque; quintam uerò, quam pentagoni la-



tus subtendit, tres esse debere. Excessus igitur arcus illius super hunc taliū duarum, qualium tota circumferentia est quindecim, partium erit. Quare eo, per propositionem 30 tertij, bifariam diuiso, quantum dati circuli quindecagoni latus fuerit, alterutra ipsius excessus medietas indicabit. Quo habito, si id quindecies circulo ordine, per primam propositionem huius, coaptatum fuerit, propositioni tandem satisfactum erit, In circulo nimirum, quindecagonum æquilaterum & æquiangulum descriptum. quod fecisse oportuit. Demonstratio neglecta est, cum ex structura hæc clara sit.


APPENDIX.

Porro circulo dato, quomodo circa ipsum quindecagonum æquilaterum & æquiangulum: Insuper, quomodo circa quindecagonum datum, circulus describendus sit, licet illa ab Euclide non tradantur, nemini tamen difficile erit, si modò eorum quæ in hoc libro ad 12 & 13 propositiones de pentagono dicta sunt, meminerit. Atque hæc hactenus de inscriptionibus & circumscriptionibus figurarum inter se, cuius quidem tractatio in hoc quarto libro erat proposita.

FINIS LIBRI QVARTI.

ΣΧΟΛΙΟΝ

Σηκωὸς τῶ ε βιβλίῳ ποδὲ ἀναλογιῶν δελαβεῖν. Κοινὸν γὰρ τὸν ἦ βιβλίον γεμετρίας τὲ καὶ ἀριθμητικῆς, καὶ μουσικῆς, καὶ παύσης ἀπλῶς μαθηματικῆς ὑψηλῆς. Τὰ γὰρ ἐν αὐτῷ ἀκροεικνύμενα οὐ μόνον γεμετρικῶς ἀρμόζει θεωρήμασι, ἀλλὰ καὶ πάσι τοῖς ὑπὸ μαθηματικῶν τεταγμένοις ὡς προείρηται ὑψηλῆς. Οὐ μὲν οὖν σηκωὸς, οὐτῷ. Τὸ δὲ βιβλίον, Εὐδόξου πινὸς εὐρέσιμ ἐῖναι λέγουσι, τὸ Πλάτωνος διδασκαλίου. Ἐπει οὖν σηκωὸς ποδὲ ἀναλογιῶν, ἢ δὲ ἀναλογία λόγων πινῶν οὐκ ἀπαιτῶν γινώσκαι πρότερον τίνος οἱ ἡστυτοὶ λόγοι. Δεῖ γὰρ τὰ ἀπλά πρότερον γινώσκαι τῶ σωθέτων. Ἐὰν γίνουσι πινὰ συγκείμενα πρὸς ἀλληλα, φέρει εἰπεῖν δύο μεγέθη, αὐτὰ μὲν ὄροι καλεῖνται· ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ ἑτέρου ὑπὲρ ἢ ἑτέρου μετὰ σασίς, Διάστημα· ἢ δὲ τὸ ἑτέρου πρὸς ἢ ἑτέρου σύγκεισις, Σχίσις, ἢ ἐκάλεισαν οἱ παλαιοὶ λόγοι. Τὴν δὲ φύσιν τοῦ λόγου πρὸς ἄλλου λόγου, καὶ ὁμοιότητα σύγκεισις, ἢ τοῖς οὐκ ἀπαιτῶν, Ἀναλογίαν προσηγοῦσασιν, ἵνα μὴ ὡς τὸδε ἢ μέγεθος συγκείμεται, ἀλλ' ὡς ὅδε ὁ λόγος πρὸς τὸδε ἢ λόγος. αὐτὴ δὲ ἢ σύγκεισις, Λόγου λέγεται λόγος· οἷον ἢ ἄρ ὡς ἢ δύο εὐθείαι, ὡρ ἢ ἑτέρου πρὸς τὴν λοιπὴν διπλασίονα λόγου ἔχει· ἢ ἀπὸ τῆς ἢ διπλασίονα λόγου ἔχουσης τετράγωνον, τετραπλασίονα λόγου ἔξει πρὸς ἢ ἀπὸ τῆς λοιπῆς τετράγωνον, ἢ ὑπὲρ ἢ μείζων εὐθεῖα πρὸς τὴν εὐθεῖαν. Τὰ γὰρ μήκει διπλασία, δυνάμει τετραπλασία. Οὐ τίνουσι λόγος τῶν τετραγώνων, τετραπλασίονα ὡρ διπλασίονα οὐτῷ τοῦ λόγου τῶν εὐθειῶν διπλασίονα ὅστι· Καλεῖται δὲ ὅτι ὁ λόγου λόγος. Ἀλλ' εἰν αὐτῷ τῷ ὑπὸ ἢ πόσον. διπλοσ γὰρ ὁ λόγος, εἰ μὲν ἢ ἀξία, ὁ δὲ ἢ ποσῶ. καὶ τὸ μὲν ἢ ἀξία ἢ ὅτι ὅστι εἶδῷ



πρὸς τὴν ἢ ὅσον χρεῖται, ἢ δὲ κατὰ ἢ ποσὸν εἶδῷ ὅστι ε. Οὐ μὲν γὰρ ὅστι Πολυπλασίονα· ὡς τὸ γ ὅ σ. ὁ δὲ Ἐπιμόριον· ὡς τὸ γ ὅ δ. ὁ δὲ Ἐπιμόριον· ὡς τὸ γ ὅ ε. Ἐοῦσι μὲν Ἀπλοῖ, ὅτι τῶν δὲ ἑπὶ ἀπλοῦσῶν, ὁ πολυπλασίονα. Ἐτόροι δὲ ἐν τῇ τέτρω σωθέσεως γίνονται β, ὅτι Πολυπλασιῶν μέρει· ὡς τὸ γ ὅ ζ. καὶ ὁ Πολυπλασιῶν ἐπιμόριον· ὡς τὸ γ ὅ η.

Ἐπὶ λόγοι δὲ εἰσι οἱ ἐλάσσονες τῶν μείζονων, Ἐπιπλασιῶν, Ἐπιμοῖοι, Ἐπιμοῖοι, καὶ ἐξῆς ὁμοίως. Ἰσῶν δὲ, ὡς ἢ βιβλίον διχῶ διήρηται, καὶ ποδὲ ἔχει τὰ μὲν πρῶτα τὴν τῶ ἀπλοῦσῶν διδασκαλίαν, ἢ τῶν τῶν πολυπλασιῶν, τὰ δὲ δεύτερα καθολικώτερα ποδὲ πάντων τῶν λόγων. Δεῖ γὰρ ὑπὲρ πάντων, ὡς εἶρηται, πρῶτα τῶν τῶ ἀπλοῦσῶν ἢ κείσθαι διδασκαλίαν. Τῶν δὲ τῶ τῶ βιβλίου διαίρεσεως τῶν τῶ, καὶ ἢ τῶ ὅρων γίνονται τῶ διαίρεσις, οἱ μὲν γὰρ πρότεροι ποδὲ ὑψηλῶν, ἢ πολυπλασιῶν· οἱ δὲ ἐξῆς καθολικώτεροι ποδὲ πάντων τῶν λόγων.

BREVIS INTERPRETATIO

HVIVS QVINTI LIBRI, INCERTI AVTORIS.

Scopus huius quinti libri est is, ut tractetur de proportionibus. Pertinet enim liber iste & ad geometriam, ac arithmetica & musicam, omnesque alias quae simpliciter mathematicae disciplinae uocantur. Etenim quae in ipso traduntur, non geometricis solum contemplationibus conueniunt, illisque propriae existunt, sed & omnibus, quae sub mathematica ipsa comprehenduntur, & ut prius dixi, disciplinis. Sit igitur hic libri scopus. Caeterum librum ipsum cuiusdam Eudoxi inuentum esse asserunt, discipuli Platonis. Cum igitur sit scopus de proportionibus, proportio autem sit rationum quarundam habitudo: quae sint illae rationes, prius cognoscendum erit necessario. Oportet enim simplicium cognitionem praecedere, quam de compositis dicatur aliquid. Itaque si quaedam inter se comparentur (sumamus autem duas magnitudines) illae quidem Termini appellabuntur, transmutatio autem siue transitus ab uno in alterum, Interuallum dicitur. Comparatio uero alterius ad alterum, Habitudo uocatur, quam ueteres Rationem nominauerunt. Collationem uero huiusmodi rationis ad aliam rationem, quae fit similitudine quadam, aut eiusmodi habitudinem, appellauerunt Proportionem, non perinde quasi magnitudo illa comparet, sed ut illa ratio ad illam rationem: quae deinde collatio, Rationis ratio dicitur, ut si duae fuerint rectae lineae, quarum una alterius respectu duplam habeat rationem: quadratum quod ab ea linea est descriptum, quae duplam rationem habet, quadruplam quoque rationem habebit, respectu uidelicet eius quadrati, quod ab altera est descriptum, siquidem collatio habeat longioris lineae ad breuiorem rectam. Quae enim longitudo dupla sunt: ea potentia quadrupla existunt. Ratio igitur quadratorum quadrupla existens, duplae rationis existentium rectarum dupla est. Talis autem uocatur Rationis ratio. Sed fuerit illa in quantitate, duplex enim est ratio, una in dignitate, altera uero quantitatis, ac dignioris quidem nulla species uidetur esse ad praesentem usum accommodata: huius uero rationis, quae secundum quantitatem dicitur, species sunt quinque. Alia enim ratio Multiplex appellatur: cuiusmodi est 6 ad 3: alia Superparticularis, ut 4 ad 3: alia uero Superpartiens, ut 5 ad 3. atque haec quidem sunt Simples, quarum tamen omnium rationum magis simplex est Multiplex. Reliquae uero duae species ex harum nascuntur compositione, Multiplex superparticularis scilicet, ut 7 ad 3: & Multiplex superpartiens, ut 8 ad 3.

Subrationes autem uocantur, cum minores maioribus conferuntur: Submultiplices, Subsuperparticulares, Subsuperpartientes, & sic deinceps. Sciendum autem, diuidi hunc librum in duas partes, et initio quidem simplicium continet doctrinam, hoc est, eam quae de multiplicibus tractat, deinde uniuersaliora de omnibus rationibus traduntur. Oportet enim, ut iam ostensum est, in omni re simplicium doctrinam praecedere. Si quis autem consideret modum diuisionis, terminorum etiam diuisio facta erit. Nam priores quidem, scilicet termini, Multiplices: qui autem deinceps sequuntur uniuersaliores, de omnibus rationibus.

EΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

EVCLIDIS ELEMENTORVM GEOMETRICORVM liber quintus.



St hic quintus liber Euclidis πρὸς τὸ λόγος καὶ ἰσότητος ἀναλογίας, hoc est, de ratione & proportione. Quæ igitur ad hanc tractationem requiruntur uocabula, primò, ut in præcedentibus etiam factum est, ordine definit.

ΟΡΟΙ.

Μέρος δὲ ἐστὶ μέγεθος μέγιστος, ἢ ἔλασσον τοῦ μείζονος, ὅταν μετρηθῆ ἢ μείζον.

DEFINITIONES.

1 Pars est quantitas quantitatis, minor maioris, quando minor metitur maiorem.

μέγεθος) Licet hac uoce continua tantum quantitas, sub qua nimirum lineæ, superficies & corpora comprehensa sunt, intelligatur, unde sic quidem magnitudinis significationem habet: tamen quia omnia, quæ in hoc libro, tam per definitiones quam etiam propositiones, ab authore nobis præscribuntur, per numeros æque ut per lineas ostendi possunt: non magnitudinis, sed quantitatis uoce, sub qua, tanquam uocabulo generali, numeri etiam comprehenduntur, in uersione usi sumus, id quod Lector æquo animo ferat, præsertim cū in hoc auctori nihil detrahatur, cum quæ etiam singula numeris declarauerimus.

καταμετρεῖν) autem est metiri, atque hoc loco dividere aliquid integrè, & quasi ad libellam, ut dicitur, sic quòd nō maneat, ultima subtractione facta, aliquid minore minus, sed nihil omnino, ad mensurandum amplius relinquatur.

Πολλαπλασιάζον δὲ ἢ μείζον τοῦ ἐλασσονος, ὅταν μετρηθῆται ἑπὶ τοῦ ἐλάττου.

2 Multiplex est, quantitas quantitatis, maior minoris, quando maior mensuratur à minore.

Harum definitionum de parte & multiplici exempla sunt.



Exempla per numeros exposita.


3 respectu scilicet { 6, 9, 12, 15, 21, est pars, Contra uero { 6, 9, 12, 15, 21 respectu 3, multiplex

Λόγος

Λόγος ὄσι δύο μεγέθῶν ὁμογενῶν, ἢ κατὰ πληρότητα πρὸς ἄλληλα πρὸς ἀξίους.

3 Ratio, est duarum quantitatum eiusdem generis, aliquatenus inter se quædam habitudo.

Duæ requiruntur, ut ex definitione colligitur, ad rationem cōstituendam, quantitates, atq; ea deinde inter illas habitudo, quanta nimirū una respectu alterius fuerit. hoc inquam, uel illa consideratio, siue respectus, ratio dicitur. Exempla sunt,



Exempla per numeros exposita.

$$25 \text{ ad } \begin{cases} 25 \\ 5 \\ 24, \\ 17 \\ 3 \\ 7 \end{cases} \text{ uel contra } \begin{cases} 25 \\ 5 \\ 24 \text{ ad } 25, \\ 17 \\ 3 \\ 7 \end{cases} \text{ est ratio,}$$

hoc est, quidam respectus, ut ratione primi exempli in utroq; ordine, numeri sese mutuo æqualiter respiciunt. Ratione secundi, in priori quidem, est prior quantitas numerus posterioris quincuplus, in posteriori uerò subquincuplus, & sic ordine deinceps. Illa autem consideratio quantitatum inter se, unius ad alteram, dicitur ratio. Et sicut lineæ ac numeri, ita quoq; superficies, corpora, ac quæq; res aliæ inter se conferri possunt.

Λόγος ἔχει πρὸς ἄλληλα μέγεθῶν λέγεται, ἂν δύο αὐτῶν πολλαπλασιαζόμενα ἀλλήλων ἰσοδρέχων.

4 Rationem habere inter se quantitates dicuntur, quæ possunt multiplicatæ inuicem excedere.

Exempla sunt.


27	18	12	12	18	27
9	6	4	4	6	9
36	36	36	27	30	22
9	9	9	9	5	11

Sic per lineas exempla præscribi possunt.

Ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μέγεθῶν λέγεται εἶναι, πρῶτον πρὸς δεύτερον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, ὅταν τὰ τῶν πρῶτου καὶ τρίτου ἰσάκεις πολλαπλάσια τῶν τῶν δὲ δεύτερου καὶ τετάρτου ἰσάκεις πολλαπλάσιον καὶ ὅποιον ἂν πολλαπλασιασμὸν ἐκάτερον ἰσάκεις, ἢ ἅμα ἐλείπων, ἢ ἅμα ἴσα ἢ, ἢ ἅμα ἰσοδρέχων, ληφθέντα κατὰ ἄλληλα.

5 In eadem ratione quantitates dicuntur esse, prima ad secundam, & tertia ad quartam, quando primæ & tertiæ æquæ multiplicia à secundæ & quartæ æquæ multiplicibus, iuxta quamuis multiplicationem utrun-

que ab utroqꝫ, uel unà deficiunt, uel unà æqualia sunt, uel unà excedunt, sumpta inter se.



Dicit definitio. Quarum rationum antecedentes uno aliquo numero, uno item, siue illo priori uel quouis numero alio, & consequentes quantitates multiplicatæ fuerint, multiplex in super primæ simili modo à multiplici secundæ defecerit, ei æquale fuerit, uel idem excesserit. sicut multiplex tertiæ deficit, æquale est, uel excendit multiplex quantitatæ quartæ: in eadem ratione dicuntur esse hæ quantitates. Ostendit autem hoc in quatuor quantitatibus autor, & dicit, In eadem ratione quantitates, &c.

Exempla in numeris sunt.

Multi.	{	24	18	12	9	excessus
		24	24	12	12	æqualitas
		16	18	8	9	defectus.
Quantita.	8	6	4	3		
		prima	secun.	tertia	quar.°	

Τὰ δὲ ἄρ' αὐτῶν ἔχοντα μέγθη λόγον, ἀνάλογον καλεῖσθω.


6 Eandem autem habentes rationem quantitates, proportionales uocentur.

Huius definitionis exempla sunt, quæ ex definitionibus præcedentibus, quarta & quinta, colliguntur.

Ὅταν δὲ ἴσάναις πολλαπλασίωμ, ἢ μὲν ἴσ' πρῶτον πολλαπλασίωμ ἕως δὲ χη ἴσ' ἴσ' δούτορον πολλαπλασίωμ, ἢ δὲ ἴσ' τρίτον πολλαπλασίωμ μὴ ἕως δὲ χη ἴσ' ἴσ' τετάρτον πολλαπλασίωμ: τότε ἢ πρῶτον πρὸς ἢ δούτορον μείζονα λόγον ἔχει λέγεται, ἢ πρὸς ἢ τρίτον πρὸς ἢ τετάρτον.

7 Quando uerò æquè multiplicium, multiplex primæ excesserit multiplex secundæ, ipsum uerò multiplex tertiæ non excesserit multiplex quartæ: tunc prima ad secundam maiorem quàm tertia ad quantitatem quartam rationem habere dicitur.

Cohæret



Cohæret hæc definitio cum præcedentibus duabus, quinta & sexta. Quando uerò dicit, æquè multiplicium, tum primæ & tertiæ, secundæ item & quartæ quantitatum, intelligendum est.

Exempla in numeris sunt.

16	8	18	18	24	20	27	45
8	4	9	9	8	4	9	9

Aliud exemplum.

16	20	18	45
8	4	9	9

Sunt hic tria exempla, quorum primum & secundum patent. In tertio autem, licet multiplex primæ in nullo multiplex secundæ excedat, cum tamen id minus à multiplici secundæ, quàm tertiæ multiplex à multiplice quantitatis quartæ deficiat: erit adhuc primæ ad secundam maior, quàm tertiæ ad quartam quantitatem ratio.

Alia exempla.

22	12	14	18	21	18	15	24
11 ad 2	&	7 ad 3		Item 7 ad 3	&	5 ad 4	

APPENDIX.

Cum quis uelit inter duas rationes iudicare, utra maior sit, commodissimè per hanc definitionem id expedire poterit.

Αναλογία δὲ ἔστιν ἡ τῶν λόγων ὁμοιότης.

8 Proportio uerò est, rationum similitudo.

ADMONITIO.

Similes siue eadem, & dissimiles sunt rationes, quantitates uerò æquales & inæquales inter se, quod hic annotare libuit.

Αναλογία δὲ ἐν τρισὶν ὀροῖς ἔλαχίστη ἔστιν.

9 Proportio autem in tribus terminis minima est.

Hoc est, ad constituendam proportionem requiruntur ad minus tres quantitates. Cum enim proportio sit rationum similitudo, & non rationis: singulæ uerò rationes duabus quantitatibus, antecedente scilicet & consequente, constant: sequitur proportionem, duabus rationibus præscriptam, quatuor terminos requirere. Sed quia non rarò solet contingere, ut unius rationis unus terminus bis repetatur, semel quidem ut sit consequens prioris, postea uerò ut sit posterioris rationis antecedens, constat, tres terminos, ut proportio constituatur, aliquando sufficere, pauciores uerò nunquam.

Exempla sunt.

9 6 4 16 12 9 16 20 25

Alia.

9 ad 4 ut 27 ad 12 32 ad 24 ut 12 ad 9

Similiter alia.

27 18 ut 12 8 64 80 ut 100 125

Adhuc aliud.

12 ad 15 ut 8 ad 10, atq; ut 4 ad 5

Cæterum, maximam proportionem quot termini constituent, hoc non definit Autor, cum ea semper quoad quis uoluerit, ut habet propositio in octauo secunda, per unum terminum augeri possit.


Όταν δὲ τρία μέγθη ἀνάλογον ἢ ἢ ἢ πρῶτον πρὸς ἢ τρίτον διπλασίονα λόγον ἔχει λέγεται, ἢ πρὸς ἢ δεύτερον.

10 Quando uerò tres quantitates proportionales fuerint: prima ad tertiam duplicatam rationem habere dicitur, quàm ad secundam.

Ανάλογον ἢ, hoc est, continuè unam & eandem rationem habuerint.

Exempla sunt.

Denominatio uel ratio primæ ad secun.



Denominatio uel ratio primæ ad tertiam.


Est autem respectu prioris duplicata, hoc est bis sumpta.

Exempla huius definitionis alia, sunt numeri uel quantitates, quas examinat definitio præcedens quarta.

Όταν δὲ τέσσαρα μέγθη ἀνάλογον ἢ ἢ ἢ πρῶτον πρὸς ἢ τέταρτον τριπλασίονα λόγον ἔχει λέγεται, ἢ πρὸς τὸ δεύτερον. Καὶ αἰεὶ ἐξ ἡς ἐνὶ πλείονι, ἕως αὖ ἢ ἀναλογία ἔπαρχει.

11 Quando autem quatuor quantitates proportionales fuerint: prima ad quartam triplicatam rationem habere dicitur, quàm ad secundam. Et semper ordinatim una plus, prout quidem proportio extensa fuerit.


Ratio primæ ad secun.



Ratio primæ ad quartam.

Est autem respectu primæ collationis triplicata, hoc est, ter sumpta.

Ratio primæ ad secun.




Ratio primæ ad quartam.

Ομόλογα

Ομόλογα μέγθη λέγεται εἶν', τὰ μὲν ἡγόμενα τοῖς ἡγόμενοις, τὰ δὲ ἐπόμενα τοῖς ἐπομένοις.

12 Similis rationis quantitates dicuntur esse, antecedentes quidem antecedentibus, & consequentes consequentibus.

Est hæc definitio modus quidam & canon, per quem, sicuti ex præcedenti quinta, quæ quantitates proportionales sint, cognoscitur, atq; huius sensus talis. Quatuor aut pluribus quantibus, pari numero propositis, quarum semper duæ & duæ inter se conferuntur, si quidem antecedentes illam inter se, quam ipsæ consequentes, eodem ordine sumptæ, rationem habuerint: similis rationis hæ quantitates esse dicuntur.




Quia prima & tertia, hoc est antecedentes, illam quam consequentes, quæ sunt secunda & quarta quantitates, inter se habent rationes: similis igitur rationis prima, secunda, tertia & quarta quantitates erunt. Sic de pluribus idem intelligitur.


Ἐναλλάξ λόγος ὅστις λήψις τῶν ἡγόμενων πρὸς τὸ ἡγόμενον, καὶ τῶν ἐπομένων πρὸς τὸ ἐπόμενον

13 Permutata ratio, est acceptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

Similis rationis quantitatibus positis: erit, ex permutata ratione, antecedens ad antecedentem, hoc est prima ad tertiam, sicut consequens ad consequentem, secunda nimirum ad quantitatem quartam.



Ergo ex permutata ratione, Aliud exemplum in ratione æqualitatis,



ἐκ τῶν ἐναλλάξ λόγων

Est huius, & proximè sequentium quatuor definitionum, generalis hypothe-
sis, ut uidelicet quantitates similis rationis habeant.


Ανάπαλιμ λόγῳ, ὅτι λήψις τοῖ ἐπομηνῶν ὡς ἡ γὰ μὲν, πρὸς τὸ ἡ γ δ μνορ ὡς
ἐπὶ μνορ.

14. Conuersa ratio, est acceptio consequentis tanquam antecedentis, ad
antecedentem tanquam ad consequentem.


Vt si fuerit proportionalium quantitatum prima ad secundam, ex hypothesi,
ut tertia ad quartam: erit contra ex conuersa ratione, secunda ad primam, nimirum
consequens ad antecedentem, sicut quarta ad tertiam, similiter consequens ad an-
tecedentem.

Exemplum est,

geometricum quidem



in numeris uerò



Σύνθεσις λόγῳ, ὅτι λήψις τοῖ ἡ γὰ μὲν καὶ τοῖ ἐπομηνῶν, ὡς ἐνὸς, πρὸς αὐτὸ
τὸ ἐπὶ μνορ.


15. Compositio rationis, est acceptio antecedentis cum consequente,
sicut unius, ad eandem consequentem.

Exemplum est,

geometricum quidem



in numeris uerò,
Ex hypothesi



Διαίρεσις δὲ λόγου, ἐστὶ λήψις τῆς ὑποδοχῆς, ἢ ὑποδέχεται, τὸ ἡγούμενον τῆς ἐπομένης, πρὸς αὐτὸ τὸ ἐπόμενον.

16 Diuisio rationis, est acceptio excessus, quo excedit antecedens ipsam consequentem, ad eandem consequentem quantitatem.

Exemplum est.

Quia 9 ad 6 ut 12 ad 8 ex hypo.
quare 3 ad 6 ut 4 ad 8 ex diuisa ra.

Ἀναστροφὴ λόγου, ἐστὶ λήψις τοῦ ἡγούμενου πρὸς τὴν ὑποδοχὴν, ἢ ὑποδέχεται τὸ ἡγούμενον τοῦ ἐπομένου.

17 Conuersio rationis, est acceptio antecedentis ad excessum, quo excedit antecedens ipsam consequentem quantitatem.

Exemplum est.


Cum ex hypothesis fuerint 9 ad 6 ut 12 ad 8: erunt ex conuersionis ratione 9 ad 3 ut 12 ad 4

SEQVITVR EXEMPLVM GENERALE, QVINQVE præmissas proportionis proprietates declarans.

Quia 15 sunt ad 8 ut 45 ad 24 ex hypothesis,

igitur $\left\{ \begin{array}{l} 15 \\ 8 \\ 23 \\ 7 \\ 15 \end{array} \right.$ erunt ad $\left\{ \begin{array}{l} 45 \\ 15 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \end{array} \right.$ ut $\left\{ \begin{array}{l} 8 \\ 24 \\ 69 \\ 21 \\ 45 \end{array} \right.$ ad $\left\{ \begin{array}{l} 24, \text{ ex permutata ratione} \\ 45, \text{ ex conuersa ratione} \\ 24, \\ 24, \text{ ex rationis} \\ 21, \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{compositione} \\ \text{diuisione} \\ \text{conuersione.} \end{array} \right.$

Δείξου λόγου ἐστὶ, πλείονων ὄντων μεγεθῶν, καὶ ἄλλων αὐτοῖς ἴσων ἢ πληθῶσι δύο λαμβανομένων, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὅταν ἢ, ὡς ἐν τοῖς πρώτοις μεγεθεσι, ἢ πρώτου πρὸς ἢ ἰσότητος, οὕτως ἐν τοῖς δεύτεροις μεγεθεσι, τὸ πρῶτον πρὸς ἢ ἰσότητος. Ἡ ἄλλως λήψις τῆς ἀκέρων, καὶ ὑπεξαίρεσις τῆς μείωσις.



18 Æqua ratio est, pluribus existentibus, quantitibus, & alijs eis æqualibus multitudine, cū duabus sumptis, & in eadem ratione, quando fuerit, sicut in prioribus quantitibus, prima ad ultimam: sic in posterioribus quantitibus, prima ad ultimam. Vel aliter, Æqua ratio, est acceptio extremarum, per subtractionem mediarum.

Τετραγμνή ἀναλογία ἐστὶν, ὅταν ἢ, ὡς ἠγόμενον πρὸς ἐπόμενον, οὕτως ἠγόμενον πρὸς ἑπόμενον, ἢ δὲ καὶ ὡς ἐπόμενον πρὸς ἄλλο τι, οὕτως ἐπόμενον πρὸς ἄλλο τι.

19 Ordinata proportio est, quando fuerit, sicut antecedens ad consequentem sic antecedens ad consequentem, sicut et consequens ad aliud quiddam sic consequens ad aliud.

Vult definitio. Ordinatis tribus quantitibus, & alijs deinde totidem, quando fuerit prima priorum ad suam secundam, sicut prima posteriorum ad secundam, illarum deinde secundam ad tertiam, ut secunda harū ad tertiam, atque sic ordine deinceps, si plures quam tres, ex utraque parte, quantitates fuerint: infertur ut in præcedenti, quod scilicet tandem extremorum utriusque sit æqua ratio,

Exemplum est,

$$4\frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{l} \text{Antecedens} \\ \text{Consequens} \\ \text{Aliud} \end{array} \right. \begin{array}{l} 1\frac{4}{5} \left\{ \begin{array}{l} 9 \\ 5 \\ 2 \end{array} \right. \\ 2\frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{l} 18 \\ 10 \\ 4 \end{array} \right. \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{Antecedens} \\ \text{Consequens} \\ \text{Aliud} \end{array} \right\} 4\frac{1}{2}$$

Potest hæc definitio, atque etiam proximè sequens se extendere, & intelligi de pluribus quantitibus, quemadmodum ipsa præcedens, ut patet.


Ordo		Ordo	
prior	poste.	prior	poste.
27	9	16	64
9	3	8	32
12	4	5	20
24	8	9	36
15	5	3	12

Τετραγμνή δὲ ἀναλογία ἐστὶν, ὅταν τριῶν ὄντων μεγεθῶν, καὶ ἄλλων ἴσων αὐτοῖς τὸ πλῆθος, γίνεται, ὡς μὲν ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσι, ἠγόμενον πρὸς ἐπόμενον, οὕτως ἐν τοῖς δευτέροις μεγέθεσι ἠγόμενον πρὸς ἐπόμενον: ὡς δὲ ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσι, ἐπόμενον πρὸς ἄλλο τι, οὕτως ἐν τοῖς δευτέροις μεγέθεσι ἄλλο τι πρὸς ἠγόμενον.

20 Perturbata uerò proportio est, quando tribus existentibus quantitibus, & alijs eis æqualibus multitudine, fit, sicut quidem in prioribus quantitibus antecedens ad consequentem, sic in posterioribus quantitibus antecedens ad consequentem: sicut autem in prioribus quantitibus, consequens ad aliud quiddam, sic in posterioribus quantitibus, id aliud ad antecedentem.

Exemplum

Exemplum est,



Alia duo exempla

Anteced. 9	9	Quid aliud	Antec. 7	8	Quid aliud
Conseq. 3	24	Antecedens	Conseq. 4	14	Antecedens
Quid aliud 8	8	Consequens	Quid al. 7	8	Consequens

Exemplum pro quinque quantitibus in utroque ordine.

Ordo



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΠΡΩΤΗ. Α.


Εὰν ἢ ὅποσα ἄρ μεγέθη, ὅπσω ἄρ μεγεθῶν ἴσω τὸ πλῆθος, ἢ ἡγεσμένικα ἴσα ἴσάκις πηλαπλάσιον ὁ ἀπλάσιόν ἔστι ἐν τῶν μεγεθῶν ἑνὸς, το αὐταπλάσια ἴσαι καὶ τὰ πάντα τῶν πάντων.

PROPOSITIONES.

PRIMA. I.


Si fuerint quotcunque quantitates, quotcunque quantitarum æqualium numero, singulæ singularum æquè multiples: quàm multiplex est una quantitas unius, tam multiples erunt omnes omnium.

Sint quotcunque quantitates, siue duæ, tres, quatuor aut plures, aliarum totarum æquè multiples, quæq; recto ordine suæ, dico, quàm multiplex est una multiplicium respectu suæ inferioris, tam multiples esse multiples omnes, simul sumptas, omnium inferiorum simul sumptarum. Est huius propositionis demonstratio



G a potiss.

potissimum illa communis noticia, Si æqualibus equalia addantur, &c. Cum enim inferiores æqualiter, ex hypothesi, in suis multiplicibus contineantur: sequitur, ut quot portiones una inferiorum in sua multiplici æquales habuerit, totidem etiam & reliquarum quæq; habeat. Diuisis ergo multiplicibus, unaquaq; scilicet in suas portiones, quot in una earum portiones sunt suæ inferiori uel parti æquales, tot & in unaquaq; alia erunt: atq; insuper quemadmodū primæ portiones multiplicium suis inferiorib. sunt æquales, ita ordine quæq; aliæ. Aequalibus igitur æqualibus additis, erunt multiplicium portiones eiusdem ordinis, primi scilicet secundi uel tertij & reliqui, si tot fuerint, simul sumptæ, ipsis inferiorib. simul sumptis æquales. Quare si primis secundæ multiplicium portiones additæ fuerint, aggregata ad partes



duplicia erunt. Quod si tertiæ his adiectæ fuerint: triplicia. Quia autem, ut ex hypothesi habetur, in una multiplici non plures portiones sunt suæ inferiori æquales, quàm in alia: quoties igitur multiplex una suã inferiorem uel submultiplicem continet, toties & multiplicium aggregatum, id quod ex inferioribus, hoc est multiplicibus, colligitur, continere necesse est, Si fuerint igitur quotcunq; quantitates, quotcunq; quantitatum, &c. quod demonstrasse oportuit.

Sequitur exemplum pro quatuor.

99

Multipli.	24	18	21	36	superiores
	8 8 8.	6 6 6.	7 7 7.	12 12 12	
Submulti.	8	6	7	12	inferiores

33

Potest & huiusmodi exemplum proponi.

	14		28	3	
Superiores	7	7	9	19	9
			Item		
Inferiores	7	7	9	18	9
	14		28	3	

In his duobus exemplis, quemadmodum nec prima, secunda, neq; etiam tertia ex superioribus suæ inferioris est multiplex, sed ei æqualis: ita etiam superiorum aggregatum, eius quod ex inferioribus colligitur, non multiplex, sed æquale est. Sed ad propositum nihil, uel parum, cum de æque multiplicibus, & non æqualibus quantitatibus hæc intelligenda sit,

Εὰν πρῶτον δυντόν ισάκεις ἢ τετραπλάσιον, καὶ τρίτον τετάρτου, ἢ δὲ καὶ πέμπτον δυντόν ισάκεις τετραπλάσιον, καὶ ἕκτον τετάρτου καὶ σῶτεβερ πρῶτον καὶ πέμπτον, δυντόν ισάκεις ἕσαι πολλαπλάσιον, καὶ τρίτον καὶ ἕκτον τετάρτου.

PROPOSITIO II.

Si prima secundæ æquè fuerit multiplex, & tertia quartæ, fuerit autem & quinta secundæ æquè multiplex, & sexta quartæ: & composita, prima scilicet & quinta, secundæ æquè erit multiplex, & tertia & sexta quartæ.



Sint sex quantitates, & esto quòd prima secundæ, ut tertia quartæ, sit multiplex: atq; etiam quinta eidem secundæ, ut sexta quartæ: dico ergo, & compositam ex prima & quinta ipsi secundæ, ut est composita ex tertia & sexta ipsi quartæ, multiplicem esse. Quoniã enim prima secundæ & tertia quartæ, ex hypothesi æquè multiplex est: quot igitur portiones sibi æquales habet secunda in prima, tot haber & quarta in ipsa tertia: atq; eadẽ ratione, quot in quinta secunda, tot etiã in sexta portiones sibi æquales habet ipsa quarta. Quare quoties secunda in ipsa prima & quinta reperitur, toties etiã quarta in quantitatib. tertia & sexta. Quàm multiplex igitur est cõposita ex prima & quinta secundæ, tam multiplex est & cõposita ex tertia et sexta ipsius quartæ. Aequè igitur multiplices sunt, composita ex prima & quinta secundæ, & composita deinde ex tertia & sexta ipsius quartæ. Quare si prima secundæ æquè fuerit, &c. quod demonstrasse oportuit.

ALIA HVIVS REI DEMONSTRATIO.

Sint quantitates, quot & quales propositio requirit, &cæ. Quoniã enim secunda in prima & quinta, ex hypothesi, to

	quinquies		quinquies
Te	bis	ter	bis
12	8	9	6
	4		3


sexta ties continetur, quoties quarta in quantitatibus tertia & sexta, si iam ad æquales, priorum multiplicium portiones denominantes numeros, posteriorum multiplicium portiones denominantes æquales numeri addantur: ipsi toti, denominantes multiplicium portiones numeri, ex communi illa noticia, Si æqualibus æqualia addantur, &c. inter se æquales erunt. atq; unus quidem, qui quoties secunda in composita ex prima & quinta, alter uerò quoties quarta in tertia & sexta simul sumpta continetur, ostendit. Quare sic composita ex prima & quinta, multiplex est secundæ: ita & quæ ex tertia & sexta constituitur quantitas, ad ipsam quartã multiplex erit. Si prima igitur secundæ æquè fuerit multiplex, & tertia quartæ, fuerit autem & quinta secundæ æquè multiplex, & sexta quartæ: & composita, prima scilicet & quinta, secundæ æquè erit multiplex, & tertia & sexta quartæ. quod demonstrasse oportuit,

Ἐὰν πρῶτον δ' αὐτόν ἰσάκεις ἢ πολλαπλάσιον, καὶ τρίτον τετάρτον, λεφθῆ δὲ ἰσάκεις πολλαπλάσια τῷ πρῶτῳ καὶ τρίτῳ· καὶ δίδου τῶν λεφθγῶν ἑκάστῳ ἑκατόν ἰσάκεις ἴσαι πολλαπλάσιον, ἢ μὲν τ' αὐτόν, ἢ δὲ τῷ τετάρτῳ.

PROPOSITIO III.

Si prima secundæ æquè fuerit multiplex, & tertiæ quartæ, sumantur autem æquè multiplices primæ & tertiæ: & æqualiter sumptarum utraq; utriusque æquè multiplex erit, illud quidem secundæ, hoc uerò ipsius quartæ.

Sint quatuor quantitates, & esto quòd prima secundæ & tertiæ quartæ sint æquè multiplices. Sint etiam duæ quantitates aliæ, quæ & ipsæ, una quidem primæ, altera uerò tertiæ, sint æquè multiplices: dico igitur, quòd etiam multiplex primæ ipsi secundæ, tertiæ deinde multiplex ipsi quantitati quartæ æquè multiplices sint. Est huius propositionis demonstratio secunda præmissa, si toties ea, quoties prima in quinta continetur, minus uno, repetatur. Hoc autem apparet, si quinta quanti-




tas & sexta in portiones, primæ & tertiæ quantitatibus æquales, distribuuntur, dico primæ deinde & tertiæ quantitatibus, æquales ex quinta & sexta portiones sumantur, quod indicasse oportuit.

ALIA ET PLANIOR HVIVS PROPOSITIO-
nis demonstratio.

Sint quatuor quantitates, &c. Quoniam enim primæ & tertiæ æquè sunt, ex hypothesis, assignatæ multiplices: quot igitur portiones sibi æquales in sua habet ipsa prima, tot & tertiam in sua habere necesse erit. quare utraq; multiplici in portiones suæ inferiori æquales distributa: erit utiq; æqualis multitudo portionum unius, si-
cua

cut & multiplicis alterius. Quia uerò æquè multiplex est prima quãtitas secundæ, & tertiã quartæ, loco primæ & tertiã quantitatũ, portionibus, quas in ipsarũ multiplicibus æquales habent, singulis ordine sumptis: & ipsæ portiones quantitatũ secundæ & quartæ æquè multiplices erunt. Ordinatis ergo iam sex quantitatibus, quarũ prima quidem & quinta sint priores duæ, quas habet prima in sua multiplici æquales, portiones, secunda deinde sit ipsa secunda, ac quarta ipsa quarta. Tertiã uerò & sexta quantitates sint duæ portiones in multiplici quantitatũ tertiæ, & ipsæ priores. Et quoniam hæ sex quantitates huiusmodi sunt, quales propositio præcedens secunda requirit, erit per hanc, ex prima & quinta composita ita multiplex secundæ, ut ex tertiã & sexta composita multiplex est ipsius quartæ. Igitur, si in multiplicibus non plures quàm duæ, primæ & tertiæ quãtitatibus æquales portiones fuerint: iam statim constat ipsa propositio. Quòd si plures fuerint, maneat secunda & quarta quantitates, prima uerò & tertiã esto priorum duarũ in multiplicibus portionũ aggregata, quinta deinde & sexta sint tertiæ in multiplicibus portiones. Et quoniam etiam iam quales propositio præcedens secunda requirit, sex quantitates apparent: idem etiam quod prius per eam inferri potest. Constat itaq; propositio, ubi quidem tres fuerint in multiplicibus portiones, suis inferioribus æquales. Non aliter procedendum erit, ubi portiones quatuor, quinque aut plures etiam fuerint, id quod pro pleniore huius propositionis declaratione dicere libuit,



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Δ.

Εὰν πρῶτον πρὸς δευτέρον τὸ αὐτὸν ἔχη λόγον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον καὶ τὰ ἰσάνεις πολλαπλασιαστικῶς πρῶτον καὶ τρίτον πρὸς τὰ ἰσάνεις πολλαπλασιαστικῶς τὸ δευτέρον καὶ τέταρτον, καὶ ὅποιοῦν πολλαπλασιαστικῶν, τὸ αὐτὸν ἔξει λόγον, ληφθῆναι κατὰ μῆλα.


PROPOSITIO

IIII.


Si prima ad secundam, eandem habuerit rationem, & tertia ad quartam: & primæ & tertiæ æquè multiplices, ad æquè multiplices quantitatũ secundæ & quartæ, iuxta quamuis multiplicationem, eandem habebunt rationem, ad se sumptæ.

Sint quatuor quantitates, & esto quòd prima ad secundam eam habeat rationem, quam tertiã ad quartam. Sint etiam æquè multiplices primæ & tertiæ, æquè insuper multiplices, iuxta quamuis multiplicationem, quantitatũ secundæ & quartæ: dico igitur, & ipsas primæ & tertiæ æquè multiplices, ad æquè multiplices


ces quantitatum secundæ & quartæ, eandem habere rationem, id quod sic colligitur, Quoniam ex hypothefi, primæ & tertię æquæ sunt multiples assignatæ, qui-



bus si aliæ æquæ assignentur multiples: erunt illæ ultimò assignatæ, per propositionem præmissam tertiam, etiam ipsarum primæ & tertię æquæ multiples. Per eandem insuper, cum secunda & quarta suas æquæ multiples, ex hypothefi, habeant, si ipsis aliæ æquæ multiples assignentur: & illæ aliæ, secunda & quartæ quantitatum æquæ multiples erunt. Quoniam autem quantitates, prima, secunda, tertã & quarta, ex hypothefi, sunt proportionales: multiples igitur, de quibus



Possunt numeri etiam sic ordinari.



iam sermo fit, ex conversione definitionis quintæ huius, in defectu, æqualitate, & excessu æqualiter sese habebunt, atq; deinde, cum hæ eadem multiples, aliarum etiam

etiam, primarum scilicet quantitatum, multiplices sint: & illæ aliæ tandem ex quinta definitione ipsa, ordine, quo solent, proportionales erunt. Si prima igitur ad secundam & tertia ad quãtítatem quartam eandem rationem habuerint: & primæ &c. quod demonstrasse oportuit.

ΛΗΜΜΑ.

Ἐπειδὴν εἰδείχθη, ὅτι εἰ ὑποδέχεται ἡ κ τὸ μ· ὑποδέχεται καὶ ἡ λ τὸ ν, καὶ εἰ ἴσος ἴσος, καὶ εἰ ἔλαστος ἔλαστος. Δῆλον ὅτι, εἰ εἰ ὑποδέχεται ἡ μ τὸ κ· ὑποδέχεται καὶ ἡ ν τὸ λ, καὶ εἰ ἴσος ἴσος, καὶ εἰ ἔλαστος ἔλαστος. Καὶ δὲ ἀνάλογον εἶσαι καὶ ὡς ἡ πρὸς ἡ ε, οὕτως ἡ θ πρὸς ἡ ζ.

LEMMA, VEL ASSVMPVTVM.

Quoniam igitur demonstratum est, Si multiplex primæ quantitatis multiplicis excedat multiplicem multiplicis tertiæ: & multiplex multiplicis secundæ excedet multiplicem multiplicis quantitatis quartæ. Quòd si æqualis: æqualis. Si uerò minor fuerit: minor etiam erit. Manifestum autem est, Si multiplicis tertiæ quantitatis multiplex, excedat multiplicem multiplicis quantitatis primæ: quod tum & multiplex quartæ quantitatis multiplicis, multiplicem multiplicis quantitatis secundæ excedet, & si sit æqualis: æqualis, si uerò minor: minor etiam sit. Atque ideo etiam multiplex secundæ ad multiplicem primæ, sicut multiplex quartæ ad multiplicem quantitatis tertiæ sese habebit.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Ἐκ δὴ τούτου φανερὸν, ὅτι εἰ ἀνὰ τέσσαρα μέγιστα ἀνάλογον ἢ καὶ ἀνωπαλιν ἀνάλογον εἶσαι.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est, quòd si quatuor quantitates in proportione sint, & permutatim etiam illas proportionales esse.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε.


Ἐὰν μέγιστον μέγιστος ἴσος ἢ πολλαπλάσιον, ὅπου ἀφαιρεθῆμι ἀφαιρεθῆμι τὸ καὶ ἡ λοιπὸν τὸ λοιπὸν ἴσος εἶσαι πολλαπλάσιον, ὅσα πλάσιον εἶσαι ἡ ὅλον τὸ ὅλον.

PROPOSITIO V.

Si quantitas quantitatis multiplex fuerit, quemadmodum ablatum ablati: & reliquum reliqui, ut totum totius multiplex erit.

Sint duæ quantitates, quarum una sit alterius multiplex: auferatur autem ab utraq; harum portio aliqua, quarum similiter una alterius, sicut tota totius, sit multiplex: dico, & reliquarum quantitatum, ut tota totius, unam alterius multiplicem esse. Sicut ablatum maioris multiplex est, ex hypothesi, ablati quantitatis minoris, ita multiplex esto, ex structura, maioris residuum quãtítatis alterius quartæ: & erit ex propositione prima huius, maior quantitas aggregati, quod ex quarta quantitate & maioris ablato nascitur, sicut ablatum de maiore minoris quantitatis ablati, multiplex. Sed quia ita etiam, ex hypothesi, multiplex est maior quantitas ipsius minoris: æquè igitur est multiplex maior quantitas utriusq; ipsorum, aggregati scilicet iam commemorati, & minoris quantitatis: quare equalia inter se, aggregatum

& minor quantitas. Demp̄to igitur eo quod est eis commune, ablato scilicet minoris, ex utraq; parte: & reliqua, quarta scilicet quantitas, atq; residuum minoris, ex



communi quadam noticia, inter se æqualia erunt. Quare quemadmodum, ex structura, æquè est multiplex ablatum maioris ipsius minoris quantitatibus ablati, & residuum maioris ipsius quartæ quantitatibus: ita nunc propter æqualitatem, loco scilicet quartæ quantitatibus residuo minoris sumpto, & reliqua, quemadmodum ablata, inter se multiplicia erunt. Sed quia ut ablatum ablati, sic ex hypothesi, & maior quantitas ipsius minoris: quare & ablatum ablati, ut ipsæ quantitates, unum alterius multiplex erit. Si quantitas igitur quantitatibus multiplex fuerit, quemadmodum ablatum ablati: & reliquum reliqui, ut totum totius multiplex erit, quod demonstrasse oportuit,

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 5.


Εὰν δύο μεγέθη δύο μεγθῶν ἰσάκεις ἢ πηλαπλάσια, καὶ ἀφαιρεθῆντα τινὰ τῶν αὐτῶν ἰσάκεις ἢ πηλαπλάσια· καὶ τὰ λοιπὰ τοῖς αὐτοῖς, ἢ ἰσοῦσιν ὅσιν, ἢ ἰσάκεις αὐτῶν πηλαπλάσια.

PROPOSITIO VI.


Si duæ quantitates duarum quantitatibus æquè fuerint multiplices: & ablatae quædam earundem æquè fuerint multiplices: reliquæ eisdem aut æquales sunt, aut æquè ipsarum multiplices.

Sint duarum quantitatibus æquè multiplices, sint etiam portiones quædam, de multiplicibus ablatae, ad easdem duas æquè multiplices: dico, multiplicium reliquas quantitates, iisdem duabus aut æquales, utranq; utriq; aut uerò earū æquè multiplices esse. Minores non possunt esse reliquæ ipsis quantitatibus positæ, propterea quòd multiplices eis æqualiter assignatæ sint. Esto igitur primò quòd prioris multiplicis reliqua suæ quantitatibus æqualis sit: dico sanè, & posterioris multiplicis reliquam suæ quantitatibus æqualem esse, id quod hoc modo demonstrabitur. Sumatur ipsi posteriori æqualis quantitas alia. Et quoniam portiones ablatae, ex hypothesi, ipsarum quantitatibus, primæ scilicet & secundæ, sunt æquè multiplices, cum quantitatibus prioribus, suæ multiplicis reliqua, ex hypothesi, posteriori uerò alia quædam quantitas, ex structura, æqualis sit, si reliqua multiplicis suæ prioris ablatae, sumpta deinde quantitas posterioris multiplicis ablatae accesserint: & hæ compositæ earundem quantitatibus æquè multiplices erunt.

Sed quia etiam una compositarum, quæ est prior multiplex, ipsius prioris, quemadmodum posterior posterioris, est multiplex, cum duæ quantitates unæ sint æquè multiplices: illas ex communi quadam noticia inter se æquales esse, concluditur. Communi igitur portione, quæ est ablata multiplicis posterioris quantitas, ab illis seiuncta, & quæ relinquuntur, ex communi quadam noticia: atq; deinde, cum una reliqua posteriorẽ quantitatibus æqualem habeat, & illa eadem



eadem posterior quantitas & reliqua ipsius, & id ex communi quadam noticia, inter se æquales erūt. Sicut igitur prioris multiplicis reliqua quātitas ipsi priori quan-



titati, ex hypothēsi, æqualis est: ita & posterioris reliquam ipsi posteriori quantitati æqualem esse necessariò sequitur. Ομοίως δὴ δείξομεν, Similiter ostēdemus, si prioris multiplicis reliqua suæ quantitatē multiplex sit, quòd & posterior ad suam tam multiplex esse debeat. Si duæ igitur quantitates duarum quantitatū æquæ fuerint multiplices, & ablatae quædam earūdem æquæ fuerint multiplices: reliquæ eisdem aut æquales sunt, aut æquæ ipsarum multiplices. quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ζ.

Τὰ ἴσα πρὸς ἕν, ἢ αὐτὸ ἔχει λόγον· καὶ ἕν πρὸς τὰ ἴσα.

PROPOSITIO VII.

Æqualia ad idem, eandem habent rationem. Et idem, ad æqualia.


Sint duæ quantitates æquales, ad aliam tertiã, quantamcunq; relatae: dico, neutram æqualium diuersam ab alia cum tertia illa constituere rationem. Colligit hæc propositio suam demonstrationem ex definitione 5 huius, in hunc modū. Sumantur æqualium quantitatū æquæ multiplices, & erunt hæ, ex communi quadam noticia, inter se æquales. Sumatur & ipsius quantitatē tertię aliqua utcunq; multiplex, & ordinentur quantitates, ut scilicet æqualium una, prima: alia, tertia: alia deinde, ubi plures essent, quinta: ac cæteræ deinceps prout naturalis imparium numerorum ordo requirit, uocentur. Illa tertia uerò, ut quæ æqualium omnium est communis consequens, à paribus numeris, secunda, quarta & sexta, &c. nomen habeat. Et quoniam, quantum ad priorem partem, prima & tertia, ac cæterarum, quarum impar est appellatio, quantitatū, æquæ assignatae multiplices, secunda & quarta, ac reliquarum deinde, ut quæ à pari numero nominantur, quantitatū æquæ multiplices equaliter excedunt, uel eis omnino æquales, uel minores ἢ sunt: infertur, ex definitione 5 huius, ipsas quantitates, primam nimirum ad secundã, & tertiam ad quartam, ac reliquas deinde omnes, quamlibet ad suam, in eadem esse ratione: quare sic patet pars prior. Posterior uerò. Manentibus ἴσδὲm quantitatibus, alio tamen ordine dispositis, ita nimirum, ut quæ in priori secunda & quarta quantitatē nomen habuit, iam primæ & tertię appellationem sortiatur. Prima uerò quæ prius, secunda nunc: & secunda deinde, quarta iam uocetur. Sicq; per eandem definitionem quintam: & posterior huius propositionis pars obtinebitur, primam scilicet, hoc est illam, quæ iam est communis æqualium omnium antecedens, ad secundam,




tionem quintam: & posterior huius propositionis pars obtinebitur, primam scilicet, hoc est illam, quæ iam est communis æqualium omnium antecedens, ad secundam,

dam, unam ex æqualibus, esse, ut eadem prima ad æquales omnes. Aequales igitur ad eandem, eandem habent rationem, &c. quod demonstrari oportuit.

Multiplīces



Multiplīces




ΠΡΟΤΑΣΙΣ Η.

Ἐν ἰσῶν μεγεθῶν, ἡ μείζων πρὸς τὴν αὐτὴν, μείζονα λόγον ἔχει, ἢ πρὸς τὸ ἔλαττον. Καὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ ἔλαττον, μείζονα λόγον ἔχει, ἢ πρὸς τὸ μείζον.

PROPOSITIO VIII.

Inæqualium quantitatum, maior ad eandem, maiorem rationem habet, quàm minor. Et eadem ad minorem, maiorem habet rationem, quàm ad maiorem.


Sint quantitates quotcunq̄, in præsentia autem, pro faciliori exemplo, duæ sufficiant, & esto quòd ex æquo ad unam & eandem quantitatem conferantur: dico igitur, quòd maior inæqualiū: maiorem, minor uerò ad eandem: minorem, & contra, hæc eadem ad minorem inæqualium, maiorem, quàm ad maiorem, habeat rationem. Sumatur ex inæqualium maiori portio, quæ sit minori æqualis: & erit altera quæ relinquitur portio, breuiori signatæ aut æqualis, aut inæqualis. Si inæqualis, utra breuior fuerit, illius multiplex, quæ communi omnium consequente maior sit, accipiatur, quàm multiplex deinde hæc eadem sumpta quantitas suæ inferioris fuerit, tam multiplex esto etiam quantitas alia portionis in maiori maioris, alia in-



super ipsius minoris quantitatis. His multiplicib, tali ordine sumptis, ipsius tandem omnium consequentis dupla, tripla, atq; deinde quadrupla quantitas accipienda est, ac deinceps iusta serie ad multiplīces quātitates alias tam diu progrediendum, donec ipsa, quæ minoris quantitatis multiplice maior sit, occurrat. Sit autem, pro operatione faciliori, consequentis quadrupla, primò ipsa minoris quantitatis multiplice maior: quæ igitur dictæ consequentis tripla quantitas fuerit, hæc eadem minoris multiplice primò minor erit: quare contra, minoris multiplex eadem consequentis tripla quantitate maior. Et quoniam quantitatum, reliquæ scilicet in maiori, & minori in ea æquali positæ, æquæ sunt assignatæ multiplīces, cum quàm multiplex sit una unius, tam multiplīces etiam, ex

propositione prima huius, omnes omnium sint: maioris quantitatis & breuioris in ea portionis æquæ multiplīces erunt. Sed cum ut breuioris portionis ita etiam, ex structura minoris quantitatis multiplex sumpta sit: minoris & maioris quantita-
tum

tum æquæ multiples erunt, quod est obseruandū. Rursus quoniam quantitatum, positæ scilicet in maiori minori æqualis, & ipsius minoris, æquæ sunt, ex structura assignatæ multiples: sequitur, ut quemadmodū quantitates, ita & ipsarum æquæ



multiples inter se æquales sint: atq; insuper, sicut una, multiplex scilicet minoris, quàm consequentis tripla quantitas, ex structura, maior est, ita & altera, multiplex scilicet positæ in maiori quantitati minori æqualis, propter æqualitatem, eadem consequentis tripla maior erit. Maior autem est, similiter ex structura, breuioris in maiori quantitate portionis multiplex ipsa consequente: tota igitur totius maioris quātitatis multiplex, simul utrisq; consequente scilicet & tripla eius, maior erit: quare etiam & eadem totius maioris multiplex, propter æqualitatem, consequentis quadrupla maior erit: unde sic ipsum etiam excedit. Sed quoniam multiplex minoris consequentis quadruplam non excedit, ut patet ex structura: maior igitur maiorem ad communem omnium consequentē, quàm ipsa minor quātitas ad eandē, ex definitione 7 huius, ratione habebit. Atq; hæc est prior huius propositionis pars. Porrò mox deinde, cōsequentibus loco antecedentiū, & antecedentibus loco consequentiū sum

ptis, per eandem allegatam 7 definitionem, consequentis ad minorem, rationem maiorem, quàm ad maiorem quantitatem habebit. Esto uerò nunc altera, quæ relinquitur, portio, breuiori signatæ æqualis, quia quantitates uel portiones in maiori æquales sunt, tum utriusuis portionis multiplex, quæ communi omnium consequente maior sit, quantitas sumenda est. nam structura deinde & demonstratione ipsa, ut in priori, instituta, res successum habebit. Si igitur inæqualium quantitatum ad unam & eandem collatio facta fuerit: maior maioris, quàm minoris quantitatis ad eam ratio erit. Contra uerò, eiusdē ad minorem maior, quàm ad maiorem quantitatem ratio, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Θ.

Τὰ πρὸς τὸ αὐτὸ ἢ αὐτῷ ἔχοντα λόγον ἴσα ἀλλήλοις ὄντι. Καὶ πρὸς ἂν τὸ αὐτὸ ἢ αὐτὸν ἔχῃ λόγον κακῆϊνα ἴσα ἀλλήλοις ὄντι.

PROPOSITIO IX.

Quæ ad idem eandem habent rationem: æqualia inter se sunt. Et ad quæ idem eandem rationem habet: & illa æqualia inter se sunt.

Habeant quotcunq; quantitates ad unā eandemq; eandem rationem. Aut contra, esto quòd unius eiusdemq; ad quotcunq; sit una & eadem ratio: dico, utrum positum fuerit, illas quantitates inter se æquales esse. Hoc autem demonstratione ad incommodum ducente, ex propositione octaua præcedenti, sic patet. Nisi enim

essent æquales quantitates illæ: sequeretur, per partem præcedentis priorem, illas ad unam & eandem: hæc deinde eadem, per partem eiusdem propositionis poste-

vel

riorem, ad illas, diuersas constituere rationes. Hoc autem cum sit contra propositionis nostræ hypothesim, illas quantitates æquales esse inter se, tam ad priorem quam etiam ad posteriorē partem, ex hac prop. 8 obtinebitur. Quæ igitur ad eandem, eandem habent rationem quantitates, &c. quod demonstrasse oportuit.

7	7	7	Item	9	9	9	9	9
	ad					ad		
uel con.	5			uel contra		11		
	ad					ad		
7	7	7		9	9	9	9	9

ΠΡΟΤΑΣΙΣ I.

Ἐῶν πρὸς τὸ αὐτὸ λόγον ἔχοντων, τὸ ἤ μείζονα λόγον ἔχον· ἐκείνο μείζον ὄσιν. Πρὸς ὃ δὲ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει· ἐκείνο ἔλαττον ὄσιν.

PROPOSITIO X.

Ad eandem rationem habentium, maiorem rationem habens: illa maior est. Ad quam autem eadem maiorem rationem habet: illa minor est.

Conferantur quotcunq; quantitates ad unam eandemq; dico, quòd illa, quæ ex his maiorem ad communem earum consequentem habuerit rationem, maior sit: dico etiam, ad quam ipsa consequens quantitas maiorem rationem habuerit,

vel

eam contra minorem esse. Nam si maiorem habens rationem, ad aliam non repute tur esse maior, erit illa alij aut æqualis, aut alia minor. Si æqualis, cum æqualium ad idem, ex priore parte propositionis septimæ huius, eadem sit ratio, harū uerò quan titatum, ex hypothesi, ratio diuersa, cōtra nostram illam hypothesim agetur, quod non permittitur. Esto autem nunc, quòd maiorem rationem habens ad aliam, mi nor sit, &c. Et quoniam, per priorem partem propositionis 8 huius, Inæqualium quantitatum maior ad eandem, maiorem rationem habet, quàm minor, erit id con tra propositionis hypothesim. Constat itaq; propositionis prior pars. Posterior eodem modo, ex posterioribus allegatarum propositionum partibus, retinebitur. Ad eandem igitur, &c. quod demonstrasse oportuit.

Exemplum in numeris.

Antecedentes	7	6	4	9
Consequens	5	uel	9	
	una & eadem quantitas.			


ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Οἱ αὐτῶ λόγοι οἱ αὐτοὶ ἑαλίκοι εἰσὶ οἱ αὐτοὶ.

PROPOSITIO XI.

Quæ eidem sunt eadem rationes: & inter se sunt eadem.

Quæ in primo libro, inter communes notitias, autor de quantitatibus in genere his uerbis, Quæ unī sunt æqualia, &c. proposuit, in eodem etiam libro idem, per propositionem 30, in lineis æquedistantibus, uerum esse demonstrauit, id quoque iam in ipsis rationibus similiter sese habere, proponit, & hoc quidem per definitionis quintæ huius conuersionem atque ipsam quintam, hac structura. Sint rationes, exempli gratia, duæ qualescunque, alij tertiæ cuidam similes & eadem: dico, eas & inter se similes eademque esse. Sumantur antecedentium quantitatū æquē multiplicēs, similiter & cōsequentium. Et quoniam utraq; duarum rationum, quæ sunt ter-



tia similes, antecedens quantitas, est ad suam consequentē, ex hypothesi, ut antecedens tertiæ rationis ad suam cōsequentem, & rursum, quoniam tam antecedentium quam etiam consequentium, ex structura, æquē sunt assignatæ multiplicēs: sequitur per conuersionem definitionis quintæ huius, bis repetitam (sunt enim duæ rationi unī similes positæ) multiplicēs antecedentium, hoc est primæ & tertiæ quantitatū, in addendo minuendo, uel æqualitate, respectu suarum consequentium æqualiter sese habere. Quemadmodum igitur se habet multiplex antecedentis in tertiā ratione, ad multiplicem suæ consequentis: ita etiam sese habebunt multiplicēs antecedentium reliquarum duarum rationum, ad suarum consequentium multiplicēs. Cum res igitur ita sese habeat: per hanc ipsam quintam definitionem huius concluditur propositum, illas scilicet duās rationes inter se similes esse & eadem. Quæ igitur eidem sunt eadem rationes, & inter se sunt eadem, quod demonstrasse oportuit.

Exemplum

Exemplum in numeris.

	6		12	18	24
Sin rationi	$\left\{ \begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array} \right.$ eadem, rationes		6	9	12
			4	6	8
			8	12	16
			12	18	24
			16	24	32

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΒ.


Εάν ἢ ὅποσα ἄρ μεγέθη ἀνάλογον ἴσται ὡς ἐν τῶν ἡγούμενων πρὸς ἐν τῶν ἐπόμενων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα.

PROPOSITIO XII.

Si fuerint quotcunq; quantitates proportionales: erit, sicut una antecedentium ad unam consequentium, sic omnes antecedentes ad omnes consequentes.

Simile autor proposuit in propositione libri huius prima, de multiplicibus. Itaq; quanto ipsa multiplice ratio est generalior, tanto etiam hæc præsens propositio, quam ipsa præcedens prima, latius sese extēdit. Sint igitur quantitates quotcunq;, continuæ uel non continuæ proportionales: dico, quam rationem habet una antecedens ad suam consequentem quantitatē, eandem & aggregatum antecedentium ad aggregatum ex consequentibus habere. Sumptis enim æquæ multiplicibus ad antecedentes, æquæ item utcunq; multiplicibus ad consequentes quantitates, cum sit, ex hypothesi, ut antecedens una ad suam consequentem, sic singulæ ad singulas: sequitur ex conuersione definitionis 5 huius, toties quoties opus fue-

Multiplices
antecedentium. consequen.




rit eam repetendo, ut sicut unius antecedentis multiplex à suæ consequentis multiplice defecerit, uel ei æqualis sit: siue uerò eandem excesserit, sic & singulæ antecedentium ad consequentium singulas multiplices sese habere. Igitur si primæ quantitatatis

titatis

titatis multiplex à suæ consequentis multiplice defecerit, aut ei æqualis sit, uel eandem excefferit: sequitur, ut antecedentium multiplices singulæ, eodem modo suarum consequentium multiplices respiciant. Quare, sicut una suæ inferioris est multiplex, ita omnes omnium. Per primam igitur propositionem huius, bis repetitam, quàm multiplex est una unius, tam multiplex etiam aggregatum antecedentium, ad cōsequentium aggregatum erit. Ordinentur ergo iam quantitates, sic, ut unius rationis antecedens sit prima: sua deinde consequens, secunda: aggregatum uerò antecedentium, tertia, & consequentium postea aggregatum, quantitas quarta. Ecquía quantitatuum, primæ & tertiæ, æquæ sunt assignatæ multiplices, secundæ insuper & quartæ similiter: infertur, ex definitione quinta, tandem id quod maxime uolebat propositio. Si fuerint igitur quotcunq; quantitates proportionales: erit sicut una antecedentium ad unam consequentium, sic omnes antecedentes ad omnes consequentes, quod demonstrasse oportuit.

Exemplum rationis sesquialteræ, continuæ,
in quantitatibus quatuor



ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΙΓ.

Εὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον ἢ αὐτὸν ἢ ἕχῃ λόγον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, τρίτον δὲ πρὸς τέταρτον μείζονα λόγον ἢ ἕχῃ ἢ πρὸς πέμπτον πρὸς ἕκτον ἢ πρῶτον πρὸς δεύτερον μείζονα λόγον ἢ ἕχῃ ἢ πρὸς πέμπτον πρὸς ἕκτον.

PROPOSITIO

XIII.


Si prima ad secundam eam habuerit rationem quam tertia ad quantitatē quartam, tertia uerò ad quartam maiorem rationē habuerit quàm quinta ad sextam: & prima ad secundam maiorem rationē habebit quàm quinta ad sextam.

Sint sex quantitates, & esto quòd primæ ad secundam & tertiæ ad quartam sit una & eadem ratio, quam uerò tertia ad quartam habet rationem, ea sit ratione quintæ ad sextam maior: dico igitur, quod & primæ ad secundam maior quàm quintæ ad sextam sit ratio. Quoniam enim tertiæ ad quartam maior est ratio, ex hypothesi, quàm quintæ ad sextam, sumantur ipsarum tertiæ & quintæ æquæ multiplices, quartæ deinde & sextæ similiter, sic tamen, quòd multiplex tertiæ excedat multipli-

li

cem

cem quartæ, non autem excedat multiplex quintæ ipsius sextæ quantitatis multiplicem. Sumantur etiã ipsarum primæ & secundæ secundum multiplici-
tatem tertie & quartæ æquæ multiplices. Et quoniam prima quantitas est ad secundam, sicut



tertia ad quartam, primæ ue-
rò & tertie, ut antedētibz,
secundæ insuper & quartæ,
ut consequentibz. æquæ sunt
ex structura, assignatæ mul-
tiplices: primæ igitur & ter-
tiæ multiplices, ad multipli-
ces secundæ & quartæ quan-
titarum, ex conuersione defi-
nitionis 5 huius, in minuendo,
æqualitate, & addendo æqualiter
sefe habebunt. Cũ igitur, & id
ex structura, multiplex tertie
excedat multiplicem quartæ,
multiplex uero quintæ non
excedit multiplicem sextæ
quantitatis: propter similitudinem
rationum, & primæ quantitatis
multiplex, ad secundæ
quantitatis multiplicem cõ-
ferendo, id faciet: maior igitur
est ex definitione 7 huius,
ad secundam, quàm quintæ
quantitatis ad sextam ratio.
Si prima igitur ad secundam
eam habuerit rationē quam
tertia ad quantitatem quar-
tam, tertia uerò ad quartam
maïorem rationem habue-
rit quàm quinta ad sextam:
& prima ad secundam ma-
iorem rationem habebit quàm
quinta ad sextam. quod demon-
strasse oportuit.

Exemplum in numeris sic ponitur:

18		16		9		8		12		12
						maïor				minor ratio
6	ad	4	ut	3	ad	2		4	ad	3
pri.		secun.		ter.		quar.		quín.		sex. numerus

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΑ.


Εὰν πρώτη πρὸς δεύτερον τὴ αὐτὴ ἔχη λόγον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, ἢ δὲ
πρώτην τὸ τρίτον μείζον ἢ καὶ ἢ δὲ δεύτερον τὸ τέταρτον μείζον ἴσαι, καὶ ἴσων
ἴσων, καὶ ἴσων ἴσων.

PROPOSITIO XIII.

Si prima ad secundam eam habuerit rationem, quam tertia ad quar-
tam, prima uerò ipsa tertia maior fuerit: & secunda quarta maior erit,
quòd si æqualis: æqualis, si uerò minor: minor.

Sint

Sint quatuor quantitates, prima ad secundam ut tertia ad quartam: dico, quem admodum prima maior est quam tertia, uel ei æqualis, siue minor ea, ita & secunda erit respectu quantitatís quartæ. Cum enim, ex hypothesi, prima maior sit quam tertia: sequitur ex priore parte propositionis octauæ huius, quòd prima maiorem quam tertia ad secundam quantitatem, habeat rationem. Quoniam autem, quem



admodum prima est ad secundam, ita est & tertia, ex hypothesi, ad quartam: propter illam rationum similitudinem, & tertiæ ad quartam maior quam eiusdem tertiæ ad secundam ratio erit. Ad quam autem una & eadem quantitas maiorem habet rationem, illa, ut posterior pars propositionis 10 huius testatur, minor esse censetur: minor igitur est quarta ipsa secunda, quare contrà secunda quam quarta maior, quod demonstrasse oportuit. *Ὁμοίως δὲ δείξομεν.* Similiter etiam ostendemus, quòd secunda quartæ æqualis, uel ea minor sit, prout quidem prima respectu tertiæ posita fuerit. Si prima igitur ad secundam eam habuerit rationem quam tertia ad quartam, prima uerò ipsa tertia maior fuerit: & secunda quarta maior erit, quòd si æqualis, æqualis, si uerò minor: minor, quod demonstrasse oportuit.

Exemplum in numeris sic se habet.

15 ad 9 ut 5 ad 3
 Vel 27 18 12 8

Quantitas		ratio		ratio	quan.
prima 27	} ad secundam, 19	{	maior	mutatis nunc 12 ad 8	ma.
tertía 12			minor	terminis uel 12 ad 18	mi.
			quantitat.	quare	maior.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ. ΙΕ.

Τὰ μὲν βίς ὡσαύτως πεπλασιáοις, ἢ αὐτῶν ἕξ λόγον, ληφθέντα κατὰ μὴλα.

PROPOSITIO XV.


Partes eodem modo multiplicium, eandem habent rationem, ad se sumptæ.

Sint duæ uel plures quantitates, quarum unaquæq; sit alterius cuiusdam quantitatís, tanquam suæ multiplicis, pars: esto tamen, ut quota pars est una unius, tota sint etiam singulæ singularum: dico ergo, quòd quam ipsæ partes, illam eandem & multiplices inter se rationem habeant, Distribuantur multiplicium una-



quæque in portiones suæ inferiori uel parti æquales, Et quoniam æquæ sunt partibus,

bus, ex hypothefi, assignatæ multiples: erunt in una tot portiones fua parti æqua-
les, quot & in altera. Rurfus quoniam portiones cuiusque multiplicis inter fe funt
æquales: erit singularum portionum ad portiones fingulas, una & eadem ratio, &
illa quidem, quæ est partis ad partem. Quare, ficut est una unius multiplicis portio,
uel æqualibus pro æqualibus fumptis, ficut est una pars ad portionem alterius, uel
partem, fic, ex propofitione 12 huius, aggregatum illorum, hoc est antecedentium,
ad confequentium aggregatum. Quam igitur æquæ multiplicium partes, illam ean-
dem & ipfæ multiples inter fe habent rationem, quod demonftrari oportuit.




ΠΡΟΤΑΣΙΣ 15.

Εάν τεσσαρά μέγθη ἀνάλογον ἢ καὶ ἑναλλάξ ἀνάλογον εἶσαι.

PROPOSITIO XVI.

Si quatuor quantitates proportionales fuerint: & permutatim hæ
proportionales erunt.

Sint quatuor quantitates in ratione una: dico, quòd & permutatim, uel permutata
ratione, hoc est, prima ad tertiam & fecunda ad quartam, in una ratione sint.
Sumantur primæ & secundæ quantitatium æquæ multiples, atq; in super tertix &



quartæ: & erunt hæ, ex præ-
missa, bis usurpata, in ea qua
sunt ipfæ partes ratione: at-
que deinde, ex propofitio-
ne 11 huius simili ratione
bis pro simili fumpta, in u-
na etiam & eadem ratione,
prima fcilicet multiplex ad
secundam, & tertia ad mul-
tiplicem quartam. Sed cum
fuerint quatuor quantita-
tes proportionales, prima
ad secundam ut tertia ad
quartam, prima uerò ipfa
tertia maior, uel ei æqualis,
uel minor ea fit, & fecunda

quartam, ex propofitione 14 huius, fic respiciet. Quatuor igitur iam quantitatibus
ordinatis, prima fcilicet & quarta, ut prius, fecunda uerò in tertium, ac tertia dein-
de in secundum locum positis, cum huius ordinationis primæ & tertix quantita-
tium æquæ multiples æqualiter fe habeant, in addendo, minuendo uel æqualitate,
ad secundæ & quartæ quantitatium æquæ assignatas multiples, ex definitione tan-
dem huius quinta concluditur propofitum: primæ fcilicet ad tertiam eam esse,
quæ est secundæ ad quartam quantitatium ratio. Si igitur quatuor quantitates pro-
portionales fuerint: & permutatim hæ proportionales erunt, quod demonftraf-
fe oportuit.

Exemplum

Exemplum in numeris.

21	9	56	24	21	9
7	ad 3	ut 28	ad 12	pri. 7	ter. 3
				se. 28	quar. 12
				56	24


ΠΡΟΤΑΣΙΣ 12.

Ἐὰν συγκεῖμνα μέγθη ἀνάλογον ἢ Ἐ' ἀλλοιωθέντα ἀνάλογον ἔσται.


PROPOSITIO XVII.

Si compositæ quantitates proportionales fuerint: & diuisæ hæ proportionales erunt.

Sint quatuor quantitates, atq; esto, quòd hæ, compositæ, hoc est prima cum secunda ad secundam, & tertia cum quarta ad quartam, in una & eadem ratione sint: dico igitur, & diuisim, uel diuisionis ratione, quod idem est, illas quantitates in una & eadem ratione esse. Colligitur huius rei demonstratio potissimum ex pro-



positionibus prima & secunda huius. Sumptis enim quatuor quantitatum, primæ scilicet, secundæ, tertiæ & quartæ æquè multiplicibus: erit, ratione primæ & secundæ quantitatum, ut quàm multiplex est una unius, tam multiplices etiam sint, per propositionem primam huius, omnes omnium, atq; deinde hoc idem, per eandem etiam propositionem, ratione quantitatum tertiæ & quartæ locum habet, ac tandem, cum ex hypothese, æquè sint quatuor quantitatum assignatæ multiplices, commutatione facta primæ & secundæ, ut unius, tertiæ item & quartæ, & harum ut unius quantitatæ æquè multiplices erunt, quod est notandum. Sumantur rursus secundæ & quartæ, utcunque aliæ æquè multiplices, cum prius etiam ipsarum secundæ & quartæ quantitatum æquè multiplices assignatæ sint, modò



sumptæ ipsis prioribus multiplicibus iunctæ, earundem secundæ & quartæ quantitatum, ex propositione 2 huius, æquè multiplices erunt. Quoniam autem quantitates, prima cum secunda, secunda, tertia cum quarta, & ipsa quarta, ex hypothese proportionales sunt, primæ uerò & tertiæ, atq; secundæ & quartæ quantitatum æquè multiplices assignatæ: primæ & tertiæ quantitatum multiplices, ipsas secundæ & quartæ quantitatum multiplices, ex conuersione definitionis quintæ huius in minuendo, æqualitate uel addendo æqualiter respiciunt. Quare si multiplex primæ, hoc est ex prima & secunda compositæ, à multiplice secundæ quantitatæ defecerit, ei æqualis fuerit, uel hanc eandem excesserit: & multiplex tertiæ, quæ scilicet ex tertia & quarta composita est, ad multiplicem quartæ conferendo, sic se habebit, ac portionibus deinde illis, quas ex utraq; parte communes habent, ablati atq; neglectis, cum de residuis multiplicibus, ex communi quadam noticia, quòd hæ

etiam ad suas inferiores sic sese habeant, nullum dubium sit: ex definitione tandem huius, id quod maximè uolebamus concluditur, primæ scilicet ad secundam esse, ut est tertiæ ad quartam quantitatem ratio. Si compositæ igitur quantitates proportionales fuerint: & diuisæ hæ proportionales erūt, quod demonstrasse oportuit.

Exemplum in numeris,

		30			40
18		12		24	16
9		6		12	8
	15				20
		30			30
18	40	12		12	6
9	20	6		16	8
					24
	15				40
		30			40
		12			16
		18			24
		9			8
		6			12

Idem exemplum, alijs multiplicibus expositum.

		45			60
27		18		36	24
9		6		12	8
		12			16
	15				20
		45			30
27	60	18		18	6
9	20	6		24	8
					16
	15				40
		45			40
		18			24
		27			16
		9			8
		6			12

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΗ.


Εὰν διuisα μέγθη ανάλογα ἢ καὶ συντεθέντα ἀνάλογα ἴσασιν

PROPOSITIO XVIII.

Si diuisæ quantitates proportionales fuerint; & compositæ hæ proportionales erunt.


Sint

Sint quatuor quantitates disiunctæ proportionales, prima ad secundam, & tertia ad quartam: dico igitur, & compositionis ratione eas proportionales esse. Nam si non, sumatur loco quartæ quantitas alia, ad quam nimirum se habeat tertia cum quarta, sicut prima cum secunda ad secundam. Et quoniam hæc sumpta, quantitati quartæ minime æqualis esse potest (nam si æqualis esset, retineretur illa: atq; statim pateret propositū) erit aut minor illa, aut maior. Vtrum nunc horum ponitur, con-



trarium semper infertur, sumptam scilicet, maiorem esse ipsa quarta, ubi posita fuerit minor, uel contrā, eandem sumptam, ipsa quarta maiorem positam, hac eadem minorem esse, hoc modo. Quoniam enim composita ex prima & secūda ad secundam, in ea est ratio, ex structura, in qua est altera ex tertia & quarta composita quantitas, ad ipsam sumptam, cum sit *σύνθεσις λόγου*, ipsæ eadem, si separatæ à se fuerint, per præmissam 17 proportionales erunt, prima scilicet ad secundam, ut tertia cum defectu uel excessu quantitatē sumptæ respectu quartæ, ad quantitatem sumptam. Sed quia sic etiam est ex hypothesi, tertia ad quantitatem quartam, cum quæ eidem sunt eadem rationes, per 11 huius, inter se etiam eadem sint: per primam tandem partem propositionis 14 huius quantitatem sumptam ipsa quartā maiorem esse infertur, cum tamen sit minor ea posita. Vel, per tertiam partem eiusdem 14, minor, cum sit posita maior. Quorum sanè utrunq; cum nullo modo esse possit, quod nimirum una & eadem quantitas iam sit alia quadam minor, atq; mox deinde etiam maior, uel contrā, concluditur uerum esse propositum. Si diuisæ igitur quantitates proportionales fuerint: & compositæ hæc proportionales erunt, quod demonstrasse oportuit.

Sint pro exemplo quatuor hæc quantitates.




Εὰν ἢ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον οὕτως ἀφαιρεθῆμι πρὸς ἀφαιρεθῆμι. Ἐὰν ἢ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον, ὡς ὅλον πρὸς ὅλον.

PROPOSITIO XIX.

Si fuerit sicut totum ad totum, sic ablatum ad ablatum; & reliquum ad reliquum, ut totum ad totum erit.

Sint


Sint duæ quantitates, portio etiam aliqua ab utraq; quantitate ablata sic, ut ablatæ portiones eam inter se quam ipsæ totæ habeant rationem: dico, quòd & reliquæ eandem cum totis rationem habeant. Cum enim, ex hypothesi, tota sit ad quantitatem totam, ut portio ablata ad ablatam: ex permutata ratione, tota ad ablatam, ut



tota ad ablatam erit. Quoniam autem est cõpositio rationis, quantitates uerò compositæ proportionales, cum hæ, ex propositione 17 præcedenti, diuisæ etiam proportionales sint, hoc considerato: reliqua ad ablatam in ratione reliquæ ad ablatam erit: atq; reliqua deinde ad reliquam, ex permutata ratione, ut ablata ad ablatam erit. Quia uerò ut ablata ad quantitatem ablatam, ita etiam est, ex hypothesi, tota quantitas ad totam: reliqua igitur quantitas ad reliquam, ex propositione 11 huius, ut tota ad totam erit. Si fuerit igitur sicut totum ad totum sic ablatum ad ablatum: & reliquum ad reliquum, ut totum ad totum erit. quod demonstrasse oportuit.

Exemplum huius in numeris.


Totum 15 totum 10 est ex hypothesi
 ut ablatum 9 ad abla. 6, Igitur
 & reliqua 6 reli. 4 ut
 totum ad totum erit.



Ergo per 11 propositionem huius, cum duæ rationes, totorum scilicet & reliquorum, uni, ablatorum nimirum, sint eadem: erunt illæ & inter se eadem. Reliquum igitur ad reliquum ut totum ad totum erit. quod demonstrasse oportuit.


Καὶ ἐπεὶ δὴ ἐδείχθη, ὡς β' α β πρὸς δ' γ δ, ἕτως ὁ ε β πρὸς ὁ ζ δ. ἢ α' ἀλλὰ ξ, ὡς ὁ α β πρὸς ὁ β ε, ἕτως ὁ γ δ πρὸς δ' ζ δ. συγκείμενα α' α' μέγιστα ἀνάλογον ἔσιν.

Et quoniam ostensum est, quemadmodum totum ad totum, ita etiam reliquum ad reliquum: conuersa uerò ratione, cum sit totum ad reliquum, ut totum ad reliquum: compositæ igitur quantitates proportionales erunt.



Εδείχθη δὲ, ὡς τὸ α β πρὸς τὸ α ε, ὅπως δ' γ δ πρὸς ε γ ζ. εἰ γὰρ ὡς ἡ γέμελον τὸ α β πρὸς πλὴν ὑπὸρχλὼ αὐτῶ λὼ ὑπὸρέχει τῶ ἐκμλίον τῶ ε β καὶ ἔστιν ἀνάστρεψαι π.

Demonstratum est autem, nimirum ex propositionis huius hypothesei & permutata ratione, sicuti totum ad ablatum, sic totum ad ablatum, cum sit ut antecedens ad id quo ipsum excedit suum consequens, ad reliquum scilicet: & rationis conuersione quantitates proportionales erunt.



ΠΟΡΙΣΜΑ.

Εκ δὴ τούτου φανερὸν, ὅτι ἐὰν συγκείμηναι μέγιστα ἀνάλογον ἢ καὶ ἀναστρεψαίαν ἀνάλογον ἔσαι, ὅπως εἶδει δ' εἶσαι.

COROLLARIUM.

Ex hoc manifestum est, Si compositæ quantitates proportionales fuerint: & conuersione rationis eas proportionales esse. quod demonstrasse oportuit.

Γεγόνασι δὲ οἱ λόγοι, καὶ ἑδί τῶν ἰσάκεις κλασάσιων, ἡ ἑδί τῶν ἀναλογίων. Επειδὴ ἡ πρὸς εἰς πρῶτον δὲ δὲ ἑτέρω ἰσάκεις ἢ κλασάσιον καὶ τρίτον τετάρτη ἔσαι, καὶ ὡς τὸ πρῶτον πρὸς δ' δὲ ἑτέρω, ὅπως τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον. ἔκ' ἐπὶ δὲ, καὶ ἀπ' ἑτέρω. Εὰν γὰρ ἢ ὡς τὸ πρῶτον πρὸς δὲ ἑτέρω, ὅπως τρίτον πρὸς τέταρτον, ἔκ' ἑτέρω ἔσαι, ὅτι μὲν πρῶτον τῶ δὲ ἑτέρω ἰσάκεις κλασάσιον, δ' δὲ ἑτέρω τῶ τετάρτη, καὶ δ' ἑτέρω ἢ τῶ ἡμιολίον ἢ ἑδί ἑτέρω λόγων ἢ τῶ τοῖς τῶν, ὅπως εἶδει δ' εἶσαι.

Locum quoque habent rationes in æqualiter multiplicibus. Quando enim ut primum secundum, sic tertium quartum fuerit multiplex: erit etiam, sicut primum ad secundum, sic tertium ad quartum, non autem conuertendo. Si enim fuerit sicut primum ad secundum, sic tertium ad quartum: non omnino erit, nec primum secundum: neque uerò tertium quartum æquè multiplex, quemadmodum hoc in sequialteris, sesquialteris, atque huius generis superparticularibus alijs manifestum est. quod demonstrasse oportuit.

Exemplum prioris partis, ubi quantitates sunt multiples, atque sic etiam proportionales.

Vt	9	3	6	2
item	36	9	12	3
uel	16	4	8	2, &c.

Kk

Exemplum

Exemplum partis posterioris, ubi, licet quantitates sint proportio-
nales, tamen non contrà omnino æquæ multiplicēs.

Vt	6	4	3	2
	4	3	12	9
	5	3	15	9


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Κ.

Εάν ἢ τρία μέγθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα ἢ πλῆθος σκέδωτο λαμβανόμενα,
καὶ ἢ τῶν αὐτῶν λόγῳ, δὲ ἴσου δὲ ἢ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον ἢ καὶ ἢ τέταρτον
τοῦ ἑκτου μείζον ἴσαι, καὶ ἴσῳ ἴσῳ καὶ ἢ ἔλασθον ἢ ἔλασθον.

PROPOSITIO XX.

Si fuerint tres quantitates, & aliæ eisdem æquales multitudine, in ea-
dem cum duabus sumptis ratione, ex æquali autē prima tertia maior fue-
rit: & quarta sexta maior erit, & si æqualis: æqualis si uerò minor: minor.

Sint tres quantitates, totidem insuper aliæ, quæ eas quas priores, eo etiã ordi-
ne, inter se habeant rationes: dico, si prima priorum maior fuerit ipsa sua tertia, uel



ei æqualis, siue ea minor: & primam posteriorū ipsa sua tertia maiorem, ei æqualem, uel minorem ea esse. Quo-
niam enim prioris ordinis prima, ex hypothēsi, maior ponitur, quàm ipsa tertia: erit illius ad mediã, ex priore parte propositionis octauæ, maior quàm huius ad ean-
dem mediã ratio. Sed quia rationes in utroque ordine sunt inter se similes & ead-
em, prior scilicet priorī, po-
sterior uerò ratio posteriori: & posterioris ordinis prima ad mediã, maiorem quàm ipsa tertia rationem habebit: quare etiã, per priorem partem decimæ, prima posterioris, hoc est quarta, eadem sua tertia, hoc est sexta quãtitate maior erit. Eodem modo, si prima quàm tertia minor fuerit, per easdē pro-
positionum partes propo-

si-
tum inferri poterit. Quod si prima & tertia prioris ordinis quantitates æquales in-
ter se fuerint, cū, per priorem partem septimæ, una & eadem sit harum ad mediã
quantitatem ratio, propter rationum similitudinem, quæ in utroq; ordine esse præ-
supponitur: & in posteriori ordine prima ipsa tertiæ ex priorī parte proportioni no-
næ æqualis erit, quod demonstrasse oportuit.

APPENDIX.

Eadem ratio & in hac, & proximè sequenti propositione concludi potest, si quatuor aut plures etiam in uno ordine, totidem quoque similium rationum in altero quantitates positæ fuerint, si prima prioris maior sit sua ultima, ei æqualis uel minor ea: quòd & tum prima posterioris ordinis, respectu suæ ultimæ, similiter sese habeat.

Exemplum in numeris, ubi prima est.

	maior ul. ti.		ultima æqualis		minor ultima	
Prima	9	6	9	6	9	12
	6	4	6	4	6	8
	15	10	15	10	15	20
ultima	3	2	9	6	12	16
quant.	prior	poster.	prior	post.	prior	posterior
						ordo


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΑ.

Εὰν ἢ τρία μέγθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα ἢ πλῆθος, σιὺδ' νο λαμβανόμενα, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἢ δὲ τετραγυμνὴ αὐτῶν ἢ ἀναλογία, δὴ ἴσου δὲ ἢ πρῶτον τὸ τρίτον μείζον ἢ καὶ ἢ τέταρτον τὸ ἕκτον μείζον ἢ ἴσαι καὶ ἴσον ἢ ἴσον, καὶ ἢ ἴσον ἢ ἴσον.

PROPOSITIO XXI.

Si fuerint tres quantitates, & alia eisdem æquales multitudine, in eadem cum duabus sumptis ratione fuerit autem perturbata earum proportio, ex æquali autem prima ipsa tertia maior fuerit: & quarta sexta maior erit, & si æqualis: æqualis, si uerò minor: minor.

Sint tres quantitates, totidem insuper alia, quæ eas quas priores inter se habeant



rationes, sit tamen perturbata earum proportio: dico, si prima priorum maior fuerit ipsa sua tertia, uel eiaequalis, siue ea minor: & primam posteriorum ipsa sua tertia maiorem, ei æqualem, uel minorem ea esse. Quoniam enim prioris ordinis prima, ex hypothesis, maior ponitur quam ipsa tertia: maiorem etiam ad secundam prima quam ipsa tertia, ex priore parte propositionis huius, habebit rationem. Quoniam autem quæ primæ ad secundam in priori, ea etiam est, ex hypothesis, ratio secundæ ad tertiã in ordine posteriori: secundæ igitur

ad tertiam in ordine posteriori: secunda igitur ad tertiam ordinis posterioris, maior quam tertia ad secundam in ordine prioris ratio erit, unde sic maior etiam quam in eodem posteriori secunde ad primam, eo quod eiusdem secunde ad primam, ex nostra hypothesis & conuersa ratione, sit ut in prioris tertia ad secundam ratio. Quare ex posteriore parte propositionis decime huius, concluditur propositum, primam scilicet in ordine posteriori ipsa sua tertia, hoc est, quartam sexta quantitate maiorem esse. Simili modo, aequalitatem: & quod etiam quantitas quarta quam sexta minor sit, si prima tertia aequalis uel minor ea ponatur, inferemus. Si fuerint igitur tres quantitates, & alie eisdem aequales multitudine, in eadem cum duabus sumptis ratione, fuerit autem perturbata earum proportio, ex aequali autem prima ipsa tertia maior fuerit: & quarta sexta maior erit, & si aequalis: aequalis, si uero minor: minor. quod demonstrasse oportuit.

Exemplum in numeris, ubi prima.

	tertia maior		tertiae aequalis		minor tertia	
prima	9	24	9	16	6	16
	8	18	8	18	8	18
tertia	6	16	9	16	9	24

Aliud exemplum.

	9	16	24	12
	8		18	
9	6	12	16	


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΒ.

Εὰν ἢ τρία μέγθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα ἢ πλεονάζοντα, σὺν δυο λαμβανόμενα εἴη τῶ αὐτῶ λόγῳ, καὶ εἴ ἴσου εἴη τῶ αὐτῶ λόγῳ ἴσαι.

PROPOSITIO XXII.

Si fuerint tres quantitates, & aliae eisdem aequales multitudine, in eadem cum duabus sumptis ratione: & ex aequali in eadem ratione erunt.

Sint tres quantitates, totidem insuper aliae, quae eas quas priores, eo etiam ordine,



inter se habeant rationes: dico, quod & ex aequali prima ad tertiam prioris ea sit, quae primae ad tertiam ordinis posterioris, ratio. Sumptis enim primarum, hoc est, primae prioris & primae posterioris ordinis, quantatum aequae multiplicibus, secundarum item iisdem, seu utcumque alijs aequae multiplicibus positis, etiam tertiarum deinde quantatum aequae assignentur multiples. Et quoniam semper quatuor proportionalium, primae & tertiae, secunda item & quarta, aequae reperiuntur

reperiantur esse assignatę multiplicēs: erunt igitur ex propositione 4 huius, toties eam, quot in utroq; ordine quantitates reperiantur, minus tamen uno, repetendo, & ipsę multiplicēs, eodem ordine sumptę, inter se proportionales. Quoniam autem tres sunt quantitates, prioris scilicet ordinis multiplicēs, alię deinde ipsis equales numero, multiplicēs scilicet quantitatū ordinis posterioris, cum duabus sumptis, & in eadem ratione, cum sicut prima prioris sua ultima uel maior, ei æqualis, uel minor ea fuerit, sic & primā posterioris suam ultimā ex propositione 20 huius respicere oporteat: per 5 definitionem huius tandem concluditur propositum, primam scilicet prioris ordinis ad suam ultimam sese habere, ut se habeat prima posterioris ad suam ultimam. Si fuerint igitur tres quantitates, & alię eisdē æquales multitudine, in eadem cū duabus sumptis ratione: & ex æquali in eadem ratione erunt, quod demonstrasse oportuit.

APPENDIX.

Hęc propositio cum proximē sequenti, quemadmodum præmissę duę, non de tribus tantum, uerumetiam de pluribus quantitatibus intelligi potest, si modò in uno tot, quot & in altero ordine, quantitates constituantur.

Exemplum in numeris sit.

27	9		27	81
26	13		39	78
35	7		21	105
32	8		24	96
27	32		81	96
9	8	ut	27	24

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΓ.


Εὰν ἢ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτῶν ἴσα ἢ πλεονάζοντα, συνδύο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἢ δὲ τετραγμύνη αὐτῶν ἢ ἀναλογία: καὶ δὲ ἴσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἴσαι.

PROPOSITIO XXIII.

Si fuerint tres quantitates, & alię eisdem æquales multitudine, in eadem cum duabus sumptis ratione, fuerit autem perturbata earum proportio: & ex æquali in eadem ratione erunt.

Sint tres quantitates, atque totidem etiam alię, quę eas quas priores, perturbato tamen ordine, inter se habent rationes: dico, quod & ex æquali primę ad tertiam prioris, ea sit, quę primę ad tertiam ordinis posterioris, ratio. Sumptis enim primę & secundę in priori, & primę in posteriori ordine quantitatıs æquę multiplicibus, etiam reliquarum trium, tertię scilicet in priori, & secundę ac tertię in posteriori ordine æquę multiplicēs assignentur. Et quoniam, quę ipsarum partium seu submultiplicium, illa eadem est, ex 15 huius, etiam multiplicium ratio, & quoniam etiam, quę eidem sunt eadem rationes, ipsę inter se sunt eadem, utraq; propositione bis usurpata, semel quidem ratione multiplicium primę & secundę prioris, ac deinde etiam ratione multiplicium secundę quantitatıs & tertię ordinis posterioris: quam priores inter se habent rationem, illam eandem & posteriores multiplicēs habebunt. Simili modo, cum secunda prioris ad suam tertiam, ex hypothesi, sit, ut prima ad secundam in ordine posteriori ac deinde, ex permutata ratione

hæ nominatæ quantitates proportionales sînt: & secunda prioris ad primam posterioris ut tertiâ illius, ad secundam huius, & multiplicès quantitatùm, secundæ scilicet prioris & primæ posterioris ordinis, per easdem decimam quintam & undecimam propositiones huius eã, quam multiplicès tertiæ prioris, & secundæ quantitatís ordinis posterioris, habebunt rationem: atq; ex permutata deinde ratione, multiplicès secundæ & tertiæ prioris, ut multiplicès primæ & secundæ quantitatùm ordinis posterioris erunt. Ostensum autem est prius, quòd & multiplicès quantitatùm prioris ordinis, primæ & secundæ, in eadem sînt ratione, in qua sînt multiplicès secundæ & tertiæ quantitatùm ordinis posterioris. Quoniam autem tres sînt quantitates, atq; totidem etiã aliæ, in eadem cum duabus sumptis ratione, estq; earum perturbata ratio: quemadmodum igitur prima maior tertiâ, uel ei æqualis siue minor ea fuerit, ita ex propositione 21 huius, & quarta respectu ipsius sextæ erit. Quare per definitionem 5, huius concluditur tandem, ut quam in priori ordine prima ad tertiã habet rationem, illam eandem in posteriori ordine prima ad tertiã habeat. Si fuerint igitur tres quantitates, & aliæ eisdem æquales multitudine, in eadem cum duabus sumptis ratione, fuerit autem perturbata earum proportio: & ex æquali in eadem ratione erunt. quod demonstrasse oportuit.



licet prioris & primæ posterioris ordinis, per easdem decimam quintam & undecimam propositiones huius eã, quam multiplicès tertiæ prioris, & secundæ quantitatís ordinis posterioris, habebunt rationem: atq; ex permutata deinde ratione, multiplicès secundæ & tertiæ prioris, ut multiplicès primæ & secundæ quantitatùm ordinis posterioris erunt. Ostensum autem est prius, quòd & multiplicès quantitatùm prioris ordinis, primæ & secundæ, in eadem sînt ratione, in qua sînt multiplicès secundæ & tertiæ quantitatùm ordinis posterioris. Quoniam autem tres sînt quantitates, atq; totidem etiã aliæ, in eadem cum duabus sumptis ratione, estq; earum perturbata ratio: quemadmodum igitur prima maior tertiâ, uel ei æqualis siue minor ea fuerit, ita ex propositione 21 huius,

& quarta respectu ipsius sextæ erit. Quare per definitionem 5, huius concluditur tandem, ut quam in priori ordine prima ad tertiã habet rationem, illam eandem in posteriori ordine prima ad tertiã habeat. Si fuerint igitur tres quantitates, & aliæ eisdem æquales multitudine, in eadem cum duabus sumptis ratione, fuerit autem perturbata earum proportio: & ex æquali in eadem ratione erunt. quod demonstrasse oportuit.

Exemplum in numeris sit.

		Ordo			
		prior		posterior	
15	5	5		15	
6	2	10		20	
8	4	4		8	
15	6	ut	20	8	6
					15
					ut
					8
					20

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΚΔ.


Εὰν πρῶτη πρὸς δεύτην ᾗ αὐτῇ ἕκτη λόγος, καὶ τρίτη πρὸς τέταρτην, ἕκτη δὲ καὶ πέμπτη πρὸς δεύτην ᾗ αὐτῇ λόγος, καὶ ἕκτη πρὸς τέταρτην ἔστω τεθεῖμ, πρῶτη καὶ πέμπτη πρὸς δεύτην τῇ αὐτῇ ἕξει λόγος, καὶ τρίτη καὶ ἕκτη πρὸς τέταρτην.

PROPOSITIO

PROPOSITIO XXIII.

Si prima ad secundam eam habuerit rationem quam tertia ad quartam habuerit autem & quinta ad secundam eam rationem quam sexta ad quartam: & composita, prima & quinta, ad secundam eam habebit rationem, quam tertia & sexta ad quartam.


Sint sex quantitates, & esto quod prima ad secundam sit ut tertia ad quartam, similiter quinta ad eandem secundam, ut sexta ad quartam: dico ergo, & compositam



ex prima & quinta, ad secundam, eam quæ est compositæ ex tertia & sexta ad quartam, rationem habere. Quoniam enim prima ad secundam, ex hypothesi, est, ut tertia ad quartam, & rursus, quoniam quinta ad secundam, similiter ex hypothesi, est ut sexta ad quartam, ex conuersa ratione uerò, secunda ad quintam ut quarta ad quantitatem sextam: & prima ad quintam, iuxta ordinatam proportionem, ex æquali, per propositionem 22 huius, ut tertia ad sextam erit. Est autem diuisio rationis, unde ex rationis compositione, ut testatur propositio 18 huius, hæc quantitates proportionales erunt: prima igitur & quinta ad quintam, sicut tertia & sexta ad quantitatem sextam. Quoniam autem quinta ad secundam, ex hypothesi, est ut sexta ad quartam: quare rursus per eandem ordinatam rationem, cum duo iam quantitatum ordines appareant, cuiusmodi scilicet hæc proportio requirit, inferitur tandem propositum, primam scilicet & quintam coniunctim ad secundam se habere, ut se habent tertia & sexta, & ipsæ coniunctæ ad quantitatem quartam. Si prima igitur ad secundam eam habuerit rationem quam tertia ad quartam, habuerit autem & quinta ad secundam, &c. quod demonstrasse oportuit.

Exemplum huius in numeris sic.

	prima		secunda		tertia		quarta
	7	ad	9	ut	21	ad	27
quinta	6				sexta 18		
	13				39		




ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΕ.

Εάν τρία ἢ περισσότερα μεγέθη ἀνάλογα ᾖ, τὸ μέγιστον καὶ τὸ ἐλάχιστον, δύο τῶν λοιπῶν μέγιστα ἔσονται.

Si quatuor quantitates proportionales fuerint, maxima & minima duabus reliquis maiores sunt.

Sint quatuor eiusdem generis quantitates proportionales, qualitercunq; modo non sint in ratione æqualitatis, ut dicitur. nam hic nulla apparet quantitas maxima uel minima, quod nunc est contra propositionis hypothesim: dico, maximam cum minima reliquis duabus quantitatibus maiorem esse. Ponantur in maioribus quantitatibus portiones, ex propositione 3 primi, suis minoribus æquales. Et quoniam quantitates maiores, aut ex hypothesi statim, aut permutata ratione etiam usurpa-



ta, primò illam, quam ipse minores, secundò deinde, ubi quidem loco minorum, portiones, quas ipse minores in maioribus signata æquales habent, sumptæ fuerint, quam ipse portiones inter se habent rationem, cum iam totum sit ad totum, sicut ablatum ad ablatum: & reliquum ad reliquum, ex propositione 19 huius, ut totum ad totum erit. Quia autem ex maioribus una, necessariò altera maior esse debet: & reliqua illius ex prima parte propositionis 14 sola, uel eadem ipsa parte, premissa tamen permutata ratione, huius reliqua maior erit. Et quia etiam utraq; minor sitæ ablata est æqualis, si æqualibus æqualia addantur: & quæ proveniunt quantitates, utraq; uidelicet minor cum alterius ablata, inter se æquales erunt. Quòd si in idem æqualibus inæqualia, reliqua scilicet, addita fuerint, utrunque suo, ac debito ordine: & producta iam, ex communi quadam noticia, inter se inæqualia erunt. illud quidem maius, quod plus acceperit, alterum deinde minus. Cum igitur id quod maius est, ex maxima & minima, quod uerò minus, ex duabus quantitatibus reliquis compositum sit, propositio tandem constabit. Si quatuor igitur quantitates proportionales fuerint, maxima & minima duabus reliquis maiores sunt. quod demonstrasse oportuit.

Exemplum in numeris sit.


Maximus	ut	Minimus numerus
27	21	9
9	7	7
18	14	7

portiones minoribus æquales, & ablatae ex totis.
Reliqui numeri.

Reliqua

18	Reliqua	14	ut	27	Tota	21
Minor 9				Minor 7		
ablata alte. 7				ablata alterius 9		
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>				<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>		
16				16		
14				18		
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>				<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>		
30 minus, quia minus accepit				34 productum maius: quia maius acce.		

Sequitur hoc idem exemplum,
numeris tamen aliter positus.




maior 34 numerus

27	21,	ut	18	14
Minores				Ablatae por.
7				7
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>				<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>
9				9
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>				<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>
16				16
14				18
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>				<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>
30				34 &c.

FINIS LIBRI QVINTI.

LI ΣΧΟΛΙΟΝ


Λόγος ἐκ λόγων συγκείσθαι λέγεται, ὅταν πηλικότητος τινῶν λόγων
 πηλαπλασιαζόμενοι πρῶσι λόγον. Εκείνος ὁ λόγος συγκείσθαι ἐκ τῶν λό-
 γων ἐκείνων λέγεται, ὡς αἱ πηλικότητες ποιούσιν αὐτῶν. Πηλικότητας δὲ λέ-
 γει, ἀφ' ὧν ὀνομάζονται ὡς ἀπὸ τοῦ δύο ὁ διπλάσιος. Ἐσω λόγος τοῦ η' πρὸς



τοῦ δ' διπλασίω, καὶ αὐτοῦ τοῦ β' διπλασίω, καὶ αὐτὸς ὁ τετραπλά-
 σιος ἐν λόγῳ τοῦ η' πρὸς τὸ β' συγκεί-
 σθαι λέγεται ἐκ τῶν δύο λόγων, τότε
 η' πρὸς τὸ δ', καὶ τοῦ δ' πρὸς τὸν β', ὅ-
 τι αἱ πηλικότητες αὐτῶν ποιούσιν αὐ-
 τὸν οὕτως. Ἐπει, ὡς εἴρηται, πηλικότη-
 τος οἱ ἀριθμοὶ λέγονται, ἀφ' ὧν αἱ σχέσεις ὀνομάζονται ὡς ἀπὸ τοῦ δύο καὶ

τρία καὶ τέσσαρα, ὁ διπλάσιος, καὶ τριπλάσιος, καὶ τετραπλάσιος λόγος.
 ὀνομάζεται δὲ καὶ τὸ ἥμισυ ἀπὸ τοῦ ἐνός. ἔστι δὲ ὁ δύο τοῦ τεσσάρου ἥμισυς.
 λαμβάνω τὸ ἥμισυ τῆς μονάδος, ἀφ' ἧς ὁ δύο τῶν τεσσάρων ἥμισυς λέγε-
 ται, ὡς λεπτῶν πρῶτον λ λαμβάνω, καὶ ἑτόρον ἥμισυ μονάδος, ἀφ' ἧς πάλι
 λιρ ὁ δι' ἥμισυς λέγεται τῆς λ, καὶ πολλαπλασιάζω τὰ λ πρῶτα λεπτά ὑπὲρ τὰ λ
 πρῶτα, ἑαυτὰ λεπτά, καὶ γίνονται δευτέρω λεπτά, ἑξακόσια. ταῦτα ἀναβιβάζω
 ἥτοι μοιράζω, γίνονται δέκα καὶ πέντε πρῶτα λεπτά, ἅπανα δεκαπέντε πρῶ-
 τα λεπτά τέταρτον εἰσι μονάδος. τετράκις γὰρ κε ξ. Ἀλλὰ δὴ ἔσω ὁ μέσος
 τοῦ β, καὶ η', ὁ μ. καὶ ἔπει τὰ δύο τοῦ μ, εἰκοσὸν ὄσιν, λαμβάνω τὸν εἰκοσὸν τῆς
 μονάδος ὅν λεπτῶν τριῶν. Ἐπει πάλιν ὁ μ, πηνταπλάσιος ὄσιν τοῦ η' μόρος
 τοῦ μ ὁ η' λέγεται, πηλαπλασιάζω τὸν τρία ἑκοσὸν τοῦ ξ, πρῶτα τὸ ε, ἀφ' ἧς πέμ-
 πτην μόρον ὁ η' τοῦ μ λέγεται, καὶ γίνονται ιε λεπτά, ἀπὸ δέκα τέταρτον μονά-
 δος. καὶ οὕτως πάλιν ὁ β' τῆς η', τέταρτος ὄσιν. Ἐσω πάλιν μετὰ τῶν δ' εἰ β,
 ὁ η'. ἔπει ὁ δ' ἥμισυς ὄσιν τοῦ η', ὁ δὲ η' ὑφημιόλιος τῆς ι β. λαμβάνω τὰ λεπτά
 λ τῆς ἥμισυ τῆς μονάδος, καὶ ποιῶ τὰ μ λεπτά τῆς ὑφημιόλιον τῆς μονάδος,
 καὶ ποιῶ τὰ λ πρῶτα τὰ μ, καὶ γίνονται χίλια δεκακόσια, δευτέρω λεπτά, ἀναβι-
 βάζω ταῦτα, γίνονται πρῶτα λεπτά κ. τὰ κ τρίτον εἰσι μονάδος, ἑὸ δὲ ἐν τρί-
 τῶν ὄσιν τῆς ι β. Ἐσω μετὰ τῶν β' εἰ τοῦ ι β ὁ δ'. καὶ ἔπει ὁ δύο τῆς δι' ἥμισυ
 ὄσιν, ὁ δὲ δι' τοῦ ι β ἑποτριπλάσιος, λαμβάνω τὰ λ λεπτά, τῆς μονάδος
 ἥμισυ ἑὸ τὰ κ, τῆς τρίτου αὐτῆς. ἀπὸ γὰρ τῆς τρία ὁ τριπλάσιος πρῶτον ὀνομάσαι.
 καὶ πρῶτα τὰ λ ὑπὲρ τὰ κ, γίνονται ἑξακόσια δευτέρω λεπτά. ταῦτα ἀναβιβάζω,
 καὶ γίνονται δέκα πρῶτα, τὰ δέκα, ἑκτὴν μονάδος, καὶ ὁ β' ἑκτὴν τοῦ ι β.
 Πάλιν ἔσω μετὰ τῶν δι' καὶ ε, ὁ κ. καὶ ἔπει ὁ δ' ἑποπηνταπλάσιος ὄσιν τοῦ
 κ, ὁ δὲ κ τετραπλάσιος τῆς ε, λαμβάνω τὸν τῆς μονάδος πέμπτου, τὰ ι β, καὶ
 τῆς δ', ἐφ' ἧς ὁ ε' τετραπλάσιος λέγεται τῆς κ, καὶ ποιῶ τὸν τέταρτον πόδι τῶν διωδέ-
 κητον, γίνονται μ η' ἑποὐπτεταρτος τῆς μονάδος. καὶ ὁ δι' τοῦ ε, ἑποὐπ-
 τεταρτος ὄσιν. Ἐσω πάλιν μετὰ τῶν β, καὶ δι' ὁ γ. καὶ ἔπει ὁ δι' τοῦ γ ὑπὲρ
 τριπλῆσις, ἔπει ἔχθ' αὐτῆς καὶ τῆς τρίτου αὐτῆς ὄσιν μονάδος. λαμβάνω τὸν μονάδος,
 ἢ πρ

Ratio ex rationibus cōponi dicitur, quādo rationum quantitates, hoc est denominationes, multiplicatae, rationē cōstituunt. Ratio ex rationib. cōposita dicit, quā uidelicet rationum denominationes cōponunt. Quantitates uerò, hoc est denominationes rationū, dicunt, à quib. rationes denominātur, ut à duob. dicitur dupla. Sit ratio octonarij ad quaternarium dupla, atq; etiā ipsius quaternarij ad binariū dupla & ipsa: quadrupla igitur ratio, octonarij ad binariū, cōponi dicit ex duab. rationib. octonarij scilicet ad quaternariū, & quaternarij ad binariū. ambarū etenim rationū denominationib. cōposita hęc denominatio cōstituit. Quoniā ergo, ut dictū modò est, quātitates, seu denominationes rationū numeri dicuntur, à quib. habitudines nominātur, describūtur ac referunt inter se, ueluti à binario ternario ac quaternario: dupla, tripla ac quadrupla ratio. Nominat



uerò & dimidiū ab uno, sunt aut duo ipsius quaternarij dimidiū. Capiō igitur dimidiū unius (integri scilicet, ut numeri 60 cū is cōmodissime distribui in minutias possit) à q̄ duo ipsius quaternarij dimidium dicit, quarū acceptarū partiū, 30 accipio: & alterū dimidiū illius unius, à q̄ iterū quaternarius octonarij medietas dicitur. & multiplico 30

prima minu. ad, hoc est cū 30 min. & fiūt secūda min. 900, hęc in 60 scilicet traduco seu diuido, fiūt 15, prima min. q̄ sanē 15 prima mi. quarta pars sunt unius, seu integri. quater .n. 15, sexaginta scilicet cōtinent. Proinde esto binarij & octonarij medius 40. Et q̄niā 2 ipsius 40 uigincuplū sunt, accipio uigincuplum, unius seu integri, nēpe tria minu. At uerò rursus 40 quincuplū sunt octonarij: pars ipsius 40 octonarij dicit, multiplico 3 uigincuplā partē ipsius 60, cū 5 denominante octonariū in 40, & fiunt 15 min. quarta pars integri, 60, s. q̄ denominatio q̄q; est inter 2 et 8, positos num. Esto rursus inter ipsos 4 & 12 octon. q̄niā 4. dimidiū sunt octonarij, 8 uerò ipsius duodenarij subsesquialter: accipio mi. 30, dimidiū integri, & facio 40 min. subsesquialterz integri, & facio 30 ad 40, & fiunt 1200 secun. mi. quib. diuisis, fiunt prima mi, 20 & uiginti tertiu sunt integri: et quatuor igit tertium sunt duodenarij. Esto inter binariū & 12 quaternarius, & q̄niam binarius quaternarij dimidiū est, quaternar. v̄o duodenarij subtripplus, accipio 30 min. unitatis seu integri dimidiū: 20 deinde, tertiu ipsius. à ternario enim tripla denominat, & facio 30 cū 20, fiunt 60 secun. min. quib. in integrz diuisis, fiunt 10 prima, q̄ 10 sexta pars sunt integri: & 2 sexta pars est duodenarij. Rursus, sit inter 4 & 5 num. 20. & q̄niā quaternar. subquincuplus est ipsius 20, numerus v̄o 20 ad 5 quadruplus, accipio integri 5 partē, nimirz 12, & quaterna. à q̄ quinarij quadruplus dicit ipsius 20, & facio quadruplū, ad 12, fiunt 48, subsesquiquartū integri: & 4 ipsorz 5 subsesquiquartū est. Esto rursus inter 2 & 4 ternarius. Et quoniam 4 ad ternarium est sesquitercius, cū ipsum & tertium ipsius, quæ est unitas, habeat, accipio integrz,

quod est 60 min. à q̄ integro tertiū existente ternarij, quaternarius sesq̄tertium ipsius dicit̄. accipio & 30, integri dimidiū, per quæ 3 ad 2 sesquialterz erit. nominat̄ uerò sesquialterz à dimidio, & facio 30 ad integrum, utpote 60 min. & fiunt 1800, secunda min. his diuisis, & fiunt 30 prima min. hæc dimidium sunt integri; quare & binarius ipsius quaternarij dimidiū est.

Ratio ex duab. siue ex plurib. rationib. cōponi dicitur, quando rationū quātitates, hoc est denominationes, multiplicatę, aliquā rationis quātitatē cōstituunt. Habeat igit̄ primū ad secundū, rationē datā, ueluti duplā, aut triplā, siue aliquā aliā, habeat & secundū ad tertiū, rationē, & ipsam datā; dico q̄ primi ad tertiū ratio, ex primi ad secundū, & secūdi ad tertiū rationibus, cōposita sit. Aut, quando primi ad secundū rationis quantitas cum secūdi ad tertium rationis quātitate multiplicata fuerit, quantitatē primi ad tertiū cōstituit. Sit igit̄, et primò quidē, primū maius secundo, secundū

itē maius tertio, esto etiā, q̄d primū quidē ad secundum duplā, secundū v̄ò ad ipsum tertiū triplā rationē habeat. Quoniā em̄ secundū triplū est ipsius tertij, ipsius uerò secūdi duplū ipsum primū: primū igit̄ ipsi⁹ tertij sexcuplū erit, qm̄. n. si triplū alicui⁹ duplicauerimus, ipsius sexcuplū p̄ducitur: hoc enim est ppriē cōpositio. Aut sic, qm̄ primū secūdi duplū est, subdiuidat̄ primū in partes ipsi secundo æquales: uocētur aut̄ hæ prior & posterior. Et qm̄ secundū ipsius tertij triplū est, æqualis uerò est prior primi pars ipsi secundo: & hæc eadē pars, ut ipsum secundū, tertij tripla erit. primū igit̄ ipsius secūdi est sexcuplū, q̄ igitur primi ad tertiū ratio (cōiuncta p̄ secundū, mediū terminū) ex primi ad secundū & secūdi ad tertiū ratione, cōposita est.

12 6 2 Similiter v̄ò & si minus fuerit secundū utrisq̄ ipsorū, primo scilicet & tertio, cōtrahētur illa. Esto em̄ iterz primū quidē secūdi triplum,

6 secundū v̄ò tertij dimidiū. Et qm̄ secundū est tertij dimidiū, secūdi v̄ò triplū est ipsum primū: primū igit̄ ipsius secūdi sesquialterz erit, qm̄. n. si dimidiū alicuius triplicauerimus, habet̄ ipsum semel & dimidiū. Et qm̄ primū secūdi triplū, secundū v̄ò ipsius tertij dimidiū est: qualiū primū est trium secundo æqualiū, taliū est & tertiū duorū, qua p̄pter sesquialterz est primū ipsius tertij, primi igit̄ ad tertiū ratio (ut q̄ per secundū, mediū eius terminum cōiuncta est) ex primi ad secundum et secūdi ad tertium ratione cōposita est. Sed rursus, sit secundū utrisq̄ illorū, primo & tertio, maius,

4 & sit quidē primū secūdi dimidia pars, secundū v̄ò tertij sesq̄tertium. Quoniā igit̄ quantū est primi dimidiū, tāta est secūdi quarta: quāta v̄ò est secūdi q̄rta pars, tāta est primi cū tertio una quinta: dimidia igit̄ primi, tertia deinde tertij, inter se æqualia erunt. Primi igitur ad tertium, nimirz 2 ad 3, ratio, p̄ secundum, mediū eius terminum, cōiuncta est. Similiter etiā & in plurib. in reliqs

etiā casib. Et manifestum est, q̄ si à cōposita ratiōe una qualiscunq̄ cōpositarū auferat̄, una simpliciū sublata, reliq̄ ratiōes cōpositarū cōprehēdant̄.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ ΧΕΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

EVCLIDIS ELEMENTORVM GEO- metricorum liber sextus.

ΟΡΟΙ.


Ομοία σχήματα εὐθύγραμμά εἰσι, ὅσα τὰς τε γωνίας ἴσας ἔχῃ καὶ μίαν, καὶ τὰς πᾶσι τὰς ἴσας γωνίας πλοῦράς, ἀνάλογον.

Ἀντιπερυστότα δὲ σχήματα εἰσι, ὅταν ἑκάστῳ τῶν σχημάτων ἡ γωνία καὶ ἡ πλοῦρα ἀνάλογον ᾖ.


DEFINITIONES.

- 1 Similes figuræ rectilinææ sunt, quæ & angulos æquales habent ad unum, & quæ circa angulos æquales latera, proportionalia.
- 2 Reciprocaæ autem figuræ sunt, quando in utraq; figura antecedentes & consequentes termini rationales fuerint.

Exempla definitionis primæ.



Exempla definitionis secundæ.



Αἴτιον

Ἀκρόν καὶ μέσον λόγον ὁμοῖα τετμηῶσαι λέγεται, ὅταν ἢ ὡς ἡ ὅλη πρὸς τὸ μείζον τμήμα, οὕτως τὸ μείζον πρὸς τὸ ἔλασσον.


3 Secundum extremam & mediam rationem recta linea diuidi dicitur, quando fuerit, sicut tota ad maius segmentum, sic maius ad segmentum minus.

Tota 12	—	6	—	18	—	180	—	Tota 8	—	4	—	12	—	80	
		maius segmentum			minus					maius			minus		
		12 ad			180 — 6	ut				180 — 6 ad			18 — 180		
		8			80 — 4					80 — 4			12		
		Similiter													


Υψὸς ἐστὶ παντὸς σχήματος, ἢ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἢ τῆς βάσεως κείτης ἀγομένη.

4 Altitudo uniuscuiusque figuræ est, à uertice ad basim ducta perpendicularis.


Sunt autem huius definitionis exempla hæc.



Alia exempla.



Similiter alia.



Λόγος

Λόγος ἐκ λόγων συγκείμεθα λέγεται, ὅταν αἱ τῶν λόγων πηλινότητες ἐφ' ἑαυτὰς πολλαπλασιασθεῖσαι, πρῶσί τινα λόγον.

5 Ratio ex rationibus componi dicitur, quando rationum quantitates multiplicatæ inter se, aliquam effecerint rationem.

Ut rationē duplam, cuius quantitas est 2, componunt & constituunt rationum sequialteræ & sesquitertia, quantitates, $1\frac{1}{2}$ & $1\frac{1}{3}$, multiplicatæ inter se, ut sequitur,

Componentes		Composita ratio	
$\frac{3}{1\frac{1}{2}}$	$\frac{4}{1\frac{1}{3}}$	12	uel 2
Sesquialtera	Sesquitertia	6	1
			Dupla

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΠΡΩΤΗ. Α.


Τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα, τὰ ἐπὶ τῷ αὐτῷ ὑψώματι ὄντα, πρὸς ἀλλήλων ἴσιμός αἱ βάσεις.

PROPOSITIONES.

PRIMA. I.


Triangula & parallelogramma, quæ sub eodem sunt uertice: ad se sunt ut bases.

Describantur sub una altitudine aliquot triangula, uel parallelogramma: dico, utra descripta fuerint, illorum eam inter se esse rationem, quæ est basium. Prolongentur in utranq; partem ultra figuram bases, unicuiq; deinde basi in sua continuata portione, aliquot portiones (siue uni basi tot quot alij, siue pauciores) sibi sumantur æquales. atq; tandem, si quidẽ triangula proposita fuerint, extremitatibus por-



tionum singulis cū uertice illius trianguli, cuius basi hæc portiones sunt æquales, rectis lineis iunctis: Vel, si parallelogramma fuerint, tot, quot portiones sunt, parallelogrammis, secundum portionum atq; descriptorum parallelogrammorum laterum quantitatem descriptis, figura demonstrationis perfecta erit. Quare nunc ad demonstrationem ipsam. Triangula siue parallelogramma cū, ex hypothesi, sint æque alta, utrinq; etiam æquales bases habeant: erunt tam hæc, ex 36, quàm illa, ex propositione 38 primi, inter se æqualia, Quàm multiplex igitur est utriusque basis basiū aggregatum, tam multiplex etiam erit utriusq; trianguli uel parallelogrammi, id quod ex triāgulis uel parallelogrammis colligitur. Quod si forte iam basium aggregatum in una, ex structura, æquale fuerit basium aggregato in collatione altera:

tera & ipsa tota triangula, ex 38, seu parallelogramma, ex propositione 36 primi, ex utraq; parte inter se æqualia erunt. Quòd si uerò unum alterum excefferit, uel ab




eo defecerit: & triangula seu parallelogrāma tum eodē modo sese habebunt. Quatuor igitur nunc quantitatis, toties quidē prout multa uel pauca triangula seu parallelogramma proposita fuerint, ordinatis, quarum prima & secūda sint bases triangulorum seu parallelogrammorum positorum, tertiā uerò quantitas & quarta basibus his superposita triangula seu parallelogramma, cum iam primæ & tertiæ, secundæ item & quartæ æquē sint assignatæ multiplicēs: infertur tandem, per definitionem 5 quinti, id quod uolebat propositio: Triangula scilicet & parallelogramma, si sub uno & eodē uertice fuerint, in suarum basium ratione esse, quod demonstrari oportuit.

8	9	32	36	12	9	72	96
4	3	16	12	4	3	24	32
Triangulorum bases		Ipsa trian- gula		Parallelogram- morum bases		Ipsa parallelo- gramma.	

APPENDIX.

Potest hæc res de triangulis tantū demonstrari, ut scilicet sit (cū de uno dicatur) in demonstrando facilior progressus. Quo facto, cum parallelogrammum & triangulum, ubi eandē basim habuerint, atq; etiā inter lineas æquedistantes fuerint, per propositionem 41 primi, illud ad hoc duplum sit, cumq; etiam partes eodem modo multiplicium, per propositionem 15 quinti, eandem habeant rationem: & alterum, de parallelogrammis, tandem sic se habere infertur, quod admonuisse oportuit.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ Β.


Εὰν τριγώνω πρὸς μίαν τῶν πλευρῶν ἀχθῆ τις εὐθεία πρὸς ἀπὸ τοῦ ἀντιπαρακείμενου ἑνὸς τῶν ἄλλων ἰσῶν ἰσῶν τῶν τριγώνων πλευρῶν. Καὶ ἰὰν αἱ τῶν τριγώνων πλευραὶ ἀνάλογον τμηθῶσιν.

τμηθῶσιν· ἢ ὑπὸ τὰς ῥυθμὰς ὑδιζουγνυμένη εὐθεῖα πρὸς τὴν λοιπὴν ἴσως τοῦ τρί-
γώνου πλευρὰν πρὸς ἄλληλην.

PROPOSITIO II.


Si ad unum trianguli latus ducta fuerit recta quædam linea parallela: proportionaliter hæc secat trianguli latera. Et si trianguli latera proportionaliter secta fuerint: quæ ad sectiones iungitur recta linea, ad reliquum tertium latus parallela erit.

Describatur triangulum, ducatur in eo etiam, ab uno latere ad reliquorū utrumlibet, recta quædam linea, reliquo tertio trianguli lateri parallela: dico, quantum ad partem priorem, latera illa per ductam parallelam ἀναλογικῶς, hoc est proportionaliter, secta esse, sic scilicet, quemadmodum se habet superior unius secti lateris pars ad suam inferiorem, uel contrā, inferior ad superiorem, ita in altero superior uel infe-



rior pars ad reliquam se habeat. Porro si recta in triangulo ducta linea, duo eius latera proportionaliter secet: hæc ducta, quantum ad partem posteriorem, lateri tertio parallela erit. Quantum igitur ad partem priorem. Cum triangulum per ductam parallelam, ut apparet, in quadrilaterum & triangulū diuisum sit, ductis in quadrilatero duabus diametris: erunt quæ sic fiunt triangula, propterea quod unam & eandem lineam, ductam scilicet perpendicularē, pro basi habeant, in eisdem item parallelis sint, ex propositione 37 primi, inter se æqualia: eorum igitur, ad reliquum ultra quadrilaterum triangulum, per priorem partem pro-

positionis 7 quinti, una & eadem ratio. Cumq; etiam horum duorum æqualium triangulorum utrunq;, cum tertio reliquo æque altum sit, atq; sic, ex præmissa prima bis usurpata, eam, quā bases, inter se habeant rationē, cum quæ eidē sint eadem rationes, ex propositione 11 quinti, hæc inter se etiā eadem sint, hæc propositione bis usurpata, prior pars tandē manifestabitur. Sequitur posterior. Maneat eadem figuræ dispositio. Et quoniam latera, per ductam in triangulo lineam, ἀναλογικῶς ex hypothesis secta sunt, & quoniam etiam triangula, ad has portiones uel laterum



partes constituta, eam quam bases, inter se habent rationem: & triangulorum inter tertium latus & ductam in triangulo lineam comprehensorum, ad tertium reliquū, per propositionem 11 quinti, una & eadem ratio erit: unde sic etiam, per priorem partem nonæ eiusdem quinti, eadem triangula inter se æqualia: atq; tandem, per propositionem 39 primi, inter lineas æquedistantes. Ducta ergo in triangulo hæc
recta

recta linea, tertio lateri æquedistans erit. In triangulo igitur si ad unum eius, & cæ. quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ. Γ.

Εάν τριγώνου γωνία δίχα τμηθῆ, ἢ δὲ τέμνηται τῶν γωνίαν ὀρθῆς τέμνησιν ἢ τῶν βάσει· τὰ ἐκ τῆς βάσεως τμήματα ἔσονται ἰσοῦς λόγῳ τῶν λοιπῶν τῶν τριγώνου πλευρῶν. Καὶ ἐὰν τὰ ἐκ τῆς βάσεως τμήματα ἔσονται ἰσοῦς λόγῳ τῶν λοιπῶν τῶν τριγώνου πλευρῶν· ἢ ἀπὸ τῆς κορυφῆς πρὸς τὴν τομὴν ἡγῆσθαι ὀρθῆς, δίχα τέμνει τὴν τριγώνου γωνίαν.

PROPOSITIO III.

Si trianguli angulus bifariam secetur, secans autem angulum recta linea secet & ipsam basim: basis segmenta eandem habebunt rationem reliquis ipsius trianguli lateribus. Et si basis segmenta eandem habuerint rationem reliquis ipsius trianguli lateribus: à uertice ad sectionem ducta recta linea, bifariam secat ipsius trianguli angulum.

Describatur triangulum qualitercunque, ducatur etiam ab uno eius angulo ad latus suum subtendens recta linea, quæ, per propositionem 9 primi, ipsum angulum bifariam, latus uerò eius utcunque secet: dico, quantum ad partem priorem, secti lateris segmenta eam, quam duo reliqua latera, inter se habere rationem. Excitetur ex alterutra secti lateris extremitate linea per propositionem 31 primi, rectæ latus unum secanti, parallela, hæc deinde, latus insuper illud: quod ab altera secti lateris extremitate egreditur, usque dum concurrant, prolongentur. Et quoniam in has duas parallelas recta quædam linea, unum scilicet trianguli latus incidit: erit angulus, me-



dietas scilicet una diuisi, per primam partem propositionis 29 primi, suo coalterno angulo æqualis, atque mox deinde & altera, per illam eandem noticiam, Quæ unum sunt æqualia, &c. eidem coalterno æqualis erit. Sed quia hæc altera diuisi medietas, ut angulus externus, per secundam partem eiusdem 29, suo interno, qui scilicet sub πρῶτῳ ἀλλήλων ducta, ac producti lateris portione exteriori continetur, est æqualis: & illi duo anguli, ad πρῶτῳ ἀλλήλων ducta positi, per eandem

communem noticiam, inter se æquales erunt: triangulum igitur, per propositionem 6 primi, isosceles. Quod si quis propositionis 2 huius sententiæ recordabitur, æquali pro æquali linea sumpta: quod prius sumptum erat, tandem inferri poterit. Posterius nunc, quod scilicet, si ab aliquo trianguli angulo recta linea ad suam subtensam demissa fuerit, sic ut huius subtensæ uel basis segmenta eam quam reliqua latera, inter se habeant rationem, angulus ille bifariam diuisus sit, hoc sic patet. Maneat eadem figuræ dispositio. Et quoniam duo reliqua latera, ex hypothesi, illud deinde quod ulterius protractum est latus, & exterior portio, per propositionem 2 huius, eam, quam ipse diuisi lateris partes, inter se habent rationem, quia due rationes unum sunt eadem: illæ ex 11 quinti, & inter se eadem erunt. Hæc duæ igitur lineæ, portio scilicet exterior, & alterum trianguli latus, per secundam partem propositionis nonæ quinti, inter se æquales erunt. sicque triangulum isosceles, cuius anguli ad basim, lineam scilicet πρῶτῳ ἀλλήλων ductam, per priorem partem quintæ primi, inter se sunt

æquales. Quia uerò unus, ex prima parte propositionis 29 primi, uní: alter uerò, ex secunda parte eiusdem, alteri diuísi anguli parti est æqualis: ut ipsi isoscelis ad basim anguli, ex priore parte quinta primi: sic propter æqualitatem iam, & diuísi anguli partes inter se æquales erunt, quare bifariam diuísus. Si igitur trianguli angulus bifariam secetur, &c. quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ Δ.

Ἐπισηγώνων τε γώνων ἀνάλογον εἶσιν αἱ πλευραὶ, αἱ πρὸς τὰς ἴσας γωνίας: καὶ ὁμολογοῦν αἱ πρὸς τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνουσαι πλευραί.

PROPOSITIO IIII.

Æquiangulorum triangulorum: proportionalia sunt latera, quæ circum æquales angulos: & similis rationis latera, quæ subter æquales illos angulos subtenduntur.

Fiant duo triangula, qualia propositio hæc quarta requirit, hoc modo. describatur primò unum qualitercunq;, ducta deinde recta linea ad eius unam extremitatem per propositionem 23 primi, unus angulus uní, ad alterã deinde, uersus illam & eandẽ partem, alius alij trianguli angulo æqualis constituatur, ac continuatis duabus illis rectis donec concurrant, triangulũ hoc, ei quod prius descriptũ est, æquiangulum erit. Dico ergo nunc, cum




sint triangula equiangula, quòd & illorũ quæ sunt circa æquales angulos, latera, proportionalia sunt: eiusdemq; & similis rationis latera, quæ sub æqualibus angulis subtenduntur. Solent huius propositionis conclusionem alij aliter interpreta-ri. Sunt enim, qui prioris rationis terminos, antecedentẽ puta & consequentem, in uno, posterioris uerò, in altero triangulo accipiunt, in hæc uerba. In qua ratione sunt quælibet duo latera circa unum angulum in uno: in eadem sunt etiam duo,

circa angulum sumpto æqualem, latera, in triangulo altero. Præterea sunt, qui antecedentes in uno, in altero uerò triangulo consequentes rationum terminos accipiunt, hoc modo. In qua ratione sunt quælibet duo latera, duos in duobus triangulis æquales inter se angulos subtendentia: in eadem sunt etiam singula reliqua ad sua singula. Cuius sanè conclusionis duplex interpretatio, cū in scholis recepta sit, utriusq; etiam demonstrationem adducendam duximus. Prioris igitur talis est. Coniungentur triangula sic, ut unum unius & alterum latus trianguli alterius sit linea una: utq; anguli etiam, ad hæc latera exteriores, ipsis medijs, uterq; suo remoueri, sint æquales. Et quoniam in duas rectas, quæ sunt extrema horum triangulorum latera, ex duobus lateribus composita recta linea incidit, cum qui sic describuntur anguli, ex structura & propositione 17 primi (æquali tamẽ pro æquali angulo sumpto) duobus rectis angulis minores sint: in eadem parte hæc duo latera, uel has duas rectas continuatas cõcurrere, ex quadam communi noticia, necesse est. Continuentur ergo ut cõcurrant. Et quoniã id quod sic describitur, ex prima parte pro-

positionis

positiōnis 28 primī, bis usurpata, parallelogrammū esse cōstat, parallelogrammī in-
super latera opposita, ex propositione 34 primī, inter se equalia sunt: per propo-
sitionem 2 huius & permutatam ratio-



nem utroque bis usurpato, æquali
subinde pro æquali linea sumpta, ex
æqua ratiōne, quantum ad priorem
conclusionis interpretationem, pro
propositioni satisfactum erit. Vel, per
propositionem secundam huius, bis
usurpatam, cum duæ ratiōnes uni
eadem sint, atq; illæ sic, ex propo-
sitione 11 quinti, inter se eadem: &
posterior conclusionis interpreta-
tio manifesta erit. Aequiangulo-
rum igitur triangulorum, propor-
tionalia sunt latera, quæ circum æ-
quales angulos: & similis ratiōnis la-
tera, quæ subter æquales illos angu-
los subtenduntur. quod demon-
strasse oportuit.

APPENDIX.

Et licet utraq; cōclusionis interpretatio, ut diximus, in scholis recepta sit, tamen
cum non conueniat ex unius propositionis hypothēsibus duplicem conclusionis
colligere interpretationem, quod ex nostra sententia, prior posteriori interpreta-
tioni præferenda sit, lectorem scire uolumus. Habet tamen & posterior suam defen-
sionem, cum sit, ut conijcere licet, ex propositione 14 huius petita.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε.


Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς πλευρὰς ἀνάλογον ἔχῃ· ἰσογώνια ἴσασιν τὰ τρίγωνα·
καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας, ὅφ' ἂν αἰομόλογοι πλευραὶ ἕπωτείνονται.

PROPOSITIO V.

Si duo triangula latera proportionalia habuerint: æquiangula erunt
triangula: & æquales habebunt angulos, sub quibus similis ratiōnis late-
ra subtenduntur.

Describatur primò triangulum qualitercunq; ex tribus deinde rectis lineis alijs
quæ eas inter se quas descripti trianguli latera, rationes habent, aliud triangulum,
per propositionem 22 primī, constituatur. Erunt autem descripta duo triangula,
qualia propositio hæc quinta requirit: quare dico, quod ea etiam æquiangula sint,
angulos item qui sub similis ratiōnis lateribus subtenduntur, æquales habeant. Con-
stituantur ad unum utriusuis trianguli latus, atq; ad eiusdem lateris extremitates,
ex illa parte quæ est extra triangulū, per propositionem 23 primī, duo anguli, ad
utrāq; nimirum extremitatem unus, duobus in altero triangulo angulis æquales.
Et quoniam per continuationem linearum, illo triangulo clauso, tertius angulus

huius, tertio alterius triāguli angulo, ex corollario propositionis 32 primi, est æqualis: hæc duo triangula primò æquiangula, atq; inde, ex propositione 4 huius, late-



rum etiam proportionalium erunt. Duo igitur simul composita triangula, per propositionem 11 quinti, & nonam eiusdem, utroq; bis sumpto, æquilatera, per octavam deinde & 4 primi, uel octavam solū, ter repetitam, etiam æquiangula erunt. Quare per communem illam notitiam, Quæ uni sunt æqualia, &c. quantum satis fuerit ea repetita, infertur tandem conclusio, triangula scilicet talia proposita, inter se etiam æquiangula esse: atq; insuper, quod anguli in utroq; sub quibus similis rationis latera subtenduntur, æquales sint. Si duo igitur triangula latera proportionalia habuerint: æquiangula erunt triangula: & æquales habebūt angulos, sub quibus similis rationis latera subtenduntur. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 5.


Εὰν δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μιᾷ γωνίᾳ ἴσην ἔχῃ, πόδι δὲ τὰς ἴσας γωνίας τὰς πλοῦρας ἀνάλογον· ἰσογώνια ἔσαι τὰ τρίγωνα· καὶ ἴσας εἶναι τὰς γωνίας, ὑφ' αἷς αἱ ὁμόλογοι πλοῦραι ὑποτείνονται.

PROPOSITIO VI.

Si duo triangula unum angulum uni angulo æqualē, circa item æquales angulos latera proportionalia habuerint: æquiangula erunt triangula: & æquales habebunt angulos, sub quibus similis rationalis latera subtenduntur.

Describatur

Describatur primò triangulum, ducatur etiam recta quædam linea, ad cuius extremitatem deinde alteram, per propositionem 23 primí, angulo, qui sit uní ex triangulo æqualis, constituto, fiat ut hæ rectæ eam, quam in triangulo, circa sumptum angulum latera, inter se habeant rationem, & coniunctis extremitatibus tertia quædam linea, quod sic describitur triangulum, & prius descriptum, huiusmodi qualia hæc propositio requirit, triangula erunt: dico ergo nunc, quòd & æquiangula sint hæc eadem triangula: angulos item, qui sub similis rationis lateribus subtenduntur, æquales habeant. Constituuntur ad unum utriusvis trianguli latus, atq; ad eiusdem lateris extremitates, ex illa parte quæ est extra triangulum, per 23 primí, duo angulí, duobus in triangulo altero angulis æquales. Et quoniam per continuatio,



nem linearum illo triangulo clauso, tertius angulus huius, tertio alterius trianguli angulo, ex corollario propositionis 32 primí, est æqualis: hæc duo triangula primò æquiangula, atq; deinde ex propositione 4 huius, laterum etiam proportionalium erunt. Sed quia rationū quantitibus inter se collatis, inde, atq; etiã ex propositionis hypothese, duæ rationes eidem eadem sunt, cum hæ duæ, ex propositione undecima quinti, etiam inter se eadem sint, unam deinde uel antecedentem uel consequentem (pro ut quidem instituta collatio fuerit) quantitatem habeant: duo illa simul composita triangula, per propositionem 9 quinti, quartam deinde primí, & æquilatera & equiangula erunt. Quia uerò unum ex his uní ex datis, per structuram est æquiangulum, & alteri datorum idem æquiangulum erit: quare sic & ipsa inter se, per communem quandam noticiam: proportionalium igitur laterum, ex propositione 4. Si igitur, &c. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ζ.


Ἐὰν δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μιᾶ γωνίᾳ ἴσῳ ἔχῃ, πῶς δὲ τὰς ἄλλας γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνάλογον, τῶν δὲ λοιπῶν ἡ ἀπόσταμα ἅμα, ἢ ἴσῳ ἢ ἐλάσσονα, ἢ μὴ ἐλάσσονα ὁρθῆς ἴσῳ γωνίᾳ ἴσῳ τὰ τρίγωνα, ἢ ἴσῳ ἢ ἐξῆς τὰς γωνίας πῶς ἂν ἀνάλογον εἴσιν αἱ πλευραί.

PROPOSITIO VII.

Si duo triangula unum angulum uni angulo æqualem, circa autē alios angulos latera proportionalia habuerint, reliquorum uerò utrunque simul aut minorem, aut non minorem recto: æquiangula erunt triangula, &


& æquales habebunt angulos, circa quos proportionalia sunt latera.

Describatur triangulum, ducatur etiam recta quaedam linea, ad cuius alteram extremitatem angulus, unum ex triangulo æqualis, per 23 primi constituatur. Ex duobus deinde trianguli lateribus, quæ sunt circa alium, quam cui æqualem posuimus angulum, proportionales partes desumptæ, una in alterutra linea, ab angulo iam




formato incipiendo, signetur: altera uero pars, ex hoc puncto, angulo formato subtendatur: quæ ubi alteram lineam attigerit, quanta ipsa, ut tertium trianguli latus, esse debeat, apparebit. Danda autem est opera in hac alterius proportionalis partis applicatione, ut quemadmodum tertius in triangulo, primo descripto, angulus minor uel non minor recto est, ita & in altero, quod iam formatur, triangulo, tertius angulus existat. Erunt autem iam descripta duo triangula, qualia propositio hæc septima requirit: dico igitur, siue uterque ex

reliquis horum duorum triangulorum angulis, minor recto, æqualis, seu maior recto, fuerit: æquiangula esse huiusmodi triangula, atque eos qui sub similis rationis lateribus subtenduntur, angulos æquales habere. Primo igitur, aut enim illi duo, inter proportionalia latera anguli, sunt inter se æquales, aut inæquales. Si æquales fuerint, cum proposita duo triangula duos etiam angulos, ex hypothesi, inter se æquales habeant, tertius item tertio, ex corollario propositionis 32 primi, æqualis sit: huiusmodi triangula iam æquiangula esse concluditur. Quod si idem inter proportionalia latera anguli, inæquales inter se fuerint, tum, siue reliquorum uterque simul, aut minor, aut non minor recto fuerit, maiori angulo, ut minori æqualis fiat, per re-




etiam quandam lineam, quemadmodum docet propositio in primo 23, succurrendum est. Et quoniam duo triangula sunt, partiale unum, & alterum positum, quorum duo anguli unius, duobus alterius trianguli angulis æquales sunt, unus quidem unum, ex hypothesi, alter uero alteri, ex structura per propositionem 23 primi, cum & tertius nunc tertio angulo, ex corollario propositionis 32 primi, æqualis sit: triangula hæc, partiale scilicet & alterum positum, æquiangula, hinc etiam ex propo-

propositione 4 huius, laterum proportionalium erunt. Quoniam autem rationum quantitibus inter se collatis, inde, atque etiam ex propositionis hypothese, duæ rationes eidem eadem sunt, cum hæ duæ ex prop. 11 quinti, etiã inter se eadem sint, unam insuper quantitatem communem habeant: quæ reliquæ duæ harũ similibus rationum quantitates sunt, alterius nimirum partialis trianguli duo latera, ex propositione nona quinti inter se æquales erunt. Triangulum igitur isosceles, habens angulos, qui ad basim sunt, ex priore parte propositionis quintæ primi, inter se æquales, id quod in genere obseruandum est. Quod si iam ex proposito receptum sit, utrunque reliquorum non minorem recto esse, cum sic propter æqualitatem, & alter huius isoscelis angulus, non minor, hoc est rectus uel maior recto existat: duo in triangulo anguli, non minores duobus rectis existentes, collocentur. Id autem, cum obstante propositione in primo 17, per quam omnis trianguli duo quilibet anguli, duobus rectis minores sunt, nullo modo esse possit: neque etiam inæquales, sed æquales inter se inter proportionalia latera anguli erunt. Quare, &c. Sed esto iam ex proposito utrunque reliquorum minorem recto esse: cum sic alter, huius iso-



recto minor



recto minor

scelis, ad basim positus angulus, recto minor sit, ac per consequens huius isoscelis angulus exterior, per prop. 13 primi, recto maior: & ille qui in triangulo altero, ex corollario allegato, eidem exteriori est æqualis, similiter recto angulo maior erit, cum tamen sit positus recto minor, quod nunc est impossibile, unum & eundem angulum, iam minorem, atque deinceps angulo recto maiorem esse. Illos igitur sub proportionalibus lateribus comprehensos angulos, non inæquales, sed æquales inter se esse oportet: quare reliquus angulus reliquo, ex corollario, æqualis erit. Aequiangula igitur triangula huiusmodi proposita. Si duo igitur triangula unum angulum uni angulo æqualem, circa autem alios, &c. quod demonstrasse oportuit.

APPENDIX.

Præcepimus autem in structura, maiori angulo, ut minori æqualis fieret, succurrendum esse, & rectè quidem. Quod si contra aliquis, minorem ad æqualitatem maioris, per eandem propositionem 23 primi, augere uellet, tam facili opera propositionis demonstrationem inde colligere posset.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Η.


Εὰν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ὑπὲρ τῆς βάσεως κἀβέτω ἄχθῆ· τὰ πρὸς τῇ κἀβέτῳ τριγῶνα, ὁμοία ἔστι ἑκάστῳ τῶν ἄλλων καὶ ἀλλήλοις.

PROPOSITIO VIII.

Si in rectangulo triangulo ab angulo recto in basim perpendicularis ducta fuerit: quæ ad perpendicularem triangula, cum toti triangulo, tum ipsa inter se similia sunt.

Describatur triangulum rectangulum, demittatur etiam ab eius angulo recto, per propositionem 12 primi, ad suam subtensam linea perpendicularis: dico quod partialia illa triangula, totali, atque etiam sibiipsis, similia sint. Cum enim, ex qua-

dam communi noticia, omnes recti anguli inter se æquales sint, partialium in super




triangulorum utrunq; , ut apparet , unum angulum cum totali triangulo communem habeat: hæc tria triângula, totale & duo partialia, primò ex corollario propositionis 32 primi, æquiângula: statim deinde, ex propositione 4 huius, laterum proportionalium: atq; tandem, ex similitum figurarum definitione, etiam similia erunt. Si in rectangulo igitur triangulo, ab angulo recto in basim perpendicularis ducta fuerit: quæ ad perpendicularem triângula, cum toti triangulo, tum ipsa inter se similia sunt, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.

Εκ δὴ τούτου φαίνεται ὅτι, ἐὰν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας εὐθεΐα πρὸς τὴν βάσιν κἀθετῶσθαι, ἢ ἀχθῆν, ἢ ἀχθῆσα τῶν τῆς βάσεως τμημάτων μέση ἀνάλογόν ὄσιν. Καὶ ἐπὶ τῆς βάσεως καὶ ἐνὸς ὁποῦτος τῶν τμημάτων, ἢ πρὸς τῷ τμήματι πλοῦρά, μέση ἀνάλογόν εἰσιν. ὅπως ἴδει δεῖξαι.

COROLLARIUM.

Ex hoc manifestum est, si in rectangulo triangulo ab angulo recto in basim perpendicularis ducta fuerit: hanc ductam inter basis segmenta mediam proportionalẽ esse. Et insuper, inter ipsam basim, & utrunq; segmentum, latus, quod ad idẽ segmentum ponitur, mediũ proportionale.



Numeri uel quantitates proportionales.

9	6	4	6	6	6
13	√ 117	9	12	√ 72	6
13	√ 52	4	12	√ 72	6

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Θ.


Τῆς ὀρθείσης εὐθείας, ἢ πρὸς ἀχθῆν μὲν κἀφελῆν.

PROPOSITIO

PROPOSITIO IX.

De data recta linea, ordinatam partem abscindere.

Sit data recta linea, atq; propositum, ordinatam ab ea partem, utpote septimam,




tertiam, tredecimā, uel aliam quamcunq; abscindere. Alia igitur recta, satis longa, lineæ rectæ datæ angulariter applicetur, in qua officio circini, utcunq; extensi, ab angulo descendēdo, septem uel tredecim, hoc est tot, quot quidem ordinatæ partis, quæ abscindi debet, denominatio requisierit, æquales partes signentur, finis deinde septimæ (si quidē illa pars ordinata fuerit) cum altera datæ extremitate, linea quadam recta, ut triangulum fiat, iungatur. Quod si iam à fine primæ partis, huic ultimò ductæ rectæ, tanquam uni trianguli lateri, per propositionem 31 primi, parallela ducta, eaq; ad datam rectam usque continuata fuerit, factum iam erit propositum, id quod propositio huius 2 & composita ratio demonstrabūt. De data igitur recta linea, ordinata pars abscissa est, quod fieri oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ I.

Τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἂτ μὲν ὅμ, τῆ δὲ δοθείσῃ εὐθείᾳ τὴ μὲν μὲν ὁμοίως τὴ μὲν.

PROPOSITIO X.



Datam rectam lineam non sectam, datæ rectæ lineæ sectæ similiter secare.




Sint duæ rectæ lineæ datæ, una quidem indiuisa, altera uerò in partes, quot & qualitercunq; diuisa, atq; propositum, indiuisam in partes secūdum rationes partium diuisæ diuidere. Applicentur lineæ angulariter, accedat etiam tertia linea, qua liberæ datarum extremitates, ut triangulum fiat, iungantur, à punctis tandem diuisionū singulis, tertiæ lineæ parallelæ ductæ, atq; ad indiuisam lineam usq; continuatæ: propositioni satisfactū erit, atq; demonstratio talis. Ducantur à punctis diuisionum singulis, illo tantum, quod est tertiæ lineæ proximum, dempto, indiuisæ lineæ parallelæ,

Nn 2

atq;

atque hæ ad tertiam usque lineam, ut parallelogramma fiant, continentur. Et



quoniam parallelogrammorum locorum latera opposita, per propositionem 34 primi, inter se æqualia sunt: triangula etiam hic appareant, quorum duo latera, per lineam tertio lateri parallelam, diuisa sunt: per propositionem 2 huius, toties, quoties secta diuisa fuerit, uno minus, eam repetendo, æqualibus subinde pro æqualibus lineis sumptis, constabit propositum. Linea enim indivisa ad rationem diuise diuisa est, quod fieri oportuit,

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΑ.

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν, τρίτῳ ἀναλογου προσευρεῖν.

PROPOSITIO XI.


Duabus datis rectis lineis, tertiam proportionalem inuenire.

Sint duæ rectæ datæ, atq; propositum, tertiam proportionalem, ad quam scilicet se habeat secunda, sicut ad hanc secundam linea prima, inuenire. Connectantur rectæ datæ, ut angulum qualemcunq; comprehendant, & claudatur triangulum recta quadam linea alia. Productis deinde uel continuatis rectis datis, ex parte tertij lateris, quæ est linea modò ducta, ultra triangulum, uni earum, in continuata parte lineæ alterius, per

propositionem 3 primi, æqualis signetur, ab huius fine postea, ubi per propositionem

31 primi, tertio trianguli lateri parallela ducta fuerit, cū hæc eadem in altera prolongata per suam intersectionem tertie proportionalis quantitatem ostendat, propositioni satisfactum erit. Quoniam enim ad unum totalis trianguli latus recta parallela ducta est, cum hæc parallela reliqua nominati trianguli duo latera, per propositionem 2 huius, proportionaliter secet: æquali pro æquali linea sumpta, statim concluditur propositum: Duabus scilicet datis rectis lineis, tertiam proportionalem inuentam esse, id quod fieri oportuit.

Rectæ datæ



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΒ.


Τειῶν δοθεισῶν εὐθειῶν, τετάρτῃ ἀναλογου προσευρεῖν.

PROPOSITIO XII.

Tribus datis rectis lineis, quartam proportionalem inuenire.

Sint tres rectæ datæ, atq; propositum, quartam proportionalem inuenire. Iungantur prima recta & tertia, ut angulum qualemcunq; faciant, & claudatur triangulum,

gulum. Secunda deinde, uel alia, secundæ æqualis, primæ ad amissim iuncta, tertia uerò ultra triangulum continuata, à fine huius secundæ, ad continuatam usq̃, ter-



tio trianguli lateri, per propositionem 31 primi, parallela ducatur: & erit portio, re-
ctæ tertiæ & huic sectioni interiaccens, linea illa quæ quæritur. Hoc autem patet ex
2 propositione huius, æquali pro æquali linea sumpta. Tribus igitur datis rectis
lineis, quarta proportionalis inuenta est, quod fecisse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΓ.

Δύο δὲθεισῶν εὐθειῶν, μέστω ἀνάλογον προσευρεῖν.

PROPOSITIO XIII.

Duabus datis rectis lineis, mediam proportionalem inuenire.

Sint duæ rectæ datæ, atq̃ propositum, mediam ipsarum proportionalem, ad
quam scilicet se habeat una ex datis, sicut hæc ipsa media ad alteram, inuenire. Con-




iungantur ad amissim duæ rectæ datæ:
ex his deinde cōposita bifariã diuîsa,
ex puncto diuisionis super ipsam to-
tam, ad interuallum alterutrius me-
diætatis, semicirculus describatur.
Quòd si tandem à puncto coniu-
ctionis datarum, tanquam à puncto
in hac recta dato, ad angulos rectos li-
nea ad circumferentiã usque ducta
fuerit: quòd hæc ducta, media data-
rum proportionalis sit, sic demonstra-


bitur. Iungantur extremitates rectæ, ex duabus cōpositæ, cum intersectione ad
rectos ductæ & semicircūferentiæ, duabus rectis lineis. Et quoniã angulus in semi-
circulo, ex prima parte propositionis 31 tertij, rectus est, cum ab eo ad basim per-

pendicularis recta demissa sit: ex priore parte corollarij propositionis 8 huius, res tandem demonstrata erit, lineam scilicet illam, quam diximus, mediam inter datas proportionalem esse. Duabus igitur datis rectis lineis, media proportionalis inventa est, quod fieri oportuit.


Alia huius tredecimæ propositionis figuratio,
Sunt autem exempla duo.



Similiter alia, quatuor exemplis ornata.



Data autem rectæ lineæ sunt,



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ.

Τῶν ἰσῶν τε, καὶ μίαν μιᾶ ἴσῳ ἔχοντων γωνίαν ἑξάλληλογράμμων, ἀντιπεπύθασιν αἱ πλῆθυσαι, αἱ πόδι, τὰς ἴσας γωνίας. Καὶ ὡν ἑξάλληλογράμμων, μίαν


μία μὲν ἰσὺν ἔχοντων γωνίαμ, ἀντιπεπόμεναι αἱ πλευραὶ, αἱ ποδὲ τὰς ἴσας γωνίας ἴσῃ ὄσιν ἐκείνα.

PROPOSITIO XIII.


Æqualium, & unum uni æqualem habentium angulum, parallelogrammorum: reciproca sunt latera, quæ sunt circa æquales angulos. Et quorum parallelogrammorum unum angulum uni æqualem habentium, reciproca sunt latera, quæ sunt circa æquales angulos: æqualia sunt & illa.

Sint duo parallelogramma æqualia: & esto, quod unus angulus unius, sit uni alterius parallelogrammi angulo æqualis: dico, horum parallelogrammorum latera, circa æquales angulos, reciproca esse. Reciproca autem dico ea parallelogramma,

Duo parallelogramma æqualia data, &c.




quorum unius longitudo ad latitudinem alterius eam, quam longitudo alterius ad latitudinem prioris, habet rationem. Coniungantur igitur parallelogramma, ut angulum faciant, utq; anguli illorum æquales, sint circa unum punctum, longitudo insuper unius & latitudo parallelogrammi alterius ad amissimam unam lineam constituent. Quibus sic coniunctis, & reliqua duo circa æquales angulos latera, una linea erunt, sequeretur enim aliàs, si alterutrum horum cōtinueretur, siue per propositionem 15 primi, & communem illam noticiam, Eidem æqualia, &c. seu per propositionem 13 eiusdem primi bis usurpatam, & communem illam noticiam, Si ab




æqualibus æqualia auferantur, &cæ. partialem angulum suo totali esse æqualem, quod fieri non potest. Sunt igitur & reliqua duo horum angulorum latera, ad amissimam lineam una. Compleatur parallelogrammum tertium, secundum quantitatem laterum anguli utriusvis exterioris: eritq; demonstrationis figura parata. Et quoniam duo, primò descripta, parallelogramma, ex hypothese, sunt inter se æqualia: erit eorum ad tertium, per priorem partem propositionis 7 quinti, una & eadem ratio. Et rursus, quoniam etiam parallelogrammorum, quæ sub eodem uertice sunt posita, in eadem qua ipsæ bases, per primam huius, sunt ratione, hac prima propositione, deinde 11 quinti, ut. aq; bis usurpata, prior pars manifestabitur. Quod nunc etiam, quantum ad partem posteriorem, parallelogramma, quæ unum angulum uni æqualē, latera etiā circa illos æquales angulos reciproca habeāt: inter se æqualia sunt,

sint, cum, ex eadem prima huius, bis usurpata, & 11 propositione quinti, parallelogramma posita cum tertio unam & eandem rationem habeant: per priorem par-



tem propositionis 9 quinti, id tandem retinebitur. Aequalium igitur & unum uni aequalem habentium angulum, &c. quod demonstrasse oportuit.

Tertia huius propositionis geometrica figuratio.



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΕ.

Ἐῶν ἴσων, καὶ μίαν μιᾶ ἴσῳ ἔχοντων γωνίῳν τετραγώνων· ἀντιπεπύθασιν αἱ πλοῦρα, αἱ ποδὲ τὰς ἴσας γωνίας. Καὶ ἔῶν μίαν μιᾶ ἴσῳ ἔχοντων γωνίῳν ἀντιπεπύθασιν αἱ πλοῦρα, αἱ ποδὲ τὰς ἴσας γωνίας, ἴσα ἔσιν ἐκείνα.


PROPOSITIO

PROPOSITIO XV.

Æqualium, & unum uni æqualem habentium angulum, triangulorum: reciproca sunt latera, quæ sunt circa æquales angulos. Et quorum triangulorum unum angulum uni æqualem habentium reciproca sunt latera, quæ sunt circa æquales angulos: æqualia sunt & illa.

Sint duo triangula æqualia, & esto quod unus angulus unius sit uni alterius trianguli angulo æqualis: dico, horum triangulorum latera, circa æquales angulos, reciproca esse. Coniungantur triangula, ut angulum faciant, utq; anguli illorum æquales, quemadmodum in præmissa, sint circa unum punctum, antecedens insuper in uno & suum consequens in triangulo altero, ad amussim unam lineam

Triangula æqualia data.




faciant: ad amussim igitur sic, superiori ratione, & reliqua duo latera erunt. Describatur triangulum tertium, per lineam quandam rectam, ab uno angulo unius ad alterum, in eadem parte alterius trianguli angulum, ductam, eritq; demonstrationis figura parata. Et quoniam duo, primò descripta, triangula, ex hypothesi, sunt inter se æqualia: erit eorum ad tertium, per priorem partem propositionis septimæ quinti, una & eadem ratio. Et rursus, quoniam etiam triangulorum quæ sub eodem vertice sunt posita, in eadem qua ipsæ bases, per propositionem primam huius, sunt ratione: per eandem igitur primam & propositionem 11 quinti, utranq; bis usurpata, prior pars manifestabitur. Quòd nunc etiam, quantum ad partem posteriorẽ, ex unius illorum anguli æqualitate, & reciprocis circa illos æquales angulos lateribus, æqualitas inferatur, non aliter atq; posterior præcedentis propositionis pars, de parallelogrammis id retinebitur. Æqualium igitur & unum uni æqualem habentium angulum, triangulorum: reciproca sunt latera, quæ sunt circa æquales angulos. Et quorum triangulorum unum angulum uni æqualem habentium reciproca sunt latera, quæ sunt circa æquales angulos: æqualia sunt & illa. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ. 15.

Εὰν τεσσαρὲς εὐθείαι ἀνάλογον ᾖσι ἢ ἔσῳ τῶν ἄκρων πῶς ἐχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ἔσῳ, ἢ ἔσῳ τῶν μέσων πῶς ἐχόμενον ὀρθογώνιον. Καὶ εἰ ἢ ἔσῳ τῶν ἄκρων πῶς ἐχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ἢ ἔσῳ τῶν μέσων πῶς ἐχόμενον ὀρθογώνιον, αἱ τεσσαρὲς εὐθείαι ἀνάλογον ἴσονται.

PROPOSITIO XVI.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint: quod sub extremis




compre


comprehenditur rectangulum, æquale est ei, quod sub medijs comprehenditur rectangulo. Et si sub extremis comprehensum rectangulum, æquale fuerit ei quod sub medijs comprehenditur rectangulo: quatuor rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales, prima scilicet ad secundam ut tertia ad quartam: dico rectangulum sub prima & quarta comprehensum, ei quod sub secunda & tertia comprehenditur rectangulo æquale esse. Describatur ex quatuor rectis proportionalibus duo rectangula, utrunq; ex suis lineis. Et quoniam primæ

Rectæ quatuor
proportionales



Rectangula ex suis li-
neis descripta



ad secundam, lateris scilicet unius ad latus rectanguli alterius, ex hypothese, est ut tertiæ lineæ ad quartam, lateris nimirum huius ad latus illius: hæc duo rectangula, cum circa æquales angulos (omnes enim recti inter se æquales sunt) latera reciproca habeant, ex propositione 14 huius, inter se æqualia erunt: quæ est pars prior. Posterior iam, lineis scilicet quatuor rectis propositis, si rectangula sub prima & quarta,

sub secunda item & tertia, comprehensa, ex hypothese inter se æqualia sint: illas tum lineas proportionales esse, sic patet. Cum rectangula, ex hypothese, inter se æqualia sint, cumq; etiam omnes anguli recti inter se æquales: ipsa rectangula primò æquiangularia erunt, atque deinde circa æquales angulos, ex prioris parte propositionis 14 huius, latera reciproca habebunt, quæ est pars posterior. Si quatuor igitur rectæ lineæ proportionales fuerint: quod sub extremis comprehenditur rectangulum, æquale est ei, quod sub medijs comprehenditur rectangulo. Et si sub extremis comprehensum rectangulum, æquale fuerit ei quod sub medijs comprehenditur rectangulo: quatuor rectæ lineæ proportionales erunt. quod demonstrasse oportuit.

ALIA HVIVS PROPOSITIONIS DEMONSTRATIO.

Quatuor rectis lineis expositis, dico, si hæc rectæ, ex hypothese, proportionales fuerint, prima scilicet ad secundam ut tertia ad quartam: & quæ sub prima & quarta, sub secunda item & tertia linea comprehenduntur rectangula, inter se æqualia esse. Quòd si harum rectarum rectangula, quæ sub prima & quarta, subq; secunda & tertia comprehenduntur, ex hypothese, inter se æqualia sint: & ipsas rectas proportionales esse oportere. Quantum igitur ad partem priorem, excitentur à duabus, primæ & secundæ, rectarum extremitatibus, utræ hæ fuerint, per propositionem 11 primæ, duæ ad angulos rectos lineæ: de priori deinde excitata, à cõmuni puncto incipiendo, recta quartæ æqualis, ab altera uerò, tertiæ datæ æqualis recta, per propositionem 3 primæ, abscindatur, cõpleanturq; parallelogramma. Et quoniam prima ad secundam, ex hypothese, est ut tertia ad lineam quartam, cum lineis tertiæ & quartæ æquales aliæ in parallelogrammis positæ sint, æqualibus illis pro tertiæ & quarta sumptis: descriptorum parallelogrammorum circa æquales angulos latera reciproce proportionalia erunt: unum igitur parallelogrammum, ex prioris parte propositionis 14 huius, alteri æquale. Quare cum unū sub prima & alia quadam
recta


recta, quarta æquali: alterum uerò sub secunda & alia, tertie æquali, recta linea continetur, æquali pro æquali linea habita atque usurpata: prior pars nunc manifesta erit. Esto autem iam, quantum ad partem posteriorem, quòd sub prima & quarta comprehensum rectangulum, ei quod sub secunda & tertia cõprehenditur rectangulo, æquale sit: dico, quòd quatuor rectæ propositæ illo ordine proportionales sint. Eisdem namq; constructis, quoniam quod sub prima & quarta comprehenditur rectangulum, ex hypothesi, sub secunda & tertia comprehenso, æquale est: hæc descripta rectangula, cum unum quidem sub prima & alia quadam recta, quartæ æquali, alterum uerò sub secundæ æquali & tertia linea contineatur, æqualitas insuper linearum nullam uarietatem inducat, inter se æqualia erunt, atq; æquiangula etiam, propterea quòd omnes recti anguli inter se sunt æquales. Aequalia uerò & æquiangula parallelogramma, cum ex priore parte propositionis 14 huius, latera circa æquales angulos reciprocè proportionalia habeant: iam statim propter æqualitatem linearum, superiori ratione, & posterior huius propositionis pars manifesta erit. Si igitur quatuor rectæ lineæ, &c. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΖ.

Ἐὰν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾖσι· ἢ ἕκαστὸν τῶν ἀκέρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ἴσιν τῶ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ. Καὶ εἰ ἢ ἕκαστὸν τῶν ἀκέρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ἢ τῶ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ· αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ἴσονται.

PROPOSITIO XVII.

Si tres rectæ lineæ proportionales fuerint: quod sub extremis comprehenditur rectangulum, æquale est ei quod à media quadrato. Et si sub extremis comprehensum rectangulum æquale fuerit ei, quod à media quadrato: tres rectæ lineæ proportionales erunt.




Sint tres rectæ lineæ proportionales, prima scilicet ad secundam, ut hæc ipsa secunda ad tertiam: dico, rectangulum sub prima & tertia comprehensum, ei quod à media describitur quadrato, æquale esse. Quoniam enim ad secundam linea prima, hæc deinde eadem secunda ad tertiam lineam confertur, pro secunda collatione, puncto inter secundam lineam & tertiam ad placitum sumpto, ad id per propositionem 2 primi, linea recta secundæ æqualis ponatur, & erit ex priore parte propositionis 7 quinti, secundæ, & suæ æqualis ad lineam tertiam una & eadem ratio. Quatuor igitur cum sint lineæ proportionales, duarum item æqualium eadem sit quæ est unius, bis sumptæ, lineæ consideratio prior propositionis pars, ex præcedentis propositionis parte priorre concludi poterit, atq; deinde etiam, ex posteriore ipsa posterior. Si igitur tres rectæ lineæ proportionales fuerint: quod sub extremis, &c. quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΗ.


Ἀπὸ τῆς δρθείσης εὐθείας τῶ δρθῆντι εὐθυγράμμῳ, ὁμοίῳ τε καὶ ὁμοίως κίμενον εὐθύγραμμον ἀναγράφαι.

A' data recta linea, dato rectilineo, simile similiterq; positum rectilineum describere.

Sit recta linea data, rectilineum item datum, atq; propositum, à recta data ipsi dato rectilineo simile, similiterq; propositum rectilineum describere. Rectilineum illud datum aut erit Trilaterum, quadrilaterum, aut multilaterum. Si trilaterum, hoc est triangulum, fuerit rectilineum datum, ad unam extremitatem datæ, per propo-



sitionem 23 primi, unus angulus uni, ad alteram deinde, uersus illam & eandem partem, per eandem etiam propositionem, alius alij trianguli angulo æqualis constituitur, & continuatis lineis, donec altera alteri occurrat, cum tertius sic tertio trianguli angulo æqualis sit: hæc duo triangula iam æquiangula, deinde etiam per propositionem 4 huius, laterum proportionalium erunt. Quare ex definitione rectilinearum similium, à data recta dato rectilineo trilatero, simile trilaterum descriptum est. Quòd si iam unum, minus scilicet, alteri quod maius est, trilatero, uel triangulo applicetur sic, ut unum angulum ambo cõmunem habeant: tum hæc etiam similiter posita erunt. Quare factum est, quod propositio requirebat. Sed esto iam quòd rectilineum datum sit quadrilaterum, uel multilaterum, tunc primò id in sua



triangula soluendum, & cum uno eorum ac recta linea data, ut iam auditum est, pergendum erit, & uidendum deinde, quam in hoc triangulo angulus, qui est uni integro in rectilineo angulo æqualis, subtensam habeat, ut scilicet, ea cognita, ad ipsius extremitates alterius in rectilineo trianguli, quod scilicet primò absoluto coheret, duo anguli æquales collocentur, atq; continuatis lineis donec concurrant, cum tertius sic tertio huius alterius trianguli angulo æqualis sit: triangula hæc, ex structura æquiangula erunt, deinde etiam, ex 4 huius, laterum proportionalium, atq;

atq; tandem ex definitione, inter se etiam similia. Non aliter cum tertio, ac reliquis rectilinei triangulis singulis agendum erit. Et quoniam rectilineum, quale propositum erat, eo modo tandem describitur, propositioni igitur satisfactum erit, quod sic demonstrari potest. Quoniam enim rectilinei, super recta data descripti, tot triangula sunt, quot ipsius rectilinei dati: ex structura igitur & communi illa noticia, Si æqualibus æqualia addantur, &c. hæc duo rectilinea iam æquiangula erunt. Et quia ex propositione 4 huius, propter proportionalitatē laterum ipsorum triangulorum, euidenter apparet, illa etiam proportionalium laterum esse: per definitionem tandem similitum superficialium concluditur propositum.

APPENDIX.

Est hoc loco notandum, postquam primum iam triangulum absolutum, ac cum alijs deinde operari cœptum fuerit, ut partiales anguli singulorum, debito ordine suis partialibus æqualibus, & non temerè quilibet cuilibet, coniungantur. Nam hoc animaduerso, non erit laboriosum, neq; etiam molestum, qualicumque rectilineo, regulari uel irregulari, multorum item uel paucorum laterum, dato, simile similitèr q; positum à data recta linea rectilineum describere.

APPENDIX II.

Quoniam propositio mentionem facit rectilinei, & rursus quoniam sub rectilineo, ut quidem ex definitione patet, omnes rectarum linearum figuræ, siue trilatere hæ, quadrilateræ uel multilateræ fuerint, comprehendantur: in genere de omnibus rectarum linearum figuris hanc propositionem intelligendā colligimus. Hinc etiam factum, quòd per triangula, tanquam rectarum linearum figuram primam, hanc propositionem primò declarauimus.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΘ.

Τὰ ὅμοια τρίγωνα πρὸς ἀλλήλα ἐν διπλασίονι λόγῳ ἐσὶ, τῶν ὁμολόγων πλευρῶν.

PROPOSITIO XIX.


Similia triangula; inter se in dupla ratione sunt, similis rationis laterū;

Describantur duo triangula, unum quidem qualitercunq; alterum uerò per propositionem præcedentem, huic simile: dico igitur, triangula hæc duplicatam inter se habere rationem, quam habet latus unius ad similis rationis latus trianguli alterius. Lateribus illis, quorum rationem duplicatam inter se ipsa triangula habere debeant, tanquam duabus rectis datis, per propositionem 11 huius, tertia continuè proportionalis quærenda est, & id quidem uel longiori latere abbreviato, uel



breuiori aucto. atque ex hoc puncto deinde, seu inuentæ proportionalis termino, ad angulum quem abbreviatum uel auctum latus subtendit, linea recta ducenda.

Fiunt autem sic duo triangula, quorum alterum, cuius scilicet tertia proportionalis est unum latus, alteri integro adhuc, ex posteriore parte propositionis 15 huius, est æquale: id quod nulli nō, hypothesiū propositionis ac rationis permutatæ, quodq; rationes unī eadē, per propositionem 11 quinti, etiā inter se eadem sint, memori,



occurrere poterit. Rursus, quoniam tres sunt lineæ proportionales, duo scilicet propositorum duorum triangulorum latera, & tertia ad ea proportionalis inuēta, cum sic prima ad tertiam, ex quadam definitione in quinto exposita, sit in ratione eiusdem primæ ad lineam secundam duplicata, triangula deinde (quorum bases sunt prima & tertia lineæ) per propositionem primam huius, in suarum sint basium ratione, similium rationum quantitatibus alijs pro alijs sumptis: & hæc ipsa triangula primæ lineæ ad secundam rationem duplicatam habebunt. Quia uerò prima & tertia lineæ sunt expositorum similium triangulorum similis rationis latera, triangula porrò ipsa, unum quidem unī ex datis, alterum uerò alteri datorum æqualis: hoc considerato, propositum iam concludi potest. Similium igitur triangulorum ratio, &c. quod demonstrasse oportuit.

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α .

Εκ δὲ γύβου φανερὸν, ὅτι καὶ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὄσιν ἕσιν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως ἢ ἀπὸ τῆς πρώτης τρίγωνον, πρὸς ἢ ἀπὸ τῆς δευτέρας, ὁμοίον, καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον.

Ἐπίπεδον εἰδείχθη, ὡς ἡ γ β πρὸς τῆς β η, ὅπως ἢ α β γ τρίγωνον, πρὸς τῆς α β η τρίγωνον, τῶν π δ ε ζ. ἢ ἐπὶ εἰδείχθη.

C O R O L L A R I V M .

Ex hoc manifestum est, Quando tres rectæ lineæ proportionales fuerint, quòd sit, sicut prima ad tertiam, sic quod à prima fit triangulum, ad id quod à secunda descriptū fuerit simile, similiterq; positū triangulum.

Quoniam ostensum est, sicut prima recta linea, hoc est unum unius trianguli latus, ad tertiam proportionalem inuentam: sic & harum primæ & tertię linearum triangula, hoc est (æquali nimirum pro æquali triangulo sumpto) triangulum primæ ad triangulum lineæ secundæ, quod erat demonstrandum.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Κ.



Τὰ ὅμοια πολύγωνα εἰς τὰ ὅμοια τρίγωνα διαίρειται, καὶ εἰς ἴσα ῥ. πλῆθος, ἢ ὁμόλογα ῥ. ὅλοις. Καὶ τὰ πολύγωνα διπλασίονα λόγον ἔχει, ἢ πρὸς ἢ ὁμόλογος πλὴν πρὸς τὴν ὁμόλογον πλὴν πρὸς.

PROPOSITIO XX.

Similia polygona; in similia triangula diuiduntur, & æquali numero, & simili ratione totis. Et polygona duplicatam rationem habent, quam similis rationis ad similis rationis latus.



Describantur duo polygona, unum quidem qualitercunq;, alterum uerò per propositionem 18, huic simile: dico igitur, quòd hæc polygona in similia, & numero æqualia triangula subdividuntur, & quòd etiam triangula cum polygonis eandem rationem habeant. Polygonorum insuper ratio ea sit, quæ est lateris unius ad similis rationis latus polygoni alterius duplicata. Diuidantur polygona per lineas rectas in sua triangula. Et quoniam polygona, ex hypothethi, sunt similia, similes

porrò figuræ rectilines, ut ex definitione patet, æquales angulos ad unum, & quæ circa æquales angulos sunt latera, proportionalia habent, iam statim aliquot: subtractis uerò subinde æqualibus, ab angulis æqualibus, partialibus nimirum ab ipsis totis, singula unius singulis triangulis polygoni alterius



per propositionem 6 huius, æquiangula erunt: quare per propositionem 4 huius, & similibus figurarum definitionem, etiam similia. Polygona igitur descripta in similia, & æquali numero, triangula subdivisa sunt, quod est primum. Quantum ad secundum, quòd scilicet triangula illam, quam polygona, inter se habeant rationem. Quoniam enim polygonorum triagula, ut demonstratum est, inter se similia sunt:

erit illorum, per propositionem præcedentem, ratio, quæ est lateris unius ad similis rationis latus trianguli alterius duplicata. Hoc nunc toties, quot in utrovis polygono triangula reperiuntur, usurpato, cum quæ eidem eadem sunt rationes, ipsæ, per propositionem 11 quinti, & inter se eadem sint: per propositionem 12 tandem



eiusdem, id quod in hac propositione, de simili ratione triangulorum cum totis polygonis, secundo proponitur, concludi potest. Quantum igitur ad tertium, Quoniam triangula, ut demonstratum est, cum sint similia, in dupla ratione sunt similis rationis laterum: cum, quam triangula, illam eandem & ipsa polygona inter se habeant rationem: & polygona similis rationis laterum duplicatam rationem habebunt.

habebunt. Similia igitur polygona, in similia triangula diuiduntur, & cæ. quod demonstrasse oportuit.

ΠΟΡΙΣΜΑ Α.

Ωσαύτως δὲ, καὶ ὑπὸ τῶν ὁμοίων τετραπλῶν δειχθήσεται, ὅτι ἐν διπλασίονι λόγῳ εἰσι τῶν ὁμολόγων πλῶν. Εδείχθη δὲ καὶ ὑπὸ τῶν τριγώνων. Ωσεὶ καθόλου, τὰ ὅμοια σὺγγράμματα σχήματα πρὸς ἀλληλα ἐν διπλασίονι λόγῳ εἰσι τῶν ὁμολόγων πλῶν.

Καὶ ἐὰν α, β, γ ἡ τρίτω ἀνάλογον λάβομεν, πῶ ξ, η, β, α πρὸς πῶ ξ , διπλασίονα λόγον ἔχει, ἢ πρὸ η, α, β πρὸς πῶ ζ κ. ἔχει ἢ καὶ τὸ πολύγωνον πρὸς τὸ πολύγωνον (ὅμοιον) ἢ δὲ πρὸς τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον, διπλασίονα λόγον, ἢ πρὸ η ὁμολογῶν πλῶν πρὸς πῶ ὁμολογῶν, ταῦτα εἰσι η, α, β πρὸς πῶ ζ κ. εδείχθη ἢ ἄλλο καὶ ὑπὸ τῶν τριγώνων.

COROLLARIUM.

Similiter etiam in similibus quadrilateris demonstrari poterit, quod hæc in duplacione sint similis rationis laterum. Id autem & in triangulis demonstratum est. Proinde in uniuersum, Similes rectæ lineæ figuræ inter se in dupla ratione sunt similis rationis laterum.



Nam si duarum linearum proportionalis tertia capiatur: ipsa prima ad tertiam duplam, quam ad secundam, habebit rationem. Habent autem & Polygona similia, quadrilatera item duplam rationem, quam similis rationis latus ad similis rationis latus hoc est, quam prima ad lineam secundam. Demonstratum uerò hoc est & in triangulis, hinc.

ΠΟΡΙΣΜΑ Β.

Ωσεὶ καὶ καθόλου φανερόν, ὅτι ἐὰν τρεῖς σὺγγράμματα ἀνάλογον ὡσιν ἴσα ὡς ἢ πρῶτη πρὸς πῶ τρίτω, οὕτως ἢ ἀπὸ α πρῶτης εἰς β πρὸς ἢ ἀπὸ α δὲ τρίτης πρὸς πῶ ἴσα ὡς ἢ τῶν ὁμοίων καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον, ὅπου ἴδει δεῖξαι.

COROLLARIUM II.

Proinde etiam in uniuersum manifestum est, Quòd si tres rectæ lineæ proportionales fuerint: erit, sicut prima ad tertiam, sic quæ à prima specie ad eam quæ à secunda similis & similiter descripta est, quod demonstrasse oportuit.




ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Τὰ αὐτῶ ἐνθύγραμμά ὅμοια, καὶ ἀλλήλοις ὅμοια.

PROPOSITIO XXI.

Quæ eidem rectilineo similia, & inter se sunt similia.

Describatur primò rectilineum unum qualitercunq; ad placitum, per propositionem deinde 18 huius, duo uel plura alia descripto similia: dico, illa & inter se similia esse. Quoniam enim singula, per propositionem 18 descripta, rectilinea, ei quòd




primò descriptum est, similia sunt: cum sic singula etiam cum eodē primo, ex conuersione definitionis similibus figurarum, æquiangula sint, ac circa æquales angulos latera proportionalia habeant: porrò eidem æqualia, illa ex communi quadam noticia, & inter se æqualia: quæ insuper eidem eadem sunt, rationes, illæ ex propositione 11 quinti, inter se eadem sint: per definitionem tandem, & illa secundò descripta rectilinea, inter se similia erunt. Quæ igitur eidem rectilineo, & cæ, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΒ.

Ἐὰν τεσσάρων εὐθείαι ἀνάλογον ᾖσιν· καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶ ἐνθύγραμμα, ὅμοια τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα, ἀνάλογον ἔσται. Καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶ ἐνθύγραμμα, ὅμοια τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα, ἀνάλογον ἢ· Ἐὰν αὐτῶ εὐθείαι ἀνάλογον ἔσονται.

PROPOSITIO XXII.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint: & ab ipsis rectilinea, similia similiterq; descripta, proportionalia erunt. Et si à rectis lineis similia similiterq; descripta rectilinea, proportionalia fuerint: & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.




lia similiterq; descripta rectilinea, proportionalia fuerint: & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.


Sint quatuor rectæ lineæ, atque esto quòd hæ ex hypothesi proportionales sint: dico ergo rectilinea, ab ipsis similia, similiterq; descripta, proportionalia esse. Describantur à prima & secunda rectis lineis per 18 præcedentem, similia similiterq; posita rectilinea, hoc idē fiat cum rectis lineis tertia & quarta per eandem, primæ deinde et secundæ, tanquam duabus rectis datis,

Pp per

per propositionem 11 huius, tertia proportionalis inueniatur, atq; hoc idem contingat lineis tertia & quarta. Et quoniam prima ad secundam est, ex hypothesi, ut tertia ad lineam quartam, secunda uero ad aliam quandam, ex structura, sicut quar



ta ad aliam: ex æqua ratione, & extrema unius in alterius ordinis extremorum ratione erunt: per corollarium igitur secundum propositionis 20 huius, patebit prior pars. Sed esto iam, quod à rectis quatuor datis rectilinea descripta, similia similiterq; posita sint: quod tum ipsæ rectæ proportionales sint, sic retinetur. Inueniatur per 12 huius, primæ, secundæ & tertiæ, tanquam tribus rectis lineis datis, quarta proportionalis: ab hac deinde quarta, per propositionem 18 huius, rectilineum, tertio rectilineo simile similiterq; positum, describatur. Et quoniam prima, secun-



da, tertia, & iam inuenta, quatuor sunt, ex structura, lineæ proportionales, à prima uero & secunda, à tertia item & ipsa inuenta, similia similiterq; posita rectilinea descripta sunt, cum ipsa rectilinea eo ordine, ex priore parte propositionis huius, proportionalia sint: rectilineum primæ ad rectilineum lineæ secundæ, sicut tertiæ ad inuentæ rectilineum erit. Sed quia sic etiã est, ex hypothesi, rectilineum tertiæ, ad rectilineum lineæ quartæ: rectilinea igitur quartæ & iam inuentæ linearum, per proposi. 11 quinti, & posterior

rem partem propositionis nonæ eiusdem, inter se æqualia erunt. Et quia per propositionem 21 præcedentem, inter se etiam similia, cum similia similiterq; posita, & inter se æqualia, rectilinea, ab inæqualibus lineis describi non possint: inuenta & quarta posita, lineæ inter se æquales erunt, tertiæ igitur ad eas, ex posteriori parte propositionis nonæ quinti, una & eadem ratio, & illa quidem quæ est primæ ad lineam secundam. Atq; hæc est pars posterior. Si quatuor igitur rectæ lineæ proportionales fuerint, &c. quod demonstrasse oportuit.

Λ Η Μ Μ Α.

Οτι δε εαν ευθυγραμμα ισα και ομοια η, αι ομολογοι αυτων πλουρα ισασιν αλληλαις ειναι, δειξομεν ουτως.

ASSUMPTVM.

Quod uerò, si rectilinea æqualia fuerint, & similia, similis rationis latera ipsorum æqualia inter se sunt, sic demonstrabimus.

Sint æqualia & similia rectilinea, ea nimirum, quæ à quarta & inuenta linea descripta sunt, cum hæc, ex definitione similibus figurarum, latera habeant circa æquales angulos proportionalia: dico, illorum similis rationis latera inter se æqualia esse, id quod ab impossibili sic demonstrari potest. Esto quod inæquales inter se sint, quarta & inuenta (propter illas enim id assumptum est) æqualium ac similibus rectilineorum lineæ. Et quoniam æqualia ac similia sunt hæc rectilinea, cum quæ circa æquales angulos habent latera, ex definitione proportionalia sint, sicut quidem prima maior tertia uel minor fuerit, ita ex propositione 14 quinti, secunda linea respectu quartæ erit, duæ igitur rectæ cum sint duabus rectis alijs longiores, utraq; utraq; & rectilineum sub prioribus comprehensum altero rectilineo maius erit, cum tamen ipsa, ex hypothesi, sint posita inter se æqualia. Non sunt igitur inæquales inter se, sed æquales, quarta & inuenta lineæ, quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΓ.

Τὰ ἰσογώνια παραλληλόγραμμα, πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχουσαν συγκείμενον ἐν τῶν πλευρῶν.

PROPOSITIO XXIII.


Æquiangula parallelogramma, inter se rationem habent eam, quæ ex lateribus componitur.

Sint duo parallelogramma æquiangula: dico illorum inter se rationem, ex laterum suorum, quæ sunt circa æquales angulos, rationibus compositam esse.




Coniungantur parallelogramma cum angulis suis, quos habent æquales inter se, angulariter sic, ut unum latus unius, uel parallelogrammi uel anguli, uni lateri, alterius sit in directum una linea: & erunt, ex propositione 14 primi, & reliqua duo circa illos angulos latera in directum iuncta, describatur etiam secundum alterutrum anguli externi, & laterum ipsius quantitatem, parallelogrammum tertium, quas uerò rationes habent circa æquales angulos latera, in istis dem rationibus continuo ponantur. iam tres rectæ lineæ aliæ, prima quidē ad placitum ducta, secunda uerò & tertia ex propositione 12 huius, primæ adiungantur. Et quoniam quas habent latera parallelogrammorum inter se rationes, illas habent

iam ex structura, hæc tres rectæ ductæ, & rursus, quoniam parallelogrammorum,




quorum unus & idem uertex fuerit, ex prima propositione huius, in suarum ba-




sium sunt ratione, hac ipsa prima, propositione deinde 11 quinti, utraq; bis usurpata, & hæc tria parallelogramma, primum scilicet, tertium & secundum, in ductarum trium linearum ratione erunt, unde ex æqua ratione sicut prima ducta ad tertiam, sic & primum parallelogrammum ad secundum erit. Sed quoniã primæ lineæ ad tertiam ratio, ex primæ ad secundam, & secundæ ad lineam tertiam, hoc est ex datorum parallelogrammorum laterum, rationibus, composita

est: & parallelogrammum igitur prius ad posterius, rationem ex laterum rationibus compositam habebit. Aequiangula igitur parallelogramma, & cæ, quod demonstrasse oportuit.

Possunt huius secundæ figurationis parallelogramma etiam sic applicari.



Aliæ duæ huius propositionis geometricæ figurationes.



√ 289

√ 32

√ 9 uel 3

ΠΡΟΤΑΣΙΣ



ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΔ.

Πάντες παραλληλόγραμμοι, τὰ πρὸς τὴν διάμετρον παραλληλόγραμμου, ὅμοιοι εἶσι ἅδι τε ὅλῳ, καὶ ἀλλήλοις.

PROPOSITIO XXIII.

Omnis parallelogrammi, quæ circa diametrum parallelogramma, tam toti quàm ipsa inter se similia sunt.

Describatur parallelogrammum, cum sua diametro, lineæ deinde rectæ duæ, sese mutuo in diametro secantes, quarum una quidem duobus, altera uerò reliquis duobus parallelogrammi lateribus parallela sit, ducantur, & figura parata erit: dico ergo iam, quòd partialia, per quæ scilicet totius parallelogrammi diameter transit, parallelogramma, & toti, & sibiipsis inter se, similia sint. Quoniam enim in utroque triangulo, duabus scilicet totius parallelogrammi medietatibus, ducta est linea, tertio in triangulo lateri parallela, cum sic reliqua duo latera in utroque triangulo, ex propositione secunda huius, per ductam parallelam proportionaliter secta sint, hac propositione bis usurpata (sunt enim duo triangula:) & parallelogrammi latera per has duas, sese mutuo in diametro secantes rectas lineas, ex propositione 11



quinti, proportionaliter secta erunt. Quia autem diuisæ quantitates proportionales, hæ compositæ etiã, ex propositione 18 quinti, proportionales sunt: partialium igitur parallelogrammorum utroque, ex permutata ratione cum ipso totali parallelogrammo laterum proportionalium erunt. Præterea, quoniam lineæ, in diametro parallelogrammi sese mutuo secantes, oppositis suis lineis, ex structura parallelæ sunt: triangula partialia singula suis totalibus, ex secunda parte propositionis 29 primi, toties eam, quoties opus fuerit, repetendo, æquiangula, atque statim etiã totale parallelogrammum utriusque partiali parallelogrammo æquiangulum erit: proportionalium deinde laterum, ex 4 huius, eorum quæ circa æquales angulos. Et quia proportionalium laterum: simile igitur utroque ipsi toti per definitionem, quod est notandum. Sed quoniam, quæ eidem rectilineo similia, illa & inter se similia esse, propositio 21 huius testatur, & hæc ipsa partialia parallelogramma, eadem ratione, inter se similia erunt, quod & ipsum notandum. Constat autem sic tota propositio. Omnis igitur parallelogrammi, quæ circa diametrum parallelogramma, tam toti quàm ipsa inter se similia sunt, quod demonstrasse oportuit.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΕ.


Τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ, ὅμοιον, καὶ ἄλλῳ τῷ δοθέντι ἴσον, ἢ αὐτὸ συστήσασθαι,

PROPOSITIO XXV.

Dato rectilineo, simile, & alijs dato æquale, idem constituere.


Duobus rectilineis datis, propositum est, tertium, quod uni quidem ex datis simile, alteri uerò rectilineo æquale sit, describere. Rectilineorum utroque in sua trian-

gula soluto, ad unum latus illius rectilinei, cui debet fieri tertium simile, tanquamq




ad rectam lineam datam, per propositionem 44 primi, in dato alterius rectilinei uno angulo, tot parallelogramma, in quot triangula idem prius rectilineum solutum est, unicuiq; scilicet triangulo unum æquale, ordine præ tendantur, et erit totum compositum toti priori rectilineo æquale. Eodem modo ad

Vel contra, inveniatur, &c. unum huius totius compositi rectilinei latus, quod scilicet lateri, in rectilineo sum-



pto, minimè est oppositum, per eandem 44 propositionem, tot parallelogramma, in quot triangula alterum rectilineum diuisum est, unicuiq; scilicet unum æquale, in priori rectilineo angulo, præ tendantur. Erit autem sic illud huius totius parallelogrammi latus, atq; prioris parallelogrammi descripti, quod scilicet in rectilineo sumptum est, ex prop. 14 primi admissim una linea. Media igitur proportionali, inter dicta latera, per prop. 13 huius, inuenta, ab e: tadem rectilineum, quod sit priori rectilineo simile, similiterq; positum, per propositionem 18 huius describatur: & propositioni satisfactum erit, quod sic demonstratur. Quoniam tres sunt lineæ proportionales, duorum nimirum parallelogrammorum, quæ duobus rectilineis, utrunq; utriq;, æqualia sunt, duo latera, & media inter ea linea proportionalis inuenta, cum ab harum prima, atq; etiam secunda, similia, similiterq; posita rectilinea descripta sint: prima ad lineam tertiam erit, ex corollario propositionis uicesimæ secundo, ut quod à prima, ad id quod à secunda similiter descriptum est rectilineum. Et rursus, quoniam parallelogramma, quæ sub eodem uertice sunt posita, ex prima huius, in suarum basium sunt ratione: quam



√ 21845 1/3

rationem igitur habet rectilineum primum, ad id quod ex propositione 18 iam descriptum

scriptum

scriptum est, illam eandem habet etiam, ex propositione undecima quinti (duae enim rationes unisunt eadem) parallelogrammum, priori rectilineo aequale, ad id quod posteriori rectilineo aequale est, parallelogrammum, atq; ex permutata ratione deinde, per propositionem 16 quinti, rectilineum ad parallelogrammum ut rectilineum ad parallelogrammum. Sed quia rectilineum in priori collatione, est suo parallelogrammo, ex structura aequale: & in posteriori sic, propter rationum similitudinem, rectilineum suo pa-

rallelogrammo aequale erit. quare & rectilineo alteri, huic parallelogrammo aequali, idem rectilineum aequale erit. Est autem & priori simile. Duobus igitur rectilineis descriptis, tertium iam, uni quidem simile, alteri uero aequale, idem rectilineum descriptum est, quod fecisse oportuit.





Figura posteriori similis & priori aequalis.

rallelogrammo aequale erit. quare & rectilineo alteri, huic parallelogrammo aequali, idem rectilineum aequale erit. Est autem & priori simile. Duobus igitur rectilineis descriptis, tertium iam, uni quidem simile, alteri uero aequale, idem rectilineum descriptum est, quod fecisse oportuit.

autem & priori simile. Duobus igitur rectilineis descriptis, tertium iam, uni quidem simile, alteri uero aequale, idem rectilineum descriptum est, quod fecisse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΣ.

Εὰν ἀπὸ παραλληλογράμου παραλληλόγραμμον ἀφαιρεθῆ, ὁμοίον τε τῷ ὅλῳ & ὁμοίως κείμενον, κοινὴν γωνίαν ἔχον αὐτῷ + πῶς τῷ αὐτῷ διαμέτρῳ ὅτι τῷ ὅλῳ.

PROPOSITIO XXVI.

Si a parallelogrammo parallelogrammum auferatur, & simile toti & similiter positum, communem angulum habens ei: circa eandem diametrum est toti.

Describatur parallelogrammum, ab eo deinde aliud, sibi simile similiterq; positum, communem etiam cum totali angulum habens, parallelogrammum auferatur: dico, ablatum circa totalis paralle-




ogrammi diametrum consistere. Sumit haec propositio suam demonstrationem ab absurdo illo, Partem suo toti, uel contra, Totum suae parti aequalem esse, hoc modo. Ducatur ablati parallelogrammi diameter, ab angulo, quem cum totali communem habent incipiendo. Quod si haec, ulterius continuata, diameter etiam pa-

rallelogrammi totalis fuerit: uerum est quod dicit propositio. Si uero non, ducatur ab eodem communi angulo, si possibile sit, linea recta alia, quae sit totalis parallelogrammi diameter: puncto deinde intersectionis, huius diametri & lateris parallelogrammi ablati. linea, quae per ablatum parallelogrammum transeat, & insuper duo-

bus

bus totalis parallelogrammi lateribus, parallela sit, per propositionem 31 primi, excitetur. Et quoniam parallelogrammorum utrunq, ablatum quidem, ex hypothesi, quod uerò iam formatum est ex propositione 24 huius, totali parallelogrammo simile est: utriusq, igitur circa æquales angulos latera, ex definitionis similibus figurarum conuersione bis usurpata, atq, propositione 11 quinti inter se proportionalia erunt. Quia autē una & eadem



β

linea, illa scilicet quæ utrisq, est latus commune, ad duo reliqua horum parallelogrammorum latera, uel contrā (prout quidem in demōstratione processum fuerit) hæc duo ad commune illud latus, unam & eandem rationem habent: hæc duo reliqua latera, ex priore uel posteriore parte propositionis nonæ quinti, inter se æqualia erūt, longius breuiori, uel contrā, quod est impossibile. Propter illud absurdum igitur hæc duo parallelogramma, ablatum scilicet & totale, his propositionis hypothesibus, circa eandem diametrum consistere necesse erit. Si à parallelogrammo igitur parallelogrammum auferatur, &c. quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΖ.

Πάντων τῶν πρὸς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν πρῶτα βαλλομένων πρῶταλληλογράμων, ἢ ἐμειπντων εἶδει πρῶταλληλογράμοις, ὁμοίοις τε καὶ ὁμοίως κειμένοις, τῶ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἀναγραφομένου· μέγιστον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας πρῶταβαλλόμενον πρῶταλληλόγραμμον, ὁμοιον ὂν τῶ ἐμείμματι.

PROPOSITIO XXVII.

Omniū, circa eandem rectam lineam projectorū parallelogrammorum, eorum quæ specie deficiunt parallelogrammis, similibus, similiterq, positis ei, quod à dimidia linea describitur: si deficientia conferantur, erit quod ad dimidium proiectum est, & simile sumpto existit, omnium maximum.

Sensus propositionis est. Si eidem rectæ lineæ applicentur aliquot parallelogramma, unum quidem ad ipsius rectæ medietatem, alia deinde ad ipsam rectam utcunq, quæ tamen singula, ad completionem rectæ, deficient in parallelogrammis, specie similibus & similiter positis, ei quod ab altera medietate descriptum est: quòd tum medietati applicatū parallelogrammum omnium maximum sit. Recta




igitur linea data, ea primū bifariam secanda, atq, ab una eius medietate, parallelogrammum utcunq, describendum est. Ab altera deinde rectæ medietate parallelogrammum unum, duo uerò uel plura parallelogramma alia, à

uarijs, ad placitum sumptis, diuisæ lineæ partibus, quæ sint medietate ipsius rectæ uel longiores uel breuiores describantur. esto tamē quòd singule in parallelogrammis ei, quod primò ab una medietate diuisæ descriptum est, similibus, deficient. Di

co igitur,


eo igitur, quod tum, si deficientia conferantur, id quod à media descriptum est parallelogrammum, omnium maximum sit. Cum enim illa, in quibus ad rectam posita parallelogramma deficient, similia inter se, alterum item alterius sit ablatum, unum deinde angulum communem habeant: circa eandem diametrum hæc, ex præcedenti propositione 26, consistunt, qua igitur ducta, figura item descripta, ut scilicet $\pi\alpha\pi\lambda\eta\rho\acute{o}\mu\alpha\tau\alpha$ appareant, demonstratio sic succedet. Quoniam supplementa omnis parallelogrammi inter se æqualia sunt, æqualia insuper uel aliquod commune æqualibus additum, æqualia proueniunt. Et rursus, quoniam quæ sub eodem uertice sunt parallelogramma, si æquales bases habuerint, æqualia inter se sunt, eo



ordine procedendo, cum duo uni æqualia sint, æqualium uno pro altero sumpto; unum supplementum tandem cum altero simili, partiali ei, quod ad medietatem rectæ ponitur, parallelogrammo, æquale erit. Illis igitur æqualibus altero supplemento adiecto: ipse gnomon, qui scilicet, propter æqualitatem parallelogrammorum, pars est eius, quod à medietate altera descriptum est, parallelogrammi, alteri parallelogrammo æquale erit: totum igitur eo maius. Omnium igitur circa eandem diametrum, &c. quod demonstrasse oportuit.

ALITER.

Sit rursus à rectæ lineæ medietate descriptum parallelogrammum, in medietate altera deficiens, ab ipsa recta uerò parallelogrammum aliud, quod deficiat in parallelogrammo simili ei, in quo à medietate descriptum defecerat. esto autem quod illud alterum sit priori descripto parallelogrammo altius: dico ergo adhuc, id quod à medietate rectæ descriptum est parallelogrammum, maius esse, &c. Quoniam enim illa, in quibus ad rectam lineam posita parallelogramma deficient, ut in superiore figuratione sese habent,




ducta diametro, alia etiam recta linea propter supplementa accedente, demonstratio sic succedet. Parallelogramma, quorum unum est parallelogrammi spacii supplementum, habēs pro latere, lineam medietati rectæ æqualem, alterum uerò quod huic continuatum est, cum æquales bases habeant, æquæ etiam alta sint: erunt illa, ex 36 primi, inter se æqualia. Et quia

etiam

etiam parallelogrammorum supplementa omnis parallelogrammi spacij, inter se æqualia sunt, cum duo unæqualia, illa & inter se æqualia esse, ex quadam communi noticia receptum sit, ab horum equalium uno parallelogrammum, per quod diameter transit, ablatum: id quod relinquitur, alteri æquali inæquale erit. Quod si tandem his inæqualibus id, quod alterum eorum ad complendum parallelogrammum, à medietate diuisæ descriptum, desiderat, ex æquo adiectum fuerit, cum quæ sic proueniant, ex communi quadam noticia inter se inæqualia sint, maius autem eorum, id quod à medietate descriptum est, parallelogrammum, minus uerò alterum à recta data, &c. descriptum, concluditur propositum. Omnium igitur circa eandem rectam lineam projectorum parallelogrammorum, eorum quæ specie deficient, &c. quod demonstrasse oportuit.

Figura huius propositionis geometrica alia.



Habet hæc figura quatuor rectilinea, unum quidem ad medietatem ductæ præfectum, tria deinde alia, ut oportuit, ad aliquam datæ partem. Et quia singula ad totius datæ rectæ completionem in aliquo rectilineo deficient toti simili: dico igitur, quod ad medietatem comparatum est rectilineum, uno quoque ex reliquis maius esse. Id quod præter geometricam rationem uel in numeris patet, atque ob id etiam hæc figura posita est.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΗ.

Παρά τῶν δοθέντων εὐθείων τῶν δοθέντων εὐθύγραμμων, ἴσον πᾶσιν ἀλλήλοισιν ἰσοπέδων, ἐπιπέδων, ἢ ἰσοπέδων, ὅμοιον ὄντων τῶν δοθέντων.

Δεῖ δὲ τὸν δοθέντων εὐθύγραμμων, ὃ δεῖ ἴσον πᾶσιν ἀλλήλοισιν, μὴ μείζον εἶναι τῶν ἀπὸ τῶν ἰσοπέδων πᾶσιν ἀλλήλοισιν ὅμοιον ὄντων τῶν ἐπιπέδων, τότε ἀπὸ τῶν ἰσοπέδων, καὶ ὃ δεῖ ὅμοιον ἐπιπέδων.

PROPOSITIO XXVIII.

Ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum comparare deficiens specie parallelogrammo, quod simile existat rectilineo dato.


CAVATIO.

Oportet autem datum rectilineum, cui æquale comparandum est,

πολλ.


non maius esse eo, quod ad dimidiam comparatur similibus uidelicet existentibus, deficientibus specie, inter se, eo nimirum, quod ad dimidiam comparatur, ei quod simile specie deficit, existente simili.

Quoniam enim, ut habet propositio præcedens 27, si quæ parallelogramma ad rectam quandam lineam comparata fuerint, quæ singula ad completionem rectæ lineæ deficient specie parallelogrammis, similibus similiterque positis ei, quod à dimidiâ describitur, cum quod ad medietatem rectæ comparatur, ex propositione præcedenti 27 omnium maximum sit: hinc ergo factum est, quod huic 28 propositioni hæc cautio tanquam obseruatu digna adiecta sit. Nunc igitur quantum ad propositionem. Requirit hæc propositio primò rectam lineam, deinde uerò duo




rectilinea: proponit autem, quomodo ad datam rectam comparandum sit parallelogrammum, uni rectilineo æquale, quod minime maius existat ad medietatem rectæ comparato, similibus existentibus sumptis, sic ut ad completionem rectæ, specie parallelogrammo deficiat, al

teri rectilineo existente simili. Recta igitur linea ac rectilineis datis, ipsa recta primùm bifariam secetur, ab alterutra deinde rectæ medietate rectilineo, quod alteri ex dato simile existat, per propositionem 18 huius descripto, à quo id deficiet ad com



pletionem rectæ, etiam cõpleatur: & erit ille defectus alteri rectilineo, *ἢ ἢ ὀλιγόν*, aut æquale, aut eo maius. Si æquale, factum erit propositum: parallelogrammum nimirum ad rectam datam, uni rectilineo dato æquale, deficiens specie parallelo-


grammo, quod alteri dato rectilineo simile est, comparatum. Quòd si defectus ille altero rectilineo maior fuerit: & quod à rectæ medietate, per propositionem 18 de



scriptum est rectilineum, propter æqualitatem, eodem altero rectilineo maius erit. In quo igitur excedit, tali excessui parallelogrammum, quod etiam ut ipsum totum alteri dato simile sit, per propositionem 25 huius describatur, & erit illud cū rectilineo dato uno, iam toti parallelogrammo æquale: toti etiam per se, ex propositione 21 huius, simile: laterum igitur

quæ habet circa æquales angulos, proportionalium. Et quoniã huic toti, quod scilicet dato uni rectilineo simile, ad medietatem etiam rectæ positum est, alteri rectilineo cum iam descripto parallelogrammo æquale est: erit contra, hoc totum parallelogrammū iam descripto solo maius: quare & illius, quàm huius, latera longiora. In longioribus igitur breuioribus æqualibus signatis, compleatur parallelogrammum: eritque illud ei, quod per propositionem 25 descriptum est, parallelogrammo æquale: ipsi insuper toti ex propositione 21 huius, simile: circa eandem

igitur diametrum hæc, parziale nimirum & totale parallelogrammum ex 26 huius



consistunt. Ducatur ergo diameter, & describatur figura. Et quoniam totum hoc parallelogrammum rectilineo uni, & excessui æquali descripto paralle-

logrammo, est æquale, assignatum uerò in eo parallelogrammum, excessui æquale, cum ex communi quadam noticia, si ab æqualibus æqualia subtrahantur: & ea que relinquuntur æqualia sint: subtractione igitur facta, gnomon, qui ex una parte relinquitur, rectilineo cuidam, ex altera parte relicto, æqualis erit. Sed quia ipsi gnomoni, ut ex primo libro facile colligitur, æquale est ad rectam comparatum parallelogrammum: quare ex communi quadam noticia, eidem relicto rectilineo hoc parallelogrammum æquale erit, deficitque specie parallelogrammo, ad complendum totum, eo quod est alteri rectilineo dato simile. Ad datam igitur rectam lineam, dato rectilineo, &c. quod fieri oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΘ.

Παρά τῷ δοθείσῃ εὐθείᾳ, τῷ δοθέντι ἐνθυγράμῳ, ἴσῃ πᾶσι πᾶσι ἀλλοῖο γράμμῳ πᾶσι ἀβαλεῖν, ἑωδὲ βάλῃον εἶδει πᾶσι ἀλλοῖο γράμμῳ, ὁμοίῳ τῷ δοθέντι.

PROPOSITIO XXIX.


Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum comparare, excedens specie parallelogrammo, simili dato.

Et hæc propositio, ut præcedens 28 duo rectilinea, & rectam lineam datam requirit. Proponit autem, quomodo ad datam rectam comparandum sit parallelogrammum, quod quidem ipsum esset uni rectilineo æquale: excessus uero ipsius, qui est ultra rectam lineam, alteri specie similis. Recta igitur linea ac rectilineis datis,



ipsa recta primum, ut in præcedente, bifariam secetur: ab alterutra deinde rectæ medietate parallelogrammo, uni ex dato rectilineo simili, per propositionem 18 huius, descripto, aliud deinde, quod & ipsum sumpto rectilineo simile sit, iam uerò descripto cum rectilineo dato altero

æquale existat, per propositionem 25 huius describatur: hæc igitur, quod scilicet iam descriptum est, & prius positum, cum uni sint rectilineo similia, ex structura, inter se etiam, per prop. 21, similia erunt, ac similis rationis latera circa æquales angulos habebunt. Et quoniam unum altero parallelogrammo, ut totum super parte, maius est: & latera illius quàm huius parallelogrammi latera longiora erunt. Brevioribus igitur ad suarum longiorum quantitatem continuatis, parallelogrammo etiã deinde cõpleto: quod sic describitur, ei, cuius longiora sunt latera, æquale, atque



etiam simile erit: quare & alteri descripto, cuius nimirum latera continuata sunt, ex

ex 21 huius simile: circa eandem igitur hæc duo parallelogramma diametrum, ex propositione 26, consistunt. Ducatur igitur diameter, & describatur figura. Et quoniam totum hoc parallelogrammi spacium, suo gnomoni & alteri parallelogrammo ad medietatem rectæ comparato, ut suis partibus, est æquale, æquale etiam ex communi quadam noticia, huic alteri parallelogrammo & uni rectilineo, ablato de illis communi: & reliquus gnomon, ex una parte, rectilineo æqualis erit. Cum igitur supplementa omnis parallelogrammi spacij, ex propo. 43 primi. cumq; etiam parallelogramma, super æqualibus basibus in eisdem item parallelis constituta, ex 36 eiusdem, inter se æqualia sint: huius memor, æquali pro æquali, hoc est, loco gnomonis ipso rectilineo, sumpto, res tandem concludetur. Ad datã igitur rectam lineam dato rectilineo, &c. quod fecisse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ. Λ.

Τὴν πῶτερον εὐθείαν πεπρασμένην, ἀκροῦ καὶ μέσου λόγον τεμῆν.

PROPOSITIO XXX.

Datam rectam lineam terminatam, per extremam ac mediam rationem secare.

Proponit hæc propositio idem quod in secundo propositio decima, sub alijs tamen uerbis. Sit igitur recta lineam terminata data, atq; propositum, eam per extremam & mediam rationem secare. Describatur igitur, per propositionem 46 primi, à recta data quadratum, ad lineam deinde, rectæ datæ πρὸς ὀρθὰς insistentem, alter-



Portio lon. $\sqrt{80} - 4$
breuior $12 - \sqrt{80}$

utram, parallelogrammum, quod ipsi quidem quadrato æquale: ultra uerò quadratum de eo proiectum, eidem quadrato etiam simile sit, per propositionem 29 comparetur. Et quia per huius parallelogrammi alterum latus, quod scilicet per quadratum transit, recta data, ut iussim, diuisa est: propositioni igitur satisfactum erit: demonstratio deinde hoc modo colligenda. Quoniam enim à recta data descriptũ, quadratum est ex structura: quadratum igitur est & id, propter similitudinem, quod ultra quadratum de parallelogrammo porrigitur. Et rursus, quoniam parallelogrammum, ad latus, rectæ datæ conterminale, per propositionem 29 applicatum, æquale est, ex structura, rectæ datæ quadrato: igitur eo quod hæc duo æqualia commune habent, de ijs ablato, & quæ relinquuntur, per communem quandam noticiam, inter se æqualia erunt. Sed quia sunt etiam æquiangula: latera igitur eorum circa æquales angulos, ex priore parte propo-

sitionis 14 huius, reciprocè proportionalia erunt. Quare, cum quadratorum latera ex definitione, inter se æqualia sint, parallelogramma insuper latera opposita, ex propositione 34 primi, æqualia inter se habeant: ex definitione lineæ, extrema & media ratione diuisæ, iam infertur propositum, quòd scilicet recta data, extrema & media ratione diuisa sit, quod fieri oportuit.

Exemplum in numeris.

Sit totus numerus

10 18 24 39 52 &c.

Qq 3 Portio

ELEMENTORVM EVCLIDIS	
Portio maior	minor
$\sqrt{125} - 5$	$15 - \sqrt{125}$
$\sqrt{205} - 9$	$27 - \sqrt{205}$
$\sqrt{718} - 12$	$36 - \sqrt{718}$
$\sqrt{1901\frac{3}{4}} - 19\frac{1}{2}$	$58\frac{1}{2} - \sqrt{1901\frac{3}{4}}$
$\sqrt{3380} - 26$	$78 - \sqrt{3380}$

Exemplum geometricum aliud.

Data recta $\sqrt{80} +$	breuior Long.
termi. 4	

Portio longior 8
breuior $\sqrt{8} - 4$

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΛΑ.

Εν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις ἢ ἀπὸ τῆς πλὴν ὀρθῆς γωνίας ἕποταινύσης πλευρᾶς εἶδ' Θ', ἴσων δὲ τῶν ἀπὸ τῆς πλὴν ὀρθῆς γωνίας πλευρᾶς πλὴν ἑσῶν εἶδει, τῆς ὁμοίως καὶ ὁμοίως ἀναγραφομένης.


PROPOSITIO XXXI.

In reſtangularibus triangulis: quæ, ab reſtū angulum ſubtendente, latere ſpecies deſcripta fuerit, ea æqualis eſt eis, quæ ſimiles ſimiliterq; poſitæ à lateribus reſtū angulum continentibus deſcribuntur.

Eſt hæc propoſitio aliquanto generalior, & latius ſe extendit quàm quæ eſt in primo quadrageſima ſeptima, cum hæc de quadratis tantum, illa uerò de omnis generis reſtularum linearum figuris, modò ſimilis delineationis fuerint, intelligatur. Sit igitur triangulum reſtū, ab illius etiam unoquoque latere reſtilineum deſcriptum, primum quidem à latere uno, ut lubet, à reliquis deinde reliqua, quem admodum docet propoſitio 18: dico ergo, reſtilineum lateris quod ſubtendit angulum reſtū, reliquis duorum laterum reſtilineis æquales eſſe. Ducatur ab angulo trianguli reſtū, per propoſitionem 12 primi, ad baſim perpendicularis. Et quoniam partialia deſcripta triangula, per propoſitionem 8 huius, & toti, & ipſa inter ſe ſimilia ſunt: æquiangula igitur hæc; & latera circa æquales angulos proportionalia habebunt. ſcilicet, ſicut ſe habet ſubtendens reſtū totalis trianguli, ad utrunq; circa reſtū angulum lateris, ſic & in utroq; partiali triangulo, reſtū angulo ſubteſa, ad utrunq; alterum. Sed quoniam tribus reſtilis lineis proportionalibus exiſtentibus, cum, per corollarium ſecundum propoſitionis 26 huius, prima ſit ad tertiam,

ut

ut quæ à prima ad illam quæ à secunda, similis similiterq; posita species describitur, ratio, eodem corollario bis usurpato, conuersa in super ratione & illa bis sumpta, cum sex quantitates appareant, quarum prima quidem ad secundam est ut tertia




ad quartam, quinta uerò ad eandem secundam ut sexta ad quartam, atq; ita, per propositionem 24 quinti, prima cum quinta ad secundam, sicut tertia cū sexta ad quantitatem quartam: sicut prima cum quinta secundæ, ita & tertia cum sexta quartæ quantitati æqualis sit, hinc propositioni satisfactū erit. In triangulis igitur rectangulis, quæ ab rectum angulum subtendente latere species descripta fuerit, ea æqualis est eis, quæ similes similiterq; positæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur, quod demonstrasse oportuit.

ALITER.

Figuræ, à rectanguli trianguli lateribus descriptæ, sunt, ex hypothesi, inter se similes: & quoniam similes figuræ, ex corollario propositionis 20 huius secundo, in duplicata ratione sunt similis rationis laterum, habet uerò & quadratum ad quadratum suorum laterum duplicatam rationem: & rectilinei igitur ad rectilineum, ex propositione 11 quinti, ut quadrati ad quadratum ratio erit. Hæc sic omnia bis usurpata, cum etiam iam sex quantitates, quales propositio 24 quinti requirit, appareant, per eandem & propositionem quadragesimam septimam primi, de triangulis rectangulis expositam, infertur tandem propositum.

Qq 4

Alia




ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΒ.

Εὰν δύο τρίγωνα συντεθῆ, ἢ ἓν μίαν γωνίαν, τὰς δύο πλευρὰς ταῖς ἀπὸ τῆς κοινῆς ἀνάλογον ἔχοντα, ὥστε τὰς ὁμολόγους αὐτῶν πλευρὰς καὶ πρᾶξι-
λας εἶναι λοιπὰ τῶν τριγώνων πλευρὰν ἢ εὐθείαν ἴσοντες.

PROPOSITIO XXXII.

Si duo triangula, duo latera duobus lateribus proportionalia habentia, secundum unum angulum composita fuerint, sic ut proportionalia illorum latera parallela sint: tum reliqua illorum triangulorum latera in rectam lineam erunt.

Sint duo triangula qualia hæc propositio requirit, quorum unius duo latera illam, quam duo alterius trianguli latera rationem constituent. Hæc autem applicentur secundum unum eorum angulum sic, ut latera rationis in uno, duobus lateribus rationis in triangulo altero sint parallela: dico, quod tertium unius, & tertium latus trianguli alterius, admissim unam lineam constituent. Quoniam enim latera rationis in uno, lateribus rationis in triangulo altero, ex hypothesi, sunt lineæ parallele, cum in eas etiam cadat recta quadam lineam alia, unum scilicet ex parallelis la-



tus: αἱ ἐναλλάξ γωνίαι, ex prima parte propositionis 29 primi, inter se æquales erunt. Eadem igitur parte bis usurpata: & anguli qui in utroque triangulo inter proportionalia latera continentur, ex communi quadam noticia, inter se æquales erunt: atque deinde triangula ipsa, ex priore parte propositionis 6 huius æquiangula, tandem duo anguli ad tertium unius, duobus angulis ad tertium latus trianguli alterius, æquales erunt. Duobus igitur æqualibus his, utri hi fuerint, angulis, anguli coalterni, qui & ipsi, ut iam demon-

bus igitur æqualibus his, utri hi fuerint, angulis, anguli coalterni, qui & ipsi, ut iam demon-

demonstratum est, inter se æquales sunt, additi: & duo duobus, duo inquam anguli in uno triangulo, duobus extra illud æquales erunt. Addito insuper his æqualibus angulo quodam communi, tertio scilicet huius trianguli angulo: tres in triangulo anguli tribus alijs æquales erunt. Sed cum omnis trianguli tres anguli interiores, ex corollario propositionis 32 primi, duobus rectis æquales sint: & alij tres duobus rectis angulis æquales erunt. Quoniam autem ad aliquam rectam lineam quæ est, unum ex parallelis latus, atq; ad eius punctum, quod est communis triangulorum copula, duæ rectæ lineæ, tertia nimirum duorum triangulorum latera, non ad easdem partes ductæ, deinceps se habentes angulos duobus rectis æquales faciunt: in directum igitur, ex propositione 14 primi, hæc duo tertia latera una linea erunt. Si duo igitur triangula, duo latera duobus lateribus proportionalia habentia, &c. quod demonstrasse oportuit.


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΓ.

Εν τῶν ἴσων κύκλοις, αἱ γωνίαι τῶν αὐτῶν λόγῳ ἔχουσι τὰς πρὸς τὰς περιφερείας ἢ τῶν βεβήκησιν, ἢ αὐτῶν πρὸς τοῖς κέντροις, ἢ αὐτῶν πρὸς τὰς περιφερείας ὡς βεβήκησιν. Ἐπι δὲ καὶ οἱ ὁμοῖοι, ἢ τῶν πρὸς τοῖς κέντροις σωματάμνοι.

PROPOSITIO XXXIII.


In æqualibus circulis, angulis eandem habent rationem ipsis circumferentijs super quibus constituuntur, illi siue ad centrum siue ad circumferentias constituti sunt: Insuper uerò & sectores, ad centra constituti.

Habet hæc propositio partes duas, requirit circulos æquales, & dicit: Si in æqualibus circulis anguli positi fuerint, illos eandem quam ipsæ circumferentiæ à quibus deducuntur rationem habere, siue ad centra illi, seu ad circumferentias positi fuerint. Insuper quod etiam sectores ad centra, illam, quam uel anguli uel circumferentiæ, rationem habeant. Describantur igitur æquales circuli, duo uel plures, in ijs etiam anguli ponantur, ad centra siue ad circumferentias deducti: dico, quam ipsæ circumferentiæ, illam eandem & angulos, ad centra siue ad circumferentias deductos, rationem habere: dico insuper, & sectores, qui ad centra positi sunt, illam eandem, quam uel circumferentiæ uel anguli, habere rationem. Signentur in uno circulo ordine quotcumque circumferentiæ, ei quæ subtendit angulum in circulo constitutum, æquales: & hoc quidem, ex propositione 28 tertij, officio circini, eo secundum quantitatem rectæ quam eadem circumferentiæ, si subtendi debeat, requirit,



rit, extenso, atq; extremitatibus harum singulis, rectis lineis cum centro iunctis, hoc idem, secundum illam uel aliam multitudinem, fiat etiam in circulis alijs. Et quoniam æquales sunt, ex structura, circumferentiæ inter se, æquales autem circumferentiæ,

cumferentiæ, ex propositione 27 tertij, in æqualibus circulis, æquales angulos subtendunt: & ipsi anguli sic inter se æquales erunt. Sicut igitur in unoquoque circulo, circumferentiarum aggregatum ad unam, illam scilicet, quæ in eodem circulo angulum subtendit, est multiplex: sic & angulorum aggregatum ad illū eundem angulū multiplex erit. Quare si circumferentiarum aggregatum in uno, æquale fuerit aggregato circumferentiæ in alio circulo, uel maius uel minus eo: & angulorum aggregata eodem modo sese habebunt. Sunt autem iam quatuor quantitates, duo scilicet anguli ad centra positi, horum deinde angulorum circumferentiæ subtense, quarum cum primæ & tertiæ assignatæ multiplices æqualiter se habeant, in addendo, minuendo & æqualitate, respectu multiplicium, quæ ipsis secundæ & quartæ assignatæ sunt: erunt illæ quantitates, ex definitione 5 quinti, in eadem ratione, prima scilicet ad secundam, ut tertia ad quartam, circumferentiarum nempe, ut angulorum ad centra positorum, ratio. Quoniam autem ad centra deductorum angulorum ratio, ea est ex 20 tertij, & propositione 15 quinti, quæ est angulorum qui ad circumferentias deducti sunt, cum duæ rationes eidem eadem, ipsæ ex 11 quinti inter se eadem sint: prior propositionis pars iam manifesta erit. Posterior nunc, quòd & sectorum ad centra, ut circumferentiarum sit ratio, sic demonstrari potest. Maneat prior dispositio, linearum deinde ipsorum sectorum extremitates, quas habent, uterque in sua circumferentia, lineis rectis coniungantur. Hoc idem fiat ex altera parte cum sectoribus proximis, & signentur in quatuor istis circumferentijs uel arcibus, quatuor puncta utcunque, atque ab ijs ad eorum arcuum fines rectæ lineæ ducantur. Et quoniam quæ ex centro circuli ad circumferentiam usque egrediuntur rectæ lineæ, ex definitione circuli, inter se sunt æquales, cum sic in utroque circulo duo triangula appareant, quorum duo latera unius, duobus lateribus in triangulo altero sunt æqualia, angulus etiam inter illa, angulo, ut iam ostensum est, æqualis: & tertium latus tertio lateri: totum deinde triangulum toti triangulo, ex proposi-



tione 4 primi, æquale erit. Et quia tertia horum triangulorum latera inter se æqualia sunt, æquales uerò rectilinéæ in æqualibus circulis, ex propositione 28 tertij, æquales circumferentias auferunt, maiorem maiori, & minorem minori, si in utroque circulo, utriusque etiam rectæ lineæ arcus à toto circulo subtrahatur: quæ relinquuntur circumferentiæ, per hanc eandem propositionem, inter se æquales erunt: quare & anguli, qui super illas circumferentias deducuntur, ex propositione 27 tertij, inter se æquales. Sectiones igitur, ex definitione, similes: atque deinde etiam, cum super æqualibus rectis constitutæ sint, ex 24 tertij, inter se æquales. Est autem & triangulum triangulo æquale: totus igitur sector toti sectori æqualis, atque ideo & sectores in utroque circulo tandem omnes, inter se æquales erunt. Quotuplex igitur est in utroque circulo circumferentiarum aggregatum ad unam, illam scilicet, quæ in eo-

dem

dem circulo sectorem subtendit, tam multiplex est etiãam sectorum aggregatum ad illum eundem sectorem. Ergo sicut se habet prima ex illis quatuor, ad tertiam, in addendo, minuendo, uel æqualitate: ita & secunda erit, respectu quantitatis quartæ. Sunt autem iam quatuor quantitates, duo scilicet sectores ad centra positi, horum deinde sectorum circumferentiæ subtensæ, quibus cum primæ & tertię, secundæ item & quartæ æquæ sint assignatæ multiples, erunt illæ quantitates, ut supra, in eadem ratione: prima scilicet ad secundam, ut tertia ad quartam: hoc est, Sectorum ut circumferentiarum, uel propter similitudinem, ut angulorum ratio. In circulis igitur æqualibus, eadem ratio angulorum est, quæ circumferentiarum super quibus constituuntur, siue ad centra siue ad circumferentias constituti sint. Itidemque sectores, qui ad centra consistunt, quod demonstrasse oportuit.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Καὶ δὴλον, ὅτι ἡ ὡς ὁ ὁμοῦς πρὸς τὴν ὁμοῦς, οὕτως ἡ γωνία πρὸς τὴν γωνίαν.

COROLLARIUM.

Et manifestum est, quod sicut sector ad sectorem: ita & angulus ad angulum.

FINIS LIBRI SEXTI.

IOANNES SCHEVBELIUS

candido Lectori S.

Habes ita, candide Lector, sex libros geometriæ Euclidis priores, ex traditione nostra, unã cum regulis Algebrae. Quod si fortè in aliquibus locis hallucinati sumus (id quod in hoc hæctenus inusitato ac lubrico demonstrationis genere facile accidere potuit) quia tamen passim multa inuenientur, quibus oblectare sese studiosus harum rerum poterit, lapsus in hac re nostri apud te facile, ut spero, ueniam merebuntur. Quod si candorem & iudicium non iniquum his adhibitum animaduерtero, posteriores etiam nouem libros pari studio illustrare conabor, tecumque communicare fideliter.

BASILEAE, PER IOANNEM

Heruagium, Anno salutis humanæ M. D. L.

Mense Septembri.

