



Fragment of a white label on the spine, containing some faint, illegible markings.


Observatorio de San Fernando


Observatorio de Marina
BIBLIOTECA


Núm. 245

Tomo

N
S
C
E







BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

PETRINO
NISALACIENSIS

OPERA, QUÆ COMPLECTUNTUR,

PRIMUM, DVOS LIBROS,
IN QVORVM PRIORE TRACTAN-
TUR PVLCHERRIMA PROBLEMA TA.

Voluntatis

linis regulæ & instrum
n Astronomicarum
m motus ex

Novius.

roblema Mechani
nis.

Opera.

GEORGII PURBANI
; præterita exponuntur.
; ita uirtute in-

1566



Cum Gratia & Priuilegio Cæ-
sareæ Maiest.

B A S I L E Æ,

EX OFFICINA HENRICI
PETRINI.



PETRI NO-
NII SALACIENSIS
OPERA, QUÆ COMPLECTUNTUR,

PRIMUM, DVOS LIBROS,
IN QVORVM PRIORE TRACTAN-
TUR PVLCHERRIMA PROBLEMAT.

IN altero traduntur ex Mathematicis disciplinis regulæ & instru-
menta artis nauigandi, quibus uaria rerum Astronomicarum
φαινόμενα circa cœlestium corporum motus ex-
plorare possumus.

DEINDE, Annotationes in Aristotelis Problema Mechani-
cum de Motu nauigij ex remis.

POSTREMO, Annotationes in Planetarum Theoricis GEORGII PURBA-
CHII, quibus multa hætenus perperam intellecta, ab alijsq; præterita exponuntur.

Quæ quemadmodum mole exigua uidentur, ita uirtute in-
gentia, Lector candide, intelliges.



Cum Gratia & Priuilegio Cæ-
sareæ Maiest.

B A S I L E Æ,

EX OFFICINA HENRICI
PETRINA.

THE
WALL
OF
THE
CITY

IN THE
CITY
OF
THE
CITY

THE
CITY
OF
THE
CITY

THE
CITY
OF
THE
CITY

THE
CITY
OF
THE
CITY

Petrus Nonius Salaciensis ad Lectorem.



A VCULA quædam afferemus candide Lector de nauigandi ratione, quo facilius ea que in hoc Commentario continentur, percipere possis. Intelligamus igitur in sphaera cælesti quatuor circulos maximos per punctum supra uerticem uenientes. Vnus eorum meridiana sit, alius uerò uerticis, qui eum secat ad rectos angulos, & per puncta intersectionem æquinoctialis & horizontis transit. His enim duobus circulis horizontis circumferentia in quadrantes diuiditur. Reliqui duo h sunt, qui per medium secant ipsos quadrantes. Communes autem sectiones eorundem circulorum & plani horizontis, rectæ quædam lineæ sunt in centro coincidentes. Nautica uerò acus ubicunq; fuerit deportata cum sit horizonti æquidistans, huiusmodi rectas lineas uirtute magnetis representat: & proinde eas horizontis partes ad quas ipse tendunt. Hispani porro eas lineas communi nomine rumbos appellant. Cæterum meridianum proprio nomine rumbum dicunt Septentrionis & Austri, eam uerò que hanc secat ad rectos angulos super ipso centro rumbum Lestis & Oestis: Subsolanum enim dicunt Lestem, Faonium uerò Oestem. Reliquarum uerò duarum que quadrantem Orientalem Borealemq; atq; oppositum bifariam secat rumbus est Nordeste & Sudoestis. Nordeste enim dicunt punctum medium inter Septentrionem & ortum Solis æquinoctialem, Sudoestem uerò punctum ei oppositum: sed que deniq; Occidentalem quadrantem Borealemq; atque ei oppositum in duas æquales partes diuidit, rumbus Noroestis & Suestis appellatur. Præterea attendendum nobis est, quòd nauis cum è portu soluunt, ita cursum instituunt, ut continuis profectionibus acus nauticæ adminiculo ad easdem horizontis partes nauis proram perpetuè intendant: quando autem oportet, ad aliam positionem diuertunt. A Leste enim in Oestem nauigare dicuntur, qui dum prora nauis intenta est in Oestem, spatium aliquod conficiunt: & de alijs quoq; nauigationibus idem habendum est iudicium. Regulares autem definimus, non irregulares. Nam si nauis prora defixa sit in Nordeste: ipsa tamen nauis



Epistola.

his propter aquarum decursus, aut uentorum impulsus, uel ob aliud quidpiam, per meridianum transuecta fuerit, neque nauigasse dicetur ad Nordestem, neque ad Septentrionem. Eas porro curuas lineas, quas naues ad eum modum currendo, in superficie maris describunt, rumbos etiam appellant. Vt si (exempli gratia) sub meridiano ad alterum polorum nauigatum fuerit, descripta linea rumbus dicetur Septentrionis & Austri: sin autem ad punctum medium inter Septentrionem & ortum equinoctialem, rumbus appellabitur Nordestis & Sudoestis: & similiter in ceteris. Quarum quidem linearum alie circulares sunt, alie ex circularibus compositae. Nam si ad alterum polorum sub uno itur meridiano, uel ab ortu equinoctiali ad Occasum sub ipso circulo equinoctiali: maximorum igitur circularum circumferentias ita describi in terra marisque subiecto globo, negabit nemo: sed si aliter, descriptas lineas ex exiguis quibusdam segmentis maximorum quorundam circularum compositas esse necesse est. Nauis enim eo modo super equora constituta est, ut per dorsum carinae, centro mundi suo pondere innitatur. Quare si per ipsum dorsum a prora in puppim secundum nauis longitudinem planum uenire intellexeris, huius itaque plani & marini globi communis sectio maximus erit circulus in horizontem incidens, quemadmodum ex primo libro Geometriae Theodosii manifeste liquet: & proinde nauis locus arcus quidam erit ipsius maximi circuli: nihil enim refert si in tanto circuitu latitudo aliqua reperiatur. Iam igitur si nauim uel uento, uel remis a loco pellas, quo prora spectat, situm uariari necesse est: propterea quod mutato loco impares fiant anguli positionum, triangulorum scientia id indicante. Atqui supposuimus similem seruari situm inter nauigandum: igitur priusquam in ipsa positione inclinatione uel notabilis differentia fiat, diuertit nauis a priori circulo in alium maximum: quapropter descripta linea non erit una circularis, sed ex circularibus composita. Quoniam uero nauis per difficile erat, similes harum lineas in globis ducere, opus etiam impeditum: planam igitur quandam orbis descriptionem Mathematici excogitarunt, nauigandi arti quam exercent non solum conuenientem, sed facillimam quoque. In ea enim quaecumque recte lineae pro rumbis positae eiusdem nominis: quoniam equidistantes sunt, cum omni linea meridiana rumbus uel Septentrionis & Austri quos angulos efficiunt. Idcirco similis notabitur situs uelut in globo, quam a legitima planisphaerij ratione haud parum deficere uideatur, quemadmodum partim in hoc Commentario, partim in alijs quos fortasse breui edemus, explicabitur a nobis. Igitur quotiescunque inter nauigandum in altum prouecti quo in loco sint cognoscere cupiunt, id statim ex inuenta altis

Epistola.

ta altitudine poli, & qualitate itineris, id est ex cognito rumbo quem sequuti sunt deprehendunt, uel ex sola itineris qualitate, & quantitate. Rumbum enim acus nautica demonstrat: longitudinem uero confecti spatij quibusdam coniecturis expendunt. Interdum etiam ignorata itineris qualitate, ex ipsius duntaxat quantitate deprehensa imprimis altitudine poli, quo in loco sint cognoscunt. Enim uero in triangulo rectangulo praeter angulum rectum quinque sunt, tria uidelicet latera cum duobus angulis acutis: ex his autem si duo quaeuis cognita fuerint, reliqua tria innotescunt: latitudinem porrò radicalis loci unde soluerunt, cognitam semper supponimus. Et quia huiusmodi triangula in ipso planisphærio quo utuntur, uel explicata reperiuntur, uel facile describi possunt ductione aequidistantium: nil propterea opus habent Geometricæ artis peritia, sed solo circino singula, & quaecumque ex his uolunt experiuntur. Iam uero si sub uno meridiano nauigatio fit, aut sub uno parallelo, facillimum est eis situm loci, in quo sunt inuenire. Nam si sub uno eunt meridiano, distantiam à circulo æquinoctiali in primis inuentam in eodem supputant meridiano uersus mundi polum. At si sub uno parallelo uersantur, confectum spatium æstimatione metiuntur: id ipsum deinde in eodem supputant parallelo ab eo loco unde soluerunt, & ad eam mundi plagam aut Orientalem, aut Occidentalem uersus quam nauigarunt: ad finem enim eiusmodi distantiae se receptos esse affirmant. Cæterum quia omnes aequidistantes æquales faciunt, consequens est ut idem spatium tot gradus comprehendat in maiore circulo, quot in minore, quod est absurdum. Sed de his aliàs.

Præcipuæ Sententiæ prio- ris libri.



CIRCULVS meridianus uia est Septentrionis & Austri, æqui-
noctialis uerò uia Lestis & Oëstis. Reliquæ autem uia quas
Hispani rumbos appellant, circuli non sunt, sed exiguis maxi-
morum circulorum segmentis constant in Præfatione.

Quamuis circulus ille uerticalis, quem recta linea Lestis &
Oëstis in plano horizontis repræsentat, per puncta ortus &
occasus æquinoctialis ueniat: non est tamen ob id ipsum suf-
picandum, ut qui sub ipso circulo globum terræ marisque circuiuerit, nauigasse di-
catur ad Lestem, aut Oëstem.

Quamuis nauis proram in ortum aut occasum æquinoctialem perpetuò diri-
gamus: fieri tamen non poterit, ut ad ipsa æquinoctialia puncta unquam perue-
niamus, sed potius eo modo nauigando, circulus quidam describatur æquinoctia-
li æquidistans.

Quando porrò ea arte nauigamus, per ambitus maximorum circulorum trans-
uehimur, simul & currimus sub æquinoctialis parallelo: diuerticalis tamen qui-
busdam quæ sensum omnem effugiunt.

Præter æquinoctialem circulum, nullus alius ex æquidistantibus Lestis & Oë-
stis uia uerè dici potest.

Quanta sit loci latitudo ostenditur, ubi Verticale sydus oritur ad Nordestem,
occidit uerò ad Noroëstem.

Qui sub maximo circulo iter fecerit præter meridianum & æquinoctialem, ne-
cesse est ut sæpissimè uiarum inclinationes commutet, propter uariam atque incon-
stantem angulorum situs inæqualitatem à nouis meridianis subortam. Aliter e-
nim fieri non poterit, ut directo itinere progrediatur.

Nautæ igitur cum ad eandem mundi partem perpetuò tendunt, simili seruato
situ, directas uias percurrere non possunt.

Cur orbis loca perperam posita sint in nautarum planisphærio?

PRÆCIPUÆ SENTENTIÆ PO- sterioris libri.



Rectilineum illud planisphærium, quo nostri nautæ utuntur, tametsi
ueram orbis imaginem præbere non possit: arti tamen nauigandi
quam ipsi exercent, ualde conueniens est.

Vnum atque eundem Ptolemæum fuisse arbitror, qui utrumque o-
pus Astronomicum nempe & Geographicum composuit.

Eadem ipsa arte, qua nostri nautæ utuntur, ad inueniendum quanta sit differen-
tia inter meridianos duorum locorum, olim Ptolemæus usus fuit.

Modus ille examinatur quo Ptolemæus usus fuit, ut longitudinis differentiam
inueniret inter Coruram & Paluram in pelago Indico.

Quoniam Ptolemæus locorum distantias in quauis inclinatione contrahit ad
rectitudinem capiendam, consultius & cautius id facit, quam nostri nautæ. Hi e-
nim spatium, quod nauigando multis ambagibus conficiunt, in rectum producunt.

Adiuncta ea linea quæ rectum subtendit angulum, necesse est ut in eadem quo-
que ratione locorum latitudines atque longitudines ultra metam sint extensæ.

Cur nautæ interuallum ab Hispania in Indiam ultra proprias fines producunt?

Modus

Modus inueniendi locorum longitudines ex eclipsibus omnium certissimus.
 Quonam modo locorum longitudines ex eclipsibus cognitæ in nautarum planisphærio sint collocandæ.

Quanam arte ea loca collocanda sunt in nautarum planisphærio, quæ sub uno parallelo nauigantibus offeruntur.

Meridianus norma quædam est aliarum positionum.

Non quæuis positio inclinatioe loci ad locum, quæ in nautarum planisphærio explicata reperitur, pro uera accipienda est, sed ea duntaxat sub qua ab uno ad alterum nauigatum fuerit aliquando.

Nautæ sæpissimè decipiunt eas locorum positiones sequuti, quas marina charta ostendit, & quomodo causas ignorent.

Errant marinarum chartas artifices, quod locorum longitudines ex ipsis chartis depromptas non alia arte in globo, quam stellas fixas collocant.

Littora maris dicitur Merranei in ipsa marina charta non ueras habent altitudines poli: & unde tantus error prouenerit.

Cur tantus appareat in marina charta Isthmus ille qui inter Mediterraneum & Arabicum sinum?

Descriptionis rectilinei planisphærij Ptolemæi emendatio, alterius etiam planisphærij facilior demonstratio.

Si susponamus in terrestri circuitu secundum maximum circulum Leucas Hispanicas esse 6000. Leuca una uni Schoeno equalis erit.

Sub eadem maximi circuli ad meridianum inclinatione non erit per omnem tractum atq; in uniuersum eadem longitudinis differentia, neq; eadem habebitur uiatoria distantia inter duo data loca. Nam si primus locus ad secundum, & tertius ad quartum eandem habuerint positionem: distantia tamen à manifesto polo inæquales fuerint, uiatorie distantie & longitudinis differentie inter ipsa loca inæquales erunt, & reliqua huiusmodi.

Longitudinis differentia duorum locorum interdum in marina charta contrahitur: interdum uerò producitur.

Longitudinis differentia duorum locorum, quomodo ex marina charta uerè concludi possit.

Tabula inclinationis maximi circuli ad meridianum septem differentes positiones continens.

Quoniam nauis uia præter meridianum & equinoctialem angulosa est: idcirco incertum pro certo statuere interdum oportet & reliqua.

Non potest fieri reditus declinationis Solis ad eadem minuta: etiam adhibita equatione.

Quomodo cognosci potest, quonam die Sol declinatione caret.

Ioannes Lucidus perperam Alphonsum reprehendit.

Ioannes de Monteregio à temporis spatio, quod in tabulis Alphonsi inter Nabonasarum & Christum reperitur unã detraxit diem, eademq; ei spatio qd inter Christum & Autumnale equinoctium à Ptolemæo obseruatum adiecit.

Fidem adhibendam non esse libello de Inerrantium stellarum significationibus à Nicola Leonico è Græco translato.

Pridie quàm Christum Redemptor orbis conciperetur fuit Verum equinoctium Romæ, celebrabatur tamen 25. die Martij iuxta Cæsaris institutum.

Observationes stellarum fixarum à Ioanne Vernero, Copernico, & Cardano facte, dissident inter se.

Alberti Pighij Campensis in Geometria error aperitur.

Alberti Pighij Sophisma quoddam circa declinationem eclipticæ fixæ dissoluit.

Marcum Beneuentanum, quoniam tantam putauit esse eclipticæ fixæ declinationem, quantam Ptolemæus mobilis eclipticæ declinationem inuenit, caput aut

Arietis eclipticę nonę anno 1519. in Gr. 28. min. 8. Piscium posuit, secum pugnae re ostenditur.

Ioannis de Montereio sententiam de æquinoctijs cur recipere nolimus.

Caput Arietis à quo in tabulis Alphonsi calculus motus astrorum initium sumit, sectionem Vernam esse.

Observatio à nobis facta Conimbricę labente anno à Christo nato 1555. in æquinoctio Autumnali.

Deductio declinationis partiũ eclipticę in unum planum tradita à Vitruvio, & à nobis demonstrata.

Fabrica atque usus cuiusdam circularis instrumenti, quo in plano horizontis iacente, Solis altitudines capiuntur.

Fabrica atque usus Astronomici radij, & Ioannis Schoneri lapsus notatur.

Hieronymi Cardani error aperitur: qui putauit ex cognita proportione umbrę ad gnomonem, cuiuscunque syderis & quacunque hora altitudinem à centro terrę inueniri posse.

Hieronymus Cardanus perperam Vitellionem reprehēdit, in quo insigniter deceptus est: cum inquit ad quantam altitudinem à terra uapores ascendere possint.

Arcus occultationis Solis in circulo altitudinis arcui distantię ipsius à puncto exortiuo equalis esse non potest, nisi in ijs locis quę sub æquinoctiali posita sunt: & quando Sol sub ipso circulo æquinoctiali decurrit.

Expolitio cuiusdam loci obscuri septimo capite primi libri Geographię Ptol. Declinationem polaris stellę tempore Hipparchi repertã non conuenire cum calculo Ptolemęi de Motu fixorum syderum.

Augustini Ricij argumentatio soluitur, qui putauit errasse Ptolemęum gradu uno, minutis sex in locis Solis & Lunę stellarum fixarum.

Hieronymus Cardanus inconsideratę in libello de Temporibus restitutione asserit, inter duas obseruationes Ptolemęi Autumnalis æquinoctij octo præcise solares annos intercessisse.

Canones, quibus nauatę ad inueniendum altitudinem poli utuntur, per altitudinem polaris stellę extra meridianum existentis, generales esse non possunt per omnia climata.

Ad inueniendum altitudinem poli per meridianas Solis altitudines & stellarum fixarum recens canon noster.

Petri Appiani modus examinatur, quo in Cosmographia usus est ad inueniendum altitudinem poli per horam cognitam.

Iacobi Ziegleri modus ad inueniendum altitudinem poli per distantiam Solis horizontalem à meridiano, examinatur.

In omni loco posito inter æquinoctialem & circulum Cancrę, quando Sol uicinior est polo mundi Arctico, quàm uerticale punctum, gnomonum umbrę citra miraculum retrocedunt.

Ex cognita poli elevatione duorum locorum, & situ quem eorum distantia seruat ad alterum meridianum, non potest in uniuersum cognosci, quanta sit ipsa distantia, necq; meridianorum differentia: quanquam hæc Ptolemęus iacter se inuenisse per organum Meteorocospium, & Ioannes de Montereio idem polliceatur problemate 46. tabulę primi mobilis.

Cur per ea quę uel Appianus cognita sumit, uel Zieglerus altitudo poli cognosci non possit.

Propositionem decimamtertiam primi libri Menelai de Triangulis sphericis ueram non esse in uniuersum: quemadmodum ea proposita est.

Posteriores partem octauę propositionis capituli 14. primi libri Reuolutionis Nicolai Copernici, in quo de triangulis sphericis agit, ueram non esse.

Et quo

Et quod undecima propositione docet, error est.

Et similiter lapsus est ipse Copernicus propositione sexta de rectilineis triangulis.

Nec minus lapsus est in duodecima.

De uaria Solis habitudine ad uerticale punctum in differentibus locis terræ, ante meridiem, & post.

Ioannis Stofleri error ostenditur, qui putauit eo die quo Sol per zenith eorū hominum transit, qui inter tropicos positi sunt, umbram matutinam eosdem habere rectam in occasum Solis eiusdem paralleli proiectam: pomeridianam uerò rectam in ortum ad horizontis punctum extendi, super quo Sol oriebatur.

Quomodo inueniatur altitudo poli per radios Solis, quando meridiani situs datur cognitus.

Quomodo inueniatur altitudo poli per radios Solis, etiamsi meridiani situs ignoretur.

Quomodo inueniatur altitudo poli per radios Solis, situ meridiani & Solis declinatione ignoratis.

Rursus quomodo Solis declinatione & meridiani situ ignoratis, altitudo poli inueniatur, idē in plano unius circuli.

Fabrica horologii horizontalis quo utraq; Solis distantia à meridiano cognoscuntur, ea uidelicet quæ per æquinoctialem, & illa quæ per horizontem.

Umbram rectam, gnomonem, & umbram uersam in continua proportione proportionales esse.

Romæ latitudo ex ratione umbræ ad gnomonem, quam Vitruuius scribit, elicitā, non conuenit cum ea quam per Astrolabiū Ioānes de Montereugio inuenit.

De radijs solaribus quinam eorum sint æquidistantes, & quinam concurrant, & quinam æquidistantes appareant.

Eratostenis obseruatio quam in Alexandria fecit ad inueniendum, quantus esset totus terreni globi circuitus, examinatur.

Gnomonum umbras æquidistantes non esse, sed apparere, & quorsum concurrant, ostenditur.

Data latitudine duorum locorum cum differentia longitudinis, eorum intercapedo quomodo inueniatur multiplex inodus.

Quomodo in superficie globi eæ lineæ duci debeant, quas nostri nauitæ rumbos appellant, similes ijs quas cum nauigamus, in superficie maris nauis suo cursu describit.

De habitudine ipsarum linearum tum inter se, tum ad mundi polos.

Vnius atq; eiusdem rumbi segmenta quam habitudinem inter se habeant.

De usu illius globi, in quo eiusmodi descriptio facta fuerit.

In poblema mechanicum Aristotelis de Motu nauigij, ex remis Annotatio una.

Præci-

Præcipuæ ex iis quæ in Theoricis planetarum, Georgij Purbachij annotauimus.



Sarcus zodiaci quem Sol apparenti motu in dato tempore percurrit, per equalia sectus fuerit à linea mediæ longitudinis tantus erit illius temporis motus æqualis, quantus apparet.

Quantouis temporis spatio dato, arcum zodiaci reperire quem Sol in tanto tempore apparenti motu percurrat, paresq; faciat in eodem tempore æqualem motum & apparentem.

Ioannis Baptistæ antiqui expositoris error aperitur, de loco maximæ æquationis centri Lunæ.

Punctum illud eccentrici Geometricè inuenitur, in quo maxima fit æquatio centri in ipsa Luna, & quantum ab auge distet ipsum punctum.

Quanta sit maxima centri æquatio numeris ostenditur: & quanta etiam sit distantia epicycli à centro mundi in eo situ.

Ioannis Baptistæ sententia de minutis proportionalibus refellitur.

Quando in uno atq; eodem situ epicycli inæqualibus argumentis pares respondent æquationes, plus distat à fine argumenti maximæ æquationis illius situs finis argumenti minoris, quam finis maioris.

In solo Marte axis orbis deferentis epicyclum axem zodiaci secat, non in Ioue, neq; in Saturno. Contrarium docet Purbachius.

Maximæ æquationis centri in tribus planetis superioribus demonstratio, in qua error aperitur Erasmi Reinnoldi, & alterius etiam Erasmi, & antiqui expositoris.

Æquationes argumentorum in ipsis tribus planetis superioribus ad situm mediocris remotiōnis centri epicycli à terra supputatas esse: non autem ad medias longitudines à Georgio Purbachio definitas.

Inter situm augis & oppositi augis semel tantum centrum epicycli Veneris atque Sol in eodem loco zodiaci uerè sunt secundum longitudinem, quando uide licet distantia centri epicycli à centro æquatis æqualis fuerit semidiametro deferentis.

Celerius moueri centrum epicycli Mercurij circa auge[m] æquantis, uidelicet super centro deferentis: tardius autem circa oppositum augis, demonstratur.

Æquationis argumentorum quæ in tabulis Mercurij scribuntur, sunt quæ contingunt dum centrum epicycli à centro mundi distat interuallo equali semidiametro deferentis: sed huiusmodi distantia mediocris distantia centri epicycli à centro mundi dici non potest, nisi ualde improprie loquaris, ut Georgius Purbach.

Quanto arcus motus argumenti uicinior fuerit opposito augis uerè epicycli, tanto æquationem ipsius motus argumenti maiorem fieri.

Maior quantitas epicycli causa non est, ut stationum puncta uiciniora sint opposito augis uerè, si cetera ponantur paria.

Fieri quidem potest, ut in minore epicyclo stationum puncta minus distent à perigeo ipsius epicycli, in maiore uerò longius distent.

Tarditas motus argumenti, id est, tardior motus planetæ in epicyclo uerè causa est, ut puncta stationum magis inuicem appropinquent.

Gebri & Ioannis de Montereio argumentatio aduersus Ptolemæum soluitur, qua contendunt fieri posse ut in eiusdem planetis ad inæquales à centro mundi remotiōnes æquales sint stationum arcus.

Discrimen quod notauit Erasmus Reinnoldus inter Mercurium & tres planetas superiores, atq; Venerem, de proportionibus quæ relinquuntur, ut causas assignaret diuersitatis stationum atq; retro gradationum ipsorum planetarum, sufficiens non est.

In motu uerò Solis fit transitus à minori in maius: sed non per equalia.

Ar.

LIBRORVM.

Arcus eclipticæ semicirculi ascendentis in climatibus Borealibus recte descen-
dere, ostenditur.

Quod Ioannes Baptista ait, Pisces & Arietem maximas habere descensiones
in sphaera obliqua, allucinatio est.

Sunt quædam loca Borealia, in quibus rectius descendit Sagittarius quàm
Aries.

Nisi tardior descensus maiorem postulauerit Solis occultationem, quanquam
longius intra noctem terminetur: causa non erit, ut Luna post coitum citius appa-
reat. Contingit enim æquales zodiaci arcus inæquales habere descensus. Cete-
rùm maiori descensui minorem occultationem respondere.

Nonagesimum gradum eclipticæ ab ascendente in círculo maximo semper ef-
se per zenith & eclipticæ polos ueniente, demonstratur.

Tantam esse distantiam inter nonagesimum gradum eclipticæ ab ascendente
& meridianum, secundum diuisiones horizontis, quanta est amplitudo ortus as-
cendentis, demonstratur.

Lucida enarratio Theoricæ latitudinis trium planetarum superiorum.

Aequationes motus accessus & recessus octauæ sphaeræ inæqualibus crémén-
tis crescunt.

Reliqua accidentia motus octauæ sphaeræ, tam secundum Alphonsum quàm
secundum Thebit demonstrantur.

FINIS.

PETRI NONII SA-

LACIENSIS, RERVM A-

STRONOMICARVM PROBLE-

mata Geometrica.

ARGVMENTVM PRIORIS LIBRI



R AE CLARVS uir Martinus Alphonfus à So-
sa anno Salutis 1530. iussu regis nostri inui-
ctissimi cum classe quadam uersus occasum
Solis hyemalem nauigauit, ad argenteum flu-
uium. Rediens autem Lusitaniam tertio suæ
nauigationis anno, retulit mihi quam accura-
tè, quamquè diligenter locorum situs perue-
stigarat, cæterum nonnulla reperisse, quæ illi
fuerant admirationi. Primùm se in diebus æ-

quinoctij Solem obseruasse in exortu, atq; in occasu, inspexisseq; ad Les-
stem exoriri, occidere uerò ad Oëstem. Interrogauit igitur atq; efflagita-
uit à me, cur quãdiù inter nauigandum cursum tenemus ad Lestem, sub
uno atq; eodem uersamur parallelo, ad æquinoctialem uerò circulū per-
uenire nunquam possumus, in quem ita nauigando proram nauis per-
petuò intendimus? Aiebat præterea se peruenisse ad latitudinem austra-
lem graduum 35. cum Sol principium Capricorni teneret, eumq; orientem
uidisse ipsa die brumæ ad Suestem cum quarta Lestis, occidentem
uerò ad Sudoëstem cum quarta Oëstis, cuius quidem rei causam igno-
rare fatebatur. Nam talis deberet esse exortus in regionibus, cum per au-
stralia signa Sol incedit, qualis in borealibus cum per borealia, at sub lati-
tudine boreali graduum 35. cum est in initio Cancri oritur ad Norde-
stem cum quarta Lestis. in latitudine igitur australi eorūdem graduum
35. cum est in initio Capricorni, similiter exoriri deberet ad Nordestem
cum quarta Lestis. Hæc igitur cur ita fierent, sciscitabatur à nobis, cau-
sas tunc illi tradidimus coràm ut potuimus, scriptis deinde mandauimus
annis ab hinc triginta, cōmentario uno edito de eare Lusitano ser-
mone, quem denique hoc tempore, ut non solum à Lusitanis,

sed etiam ab alijs hominibus legi, atq; intelligi possit,
in Latinum uertere uoluimus.

A De

De duobus problematis circa nauigan-

DI ARTEM PETRI NONII

SALACIENSIS LIBER VNVS.




Rincipio igitur ita rem se habere in uniuersum, quemadmodum quibusdam in locis Martinus Alphonsus se deprehendisse ait, accipiamus oportet. Vbicunque nempe simus exoriri Solem ad Lestem, occidere aut ad Oestem, cum æquinoctialia puncta ingreditur. Ducta enim per horizontis centrum recta linea meridiana, uelut docuit Vitruuius, si super ea ab ipso centro in eodem plano rectam lineam ad rectos angulos excitaueris, ipse circulus horizontis his duabus rectis lineis in quadrantes diuisus erit. Quarum prior quæ meridiana est rumbus, est Septentrionis et Austri, posterior uerò rumbus Lestis atq; Oestis Hispanicè dici solet. Hoc autem repræsentat nauticum illud instrumentum, quod uulgò acum appellant, & quæuis eius imago in nautarum planisphærio depicta. Quoniam uerò ex circulis parallelis solus æquinoctialis est, qui unâ cum meridiano horizontem in quadrantes secare possit, quod accidere necesse est nisi circulis qui à Leste in Oestem producuntur, nullus idcirco præter Æquatorẽ parallelus Lestis & Oestis rumbus esse potest. Sed circulum quendam maximum cœlestis sphæræ intelligemus, meridianum in uerticali puncto ad rectos angulos secantem, & per horizontis atque æquinoctialis intersectiones uenientem, quæ ortus & occasus æquinoctiales dicuntur. Erit profectò recta illa linea Lestis & Oestis communis sectio plani huius uerticis circuli atq; plani horizontis: quod ex undecimo libro elementorum Euclidis facile potest ostendi. Si quis igitur eandem Lestis & Oestis lineam sequutus fuerit, quandiu rectà processerit, tandiu in ipso uerticali circulo erit ortus atq; occasus æquinoctialis: uertex etiam sub eiusdem circuli circumferentia uersabitur. Quòd si de uero illo horizonte ageremus, qui ex maximis circulis sphæræ est, uanam tantum rectam lineam Lestis atq; Oestis affirmaremus esse, eamq; recto horizonti communem, in qua certè communis sectio fit omnium horizontum cum uerticalibus. Cæterum est alius horizon qui à nobis usurpatur, per superficiem terræ transiens, non per centrum, uerò illi centralique horizonti parallelus, ab eo quæ parum distans, quippe qui cœli ferè dimidium nobis ostendat. In huiusmodi itaq; horizonte habet unusquisq; locus propriam sibi peculiaremq; Lestis & Oestis lineam, in ortum atq; occasum Solis æquinoctialem utrinq; productam.

Sed quamuis prædictus circulus maximus uerticisq; quem Lestis
& Oestis

& Oestis linea representat, in ortum tendat æquinoctialem, adeò ut qui sub eo terræ marisq; globum circuiuerit, ipsum punctum exortiuum uertice suo pertingat: non est tamen ob id ipsum suspicandum, ut qui ad eum modum illuc transuectus fuerit, nauigasse dicatur ad Lestem. Nam cum longiusculum spatium confecerit, nauis proram aliò tendere uidebit, non in Lestem. Quapropter gubernator clauum tenens, tametsi causam ignoret, cum sub uno parallelo in plagam orientalem contendit, rectæ nauigationi prospiciens statim à principio eum præcauet errorem. Enimuerò si nauigando nauis proram intenderemus in Lestem, tum uerò gubernaculum ita constringeremus, illigaremusq;, ut nihil uacillare posset, mari autem tranquillo placidoq; uteremur, uentus insuper secundus ad nostrum flaret arbitrium, qui quò prora tendit eo aspiraret, si ad eum, inquam, modum cursum teneremus, & aliquanto iam spatio confecto in acum nauticam respiceremus, nauis proram aliorsum inclinatum esse comperiremus, alioq; tendere, non in Lestem. Causa est quòd in eo loco de quo proficiscimur, meridianus cum uerticali rectos efficit angulos. Cæterum ut ab eo discedimus, sub ipso uerticali perducti, in nouum protinus horizontem, nouumq; incidimus meridianum. Nouus itaq; meridianus cum uerticali prioris loci pares angulos non efficit, uelut antea, sed potius impares. Quorum alter exterior est in spherico quodam triangulo ex ipsis meridianis & eodem uerticali constituto, positionis angulus situs uè à Geographis appellatus: alter uerò interior est ei oppositus qui ad uerticem prioris loci, quò nam tenderemus indicabat. Quoties autem circulus maximus sub quo ducimur, alius est quàm æquinoctialis, ipse exterior angulus interiori opposito est inæqualis: interdum maior, interdum minor, iuxta uariam cognominationem aut borealem, aut australem partium orbis, ad quas, & per quas sub ipsis maximis circulis ducimur. Ita enim res se habet in his triangulis, quanquam in rectis lineis exterior interiore ei opposito semper sit maior. Sed redeamus ad institutum. Si itaque ad eum modum nauigatum fuisset, errore deprehenso, opus esset emendatione, rursusq; ad prioris latitudinis parallelum reuocato cursu regredi oporteret. Cæterum non ita nauigare consuevit qui in Lestem intendit, sed oculis in acum nauticam defixis, ita temonem mouet, regitq; semper, ita deniq; cursum instituit, ut nauis prora eò tendat, quò Lestis linea. Sic igitur errorem præcauet, uitatq;, ut in latitudine nullus sit lapsus, aut imperceptibilis. Nauis itaq; prora in ortum æquinoctialem semper est intenta, qui à uerticali puncte partibus distat nonaginta, sed ad ipsum æquinoctialis punctum peruenire nunquam potest. Quinimo sub uno atque eodem uersatur parallelo, quod dignum uidetur admiratione. Porro cum ad eum modum omnia loca

in Lestem per quadrantem currimus g i h, in horizontē s h t, in quo punctum h, est ortus æquinoctialis, ad quod linea Lestis & Oestis uergit. Variatis enim horizonte atque meridiano punctum exortium uariari necesse est. At in ipso g i h, parum progressi, confestim transuolamus in alium uerticalem per k ductum, & ab eo rursus in alium incidimus. Totiesq̄ per uarios uerticales nouos subimus horizontes, nouosq̄ meridianos, nihil unquam quod sensui pateat, à Leste recedentes, donec appellimus ad o, cuius loci latitudo æqualis est priori. Per ambitus igitur maximorum circulorum transuehimur, simul & currimus sub parallelo, diuerticulis quibusdam quæ sensum omnem effugiunt. Quod autem uideamur sub parallelo examussum uersatos esse, causam esse puto, quòd hi circuli uerticales per quos ducimur, meridianos secant ad rectos angulos ad ea puncta, in quibus parallelum contingunt. In uicinis igitur punctis recessus ab eo admodum est exiguus: rectus enim ferè incidit uerticalem in propinquos meridianos circa idem punctum contactus. Quare non protinus si currimus per uerticalem, à parallelo discedimus sensibili differentia. Ita fit ut cum initium signi Cancrī ab Æquatore declinet gradibus uiginti tribus cum semisse, quintus tamen aut sextus gradus eiusdē signi, ijsq̄ compares ad Geminorum finem, declinationem habeant sex tantum aut septem primis minutis ipsa maxima declinatione minorem: atq̄ id puto permagni momenti esse ad hūc nodum explicandum. Est adhuc alia ratio, quòd circulus tangit circulum in puncto tantum, quando citra latitudinem intelliguntur. Sed circuli illi per quos ducimur latitudine non carent: quapropter ipsorum contactus in quodam diuisibili erit, non in puncto. Et proinde cum per maximos traducimur circulos, quodam modo minorem transcurrimus. Sic igitur puto priorem interrogationem dissoluisse. Tantum uerò ad ampliorem explicationem id in memoriam reuocemus oportet, quod inter omnes constare puto, nempe neminem esse eadē inscium, adeoq̄ literarum expertem qui non norit, æquinoctij tempore cum uidelicet Sol æquinoctialem circulum percurrat, sexta hora antemeridiana oriri, sextaq̄ occidere pomeridiana. At qui in horizontalibus horologijs linea horæ sextæ quæ Lestis & Oestis est meridianam secat ad rectos angulos. Idcirco uelut principio statueramus, dubium nō est quin Sol oriatur ad Lestem, occidat uerò ad Oestem, cum æquinoctialem circulum percurrat. Ut posteriorem uerò diluamus ambiguitatem, illud idem quod superius explicare cœpimus, quali nempe uia ducantur qui parallelum transcurrunt, expediemus oportet. Aduertendum igitur censeo, quod quamquam parallelus omnis rectos angulos efficiat cum omni meridiano, quod etiam accidere necesse est ijs rumbis qui à Leste in Oestem produ-

cuntur, nullus tamen parallelus præter Æquatorem rumbus Lestis & Oestis dicetur esse. Non deerunt fortasse qui suspicentur huiusce rei causam esse angulorum inæqualitatem. Cum enim Solstitorum colurus, qui officio & ipse fungitur meridiani, à polis ueniat æquinoctialis, à polis etiam zodiaci, rectos angulos efficit cum circulo Cancræ, & unâ cū ecliptico ad unū idemq; punctum. Nil igitur mirū si Sophistica quædam ratione inducti rectum angulum putauerint recti anguli partem esse, & proinde minorem. At non est ita. Nam omnes recti anguli æquales inuicem sunt, siue fiant ex concursu maximorum circulorum cum maximis, siue cum minoribus, quemadmodum alibi demonstratum est à nobis. Pro certo autem credendum est nullum parallelum præter Æquatorem rumbum esse Lestis & Oestis, neq; quēquam alium, eorum omnium quos acus nautica uel iam ostēdit, uel adhuc in ea intelligi possunt. Causam porrò & rationem tunc attinges, cum inspexeris rumbos omnes rectilineos itinerum demonstratores per centrum horizontis duci, communesq; sectiones esse maximorum quorūdam circulorum, & plani horizontis, cuius quidem acus nautica (uelut superius diximus) figura est. Cum igitur paralleli omnes (excepto Æquatore) circuli minores existant, ipsum idcirco horizontem si qui secant, per inæqualia secant, & præter commune centrum horizontis & ipsius acus, & proinde nullo modo fieri poterit ut alicuius rumbi officio fungantur, quemadmodum in subiecta apparet figuratione. In qua quidem circulus a b c d, tam horizontem quàm acum nauticam repræsentat: recta uerò a c,



communis sectio est meridiani & horizontis, rumbusq; rectilineus est Septentrionis & Austri, recta autem b d, communis sectio horizontis & eius uerticæ, qui ad meridianum rectus est, & proinde rectilineus rumbus dicetur esse Lestis atq; Oestis, recta uerò f g, communis sectio est horizontis & eius uerticæ, qui quadrantes a d, & b c, per medium secant, rumbusq; appellatur rectilineus Nordestis & Sudoestis, reliqua h y, ad eundem


modum in reliquis quadrantibus ducta rumbus rectilineus est Noroestis & Suestis. Mediæ deniq; positiones horum rumborum quas nauæ medias appellant profectiones, & eorum quartæ, similiter sunt intelligendæ. Porrò à circulo æquinoctiali ad gradus usq; 45. latitudinis, parallelus per uerticem transiens intersecat horizontem, reliquorum uerò

ad ma

ad manifestum polū nullus interfecare potest. Ipse porrò parallelus graduum 45. horizontem in uno puncto contingit. Igitur uerticalia sydera à circulo æquinoctiali usq̃ ad eundem parallelum Gr. 45. qui totius latitudinis medius est, per uniuersum quadrantem oriẽtalem a d, ortum habent. Secat autem parallelus horizontem super recta linea f h, id est, uerticale sydus orit̃ ad f, occidit uerò ad h, in eo loco in quo quadratum sinus recti altitudinis poli dimidium est quadrati sinus recti altitudinis Æquatoris. Quapropter numerorū proportionalium ad miniculo ipsa loci latitudo innotescet. Geometricæ autem sic. Recta linea h f, producat̃ usque ad m, ut fiat k m, æqualis circuli a b c d, semidiametro: p̃terea à centro e, ad m, recta ducatur e m, quæ circumferentiam secet in l. Erit igitur arcus d l, latitudo loci in quo id accidit: sydus nempe uerticale orietur ad Nordestem, occidet uerò ad Noroẽstem, ubi distantia uerticis ab æquinoctiali æqualis fuerit ipsi arcui d l.


Fatemur equidem quæuis duo loca orbis certam quandam ad se inuicem habitudinem situs habere, quæ euntibus ab uno ad alterum obseruanda erit, quod etiam commune est ijs quæ sub uno posita sunt parallelo. Cæterum eiusmodi uia circulo aliquo ex minoribus diffinienda non erit, sed potius maximo quodam, qui per duo concepta loca uel ea arte ducendus erit qua usus est Theodosius, uel alia quapiam faciliore. Arcus autem ipsius maximi circuli inter eadem loca comprehensus, minor est eo paralleli arcu, qui eisdem duobus locis interiacet, quemadmodum euidenti ac necessaria ratione ex Geometricis principijs concludi potest. Hæc igitur accedit commoditas, quòd per eum proficiscentibus breuior uia ac compendiaria sit. At oportere sciat qui eam ingressus fuerit, non semel tantum, sed sæpissime rumbos cõmutet: idq̃ propter uariam, atq̃ inconstantem angulorum situs inæqualitatem à nouis meridianis subortam. Cuius quidem rei subtilis admodum est inuestigatio, atq̃ in eo consistit, ut scilicet intelligamus quantum crescant, aut decrescant huiusmodi anguli per eum tractum. Quicumq̃ autem ita progressus fuerit, rectà ducetur. Neq̃ fieri poterit ut quisquam directo itinere p̃grediatur, si unum atq̃ eundem rumbum præter meridianum & æquinoctialem, perpetuò sequutus fuerit. Quin oportebit toties eum commutare, quoties directus cursus postulare uidebitur. Quæ cum ita sint, cur igitur nautarum planisphærium tortuosas illas fractasq̃ rumborum lineas rectas ostentat? easq̃ sub æquali situ? Hæc enim (uelut ex supradictis patet) simul stare non possunt. Nautæ enim tali arte nauim detorquent, atq̃ deflectunt, ut perpetuò eam cogant unà cum ipsa acu, eodem angulos efficere cum recta linea Septentrionis & Austri. Neq̃ aduertunt rectas quascunq̃ lineas eius planisphærij, quo utuntur sectiones

communes esse maximorum circulorum & horizontum. At cum ad eandem mundi partem perpetuo tendant, simili seruato situ, fieri nullo modo potest ut directas uias percurrant. Sed ipsi nihilominus eisdem rectis lineis adhibito calculo, locorum situs perinde quaerunt, ac si directum cursum tenuissent. Ita fit ut orbis loca perperam posita sint in ipso planisphaerio. Quin asseuerare audeo nullum eorum iusta longitudine constitutum esse, errorem uero non esse exiguum, sed notabilem. Ea tamen semper excipio, quae nauigantibus à Septentrione in Austrum, aut è contrario ab Austro in Septentrionem obuia fuere. Quod autem attinet ad decursi spatij longitudinem, propter itinerum obliquitates, atque anfractus, longius quam putent progrediuntur, praesertim ubi locorum intercapedo magna est, & rumbus ille curuilineus angulosior fuerit, quemadmodum in subiecto schemate intueri licet. Quoties uero ignorata altitudine poli, ex explorata itinerum dimensione locorum situs perquirunt, longitudinem propterea ultra metam extendunt, quoniam id quod natura flexuosum est, atque obliquum, in rectum proijciunt. Sed si ex deprehensa altitudine poli quam raro exquisitam habent, quo in loco sint expendant, longitudinem plus iusto interdum producant, interdum contrahunt. Rumbus Nordestis & Sudoestis quem putant



sequutos fuisse, est in hac figura linea d ce, ceterum describunt a c b, quae neque recta est, neque unà circularis. Quisquis itaque haec inspexerit, expenditque, facile concipiet fieri posse, ut ex erroribus nautarum, falsisque eorum relationibus, quamuis ipsa loca non adeamus, ueritas eliciatur. Praestaret tamen ad locorum situs cognoscendos, arte quadam, ac methodo, nauigare. Quae profectò ars utrovis duorum modorum rem expedire poterit. Prior eorum permittit eundem cursum perpetuo teneri inter nauigandum, qui semel fuerit institutus, uelut hodie nauae obseruant. Caeterum locorum situs peruestigandus est in curuilineo aliquo planisphaerio, cuius rumbi eam figuram praeseferant, quam in hoc schemate rumbus Nordestis & Sudoestis, non autem in rectilineo nautarum. Posterior admonet maximum sequi sphaerae circulum, ea cursuum uarietate, quam mutatio exigat meridianorum. Et proinde locorum situs inquirendus erit in ipsis maximis circulis, aut in rectilineo aliquo planisphaerio, quod eosdem maximos circulos aliter representet, quam uulgatum illud idem nautarum. In quo tamen si rectilinei rumbi sectiones communes ponantur esse maximorum circulorum uerticalium & plani horizontis, non pote-

poterunt tamen huic negotio inferuire, propterea quod ob eorum æqui distantiam pares angulos perpetuò cum meridianis efficiunt. Quamquam uerò globus, ut decet, deliniatus sit quouis planisphærio utriusq; modo accommodatior, priorem nihilominus exequi possemus, ipso nautarum rectilineo aliquatenus immutato. Sed undè digressi sumus reuertamur. Quotiescunq; igitur quosdam situs duo data loca inter se inuicem habeant, cognoscere operæ præteritum fuerit, maximus circulus per ambo ducendus erit. Arcus enim horizontis prioris loci ipso maximo circulo & æquinoctiali comprehensus, quo nam posterior uergat indicabit. Vt si, exempli gratia, ipse arcus horizontis gradus habuerit 45. orientalis atq; Borealis quadrantis, distabit posterior locus à priori ad Nordestem: similiterq; in alijs res se habebit. Hoc autem in subiecta figura



loci uerticem habentis ad b, sit g a h. Parallelus eius loci qui uerticem habet ad d, esto y d k, sit autem b d c, quadrans maximi circuli ducti per b, & d. Quadrans uerò b a, meridianum loci b, ad rectos angulos fecet. Angulo igitur a b c, respondet in horizonte arcus a c, qui si gradum 45. inuentus fuerit, ipsum maximum circulum ductum per b, & d, à Sudoeste in Nordestem uenire pronuntiabimus. Hinc manifestum est quod trium locorum sub uno atq; eodem parallelo positorum, prius


ad medium alium situm habet quam ad postremum: adeo ut eorum unusquisq; ad quemuis alium diuersam habeat habitudinem positionis. Quod enim quando à Leste in Oestem nauigamus, ea omnia perlustremus, est de hoc alia ratio à nobis iam explicata. Quæcunq; igitur loca posita sunt in b c, uergunt ad Nordestem, & quæcunq; in alio quadrante qui est ante b, constituta sunt, uergunt ad Sudoestem, omnia namq; conferuntur ad b. Ceterum si recurrendo situm loci b, uelis referre ad d, scito ipsum b, ad Sudoestem non uergere, sed multo aliam inclinationem habere inter Nordestem & Septentrionem, siquidem posuimus Borealiorem esse b quam d. At si posueris æquales habere altitudines poli, quoniam d, collatus ad b, uergit ad Nordestem, b, igitur relatus ad d, uerget ad Noroestem. Sed si ponamus d Borealiorem, & distare nihilominus à loco b, uersus Nordestem, poterit profectò hoc accidere duobus locis pares habentibus altitudines poli, quæ inæqualiter tamen

B distas

distabunt ab ipso b. Quapropter si idem locus b, referatur ad propinquiore, inclinatus reperitur ad punctum quoddam horizontis inter Oëstem & Sudoëstem, sed si ad distantiore comparisonem feceris, ad simile punctum uergere affirmabis in Boreali accidentalique quadrante horizontis inter Oëstem & Noroëstem, æquali nempe interuallo distabunt illa duo puncta ab Oëste. Docet hæc triangulorum sphericalium scientia, quæ uel in globo, uel in tabulis Astrolabij experiri licebit. Ex his intelliges uarios haberi in diuersis locis terræ orientis Solis respectus. Nam cum est in initio Cancris constitutus, ñs qui Sienem inhabitant, ñsque omnibus qui sub ipso circulo Cancris positi sunt, oritur ad Lesnordestem tribus gradibus cum semisse additis uersus Nordestem, cum sit latitudo ortus graduum 26. At eodem tempore duodecima nempe die mensis Iunij, ñs qui habitant sub æquinoctiali ad Lesnordestem oritur, uno tantum addito gradu: habet enim latitudo ortus gradus 23. cum dimidio. Incolentibus porro plagam nostram Borealem, sub altitudine poli gradum 35. oritur ad Lesnordestem cum dimidio ferè unius quartæ Nordestem uersus, quia latitudo ortus gradus habet 29. In horizonte tamen Olissiponensi ubi polus Boreus eleuat gradibus ferè 39. oritur ad Nordestem addita quarta una & gradibus duobus cum semisse uersus Lestem: habet enim latitudo ortus gradus 31. Latitudinem ortus Solis Astronomi dicunt arcum horizontis inter æquinoctialem & ipsum Solem exorientem. Ex his autem intelliges quibus in locis occidat horizontis ipso eodem die Cancris, similiter ubi oriatur & occidat, quando est in tropico hyberno. Hæc uerò ex eo patent, quoniã sinus rectus complementi altitudinis poli ad sinum totum, & sinus declinationis Solis ad sinum latitudinis ortus eandem habent rationem. Propterea si sit tibi acus nautica quæ exactè situm meridiani ostendat, uel quouis alio modo eum exploratum habeas, ex obseruato Solis exortu, altitudinem poli supra horizontem certissimo calculo deprehendes. Quod quidem nos quouis diei tempore inuenire solemus, ignorata hora, situ etiam meridiani ignorato. Nautæ uerò & nauium magistri adeò sunt inertes, ut cum multis modis possent ipsam poli sublimitatem inuenire, tempore duntaxat meridiano eandem perquirunt. Et quoniam sæpenumero accidit, radios Solis impediri eo tempore, sola tunc æstimatione, quæ non raro eos fallit, quo in loco sint expendunt. Quendam enim uidimus, qui in Indiam plusquam decies nauigauerat, postea tamen cum scientiæ præsidio destitutus esset, non paucos dies Solis declinationem tum detraxit, quando erat adijcienda, tum adiecit, quando erat detrahenda. Sed ut finem imponamus huic tractationi, uel ex ipsa Ptolemæi demonstratione, uel ex propriis principijs scientiæ triangulorum constare arbitramur,

tramur,

tramus, Sole equaliter recedente à circulo æquinoctiali, siue ad Boream; siue ad Austrum, æquales haberi arcus latitudinis ortus. Atqui in omnibus horizontibus ijdem rumbi ad easdem partes pertinent, in duobus præterea locis quorum unus borealis est, alter australis æqualis altitudinis poli, æquales facit Sol latitudinis ortus, & ad eandem horizontis partem. Igitur cum in principio Cancrī fuerit constitutus, ijdem duobus locis æquali oriatur inclinatione. Oritur autem cum est in tropico Capricorni ad Suëstem, quarta una & dimidio ferè quartæ addita uersus Lestem, ijs qui borealem altitudinem habent graduum 35. Quapropter & ijs etiam qui æqualem altitudinem australis poli habent, oriatur eodem tempore similiter ad Suëstem, quarta una & dimidio ferè quartæ addita uersus Lestem: æquales enim relinquuntur arcus quadrantis orientalis australisq; in utroq; horizonte. Quicumq; enim animaduertit acus nauticæ Lestem ubiq; locorum in ortum æquinoctialem tendere, sanè quoniam Sol ab æquinoctio autumnali usq; ad uernum declinat ab Æquatore uersus Austrū, protinus intelliget in toto terrarum orbe per ijdem tempus ad eos rumbos oriri, qui ad quadrantem pertinet Orientalem Australemq;, quemadmodum in subiecta figura apparet, in qua circulus a p c o, meridianum repræsentat duorum locorum sub l, & k, positurum, quæ quidem loca pares habent latitudines ad differentes mundi



partes l, ad Boream k, ad Austrum. Sit a b c, æquinoctialis, circulus Cancrī sit d e, Capricorni uerò f g. Horizonti loci, sit m b n, loci autem k, sit o b p. Quoties igitur Sol Cæcrum fuerit ingressus ex oriatur ad r, in horizontē Borealis loci, at in horizontē loci australis exoriatur ad t. Et quoniam duo arcus b r, & b t, quadrantum orientalium borealiumq; b m, & b o, æquales sunt: Sol igitur ijs qui sunt ad l, & ijs qui sunt ad k,

similes faciet exortus. Sunt autem b l, & b k, eorum uerticalium circuloꝝ quadrantum qui Lestem ostendunt, quadrantum uerò l r, & k t, eorum uerticalium sunt, qui Solis exortus in ipsa die Cancrī ostendunt: ipsis igitur circumferentijs b r, & b t, æquales anguli respondent b l r, & b k t, ad uertices l, & k. Quoties autem Capricornum Sol ingressus fuerit, ijs

qui sunt ad l, exorietur ad s, ijs uerò qui ad k, exorietur ad z. Et quoniam circumferentiæ b s, & b z, æquales sunt, utrobique igitur similes faciet exortus in ipsis quadrantibus Orientalibus atque Australibus. At uerò quoniam hæ omnes rumborum circumferentiæ æquales inuicem sunt, liquet igitur tanto solem exoriri supra Lestem cum est in Cancro, quanto infra Lestem cum est in Capricorno. Vt si quadrans l r, eat ad Nordestem eorum qui sunt ad l, quadrans igitur l s, tendet ad Suëstem. Sic igitur utramque soluimus ambiguitatem. illud tamen superest explicandum, nempe Martinum Alphonsum (ut superius diximus) in loco quodam Australi gradibus 35. ab æquinoctiali distante Solis ortum obseruasse cum initium Capricorni teneret, eumque orientem uidisse ad Suëstem, quarta una addita uersus Lestem: noster tamen calculus ultram quartam unam dimidium ferè adiecit unius quartæ, nec mirum. Quoniam Sol ipsa oriretur die, non potuit exactissimè & sine ullo errore sola acu nautica deprehendi, sed operæ pretium erat quidpiam aliud superaddere eidem instrumento, quemadmodum alio in loco admonuimus, & ea de causa medietas ferè unius quartæ omissa fuit. Enim uerò ex data poli sublimitate, atque ex gradu Solis cognito, nullius instrumenti adminiculo, quin & ipso etiam sole non uiso, euidenti ac necessaria ratione concludimus gradus 29. circumferentiæ horizontis eodem ipso die contineri inter punctum exortium & Lestis punctum. Atqui Suëstes cum quarta Lestis gradus comprehendit 33. Sc. 45. differentia igitur quæ gradus continet 4. cum minutis 45. dimidium ferè est unius quartæ, est enim aliquanto minor. Et proinde Sol cum est in initio Capricorni constitutus, ijs qui altitudinem poli habent graduum 35. ad Suëstem oritur cum quarta una & dimidio ferè quartæ uersus Lestem. Quoniam uero in nauticis instrumentis consuetis ultra dimidij quadrantis quartam nihil præterea adnotatur, non potuit idcirco sola acu nautica hoc exactè deprehendi. Geometrica porrò demonstratio euidenter ostendit, Solem in tropico hyberno ijs duntaxat exoriri ad Suëstem cum quarta Lestis, qui altitudinem poli habent graduum 44. in nostra uerò hac habitatione ad Suëstem cum quarta Lestis duobus gradibus & minutis 45. additis uersus Lestem, quoniam latitudo ortus graduum est 31. Quæcunque igitur super his rebus à nobis scripta sunt, citra omnem ambiguitatem recipi debent, quum demonstratione mathematica nihil sit certius, nihil euidentius, cui quidem nemo unquam refragari poteris.

De re

13

Petri Nonii Salaciensis de regulis & instru


mentis, ad uarias rerum tam maritimarum quàm & coelestium
apparentias deprehendendas, ex Mathematicis
disciplinis Liber II.

De carta marina nautarum uel planisphærio Cap. i.




Lusitanorum nauigationes hoc sæculo factas admirabi-
les esse nemini incompertum est. Lusitani enim Ocea-
num transnatare ausi sunt: nouas reppererunt insulas anti-
quitati prorsus incognitas, noua littora, noua maria, nouos
atq; nunquam uisos populos. Non eos perterruit in-
gens calor exultæ zonæ, neq; immodicum frigus gelidæ, quin continuis
profectionibus tandiù nauigarent, donec ultra æquinoctialem ingens
illud Africæ promontorium, quod bonæ spei caput appellant, præ-
teruecti, iterumq; in Borealem plagam se recipientes, Æthiopicum ma-
re quod in Iroglodytica est, Arabicum, Persicum, transgressi in Indiam
tandem appulerint. Inde uerò ultra Gangem, ultra Iaprobanam, in re-
gionem Sinarum, atq; in insulas ad orientem Solem maximè spectantes
peruenerunt. Hæc uerò ab eis nec temerè quæsitæ, nec casu reperta fue-
runt. Gestabant enim Astronomica instrumenta ad astrorum observa-
tiones, tabulasq; motus Solis & Lunæ, à Mathematicis numeris atq; cer-
ta ratione designatas: illud præterea uium diuinumq; organum priscis
hominibus incognitum, quod acum nauticam appellant. Cuius qui-
dam circumferentia quæ Horizontem repræsentat, in partes æquales
32. diuisa mundi cardines ostendit. Huius instrumenti beneficio terras
relinquere ausi sunt, & in altum prouehi à littoribus procul, adeò ut ac-
ciderit aliquando Lusitanorum naues post menses sex in Indiam appel-
lere, nulla interim uisa insula, nulloq; uiso continente. Prisci uerò nauæ
cum eo organo carerent, mirandum non est quòd tantum propè oras na-
uigarent. Ipsum uerò rectilineum orbis planisphærium quo hodie utun-
tur, quanquam ob parallelorum quam facit æqualitatem, ueram orbis
imaginem præbere non possit, arti tamen nauigandi quam ipsi exercēt,
ualde conueniens est. Nam quòd insula una, aut terræ tractus quiuis,
longior appareat in eo, quàm uerè sit, parum referre uidetur ad nauigan-
tium usum, dummodo locorum distantia secundum partes maximi cir-
culi, aut stadia, aut miliaria, aut alias quascunq; mensuras cognoscantur.
Claudius enim Ptolemæus præstantissimus mathematicus quum in pri-
mo libro Geographiæ distantiam inter Cori promontorium & Sinam

inuestigare uellet, & inter alia quædam loca quæ in Gangetico sinu sunt, rectas lineas æquidistantes pro meridianis accepit, rectas etiam æquidistantes pro circulis parallelis. Triangulis itaq; rectilineis pro sphericis usus est, quod rursus facit in magna astrorum compositione libro quinto, quum eos angulos inquirat, qui ex concursu sunt zodiaci & meridiani, atq; diuersitatem aspectus Solis & Lunæ. Nec dubitamus eundem fuisse Ptolemæum qui utrunq; opus Astronomicum et Geographicum composuit, cum in secundo libro magnæ compositionis Geographiam à se editam commemoret, rursus uerò in octauo Geographiæ ipsum opus Astronomicum, in utroque autem opere sub eadem ferè ponitur quantitate maxima Solis ab æquinoctiali circulo declinatio. At ut constare possit quo nam modo & quibus in locis, rectis lineis pro circularibus sit utendum, unum sequemur exemplum primi libri. Navigationem à Corura in Paluras usq; (ex traditione Marini ait) ad ortum hyemalem esse stadiorum 9450. à quibus propter cursus inæqualitatem tertiam partem adimit, stadia nempe 3150. & relinquentur 6300. pro directâ distantia. Horum uerò sextum aufert, & relinquentur idcirco stadia 5250. idest gradus 10. Sc. 30. pro distantia meridianorum eorundem locorum. Esto enim Corura a, Palura b, meridianus per a, sit a c, parallelus



per b, sit b c, distantia inter a, & b, cum navigationis inæqualitate stadiorum sit 9450. detracto autem uno tertio, erit arcus a b, stadiorum 6300. directum nempe interuallum inter a, & b; arcus uerò a c, differentia latitudinis erit eorundem locorum, at b c, longitudinis differentia in circulo parallelo æquinoctiali, angulus igitur qui ad c, rectus erit, sed qui sub b a c, acutus sitū demonstrat loci b, respectu a. Et quoniam supponit Paluras distare a Corura ad exortū hybernū, unde Eurus spirat: diuiso igitur australi orientaliq; quadrante in tres æquales partes pro antiqua uentorum distinctione, ipse positionis angulus b a c, duas earum comprehendet. Quapropter si pro spherico triangulo rectilineū sumamus a b c, reliquus acutus angulus c b a, tertia pars



erit unius recti, ipsa uerò a b, recta linea trianguli a b d, æquilateri latus erit, & recta a c, eius dimidium, b c, cathetus. Quadratum itaq; ex a b, ad quadratum ex b c, sesquiterciam habebit rationem. Et quoniam quadratorum ratio dupla est quàm laterum, ratio igitur a b, ad b c, erit ferè sesquiquinta, ut si a b, partium 5 quælium sex subiiciatur, eius quadratum erit 36. quadratum igitur ex b c, erit 27. cuius latus aliquanto maius erit quàm quinq;, crassiore itaq; computo eam Ptolemæus supponit quinq;, ut ratio a b, ad

b c, sit

b c, sit sesquiquinta. Quapropter ex ipsa a b cognita, uno detracto sexto, nota relinquetur b c, stadiorum uidelicet 5250. Et quia parallelus loci b, parum aut insensibiliter differt à maximo circulo, cum sit æquinoctiali uicinissimus, computatis igitur quingentis stadijs pro quolibet ipsius paralleli gradu, differentia longitudinis inter b, & c, decem comprehendet gradus cum unius gradus dimidio. Vides igitur hunc modum nihil differre ab eo quo nautæ nostri temporis utuntur. Qui multo tamen exactius supposita quantitate anguli positionis, distantiam meridianorum ex tabula quadam numerorum eliciunt, quam ad singulas positiones supputatam habent. Quoniam enim Ptolemæus rationem a b, ad b c, sicut sex ad quinque posuit, ducenta idcirco & amplius stadia ea supputatione sunt omissa, quibus equidem respondent plus quam duæ quintæ partes unius gradus. Hoc autem facile experieris in hunc modum. Quoniam enim a c, dimidium est a b, stadia igitur continet 3150, cuius quadratum si auferas à quadrato lateris a b, relinquentur 29767500. quadratum nempe lateris b c: ipsum igitur latus b c, stadia ferè comprehendet 5456. quibus gradus undecim ferè respondent. Illud præterea est aduertendum, itineris distantiam inter Coruram & Paluram æstimatione cognosci potuisse. cæterum ignoratis eorundem locorum latitudinibus, angulus positionis unius ad alterum cognosci non potuit, nisi fortasse notato situ atque distantijs ad quempiam alium locum. Ex Corura enim conspici Paluras est incredibile, sed si a d, sit arcus meridiani cognitus inter a, Coruram & locum alium qui sit d, distantia uerò




ipsius d, à Palura b, & ea quoque quæ inter a, & b, fuerint cognitæ, angulus idcirco situs d a b, à Corura in Paluram cognitus erit. Modus tamen parum exactus est, præsertim in tanto interuallo, & maritima profectioe. Iam uerò si subiicias tam diu nauigatum fuisse uersus exortum brumalem, eadem perpetuò seruata inclinatioe, donec ad Paluras peruentum fuerit, qui profectioe modus à recentioribus nautis acus nauticæ ad miniculo obseruari solet, manifestò apparet ex ijs quæ diximus in

superiori libro, confectum iter directum non esse: & proinde directam distantiam eorundem locorum aliam habere positionem ad Coruræ meridianum. Quòd si latitudines à circulo æquinoctiali cognitæ supponat Ptolemæus, minimo certè negotio meridianorum differentiam cognoscere potuisset, idque neglecto positionis angulo, sed sublato tantum quadrato differentia latitudinis ex quadrato directe distantia inter Coruram & Paluras: remanentis enim latus quadratum pro ipsorum meridianorum differentia accipiendum esset, quandoquidem rectis lineis

pro

pro circularibus uti uoluit. Sed si exactius id ipsum inuenire libeat, in sphaerico triangulo ex distantia locorum cognita, & complementis latitudinum etiam cognitis, eum angulum statim cognoscere poteris, qui ad polum mundi differentiam meridianorum subtendit. Vt cunque tamen positionis angulus cognitus fuerit, ex supradictis patet, eadem arte olim Ptolemæum usum fuisse ad locorum longitudes inueniendas, qua nautæ hodie utuntur. Quòd autem in quavis inclinatione locorum distantias contrahat ad rectitudinem capiendam, consultius & cautius id facit, quàm nostri nautæ. Hi enim spatium quod nauigando multis ambagibus conficiunt, in rectum producunt. Quare necesse est ut ad aucta ea linea quæ rectum subtendit angulum, in eadem quoque ratione locorum latitudes atque longitudes ultra metam sint extensæ, quod in subiecta apparet figuratione. In ea enim sicut a e, distantia ad a b distantiam, sic a d, longitudinis differentia ad a c, longitudinis differentiam, et eandem quoque rationem habent d e, & b c, latitudinis differentie. Quoniam uerò in magnis ac diuturnis nauigationibus non raro hoc committunt: nihil igitur mirum si ab Hispania in Indiam interuallum ultra modum extendant.




Idem enim sine discrimine faciunt in quavis locorum inclinatione, quod quando sub uno meridiano, aut sub uno nauigant parallelo. Præterea quod Ptolemæus tantum facit in locis propinquis æquinoctiali, & in distantia mediocri, ipsi in uniuersum per totum orbem, & in quammaximis distantijs audacter pro sphaericis triangulis rectilineis utuntur. Sed nihilominus littorales orbis descriptiones eorundem nauigationibus confectæ multò certiores sunt, quàm quæ traditæ sunt à Ptolemæo: qui partim coniecturis, partim uerò falsis quorundam hominum relationibus longitudinem atque latitudinem habitati orbis dimensus est. Eclipses enim Lunares neque frequenter fiunt, neque cum fierent, erant ubique Mathematici qui obseruarent, præsertim apud barbaras nationes. Est enim modus inueniendi longitudes locorum ex Eclipsibus omnium certissimus, sed qui à nautis negligitur, tametsi eorum tabulas habere possint in multos annos exaratas. Quod si contingat quempiam ab eis obseruari, eum locum in quo facta est obseruatio eadem prorsus arte in marina charta collocant, qua in globo, per gradus nempe longitudinis & latitudinis, in quo equidem errant. In primis enim differentia longitudinis in parallelo dati loci sumpta in partes maximi circuli, uel in mensuras nostras consuetas conuertenda est, & per eas deinde in eadem marina charta ipse locus collocandus. Ea porro loca quæ extra circulum æquinoctialem sub uno parallelo nauigantibus obseruntur,

de Obser. Reg. & Instr. Geom. Lib. II. 17

feruntur, quo nam modo collocari debeant in ipsa marina charta, non est facile definire. Quod ut planius intelligatur, duo concipiamus loca quæ æquales ferè latitudines Boreales habent, & ab uno in alterum quotidie nauigant Lusitani, ea autem sunt Olissippo, & ea insula ex occidentalibus Portugaliæ quam tertiam appellant. Habet enim Olissippo gradus ferè 39. latitudinis, ipsa uerò tertia insula gradus ferè 40. Distantiam porro eorundem locorum explicat marina charta nostrarum leucarum 262. circiter, æqualem uidelicet quindecim gradibus meridiani, tantam enim nostri nauitæ sæpissimè inuenisse aiunt, non solum æstimatione confecti itineris, cum à Leste in Oestem nauigant ad eandem insulam sed alio multò certiore calculo. Nauigatio enim ab Olissippone, in insulam quam Materiæ appellant, est ad Sudoestem: ab hac autem in tertiam insulam est ad Noroestem. Et quoniam à Nordeste in Sudoestem, similiter & à Sueste in Noroestem, tantum spatium comprehenditur inter meridianos quantum inter parallelos, idest tanta est differentia longitudinis quanta latitudinis, propterea quòd angulus positionis in utraque nauigatione dimidio recti sit æqualis, ipsa uerò materiæ insula latitudinem Borealem habet graduum 32, idcirco supposita structura rectilinei planisphærii quo nauitæ nostri temporis utuntur, inter Olissipponem & tertiam insulam spatium quindecim graduum maximi circuli comprehendere necesse est, sed ipsius paralleli graduum 39. aut 40. latitudinis plures erunt gradus in eodem spatio. Hac profectò arte usus est Ptolemæus libro primo Geographiæ pro inueniendis locorum distantijs. Cæterum illud ambiguitatis relinqui uidetur. Enim uerò si inter Olissipponem & insulam tertiam ipse arcus paralleli quadraginta graduum latitudinis quindecim gradibus maximi circuli est æqualis, cum in omni parallelo grammo latera opposita sint æqualia: erunt igitur in ipsa marina charta quindecim gradus æquinoctialis comprehensi in ipso æquinoctiali inter eorundem locorum meridianos, quod quidem ex Theodosio libro 2. impossibile esse liquet. Hanc tamen dissolues ambiguitatem, si intellexeris fieri non posse ut utræq; rectæ lineæ æquinoctialis parallelos ad rectos angulos secantes pro meridianis ponantur in ipso æquinoctiali, aut in eis parallelis qui à prioribus plurimum distant, nisi ratio seruetur meridiani ad parallelum medium, quæ admodum Ptolemæus faciendum admonet in tabulis prouinciarum, ne sensibilis error committatur. Præterea neminem perturbari uelim, quod nauigationem ab Olissippone in insulam Materiæ ad Sudoestem fieri dixi, ipsamq; insulam ab Olissippone distare ad medium quadrantis Australis Occidentalisq; quod nullo modo fieri posse planè constat. Nam si soluentes ab Olissippone nauis proram dirigamus ad Sudoestem, tam diuq; nauige

mus sub ipsa eadem inclinatione, donec ad insulam Materiæ perueniamus, alia inuenta erit positio, quàm quæ dimidij quadrantis. Cæterum hac etiam liberaberis difficultate, si animaduuerteris in distantijs non admodum magnis parum aut nihil referre, si uel dixeris distare locum à loco ad Sudoëstem, aut quam diu nauigamus ab uno in alium semper pro ram dirigi ad Sudoëstem. Ex prædictis idcirco elicies, qua'nam arte ea loca collocanda sint in nautarum planisphærio, quæ sub uno nauigantibus parallelis sunt oblata. Constare etiam arbitror ex ijs quæ à nobis dicta sunt hoc in loco, & in priori libro, quòd non solum contingat allucinari circa situm multorum locorum quos marina charta sub uno ostendit meridiano, sed etiam in alijs distantiarum positionibus inclinationibus. Est enim meridianus norma quædam aliarum positionum: ubi igitur in situ meridiani erratum fuerit, in inclinationibus etiam reliquorum rumborum lapsum fieri necesse est, & proinde non omnis positio inclinationis uel loci à loco, quæ in marina charta explicata reperitur, pro uera accipienda est, sed ea tantum sub qua ab uno in alium nauigatum fuerit aliquando. Exempli gratia ab Olissipone à directâ uia nauigantibus uersus polum Austrinum offeratur locus d, sub æquinoctiali circulo positus, ad Sudoëstem uerò nauigantibus sub latitudine graduum 32. insula materiæ b: recta igitur a d, in marina charta latitudo est loci a, perpendicularis b e, latitudo loci b, perpendicularis uerò b f, distantia inter meridianos ipsorum locorum a, & b, in ipsius loci b, parallelo: notetur autem locus c, ultra e in recta linea c d, æquinoctialem




representante, qui & in globo, & in marina charta, uno atq; eodem numero graduum distet à loco d. Quatuor igitur loca a, b, c, d, rectè posita sunt in charta. Cæterum b, ipso e, occidentalior est, constat hoc ex supradictis. Quapropter perpendicularis b e, uerum situm non habet meridiani, nec angulus e b c, positionem loci c, respectu b, demonstrare poterit in ipsa marina charta. Cæterum sit eadem loca a, b, c, & d, eadem arte in globo collocarentur, ductis meridianis per a, et b, maximis etiam circulis ductis per a b, & per b c, haud dubiè ueras inter se seruaarent positiones. In eo enim si quædam loca per latitudines & longitudinis differentias collocaueris, quædam uerò per latitudines & angulos positionum, omnia tandem inter se debitam habebunt positionis conuenientiam, quod in marina charta multò aliter euenire solet. Id etiam in ea nauigatione quæ à nostris in Indiam fit, intueri licebit. Enim uerò promontorium illud Aphricæ trium cuspidum latitudinis Borealis quatuor graduum cum dimidio, & insulas Tristani à cugna quæ gradus 36.

Austras

Australis latitudinis habent, sub uno atq; eodem meridiano marina charta demonstrat: interuallum præterea inter easdem insulas & promontorium bonæ spei quadringentas ferè leucas continere, quæ tamen simul stare non possunt. Nam si littora omnia à promontorio triū cuspidum usq; ad promontorium bonæ spei rectè descripta sunt, & ipsum idem promontorium trium cuspidum cum eisdem insulis sub eodē iacet meridiano, necesse est igitur prædictam distantiam multò minorem esse, seruata graduum & parallelorum proportione. Sed si minor non est, fieri non potest ut eūdem habeant meridianum cum ipso trium cuspidum promontorio, quinimo erunt occidentaliore. Hinc fit, ut sapissimè decipiantur nauæ cum ex uno loco alium petunt, eam positionem sequuti quam ostendit marina charta. Quem cum minimè ea nauigatione reperiant, erroris causam putant esse, uel aquarum celerem in aliam partem defluxum, uel polorum magnetis à ueris polis mundi declinationem, quanquam ob id solum fortassis errarunt, quòd quales positiones ea loca inter se haberent, cognitæ nōdum haberent. At non solum in eo decipiuntur, quòd marinam chartam existiment omnium locorum situs referre posse, sed quòd quotiescunq; littora in globum transcribere uolunt, habitantur ratione ad numeros graduum longitudinis & latitudinis in ea repertos, id efficiunt, ac non aliter, quàm cum stellas fixas collocant. Ita fit ut non solum ij committantur errores, qui necessariò prodeunt ex charta, quia plana est, sed alij etiam quos euitare poterant, si quas distantias uerè cognitæ habēt, in primis in gradus conuerterēt, deinde uerò ipsas locorum longitudes & latitudes sequerentur. In littorum porrò descriptione maris mediterranei, quoniā aduertimus locorum latitudes multò maiores, quàm uerè sint, positas esse, opus est emendatione. Alexandria enim in qua Ptolemæus tam multas fecit astrorum obseruationes latitudinem Borealem habēs graduum 30. cum mi. 58. ponitur in marina charta sub latitudine graduum 36. Rhodi latitudo gradus tantum habet 36. Sed ponitur in eadem charta graduum 42. Romæ latitudo gradus ferè 42. comprehendit, in eadem tamen reperitur graduum 46. Venetiæ in medio quadrantis positæ, & in quibus æquinoctij tempore par est umbra gnomoni, nempe graduum 45. latitudinis, quinquaginta uidentur habere, & in reliquis ferè locis omnibus latitudes similiter auctæ sunt. Cuius erroris causam cum aliquando quaesuissem, id mihi succurrit, quòd propter angustiam maris mediterranei, & quia frequentes in eo sunt nauigationes, locorum inuicem positiones & intercapedines exactè sunt exploratæ, atq; compertæ, adeò ut nauigantibus non sit opus Astrolabijs, aut latitudinis cognitione. Quoniam enim omni die uel aliquam insulam, uel continentem oculis cernunt nauigantes,


gantes, quo in loco sint facile possunt agnoscere. Superioribus etiam sæculis Hispanicum mare, Gallicum & Germanicum, idcirco sine instrumentis Astronomicis nauigabatur, quia oras tantum lustrabant, deinde uerò quoniam recentioribus Lusitanorum nauigationibus maximè orbis partes sunt peragratae, quod quidem sine auxilio Mathematicarum artium effici non potuit: coeperunt itaq; nauitæ locorum latitudines obseruare, & in chartis annotare. Cum igitur uellent mediterraneum cum Oceano componere, ut una cohærent, altiorem fortè situm sortitum est quàm debuerat. Vel si iam rectè cõnexa continuataq; sunt, fuit fortasse erroris causa quòd distantia inter maritima loca mediterranei Italici miliaribus fuerunt annotatae, sed littorum Oceani uel gradibus uel Hispanicis leucis: marinarum uerò chartarum artifices miliaria in gradus aut in leucas perperam conuerterunt. Vel quod deniq; magis probo, uel littorum mediterranei positiones, uel distantias, nauitæ non satis notarunt, & proinde non solum latitudines, sed etiam longitudes à ueris declinasse necesse est. Esto enim in marina charta recta a, b, rûbus Lestis & Oestis, sit a c, quiuis alius rumbus aliam ostendens positionem, eã nempe qua itur à loco a, in c, recta uerò b c, rectos efficiat angulos cum a b, in



puncto b. Erit igitur ipsa recta ac duorum locorum a, & c, intercapedo b c, differentia longitudinis. Intelligamus deinde unam aliam positionem quæ angulo denotetur b a e, sub æquali tamen intercapedine quæ sit a e, differentia latitudinis inter loca a, & e, erit d e, priore maior, at longitudinis differentia erit a d, priore minor. Descriptis enim circulis circa triangula rectangula a d e, & a b c, rectæ lineæ a c, & a e, inuicem æquales descriptorum circulorum diametri fient. Quapropter ipsos circulos æquales esse necesse est. Angulus autem d a e, maior ponitur quàm b a c, maior igitur erit arcus anguli d a e, arcu anguli b a c, & proinde recta subtensa d e, maior quàm b c. Eodem argumento quoniam angulus a e d, qui relinquitur ex duobus rectis minor est quàm a c b, minor igitur erit a d, quàm a b. Hæc autem ad impossibile facile poteris demonstrare ex primo Euclidis. Quòd si locorum inuicem positiones seruatae sunt, sed distantia ultra proprios fines sint extensa, utraq; differentia longitudinis & latitudinis aucta erit. Quo'nam igitur modo tantus acciderit lapsus dubium est, sed latitudines ueras non esse certò scimus. Ex quo fit ut longitudes quoque plerunque falsæ sint. Fortasse tamen uniuersa mediterranei longitudo à freto Herculeo ad sinum Ibsicum, quam marina charta ostendit uera est, quanquam in partibus erratum fuerit. Id enim fieri potuit, si quantum longitudinis inter aliqua loca redundat, tantum in reliquis deficiat. Cæ-

terum


terum latitudines falsas esse nemo ibit inficias, si præter ea quæ diximus eum Isthmum qui inter mediterraneum & Arabicum sinum est, inspexerit. Nam differentia latitudinis inter Pelusium & interiorem partem Arabici sinus ubi olim Heroum ciuitas, paulò maior est uno gradu, quæ tamen in marina charta non minor est quinque gradibus. Differentia longitudinis quæ propemodum nulla est, idcirco multò maior apparet, quoniam littoralis descriptio mediterranei secundum partes maximi circuli in eadem charta facta est, quæ tamen si ad partes gradusue sui paralleli traduceretur in utrouis Ptolemæi planisphærio, iam Pelusium & recessus intimus Arabici sinus sub uno ferè meridiano comprehendi uiderentur. Hoc autem in globo quàm aptissimè fieri posset, non quemadmodum nostri artifices facere consueuerunt, qui eundem numerum graduum in plana descriptione marinæ chartæ repertum ad globi parallellos transferunt, nulla obseruata inæqualium circulorum ratione. Pelusium idcirco multò ante suos fines relinquitur, & mediterranei atq; Arabici sinus intercapedo in ipso Isthmo perquàm magna, nisi interim uelint mare rubrum ultra proprias metas producere ad id uitium occultandum. Aduertimus præterea (quemadmodum superius admonuimus) multa esse loca quæ cum longitudine differant, in marina tamen charta eundem uidètur habere meridianum. Sint enim in ipsa marina charta rectæ lineæ a b, & c d, æquidistantes pro meridianis positæ, rectæ uerò e f, &



g h, in eas perpendiculares parallellos representent, uidelicet e f, æquinoctialem, sed g h, unum alium ex æquidistantibus, recta uerò a k, meridiani quadrantem. Duo autem loca y, & k, compertum fuerit sub uno atq; eodem meridiano esse, à quibus duo alia loca r, & z, equalibus distent interuallis y r, & k z. Videbuntur igitur r, & z, eodem comprehendi meridiano: posita enim sunt in recta linea c d, at non est ita. Imo uerò si est y, ipso r, orientior, erit etiam locus z, eodem r, orientior. Quoniam enim æqualia spatia subiiciuntur k z, & z r, maiorem parallelum representat e f, quàm g h, patet igitur gradus sui circuli continebit k z, quàm y r. Atqui circuli meridiani æqualem numerum graduum auferunt ex omnibus parallelis: distabit igitur z, à meridiano loci r, Orientem uersus, nisi parallelorum differentia adeò sit exigua ut alter alteri æqualis existimetur. Sed si eum locum paralleli e f, cognoscere cupis qui communè cum r, meridianum

C 3 habet,


habet, ipsorum parallelorum ratio elicienda erit in primis uel ex tabula numerorum ad id confecta, uel ex instrumento inferius posito, deinde uerò spatium yr , multiplicabimus in numerum qui debetur parallelo ef : productum tandem diuidemus per numerum paralleli gh , & prouenit ex partitione distantia loci k , ab eo loco qui eundem habet meridianum, quem locus r . Ea igitur computetur, aut circini officio in parallelo ef , adnotetur, sitq; exempli gratia k & t loca igitur r , & t , sub eodem erunt



meridiano. Vt si gh , parallelum p̄ Rhodum representet latitudinis nempe graduum 36. ef , uerò æquinoctialem circumlum, eorum ratio elicietur ex tabula, uel ex instrumento ferè sicut 5. ad 4. spatium yr , 80. contineat stadia, quæ quidem multiplicabimus in 5. productum uerò diuidemus per 4. & uenient ex partitione stadia 100. Accepta igitur ex ef , recta kt , 100. stadiorum, duo igitur loca r , & t , sub eodem dicemus esse meridiano. Cæterum quanquam ita sit, non est ob id ipsum suspicandum, rectam lineam ductam per r , & t , meridianum representare. Nam si recta linea tr , meridianum representat, cum duo anguli ad k , & t , sint minores duobus rectis, producta igitur eadem tr , in rectum, concurret cum ab . Non quidem ante a , nam fieri non potest ut aliquod punctum præter polum in duobus existat meridianis, est enim a , polus. Neq; concurrere potest in ipso a , polari puncto. Nam si concurrat, ducatur igitur linea recta al parallelum representans latitudinis 60. graduum, cuius sectio cum at , sit in puncto m . Erit idcirco propter similitudinem triangulorum akt , & alm , sicut ak , ad al , sic kt , ad lm . Atqui recta ak , ad rectam al , triplam habet rationem: tripla est igitur recta kt , rectæ lm . At uerò circumferentia æquinoctialis duobus meridianis comprehensa dupla est eius circumferentiæ quæ in parallelo graduum 60. latitudinis eisdem comprehenditur meridianis, ratio enim diametrorum eorundem circulorum dupla est. Quapropter recta kt , ad rectam lm , duplam habet rationem, ostensum est autem quòd & triplam, impossibile igitur. Et proinde si recta at , meridianum representat, non concurret cum ak , in ipso a , polari puncto. Sed si denique dicatur concurrere cum eadem ab , producta in rectum supra a , secabit igitur polarem lineam ac , secet itaque in n , quemadmodum in subiecta figura. Et quoniam circulorum circumferentiæ & diametri eandem habent ratio-

nem,


nem, rectarum uerò linearum ratio in infinitum augeri potest. ex paral-
lelis igitur unum sumemus in sphaerica superficie ad quem æquinoctia-
lis maiorem habeat rationem, quàm kt ad rectam an , eumq̃ in marina
charta recta pq repræsentet, cuius quidem spatium inter duos meridia-



nos ak , & tn , comprehensum sit recta su . Re-
cta igitur linea kt , ad rectam su , eandem habe-
bit rationem, quam æquinoctialis circulus ad
assumptum parallelum seruat. Atqui eiusmo-
di ratio maior posita est quàm quæ rectæ kt ,
ad rectam an , maiorem igitur rationem habe-
bit kt ad su , quàm ad an , & proinde minor
erit su quàm an . At facile demonstrabitur
maiolem esse, ducta perpendiculari à puncto
 n , in su , quæ necessario cadet inter u & s , quo-
niam angulus nus , acutus est: sequitur igitur
impossibile, & proinde recta linea tr , concu-
rere non poterit cum ak , si meridianum repre-
sentat. At necesse est concurrere per Euclidis

postulatum: non repræsentat igitur meridianum ipsa tr , in marina char-
ta, quod demonstrandum suscepimus. Atque ex his intelliges planam
illam orbis descriptionem, in qua quidem rectæ lineæ pro meridianis po-
nuntur, traditam à Ptolemæo in libro primo Geographiæ, parum con-
uenire cum ea quæ in sphaerica superficie facta est. In ipsa enim plana
descriptione æquinoctialis ad parallelum qui per Rhodum scribitur, ra-
tionem propemodum habet sesquialteram, nempe sicut 115. ad 79. Que
tamen sesquiquarta deberet esse, & idcirco ipsæ rectæ lineæ ijs dum ta-
xat locis meridiani erunt, quæ in æquinoctiali & parallelo qui per Thy-
lem transit, posita sunt: non ijs quæ in Rhodi parallelo. Assumit autem
4. gradus meridiani medijs quos pro quinque constituit in ipso Rhodi pa-
rallelo, ut in eo saltem longitudo orbis habitati eam seruet rationem ad
uniuersam latitudinem, quam in sphaerica superficie habet. Cæterum
constat hoc fieri non posse ea arte qua ipse usus est, rectilineo cum curui-
lineo nullatenus congruente. Quapropter multo melius id ad hunc mo-
dum efficies. Esto kmn , semicirculus ipsius paralleli, qui per Rhodum
transit, quam in 22. æquas partes secabimus, earumque sumemus km , se-
ptem partium. Æqualis igitur erit ipsa circumferentia km semidiame-
tro gk , per ea quæ demonstrauit Archimedes de circuli dimensione. Er-
erunt idcirco in eadem km , gradus 79. medijs meridiani, quos Ptolemæ-
us ponit continere rectam gk . Ab ijs igitur septem reñciantur, quos cõ-
prehendat circumferentia mz , undecima ferè pars ipsius km , & relin-
quetur

quetur idcirco circumferētia kz , graduum 72. mediū meridiani. Et quoniam in spherica superficie gradus 72. meridiani gradibus nonaginta illius paralleli qui per Rhodum transit pares sunt, ipsam igitur kz , in sex spatia æqualia secabimus, & erit quodlibet eorum unius horæ intervalum in ipso eodem Rhodi parallelo.




Rectas itaq; ducemus lineas à puncto g , per singulas diuisionum notatas horariorum interuallorum usq; ad æquinoctialem, & horarium interuallum (si libuerit) in tres æquales partes secabimus. Idemq; faciemus in circumferentia ko , quam æqualem constituemus ipsi kz , & reliqua deinde quemadmodum admonet ipse Ptol. Quòd si ipsum planisphaerium tali arte describere libeat, ut extremi paralleli æquinoctialis nempe, atq; is qui per Thylem transit, cam seruent rationem inter se, & ad meridia

dia

de Obser. Reg. & Instr. Geom. Lib. II. 25

dianos, quam in sphaerica superficie habent: illud idem faciendum erit in æquinoctiali, qd modo fecimus in Rhodi parallelo. Æquinoctialis enim semicirculus in 22. æquas partes secandus erit, quarum quidem septem semidiametro gs , id est gradibus 115. mediæ meridiani æquales erunt. Reiectis igitur gradibus 25. relinquentur tandem nonaginta, interuallum nempe sex horarum. Quod quidem in sex spatia secandum erit, & recta lineæ ducendæ à centro g , reliquaq; (uelut antea) peragenda. In alia uerò plana orbis descriptione ipsius primi libri multis syllogismis inquirat, quanta sit recta lineæ fg , in subiecta figura. Est enim g , commune centrum æquinoctialis & reliquorum omnium parallelorum. Quod tamen poterat facillimo calculo atq; demonstratione inuenire. Nam quoniam ef , talium partium est 23. cū qnq; sextis qualiū est be , 90. & est g centrū circuli bfd , semicirculus igitur perficiat fb & connectatur br . Quapropter angulus fb , supra diametrum in circumferentia existens rectus erit, & idcirco sicut ef ad eb , sic ipsa e bad e , per 9. propo-



sitionem sexti libri elementorum Euclidis. Multiplicabimus igitur eb , nonaginta nempe partes in se ipsas, productum uerò quod est 8100. diuidemus per ef , habentē 23. cū qnq; sextis et ueniēt ex partitione partes quas habet er , quibus addemus 23. cum qnq; sextis q; sunt in ef & cōflabit fr , cuius quidem dimidium est fg . Vt cunq; tamen in plano orbem designauerit Ptolemæus, eam rationem describendi particulares prouinciarum tabulas, qua ipse usus est, magis probamus ad nauigandi artem. Quippe in quibus rati meridiani ad parallelum mediū seruetur. In eis enim propter meridianorum æquidistantiam pares perpetuo angulos efficit quæ

D bula uni

uis recta lineæ in ipsos incidens meridianos. Extremos autem parallelos non admodum à se inuicem distare oportet. Et ponenda est in omni ta-

bula uniuersa orbis longitudo, latitudo uerò ueluti per climata. Quamuis enim prouincia tota non in tabula una integra reperiatur, sed diuisa, non admodum refert ad id institutum. Hoc tamen admonemus, pauca aut nulla propemodum loca transferri debere ex consueta marina charta ad has tabulas, ob incertitudinem longitudinis locorum in ea positorum, multò autem minus ex tabulis Ptolemæi. Sed his tantum utiles erunt huiusmodi tabulæ, quibus in animo fuerit orbem denuò peragrare, atque ueros locorum situs examinare. Omnium tamen certissimus modus erit si tortuosæ illæ atque fractæ rumborum lineæ in globi superficie ducantur, quas in priori libro diffiniuimus. Tum uerò ex deprehensa in utroque distantia termino altitudine poli, & qualitate itineris, differentia longitudinis, & locorum intercapedo cognita erit. Sed si ex confecti itineris longitudine hoc uelis experiri, detrahendum erit in primis id quod propter uiarum obliquitates redundat, quod nostri nauæ non faciunt. Ex eclipsibus porrò longitudinis inuentio omnium calculo comprobata est. Præterea per motum Lunæ, aut eius congressum cum sydere aliquo fixo: de qua quidem in uestigatione in libro de erratis Orontij fingi loquuti fuimus. Hæc de nauarum planisphærio dixisse sufficiat.

De tabula illa numerorum qua nauæ utuntur, ad inueniendum quantum sit directum interuallum, nec non longitudinis differentia inter quæuis duo loca in marina charta posita. Cap. 2.

HAbent præterea nauæ tabulam quandam numerorum à Mathematicis confectam, ex qua ipsi cognoscere possunt quantum sit directum interuallum, quod unaquaque itineris inclinatione unicuique gradui differentia latitudinis respondet, & quanta etiam sit meridianorum differentia sub eadem inclinatione. Ex qua rursus tabula si directum itineris interuallum inter duo loca, & latitudinis differentia cognita subiiciatur, distantiam inter meridianos & ipsam etiam inclinationem eliciunt. In triangulo enim rectilineo rectanguloque abc sit ab , meridiani pars latitudinis differentia duorum locorum a & c , sitque bc , differentia longitudinis eorundem locorum in parallelo loci c , recta uerò ac , directum interuallum inter ipsa eadem loca. Dico quòd si præter angulum rectum unus ex duobus acutis angulis cognitus fuerit, uel duorum laterum ratio cognita supponatur, reliqua omnia innotescunt. Nam quoniam sinus recti angulorum atque subtensa laterum eodem ordine sunt proportionalia, quod




statim

statim intelliges descripto circulo ad mensuram a c, super altero ipsius termino, si igitur angulus b a c, cognitus subiiciatur, ratio sinus totius ad sinum rectum eiusdem anguli nota erit. Et proinde ratio a c ad b c, cognita quoque erit. Ex angulo autem b a c cognito reliquus a c b, illico innotescet. Et proinde ratio a c ad a b, ignorari non poterit. Quapropter ex proportione trium laterum trianguli cognita, si unum eorum uel in partibus maximi circuli, uel in stadijs, aut quauis alia consueta mensura cognitum fuerit, reliqua latera in eadem mensura patefient. Sed si nullus angulus præter rectum supponatur cognitus, duo tamen latera cognita fuerint, reliquum latus per 47. propositionem primi libri Euclidis statim innotescet. Ex lateribus autem cognitis uterque acutus angulus per regulam numerorum proportionalium & tabulam sinuum rectorum cognoscetur. Quod si duorum laterum quæ cognita supponuntur alterum fuerit recto angulo subtensum, tertium latus cognoscere poteris absque radicis quadratæ extractione, dummodo tabula utaris sinuum rectorum. Nam si ratio a c ad a b, cognita est, intelligatur a c, sinus totus, et per regulam numerorum proportionalium recta a b, in partibus semidiametri cognita ueniet. Quare arcus cui ipsa a b, tanquam sinus rectus debetur cognitus erit, quo detracto ex quadrante arcus ille notus relinquetur cuius b c, sinus rectus existit. Cum igitur hac arte ratio a c ad b c, cognita fuerit, secundum eam mensuram qua cognita fuerit a c cognoscetur & b c. Nos ad eum modum ipsam numerorum tabulam examinamus

Inclinatio ad meridiana
num per quartas

Directum interuallum

Differentia longitudo
dinis




	Leucæ		Leucæ	
1	17	cum quinque octauis	3	cum semisse
2	19	cum tribus octauis	7	cum una quarta
3	21		11	cum duabus tertijs
4	24	cum dodrante	17	cum semisse
5	31	cum semisse	26	cum una quinta
6	45	cum dodrante	42	cum una quarta
7	89	cum dodrante	88	

nimus, atque multò exactiorem fecimus. Continet autem unus gradus circuli

D 2 culi

culi maximi in terrestri superficie leucas 17. cum semisse ut Lusitani as-
 sunt. Inter quos tamen sunt qui arbitrantur sedecim tantum compre-
 hendere eum duabus tertijs unius leucæ, ut sint in toto circuitu leucæ
 6000. Et quoniam secundum sententiam Ptolemæi & Marini uni gra-
 du maximi circuli quingenta respondent stadia, triginta uero stadia u-
 num conficiunt Schoenum, erunt igitur in uno gradu Schoeni 16. cum
 duabus tertijs. Quapropter leuca una uni Schoeno æqualis erit. Quod
 si ipsi Ptolemæo licet, quemadmodum scribit in primo libro Geogra-
 phiæ, ex cognita positione unius loci ad alium, & distantia uiatoria inter
 eadem loca, differentiam lōgitudinis metiri in rec̄ ilineo triangulo, non
 uideo cur similiter non liceat eisdem fundamentis dfferentiam latitudi-
 nis, & reliqua per omnem tractum atq; in uniuersum inuenire. Quæ ta-
 men si feceris, cum ijs pugnabunt quæ a nobis statim demonstranda es-
 sunt. Quoniam enim omnis nauigatio secundum maximorum circulo-
 rum circumferentias fit in exiguis quibusdam segmentis, quæ admodum
 fuit à nobis in Præfatione primi libri explicatum: in mundo igitur mul-
 to aliter fiet ijs qui secundum maximos circulos iter fecerint. Nam si ea-
 dem seruata fuerit latitudinis differetia, & eadem quoq; maximi circuli
 ad meridianum inclinatio, minor idcirco reperta erit uiatoria distan-
 tia, & minor similiter longitudinis differentia inter loca quæ à manifeste
 polo sunt remotiora, dum ad ipsum accedimus polum, eum inter loca
 eidem polo propinquiora. Sint enim in mundo duo loca a & f, à manife-
 sto polo c remotiora, quàm duo alia b & d. ceterum latitudinis differen-
 tia pares ponantur. Item maximi circuli scripti per a & f, & per b & d,
 pares faciant inclinationes ad meridianos ac & bc, sub acutis argulis c



a f & e b d. is autem qui uenit ab a circum-
 ferentia maximi circuli af, parallelum loa-
 ci f, attingat in ipso f, similiter qui uenit à
 b, sub maximi circuli bd, circumferentia
 parallelum loci d attingat in ipso d. Aio
 itaq; interuallum uiatorium bd, inter loca
 b & d, polo c manifesto propinquiora
 maius esse af, & differentiam quoq; lon-
 gitudinis inter eadem loca b & d, maio-
 rem esse differentia longitudinis duorum
 a & f, super polo enim c parallelus descri-
 batur per d, meridianum bc intersecans
 in e puncto, parallelus item per f meridianum ac, intersecans in g, & quo-
 niam cg, maior est quàm ec, per Hypothel m. Circumferentia igitur
 sumatur gk, in gc, æqualis ipsi ce, aut cd & super k, tanquam po-
 lo ad

lo ad mensuram $k g$, circulus describatur per g , qui per sextam propo-
 sitionem secundi libri Theodosij parallelum $f g$, & ex eodem sumatur cir-
 cumferentia $g i$, æqualis circumferentiæ $d e$: sunt enim circuli æquales qui
 per d & per g , describuntur super polis c et k . Quapropter si maximus
 circulus ductus fuerit per k & i , maximus etiam fuerit descriptus per c et
 d , duo anguli $k i$ & $b c d$, inter se æquales erunt. Ducemus igitur maxi-
 mum circulum per a & i , qui non erit alius quam is qui uenit per a & f .
 Nam si cadit intra triangulum $a c f$ angulum disspescens $c a f$, angulum id
 circo faciet cum $a k$ in puncto a , æqualem angulo $c b d$, per similem pro-
 positionem quartæ primi libri Euclidis à Menelao demonstratam libro
 primo de triangulis spheræicis, & proinde angulo $f a k$ æqualem, per
 communem sententiam, partem toti æqualem, quod est impossibile. Simile
 haberetur incommodum si extra idem triangulum caderet. Et propterea
 circulus maximus qui per a & i , describitur, per f uenit. Sic igitur in
 teruallum $a f$, minus erit interuallo $a i$. At ipsum $a i$ ipsi $b d$, est æquale:
 maius igitur est uiatorium interuallum $b d$, inter loca b & d , manifesto
 polo propinquiora, quam uiatorium interuallum $a f$, inter loca a et f , que
 quidem à manifesto polo remotiora sunt, paremque habent latitudinis dif-
 ferentiam, quod à nobis erat demonstrandum. Porro quod & maior sit
 longitudinis differentia, ostendemus scripto per c & f , maximo circulo
 qui $k i$, in puncto l intersecet. Quoniam enim duo loca d & f , manifes-
 tum habent polum c : circumferentiæ igitur $a d$ & $c f$, minores sunt qua-
 drantibus, quapropter $c l$ & $k l$, minores quadrantibus erunt, & idcirco
 in triangulo $k l c$, exterior angulus $a k l$, maior est interiore $k c l$. At æqua-
 les inuicem sunt $a k l$ & $b c d$, in duobus æquiangulis triangulis $a k i$ & $b
 c d$: maior igitur erit angulus $b c d$ ipso $k c l$. At qui his proportionales
 sunt duo arcus æquinoctialis circuli, quorum unus est differentia longi-
 tudinis duorum locorum b & d , alter uerò duorum a & f : maior igitur
 erit differentia longitudinis duorum locorum b & d , quam duorum $a
 & f$, quod item demonstrandum suscepimus. Et ex hac demonstratione
 apparet nihil referre siue duo loca a & b , polum c , manifestum habeant,
 siue occultum, dummodo idem polum c loco d , sit manifestus, loco uerò
 f , minime sit occultus. Sed uel illi planè sit conspicuus, uel in horizonte
 positus. Sumpsimus autem circulum $g i$, secare non posse eum circulum
 qui per a & f uenit, inter a & f , ne sequatur impossibile, partem uidelicet
 suo toto maiorem, maximo circulo $a k c$ extenso, donec ipsos circulos $g
 i$ & $g f$, rursus intersecet. Quod si primi loci ad secundum, & tertij ad
 quartum, eadem seruata fuerit magnitudo anguli positionis, et eadè quo-
 que longitudinis differentia, fuerintque primus locus & secundus à mani-
 festo polo remotiores, quam tertius & quartus remotiorque primus secun-


circulumque æquidistantem duxeris quod de, interfecet inter d & e. O-
 stensoria tamen demonstratione id ipsum ad hunc modum demonstra-
 relibet. Quoniam enim in triangulo spherico acb: maius est latus acla-
 tere b, c, maior igitur erit angulus abc angulo bac, angulus autem cbf,
 unà cum ipso angulo abc, duobus rectis est æqualis: igitur idem angus-
 lus cbf, unà cum angulo bac, duobus rectis minor erit. At maior est is-
 pse angulus cbf, ipso angulo cab, quia duo latera ac & bc, congesta se-
 micirculo minora sunt, locus enim a, per Hypothesim polum c, manifes-
 tum habet, igitur sinus rectus anguli cbf, maior erit sinu recto anguli c-
 ab. Quapropter sinus rectus anguli afd, maiorem habet rationem ad si-
 num rectum anguli daf, quàm ad sinum rectum anguli fbe. Atqui sicut
 sinus rectus anguli afd, ad sinum rectum anguli daf, sic sinus rectus late-
 ris ad, ad sinum lateris df, in triangulo spherico adf, rursus sicut sinus
 rectus eiusdem anguli afd, ad sinum rectum anguli fbe, sic sinus rectus
 lateris be, ad sinum lateris ef, in triangulo bef. Igitur & maiorem ratio-
 nem habebit sinus lateris ad ad sinum lateris df, quàm sinus lateris be,
 ad sinum lateris ef. Quapropter sinus rectus arcus ad ad sinum rectum
 arcus be, maiorem habebit rationem quàm sinus rectus arcus df ad si-
 num rectum arcus ef, per uigesimam septimam propositionem quinti
 libri Euclidis adnotã à Campano. Est autem arcus df (quemadmodum
 superius fuit demonstratum) quadrante minor. Igitur maior erit sinus
 rectus ipsius df, sinu recto arcus ef, & proinde multo maior sinus rectus
 arcus ad, sinu recto arcus be, & maior igitur arcus ad arcu be. At æqua-
 les sunt arcus be & gk, inter duos parallelos comprehensi. Maior igitur
 ad ipso gk. Quapropter detracto communi dg maior relinquetur ag,
 quàm dk, sic igitur patet maiorem esse latitudinis differentiam inter a
 primum locum & b secundum, quàm inter d, tertium & e, quartum, quod
 postremò erat demonstrandum.

Sed si denique primus locus ad secundum, & tertius ad quartum, ean-
 dem habuerint positionem, & interualla uiatoria æqualia quoque, siue ma-
 nifestus sit, siue occultus in ipsis locis polus ille mundi ad quem accedi-
 mus, fueritque primus locus ab ipso polo remotior quàm tertius, maior
 erit differentia latitudinis inter primum & secundum, quàm in tertium
 & quartum. Quòd si secundi loci & quarti ab ipso eodem polo distantie
 coniunctæ semicirculo æquales fuerint, tanta erit longitudinis differen-
 tia inter primum & secundum, quanta inter tertium & quartum. Hoc
 autem fiet si euntibus nobis uersus partes poli Borealis, tãta fuerit secun-
 di loci Australis latitudo, quanta quarta Borealis. Cæterum si ipsæ distan-
 tiæ coniunctæ semicirculo maiores fuerint, maior erit differentia longitu-
 dinis inter primum & secundum, quàm inter tertium & quartum, at si


semis

rentia longitudinis inter primum & secundum differentia longitudinis inter secundum & quartum.

Adde quòd si à duobus locis sub uno meridiano positis duo profecti fuerint, sub æquali similiue circuli maximi ad ipsum meridianum inclinatione, Boreali ad plagam Australem, Australior uerò ad Borealem, tam diuq̃ pergant donec parallelum attingant medium, præter circulum æquinoctialem, is qui ad partes poli inierit ipsi medio parallelo uicinioris, maius spatium conficiet, longisq̃ distabit à radicali meridiano, quàm qui ad alterum polum. Sint enim poli mundi a & b, semi meridianus a b in quo duo loca c & d, parallelum medium, qui non est æquinoctialis habeant e f g. Ad quem quidem à loco d, secundum inclinationem acuti anguli c d f, sit iter d f, ad partes nempe poli a ipsi medio parallelo e f g, uicinioris. Dico quòd si quis profectus à loco d, sub eiusmodi inclinatione ad f uenerit, maius spatium conficiet, longisq̃ distabit ab ipso radicali meridiano a b, quàm qui profectus à loco c, sub tãta inclinatione ad eundem uenerit parallelum. Nam à puncto g, circulum maximum h g k, excitabimus ad rectos angulos ipsi meridiano a g b, cuius intersectio cum d f sit in k. Parallelum igitur e f g, continget in ipso g puncto per



quartam secundi libri Theodosij. Per duo autem puncta c & k, circulum maximum describemus ipsum parallelum intersecantem in y. Quare cum duo latera c g & g k, duobus lateribus d g & g k, sint æqualia, & anguli ad punctum g æquales, sunt enim recti, bases igitur c k & d b, sphericorum triangulorum c g k & d g k, æquales inuicem erunt, & anguli g c k & g d k, inter se æquales. Quapropter ipsi maximi circuli c k & d k, inclinationes facient æquales cum ipso radicali meridiano ad eadem loca c & d. Et quoniam c y minor est quàm c k, igitur multò minor erit quàm d f. At qui profectus est à loco c, ad locum y, ueniens meridiano propinquiorem ipso f, spatium confecisse constat c y: maior igitur erit longitudinis differentia, & maior etiam uiatoria distantia inter d & f, quàm inter c & y, quod demonstrandum erat. Adde etiam quòd eunti, & sub eadem circuli maximi inclinatione redeunti eadem uia non est. Quare ad eum locum non redit, unde profectus fuerat. Redibit enim ad eundem meridianum, sed in alio parallelo, ad eundem uerò parallelum, sed in alio meridiano. Sint enim duo loca b & c, in meridianis a b & a c, manifestus polus sit a, & maximus circulus b c f, inclinationem faciat a




cuti anguli $a b c$, cum meridiano $a b d$, in puncto b , cum meridiano uerò $a c e$, inclinationem acuti anguli $b c e$, in puncto c . At quoniam duo latera $a b$ & $a c$, coniuncta minora sunt semicirculo, maior igitur erit angulus $a c f$, angulo $a b e$. Quapropter contra positus angulus $b c e$, maior etiam erit ipso angulo $a b c$. Faciemus igitur ad punctum c angulum $d a c$, maximo circulo descripto per d & c , qui quidem angulus sit æqualis ipsi $a b c$, & idcirco qui profectus à loco b secundum maximi circuli circumferentiam ad e , uenerit, in rediens sub tanta maximi circuli inclinatione, non ibit ad b , sed ad d , & in alio quidem parallelo. Sit autem in puncto k , ipsius circuli $c d$ intersectio cum $b g$, parallelo loci b . Quare patet quòd sub ipsa eadem circuli maximi $c d$ inclinatione ad k ueniet, in eodem parallelo loci b , sed in alio meridiano, quod erat demonstrandum. Idem accidere necesse est si polus a eisdem locis b & c , occultus fuerit, ut in sequenti figura. Quoniam enim angulus $a c f$, minor est angulo $a b c$, circulus igitur maximus $c i h$, describatur qui angulum $g c h$, æqualem faciat angulo $a b c$, sitq; ipsius intersectio cum meridiano $a b$ in puncto i , & cum parallelo $b g$ in h . Demonstrabis igitur quòd qui à loco b uenit in c , cum redierit sub tãta inclinatione, non ibit ad b , sed ad i in alio parallelo, ad h uerò in alio meridiano. Inequalitatem uerò inter uiatorias distantias in eisdem figuris facile erit intelligere. Quæ cum ita sint, mirum non est si nauæ inter nauigandum sæpissime allucinentur, et quia causas ignorat, magnis subindè uersentur erroribus. Esto enim nauigationis a ad b , sub inclinatione acuti anguli $a d$, decursum spatium fracta linea $a d e b$. Cum qua meridiani $c a$, $c d$, $c e$ & $c b$, à polo manifesto c uenientes, æquales constituent angulos in punctis $a d e b$. In intermedijs autem aliquanto maiores, sed per exigua differentia, & quæ sensum effugiat gubernatoris. Per a & b , maximi circuli segmentem scribatur $a f b$. Quod quidem constat breuius esse fracta linea $a d e b$. Nam ducto per a & e , segmento $a e$, maximi circuli, maiora erunt $a d$ & $d e$, simul sumpta ipso $a e$, segmento. Rursus $a e$ & $e b$, coniuncta longiora quàm $a f b$. Igitur multò maiora $a d$, $d e$ et $e b$, segmento $a f b$ ipse

ipse




ipse uero profectio-
nis peragrati-
onis uel an-
gulus $c a d$ maior erit positionis angulo $c a b$. Ponemus igitur in marina charta re-
ctum $g k$, pro fracta curuaq; linea ad $e b$,
tantamq; habere inclinationem ad meri-
dianum $g l$ quantam in mundo habet $a d$
in meridianum $a c$. Et pro segmento $a f b$,
resecetur ex ipsa $g k$ recta $g m$, secundum
proportionem. Erit igitur $k m$, id quod
propter obliquitates redundat, detracta $a f b$
ex $a d e b$. A puncto porro in recta o ,
excitetur ad rectos angulos super $g l$. In triangulo igitur rectangulo re-
ctilineoq; $g m o$, iuxta Ptolemæi institutum recta $m o$, differentiam lon-
gitudinis duorum locorum $a e t b$, nobis indicabit, recta uero $g o$, latitudi-
nis differentiam. At iuxta nautarum
regulas, ducta ipsi $m o$ æquidistante $l k$
erit eadem $l k$, differentia longitudinis
sed recta $g l$, latitudinis. Quamquam ue-
rò diuisa recta $g k$, in spatia proportio-
nalia ipsis $a d$, $d e$ & $e b$, ductis præterea
in utraq; figura meridianis & paral-
lelis, æquales appareant inter se diffe-
rentiæ longitudinis & latitudinis in ex-
iguis sphericis triangulis, et rectilineis,
nondum tamen licebit à partibus totam distantiam colligere longitudi-
nis, & latitudinis. Quod enim in singulis propter paruitatem negligi-
tur, collectum in multis notabile fit. Etto præterea in mundo nauigatio-
nis $a ad b$, inclinationis angulus $c a d$ siue $c d b$, quibus maiores sint insen-
sibili tamen differentia, si qui ad intermedia puncta efficiuntur, inter a &
 d , & inter d & b . Manifestus polus sit c , parallelus loci b sit $e b$, differen-
tia latitudinis $a e$ cognita subiiciatur, & inclinationis angulus cognitus.

In charta porro marina pro a & b , sint f &
 g , & pro e sit k , & pro angulo $c a d$ sit $k f g$,
Dico differentiam longitudinis locorum
 a & b , in ipsa marina charta ultra metas p-
ductam esse. Circulus enim maximus qui
per a & d , uenit, parallelum $b e$, secet in l , e-
rit igitur punctum l ultra b , propterea quod
maior est angulus exterior $c d l$, interiore $c d b$,
interiore $c a d$ siue $c d b$. Triangulum igitur




nondum tamen licebit à partibus totam distantiam colligere longitudi-
nis, & latitudinis. Quod enim in singulis propter paruitatem negligi-
tur, collectum in multis notabile fit. Etto præterea in mundo nauigatio-
nis $a ad b$, inclinationis angulus $c a d$ siue $c d b$, quibus maiores sint insen-
sibili tamen differentia, si qui ad intermedia puncta efficiuntur, inter a &
 d , & inter d & b . Manifestus polus sit c , parallelus loci b sit $e b$, differen-
tia latitudinis $a e$ cognita subiiciatur, & inclinationis angulus cognitus.



In charta porro marina pro a & b , sint f &
 g , & pro e sit k , & pro angulo $c a d$ sit $k f g$,
Dico differentiam longitudinis locorum
 a & b , in ipsa marina charta ultra metas p-
ductam esse. Circulus enim maximus qui
per a & d , uenit, parallelum $b e$, secet in l , e-
rit igitur punctum l ultra b , propterea quod
maior est angulus exterior $c d l$, interiore $c d b$,
interiore $c a d$ siue $c d b$. Triangulum igitur

E a taq;




est autem $e b$, quam $e f$: in marina igitur charta differentia longitudinis contracta est. Quoniam igitur modo veræ locorum longitudines ex ipsa marina charta eliciendæ sint operæ pretium erit ostendere.


De inveniendâ differentia longitudinis duorum locorum ex marina charta. Cap. 3.

Quanquam orbis loca in marina charta perperam posita sint, veræ tamen ipsorum longitudines & intervalla ex ea concludi poterunt, si modo cognitum fuerit qua ratione reperta fuerunt, & in ipsa marina charta collocata. Aliter enim prorsus impossibile. Igitur ut id à nobis efficiatur, ostendemus in primis inter æquinoctialem & alterum mundi polum, maximorum circulorum ad meridianos inclinationes, minus augeri versus eundem polum, in locis ipsi æquinoctiali circulo propinquioribus, quam in remotioribus. Sit enim a , polum mundi, circuli autem maximi $b c f$ & $d e g$, æquales faciant inclinationes ad meridianos $a b$ & $a c$, puncta autem b & c , propinquiora sint æquino

taq; recti lineum $f q k$, pro spherico triangulo $a l e$, positum erit secundum proportionem. Differentia igitur longitudinis $k q$ pro $e l$, erit accipienda. At minor est $e b$ ipsa $e l$, & idcirco longitudinis differentia locorum a & b , ultra debitos numeros extensa est in marina charta. Sint rursus in mundo duorum locorum a & b , differentia latitudinis comperta $a e$, occultus polus c , inclinatio nis angulus profectionis $u e c a d$ æqualis angulo $c d b$, maximus circulus per a & d , scriptus parallelum $b e$, sec et in f . Erit igitur punctum f ante b , propterea quod minor


est angulus $c d f$, ipso angulo $c a d$, quare minor est $e f$ quam $e b$. In triangulo vero recti lineo $g h k$, marinæ chartæ recta $g h$ pro $a e$, posita sit. Acuti vero anguli $c a d$, inclinatio angulo $g h k$, æqualis subiiciatur. Recta igitur $h k$ pro $e f$, spherici trianguli $e a f$, posita est. Maior





quinoctiali circulo quàm d & e, sed tã
tum a b excedat a c, quantum a d ex
cedit a e: inclinationis porrò angulus
a c f, quem maximus circulus b c f,
cum meridiano a c efficit, maior est in
clinationis angulo a b c, quem idem
circulus b c f, cum meridiano efficit a
b, propterea quòd a b & a c, coniun-
cta semicirculo minora sunt. Pari


quoq; argumento inclinationis angulus a e g, quem circulus maximus d
e g, cum meridiano efficit a e, maior est inclinationis angulo a d e, quem
idem maximus circulus cum meridiano facit a d. Dico igitur acutum an-
gulum a c f, minus excedere a b c quàm acutus a e g, angulum superet a d
e. Quoniam enim circumferentia d e, maior est circumferentia b c, per ea
quæ superius demonstraui in capite precedenti: circumferentiam igitur b g,
æqualem sumemus ipsi d e, & ex a b, secabimus b h, æqualem
circumferentiæ a d, & per puncta g & h, circulum maximum describe-
mus, qui a c secet in i. Quapropter in duobus triangulis b h g & a e d, æ-
qualis erit angulo b g h, & idcirco duo exteriores anguli h g f & a e g, æ-
quales relinquentur. At uerò ipse angulus h g f maior est angulo a c f:
quia duo latera c i & g i, triangulo c i g, coniuncta semicirculo minora
sunt. Maior igitur est angulus a e g quàm a c f, sunt autem ex Hypothesi
inter se æquales duo anguli a b c & a d g. Igitur minus excedit angulus
a c f angulum a b c, quàm angulus a e g, excedat angulum a d g. Et proin-
de inter æquinoctialem, & mundi polum maximorum circulorum ad
meridianos inclinationes minus augentur in locis ipsi æquinoctiali pro-
pinquioribus, quàm in remotioribus, quod in primis erat à nobis osten-
dendum. Idem aliter demonstrabis ad hunc uidelicet modum per pro-
portiones sinuum. In meridiano enim in quo a b, sumantur a k a l & a m,
æquales ipsis a c a d, & a e, centrum sphaeræ sit n, & in semidiametrum a
n, ducantur ad rectos angulos b o, k p, l q, & m r, sinus uidelicet recti is-
psorum arcuum. Præterea à punctis k & m, perpendiculares ducantur
k s, supra b o & m t, supra l q, & cōnectantur rectæ b k & l m. Et quonia-
am circumferentia b k, circumferentiæ l m, æqualis est per Hypothesim,
maior igitur erit k s quàm m t, demonstratum est hoc à nobis in annota-
tione motus octauæ sphaeræ. At quoniam recta b k rectæ l m, est æqualis,
quadratum igitur ex b s, minus erit quadrato ex l t, & proinde ipsa b s mi-
nor l t, quapropter maiorem rationem habebit l t ad q t, quàm ad s o. At
maio-rem rationem habet eadem l t ad s o, quàm b s ad s o, igitur maio-
rem rationem habet l t ad t q, quàm b s ad s o. Per coniunctam igitur ma-
iorem



iorem rationem habebit lq, ad tq, quam
 b o ad s o. Æqualis est autem tq recte m r
 & s o, rectæ kp : maiorem igitur ratio-
 nē habet sinus rectus arcus al, ad sinum
 rectum arcus am, quam sinus rectus ab,
 ad sinum rectum ak. Et proinde in supe-
 riori figura maiorem habet rationem si-
 nus rectus ad ad sinum rectum ae, quam
 sinus rectus ab ad sinum rectum ac. At-
 qui sicut sinus rectus anguli aeg, ad si-
 num rectum anguli ade, sic sinus rectus arcus ad, ad sinum rectum ar-
 cus ae. Itē sicut sinus rectus anguli acf, ad sinū rectum anguli abc, sic si-
 nus rectus arcus ab ad sinum rectum arcus ac. Igitur maiorem habet ra-
 tionem sinus anguli aeg ad sinum anguli ade, quam sinus anguli acf,
 ad sinum anguli abc: æquales sunt autem ex Hypothesi duo anguli a
 de & abc. Et propterea maior erit sinus rectus arcus anguli aeg sinu an-
 guli acf, & quia uterq̃ eorum sumitur acutus, maior idcirco erit angu-
 lus aeg angulo acf, quare minus excedet angulus acf angulum abc, q̃
 aeg excedat ade, quod erat rursus demonstrandum. Et ex hac conclu-
 des quod si æquales maximorum circulorum ad meridianas inclinatio-
 nes æqualiter fuerint auctæ, maior erit differentia latitudinis inter loca
 circulo æquinoctiali propinquiora, quam inter remotiora. Ostende-
 mus præterea quòd si inter æquinoctialem & unum eius polum duo cir-
 culi maximi in meridianos uersus eundem polum fuerint inæqualiter in-
 clinati, sed meridianorum sectiones æquales, maior erit differentia in-
 ter maiores inclinationes, quam inter minores. Esto enim alter polorum
 mundia, duo autem meridianorum segmenta ab & ad, æqualia, sed neu-
 trum quadrante maius, duo autem ac & ae, his minora, sed inter se æ-
 qualia. Circulus porro maximus bcf, sit inclinatus in ab & ac, circulus
 p̃terea maximus deg, inclinatus in ad & ae, sed maior inclinationis an-
 gulus abc, inclinationis angulo ade. Aio acutū angulū aeg, inclinatio-
 nis circuli deg in ae, minus excedere
 acutū angulū adg, inclinationis ipsi-
 us deg in ad, quam acutus acf exce-
 dat acutum abc. Quòd enim angu-
 lus aeg angulo ade, maior sit, simili-
 ter angulus acf maior abc, ex colis-
 quet, quoniam per Hypothesim nul-
 lum ex datis meridianorum segmen-
 tis maius est quadrante. At quòd acf,
 angulus



angulus maior sit angulo a e g, ex eo concluditur, quoniam in triangulo a b c, sicut sinus lateris a b, ad sinum lateris a c, sic sinus anguli a c f, ad sinum anguli a b c. Præterea in triangulo a d e, sicut sinus lateris a d, ad sinum lateris a e, sic sinus anguli a e g, ad sinum anguli a d e. Aequalia sunt autem a b & a c, ipsis a d & a e, alterum alteri: igitur sicut sinus anguli a c f, ad sinum anguli a b c, sic sinus anguli a e g, ad sinum anguli a d e. Et ideo per permutatam sicut sinus anguli a c f, ad sinum anguli a e g, sic sinus anguli a b c, ad sinum anguli a d e. Atqui maior est sinus anguli a b c sinu anguli a d e, igitur maior erit sinus anguli a c f sinu anguli a e g. Et quia uterque eorum est acutus, maior igitur erit angulus a c f angulo a e g, sed quod idem angulus a c f, maiori differentia excedat angulum a b c, quam a e g ipsum a d e, ostendemus in alia figura. In circulo enim h i k sit h m, arcus anguli a c f, sinus uero rectus m n, sitque h o arcus anguli a b c, sinus rectus o p sit præterea h q, arcus anguli a e g sinus rectus q r, sitque h s arcus anguli a d e, sinus rectus s t, & à puncto o in m n, ad rectos angulos excitetur, recta o l, & a b s, in q r, ad rectos angulos s u & a b o, in m & a b s, in q rectæ ducantur lineæ. Jam igitur si circumferentia o m, maior non est circumferentia q s, aut igitur ei æqualis erit, aut minor. Si æqualis, æquales igitur erunt duæ rectæ o m & s q, sed o l, maior est duam s u, quare minor relinquetur m l quàm q u. Maior est autem l n quàm u r, maiorem igitur habebit rationem q u ad u r, quàm m l ad l n, & idcirco maiorem habebit rationem tota q r ad u r, quàm tota m n ad l n, & pro



inde maiorem rationem habebit sinus rectus anguli a e g, ad sinum anguli a d e, quàm sinus anguli a c f, ad sinum anguli a b c, quod est impossibile: eandem enim rationem esse demonstrauimus. Et propterea circumferentia o m, æqualis non est circumferentiæ q s, atqui minora non est. Nam si sit minor, sumatur igitur m z, circumferentia æqualis eidem q s, & sit z y, sinus rectus segmenti h z, & ducatur à puncto z in m, recta lineam z, & ab eodem z recta z x, ad rectos angulos super m n. Quare ostendes eadem arte maiorem rationem habere q r ad u r, quàm m n ad x n. At m n ad x n, maiorem rationem habet quàm ad l n, quia maior est l n quàm x n. Idcirco multò maiorem rationem habebit q r ad u r, quàm m n ad l n. Quapropter sinus anguli a e g, ad sinum anguli a d e, maiorem habebit rationem, quàm sinus anguli a c f, ad sinum anguli a b c, quod rursus est impossibile, contrarium enim fuit antea ostensum. Et propterea maior

rea maior est differentia mo , qua angulus acf , excedit angulum abc , quam differentia qs qua angulus aeg , excedit angulum ade , & proinde maior est maiorum differentia quam minorum, quod demonstrandum suscepimus. Hæc autem intueri licet in sequenti figura, & numerorum tabula à nobis exarata. In qua quidem ab & ac , sunt meridianorum segmenta locorum b & c , polus manifestus a , circulus maximus bcd , inclinationem facit in loco b , acuti anguli abc cum ab : in loco uerò c , inclinationem facit ad meridianum ac acuti anguli acd , quem maiorem subiicimus ipso abc , duobus gradibus. Quando igitur ab graduum fuerit 90 . id est, quando ipse locus b sub æquinoctiali positus fuerit, erit ac , graduum 50 . $m. 20$. si inclinatio uiae bc , fuerit primæ quartæ, quæ à Septentrione recedit ad Nordestem, uel Noroëstem, aut ab Austro ad Sudoëstem uel Suestem gradibus 11 . $m. 15$. circumferentiæ Horizontis. Sed si uiae inclinatio duarum quartarum fuerit, qualis est Nornordestis & Susudoëstis, aut Nornoroëstis, & Susuestis, erit ipse arcus ac , Gr. 67 . $m. 20$. at si trium quartarum fuerit, erit ac , Gr. 71 . $m. 59$. In cæteris autem inclinationibus, quemadmodum in ipsa tabula apparet. In qua quidem si ab , graduum subiicias 80 . erit ac , in prima quarta Gr. 56 . $m. 57$. In secunda uerò Gr. 65 . $m. 16$. Inertia Gr. 68 . $m. 51$. Ad reliquas item inclinationes & ipsius loci b , à manifesto polo distantias debitos numeros inuenies in eadem tabula. Horizontis circumferentiã, pariter & nautici instrumenti diuisã supponimus in partes æquales 32 . in rumbos uidelicet 8 . semirumbos 8 . quos medias inclinationes siue profectiões appellat, & rumborum quartas sedecim. Quoniam uerò (ut credi par est) qui clauum regit, auctã aut diminutã duobus circiter gradibus inclinationem ob paruitatem non sentit. Idcirco tandiu uersari nauem sub uno atq; eodem maximo circulo subiiciemus, quoad prior inclinatio duobus gradibus auctã fuerit, quando ad partes manifesti poli nauigatur. Inde uerò aliũ subire maximum circulum, qui paruum illum inclinationis lapsum emendet, si eandem perpetuò inter nauigandum seruare intendimus inclinationem, eundemq; cursum. Nam nauis uiam angulosã esse necesse est, & in ipsis angulis inæqualitatem inueniri. Huiusmodi autem inæqualitatem uariã & inconstantem esse fatemur. cæterum incertum pro certo statuere interdum oportet, dum res non constat, hoc uidelicet emolumento: ut quod prorsus ignoratur, aliqua ex parte innotescat. Ac locorum situs in marina charta positõrum ignoti sunt, quãquam latitudines sint cognitæ, & profectio-

Siest

Quando inclinatio uiaē b c, est unius quartæ id est Gr. 11. m̄. 15.
 Quando inclinatio uiaē b c, est duarum quartarum id est Gr. 22. m̄. 30.
 Quando inclinatio uiaē b c, est trium quartarum id est Gr. 33. m̄. 45.
 Quando inclinatio uiaē b c, est unius rumbi id est Gr. 45.
 Quando inclinatio uiaē b c, est unius rumbi cum quarta una. i. Gr. 56. m̄. 15.
 Quando inclinatio uiaē b c, est duarum quartarum Sr. rumbum. i. Gr. 63. m̄. 30.
 Quando inclinatio uiaē b c est trium quartarum Sr. rumbum. i. Gr. 78. m̄. 45.


Gr.	m̄.	Gr.	m̄.	Gr.	m̄.	Gr.	m̄.	Gr.	m̄.	Gr.	m̄.	Gr.	m̄.	
90	58	20	67	20	71	59	75	12	77	54	80	31	83	34
80	56	57	65	16	68	51	74	59	74	21	76	15	78	8
70	53	7	60	8	63	20	65	18	66	45	67	57	69	2
60	47	29	53	3	55	16	56	51	57	52	58	40	59	23
50	40	42	44	59	46	45	47	47	48	31	49	5	49	34
40	33	10	36	2	37	41	38	25	38	56	39	21	39	42
30	25	11	27	29	28	23	28	55	29	16	29	33	29	47



F num



num anguli cogniti. Nam longitudines sunt ignotæ, & positionum anguli inter quæuis duo loca etiam ignoti, quamuis uiarum inclinationes fuerint cognitæ. Hæc tamē nostra tabula plurimum nos iuuabit ad inueniendum ueras locorum longitudines, & positionum angulos. Nam si exempli gratia in terræ marisq; globo fracta linea $b c d e f g$, inclinationem habuerit unius quartæ ad meridianorum segmenta in ipsis punctis $b c d e f g$, locus uerò b , sub æquiuoctiali subiiciatur. Erit igitur à loco b in c , projectionis angulus graduum $11. \text{m.} 15.$ minor quidem angulo $a c k$, (ut supposuimus) duobus gradibus. Quapropter si secundi loci latitudinis complementum repertum fuerit $\text{Gr.} 58. \text{m.} 20.$ certum habebimus ipsum secundum locum ibi esse ubi c . Quare projectionis angulus $a b c$, idem erit & positionis, directum uerò interuallum erit $b c$, & idcirco in triangulo spherico $a b c$, ex $a b$ & $a c$, cognitiss, cum acuto angulo $a b c$, obtuso existente $a c b$, reliquus angulus $b a c$, longitudinis differentie inter eadem duo loca cognitus erit, & ipsum directum in-



teruallum $b c$, quoq; cognitum. Sed si secundi loci latitudinis complementum maius repertum fuerit gradibus $58. \text{m.} 20.$ erit igitur ipse secundus locus inter b & c , quare consimili arte longitudinis differentia, & interuallum itineris innotescet. Quod si ipsum secundi loci latitudinis complementum minus reperiatur gradibus $58. \text{m.} 0.$ erit igitur secundus locus positus ultra c . Et quoniam sinus recti complementorum $a b$, $a c$ & $a d$, & reliquorum proportionales sunt in continua proportione, nempe sicut sinus rectus $a b$ ad sinum rectum $a c$, sic sinus rectus $a c$ ad sinum rectum $a d$, & ita deinceps, propter angulorum ad bases triangulorum æqualitatem. Multiplicabimus igitur sinum rectum segmenti $a c$, graduum $58. \text{m.} 20.$ in se ipsum, productum uerò diuidemus per sinum segmenti $a b$, partium uidelicet 100000 . & ueniet in quotiente sinus rectus segmenti $a d$, quare per tabulam sinuum ipsum segmentum $a d$ ilico innotescet. Quod si æquale repertum fuerit complemento latitudinis secundi loci, erit igitur secundus locus ubi d . Iam igitur in spherico triangulo $a c d$, ex duobus lateribus $a c$ & $a d$, cognitiss cum angulo $a c d$, obtuso existente $a d c$, reliquus angulus $c a d$, differentie longitudinis duorum locorum c & d , innotescet. Cognitus autem erat simili syllogismo angulus $b a c$: totus igitur angulus $b a d$, differentie longitudinis duorum locorum b & d , patefiet, simul et circumferentia $c d$, quapropter obliquum

liquum itineris interuallum bcd , cognitum erit. Quod si directum interuallum cognoscere libeat, ducto per b & d , maximo circulo in spherico igitur triangulo abd , ex duobus lateribus & angulo bad , cognitis, cognoscetur basis bd , simul & positionis angulus abd , qui alius est à perfectionis angulo. At si ipsum ad , segmentum minus repertum fuerit complemento latitudinis secundi loci, erit igitur ipse secundus locus inter c & d , quapropter differentiam longitudinis eiusdem m & loci c , quem admodum docuimus quando erat positus inter b et c , notam faciemus. Cui quidem adiungemus differentiam longitudinis eorum b & c : tota igitur longitudinis differentia primi loci & secundi cognita erit, obliquum etiam interuallum & directum prædicto modo innotescant. Neque dissimiliter operabimur, quando secundi loci latitudinis complementum segmentum ad superauerit. Ex his igitur intelliges quomodo sit inuestiganda differentia longitudinis duorum locorum quando ab , complementum latitudinis primi loci gradus habuerit 80 . aut 70 . & ita deinceps, alius etiã fuerit perfectionis angulus, quam is quem hoc exemplo unius tantum quartæ supposuimus. Tabula uerò quam exarauimus multò commodior esset, si in quinos gradus, aut ternos, aut binos extensa esset, uel sit ea arte constitueret, ut supposito segmento ab , graduum 90 . scriberentur in eadem tabula reliqua segmenta ac , ad , ae , af , ag , & ita deinceps, quæ in continua proportione sunt proportionalia. Hoc autem iuxta quamlibet fractæ lineæ inclinationem anguli uel perfectionis magnitudinem. Eiusmodi uerò tabula non maiori negotio confici posset, quam quæ à nobis exarata est. Nam in unaquaq; inclinatione angulo uel perfectionis communis multiplicator erit sinus rectus ipsius inclinationis, communis autem diuisor sinus rectus erit illius anguli qui datae inclinationis, angulum duobus gradibus superauerit, si ita subiicere libeat, aut qui uno tantum, si exactius rem tractare uelis. Exempli gratia in inclinatione Nordestis & Sudoëstis, aut Noroëstis & Suëstis communis multiplicator erit sinus graduum 45 . communis porro diuisor sinus rectus graduum 47 . aut 46 . si mauis. Incipiendo igitur ab æquinoctiali, erit sinus totus primus numerus multiplicandus per communem multiplicatorem, productum porro diuidetur per communem diuisorem, & ueniet in quotiente sinus rectus segmenti ac . Eum uerò multiplicabimus per communem multiplicatorem, & productum diuidemus per communem diuisorem, & ueniet in quotiente sinus rectus segmenti ad . Hunc deinde sinum rectum multiplicabimus per communem multiplicatorem, productum uerò diuidemus per communem diuisorem, & ueniet in quotiente sinus rectus segmenti ae , & ita in cæteris operandum erit. Cognitis igitur hac arte sinibus rectis singulorum

segmentorum, segmenta ipsa quæ quidem latitudinum complementa sunt ex tabula sinuum rectorum cognita erunt. Cæterum quoniam huiusmodi segmenta innumera sunt, minima enim proportionalium assignari non potest: sat igitur erit huiusmodi tabulam usque ad latitudinem graduum 60. extendere. Quod si in unaquaque inclinatione iuxta numerum graduum & minutorum complementi latitudinis, numerum graduum & minutorum anguli bac , id est differentiam longitudinis inter b & c , apposueris, directi etiam interualli bc magnitudinem, & similiter iuxta reliqua segmenta meridianorum, differentias longitudinis, & interualla inter angulos fractæ lineæ $bcdefg$, erit hoc nobis magno usui, non solum ad ueras longitudes ex marina charta eliciendum sed etiam adducendum lineas in globo, similes his quas nauis in superficie maris describit. Quando uero latitudinis complementum uel eius loci à quo proficisceris, uel eius ad quem appellis in memorata tabula iuxta tuum profectionis angulum ex amussim repertum non fuerit, non alio modo proportionem facere oportebit, quam si tabulis Astronomicis uteris. Ponamus enim exempli gratia nauigatum fuisse à loco c , ad locum l , positum inter c & d , sublata inclinatione anguli abc , habere autem in prædicta tabula segmentum ac , Gr. 72. ad uerò Gr. 63. angulum cad , longitudinis differentiam inter c & d , Gr. 6. interuallum autem cd , Gr. 10.



porrò complementum latitudinis loci l , quod quidem est al , observatione repertum fuerit Gr. 69. Operæ pretiū igitur erit longitudinis differentiam per ipsam tabulam inuenire inter c & l , nec non directum interuallum cl . Quod ut efficiamus duorum segmentorum ac & ad , differentiam id est Gr. 9. primum proportionis terminum statuemus, secundus terminus erit differentia longitudinis ipsorum locorum c & d , Gr. nempe 6. tertium terminum ponemus Gr. 3. differentię duorum segmentorum ac & al . Multiplicabimus itaque tertium in secundum, productum diuidemus per primum, & uenient ex partitione Gr. 2. pro differentia longitudinis locorum c & l , interuallum uerò cl , eadem arte inueniemus Gr. 3. m. 20. Primum enim terminus atque tertius idem erunt, qui in priore operatione, sed pro secundo ponentur Gr. 10. quos continet interuallum cd . At si ex ista ratione uti uelis, scientiam triangulorum sphericorum consulas quemadmodum ad ipsius tabulæ compositionem facere consueuisti.

Propositis itaque duobus locis in charta marina positis, inter quos longitudo

gitudinis

gitudinis differentiam inuenire oporteat, poterit id ex nautarum relationibus deprehendi, per doctrinam à nobis traditam. Nam uel ab uno in alterum nauigatum fuit aliquando: uel nemo unquam ab uno in alterum nauigauit, sed potius ab uno alio loco in ipsa duo loca. Quod si ab uno loco in alterum nauigatum fuit, & uel à Septentrione in Austrum, uel è contrario ab Austro in Septentrionem, certum est eadem duo loca longitudine non differre, sed si alia fuit ea nauigatio, quàm quæ sub uno meridiano fit, aut sub uno parallelo, non erit difficile, per ea quæ docuimus ex angulo profectionis & eorundem locorum latitudinibus differentiam longitudinis inuenire. Veruntamen si ab uno datorum locorum in alterum nemo unquam nauigauit, sed potius à quodam uno tertio loco ad ipsa data loca, uel ab iisdem ad illum. Inuestigabimus igitur eadem arte longitudinis differentias inter ipsum tertium locum & duo proposita loca. Ex eis enim differentia longitudinis duorum datorum locorum in marina charta positorum patefiet. Ut autem faciliore negotio complurium locorum longitudinis differentias cognoscere possis, sumendus erit pro radicali loco cum quo reliqui sint conferendi unus ex maritimis, aut potius ex insularibus à continente ualde remotis, à quo in complures orbis prouincias solitum sit nauigari. Et subiicimus in huiusmodi operationibus angulos profectionis cognitos esse. Nam uel uiatorium illud instrumentum, quod Hispaniacum nauticam appellant, mundi cardines rectò ostendit. & proinde reliquas plagas, uel si nutat, ut experientia docuit, quanta sit à polis mundi in omni loco nutatio in primis esto comperta.

De Solis declinatione. Cap. 4.

IN tabula declinationis Solis qua utuntur ad latitudinem inuenienda maxima declinatio transcendere non debet gradus 23. m. 30. quare opus est emendatione. Præterea errant: quoniam inquirunt in eadem tabula declinationem Solis per diem mensis, gradu Zodiaci in quo est ignorato: constat autem quòd uera esse non potest ipsa eorum tabula in plures annos. Non enim fieri potest reditus declinationis ad eadem minuta, etiam adhibita æquatione. Consultius igitur facerent si uerum locum Solis in primis inuenirent per tabulam ad quatuor annos supputatam, quibus finitis utendum erit æquatione. Deinde uerò per locum Solis cognitum declinatio elicienda erit ex tabula declinationum. In ea autem inuestigatione differentiam meridianorum negligendam censemus, nisi spatium sex horarum superauerit, aut in ijs diebus eam inquirant in quibus insigni differentia augetur, aut minuitur, id est circa æqui

noctialia puncta. Cæterum quouis modo Solis declinationem supputare uelint, est in alia re multò maior ambiguitas. Subijcitur enim in istis tabulis quibus nautæ utuntur, undecima die Martij in anno communi nostra ætate, Solem declinatione carere, quod non ualde constare uideo inter doctos Mathematicos. Nam qui octauam spheram ponunt motu trepidationis moueri, cum tabula motus Solis sit constructa ad Eclipticam primi mobilis cuius initium est immobilis sectio, necessariò concedent (uelut Georgius Purbachius infert) Solem in initio Arietis & Libræ constitutum, ab æquinoctiali primi mobilis sapissimè declinare, et proinde in initio Canceri non maximam habere declinationem, quod tamen negare debent qui eum trepidationis motum recipere nolunt. Huiusmodi autem difficultas facile dissolui posset, si apud Solstitium æstiuum minimam Solis distantiam à uertice obseruarem: præterea in eodem loco maximam remotionem circa Hybernium, ut nota relinquatur inter tropicos exacta distantia. Cuius dimidium quæ maxima est declinatio si auferatur à maxima Solis altitudine, nota relinquatur altitudo æquinoctialis supra Horizontem eius loci in quo facta fuerit huiusmodi obseruatio, qua cognita facile quidem poteris intelligere quonam die Sol declinatione careat. Enim uerò si circa æquinoctiorum tempora meridiana Solis altitudinem obseruaueris, idè tam diu feceris, donec ea æqualis inueniatur altitudini æquinoctialis supra horizontem, dubium non erit, quin Sol in ipsa die declinatione careat: inuento igitur uerò loco ipsius ad eandem diem, ipse gradus eclipticæ primi mobilis in quo Sol nostra ætate declinatione caret, cognitus erit. At facilioris doctrinæ gratia uernalem sectionem eclipticæ octauæ spheræ principium Arietis appellabimus, à quo ueri loci Solis supputatio pro ipsius declinatione inuenienda nostra hac tempestate initium sumat. His igitur suppositis locorum latitudines ex altitudine meridiana & Solis declinatione uere concludi poterunt. Quas quidem obseruationes non minus deberent facere qui prædictum motum trepidationis ponunt, quàm qui eum in natura esse negant. Vtrique enim tabulis & calculo Alphonsi regis utuntur ad uerum locum Solis & Lunæ, & planetarum quolibet die inueniendum, Qui certè computus adeò exactus esse non potuit, quin aliquid nota dignum sit deperditum trecentis his annis qui ad nostra usque tempora fluxerunt. Hæc parum animaduertit uir quidam circa emendationem temporum diligentissimus, qui cum ex tabulis Alphonsinis ingressum Solis in Arietem nostro tempore collegisset decima die Martij, æquinoctium uerò uernale à Iulio Cæsare notatum 25. die eiusdem mensis, falsam idcirco conclusit anni quantitatem suppositam ab Alphonso, quoniam quindecim qui intercidunt dies inter duo uerna æquinoctia, compleri non

non possent nisi in annis 2000. Probat autem sententiam Albategnij de eadem re, quoniam ipsos 15. dies impleat. At non aduertit Campanum anno natiuitatis Christi millesimo ducentesimo simili prorsus argumento in magno computo improbasse ipsam Albategnij opinionem de æquinoctiorum anticipatione, quoniam sequeretur ex ea diem Solstitij hyemalis diem natiuitatis Christi præcessisse duobus diebus. Præterea non uidet ingressum Solis in Arietem referri ad sectionem immobilem in ecliptica primi mobilis, æquinoctium uerò uernum ad mobilem sectionem eclipticæ octauæ sphaeræ. Quare cum eosdem terminos non accipiat in ea computatione, nihil ex ea concludi potest. Sed si iam uelis nullam esse apud Alphonsum sectionem mobilem, imo uerò tunc æquinoctium uernum accidere cum per tabulas reperitur in initio Arietis, quanquam si habenda esset ratio motus trepidationis aliter sentiendum esset: ueræ sunt igitur tabulæ Alphonsi ad ostendendum æquinoctia, & proinde anni quantitas uera est quam eadem tabulæ subiiciunt. Et (quod certissimum putat) fuisse Iulij Cæsaris ætate annis uidelicet 45. ante Christum uernum æquinoctium 25. die Martij, bissextili anno, maioris est ambiguitatis. Nam si Ptolemæo credimus exactissima illa obseruatio autumnalis æquinoctij quam decimo septimo anno Adriani fecit, fuit post initium annorum Nabunafari annis Ægyptijs 879. diebus 66. & horis duabus, fluxerunt autem ab ipso principio regni Nabu. usque ad initium annorum Christi (ut scribit Alphonsus) anni Romani 746. & dies 310. Fuit igitur prædictum æquinoctium autumnale anno 132. à Christo nato. Intercesserunt enim anni Romani 131. dies 268. & horæ 2. & erat annus ille bissextilis. Quapropter facta per mensium dies computatione consequens est, accidisse ipsum autumnale æquinoctium 24. die Septembris. Cæterum si calculum sequaris Georgij Purbachij & Ioannis de monte regio tertio libro Epito. sequenti die fuisse reperies, id est 25. eiusdem mensis. Hi enim à temporis spatium quod in tabulis Alphonsi inter Nabu. & Christum fluxisse reperitur, unam diem detraherunt, & eandem ei qui inter Christum & prædictum autumnale æquinoctium addiderunt, quod quidem congruit cum his quæ Georgius Valla ex Ptolem. tradit de ortu & occasu signorum. Nam 25. die Septembris confectum scribit autumnale æquinoctium, uernum uerò 22. Martij. Ioannes Stofferus in Calendario idem affirmat. Reperimus tamen in libello quodam de inerrantium stellarum significationibus à Nicolao Leonico è Greco translato, quem Ptolemei dicit esse, uernum æquinoctium 26. Martij in anno communi. Cui idcirco fides adhibenda non est in ea re, quoniam autumnale conficiat 21. die Septembris, quæ coherere non possunt, & obseruatis repugnant. Ostensum fuit enim à Ptolemæo in

ter uera

ter uernum æquinoctium & autumnale dies esse 187. Quare si uernale fuit 26. die Martij, oportebat igitur autumnale fieri 29. Septembris, non 21. Patet igitur ex supradictis quod anno 132. à Christi natiuitate æquinoctium uernum fuit, uel 21. uel 22. Martij. Anno igitur conceptionis qui fuit quoque bissextilis oportuit esse uel 22. uel 23. Et idcirco etiam si (ut ait ipse Ioannes Lucidus) anno domini 1545. uernum æquinoctium acciderit decima die Martij, non potuit tamen æquinoctiorum anticipatio à 45. anno ante Christi natalem dies 15. comprehendere. Campanus autem quoniam Thebitij sententiam amplexus est de quantitate anni, & stellarum fixarum motu, affirmat in magno computo uernum accidisse æquinoctium pridie quam in utero uirginis Christus redemptor orbis conciperetur: celebrabatur tamen Romæ ipso conceptionis die, idest 25. Martij, iuxta Cæsaris institutum. Nam quoniam Hipparchus & alij Astronomi anni quantitatem diffinierant dierum 365. cum quadrante. Cæsar igitur neglectis quadrantibus trium annorum unum diem adiunxit quarto, quem bissextilem nominauit, & proinde quatuor illis annis Solem cursum suum ex amussim confecisse existimauit. Et quoniam obseruatum fuerat aliquando à uetustioribus Astronomis uernum æquinoctium quodam mensis Martij die, qui iuxta instituti Calendarij formam 8. Cal. Aprilis erat bissextilis anni, firmam propterea atque in uariatam sedem putauit habere. Non quod Cæsari præsentis obseruatione ingressus Solis in uernalem sectionem innotuisset. Quod autem dicit Alphonsum Regem Albategnij opus non legisse, quia nondum in Latinum translatum esset, falsum est. Nam Arabicis libris omnino usus fuit, quibus eo tempore tota Hispania plenissima erat, & adiutus mauris quibusdam Toletanis tabulas coelestium motuum construxit. Quin in opere illo magno Hispanicè ab eo conscripto quod in Complutensi extat Bibliotheca ipsas tabulas quæ circumferuntur posuit, tabulas etiam Ptolemæi & Albategnij, ut liceret cuius quibuslibet tabulis uti. Sed hæc notiora sunt, quam ut à nobis inculcari sit necesse. Similiter ferè labi uideo complures nostri tēporis Astronomos, qui cum Alphonsinam sequantur positionem de motu stellati orbis, ex maxima tamen Solis hac ætate declinatione, & latitudine stellæ, atque eius uero loco per tabulas inuento declinationem ipsius eliciunt, & uicissim ex cognita declinatione uerum locum inquirunt. Quippe ut intelligant quantum fixa sydera progressa fuerint uel à temporibus Ptolemæi, uel Alphonsi, uel aliorum ad hæc tēpora Non aduertunt autem retulisse Ptolemæum initium motus stellarum fixarum ad sectionem eclipticæ mobilem, quam immobilem tamen putabat. Quapropter siue in tabulis Alphonsi ipsorum computus sectionem mobilem in qua uernum æquinoctium accidit, initium supputationis

tationis faciat, siue immobilem, ijdem termini non seruantur. Cæterum constat eosdem authores stellarum fixarum motus à sectione uernali cõputare, longitudinis angulo sphericæ trianguli constituto ad polum eclipticæ octauæ spheræ, quemadmodum tabulæ directionum Ioannis de Montereio subiiciunt. Si enim canem maiorem posueris in septimo gradu m. 18. signi Cancræ, latitudinemq; Australem habere Gr. 39. m. 10. supposita igitur maxima Solis declinatione nostra ætate Gr. 23. m. 30. quæ & eadem est Eclipticæ octauæ spheræ, eiusdem stellæ declinationem gradus quindecim habere concludes cum m. 49. quemadmodum noster calculus indicauit in libro Crepusculorum, quantam etiam reperio in uulgata Ephemeride Ioannis Stoflerini. Et proinde motum stellarum fixarum non referunt ad initium Arietis primi mobilis, sed ad sectionem æquinoctialis & eclipticæ octauæ spheræ. Inuenit quidem eadem illa arte Albategnius astrorum fixorum motus, sed prædictum trepidationis motum, si is in cælo est ignorauit. Ioannes Vernerus Norimbergensis duplicem posuit motus octauæ spheræ trepidationem, ut quæ obseruationibus inuenerat, cum ijs quæ reperta fuerant ab Alphonso, Albategnio, & Ptolemæo, atq; alijs uetustioribus Astronomis congruerent. Nouissimè autem Nicolaus Copernicus Toringus aliam rationem commentus est ut idem efficeret, sed quæ reperta fuerant ab Alphonso non commemorat. Vtriorum adhærendum sit planè nescimus. Nam eodem fermè tempore fixa sydera obseruarunt, & eandem posuerunt maximam Solis declinationem, graduum nempe 23. m. 28. se. 30. Cæterum uel propter fallaciam instrumentorum, uel quia latitudines locorum in quibus suas fecerunt obseruationes, non satis fuerunt exploratæ, dissident ipsi inter se. Spicam enim uirginis inuenit Vernerus in Gr. 16. m. 54. Libræ, at Copernicus eadem usus methodo in Gr. 17. m. 14. eiusdem signi, & eandem rursus stellam post uiginti duos annos Hieronymus Cardanus in Italia ait inuenisse undecim ab eo factis obseruationibus in Gr. 16. m. 18. Nos uerò interim quamuis assidue astrorum faciamus obseruationes, quoniam talia organa nondum habemus quibus confidenter uti possimus, nil pro certo affirmantes cum Albategnio sentimus. Scripta Marci Beneuentani ad manus nostros non peruenierunt, sed librum de æquinoctijs & Solstitijs & Apologiam legimus Alberti Pighij, qui non toties uincit, quoties uincere putat. Et quoniam persuaserunt sibi nonnulli eum euidenter demonstrasse ex Alphonso positione, uernale æquinoctium tempestate nostra quinq; dies præcedere introitum Solis in caput Arietis Alphonso tabularum, id ipsum modò operepretium erit examinare. Conatur imprimis ostendere stellarum fixarum motum per tabulas Alphonso inuentum non conuenire


nire cum obseruationibus Ptolemęi, quod Nicolaus Cusanus primus annotauit: quoniam si motum octauę spherę inter Ptolemęum & Alphonsum abstuleris (inquit) à loco stellę cordis Leonis obseruato ab Alphonso, relinquętur Gr. 4. m. 20. eiusdem signi, quam tamen stellam Ptolemęus in Gr. 2. m. 30. inuenit. At quoniam computum Alphonsi censet exordiri ab initio Arietis primi mobilis in ecliptica fixa, Ptolemęus uerò supputationes inchoauit à mobili sectione eclipticę octauę spherę, hoc igitur solum consequi uideo, fuisse tempore Ptolemęi eandem stellam in Gr. 4. m. 20. Leonis eclipticę fixę, & proinde sectionem uernam tunc fuisse in primo gradu, m. 50. Arietis. Quapropter multum distabant à coniunctione capita Arietum nonę spherę, & primi mobilis tempore natiuitatis Christi, sectio uerò uerna nec est nostra ętate, nec fuit multis antea seculis in signo Piscium. Et rursus quedam alia sequuntur in quibus fortasse est absurdum, sed non id quod infert de motu motui minimè congruente. Quod deinde ait tabularum Alphonsi compositores capiti Arietis nonę aliquem locum determinasse, & coniuncta fuisse capita Arietis nonę spherę & primi mobilis, anno dominicę incarnationis, id quod liquere ex Purbachio, & ex ijs omnibus qui Alphonsum subsequuti sunt, hoc colligere non possum ex ipso Purbachio. Quin manifestum esse puto, quouis loco caput nonę intelligamus esse, stellarum fixarum motus nihilominus computari posse, & propterea nullam eius rei mentionem in tabulis factam fuisse. Declinationem uerò eclipticę fixę quę quidem ignota est, cognitam sibi sumit Gr. 23. m. 51. at minorem eam inferius constituit. Quare cum ex his atque alijs non minus dubijs Hypothesibus de interfectione duarum eclipticarum, in quo à Purbachio recedit, uernalem sectionem concluderet ex Alphonsina positione eo tempore fuisse in initio 26. Gr. Piscium, non fuit igitur ab eodem id quod contendebat demonstratum. In ijs autem quę ratiocinando colligit, in Geometricis apparet non satis exercitatus. Putat enim in sphericis triangulis non eandem seruari rationem inter sinus rectos angulorum & oppositorum laterum, nisi eadem opposita latera simul sumpta semicirculo minora fuerint. Adhęc cum sibi proposuisset demonstratione inuenire quātus fuit arcus ęquatoris inter duas sectiones eclipticarum, anno à partu uirgineo 16. uidelicet capite Arietis octauę in summitate parui circuli constituto, angulos duarum eclipticarum cum equinoctiali equalis inuicem supposuit in ea supputatione, graduum uidelicet 23. m. 51. predictumque arcum elicuit graduum 21. m. 10. ferè. At non uidet sequi ex eo duo latera concepti trianguli quę angulum continet eidem arcui oppositum simul iuncta uni semicirculo equalia esse, quę tamen semicirculo minora esse concluderat, quod non semel tantum facit. Nam inquir

rit des

de Obser. Reg. & Instr. Geom. Lib. II. 51

rit deinde declinationem capitis Arietis eclipticę octauę ad annum 263. à Christi natiuitate, supposita declinatione fixę Gr. 23. m. 51. Rursus uerò ex inuenta declinatione per tabulam declinationum Ptolemęi, quę eandem supponit eclipticę obliquitatem, arcum eclipticę ipsius octauę inuestigat inter idem punctum & mobilem sectionem. Sic igitur æquales facit duos angulos eclipticarum cum æquinoctiali, & proinde duo latera trianguli coniuncta uni semicirculo equalia erunt, quę minora antea demonstraerat. In eodem errore fuit Orontius Finęus, qui quum cãnone 16. secundilibri de calculo motuum cœlestium, distantiam inuenire proposuisset uernalis sectionis eclipticę mobilis à sectione eclipticę fixę, ex uero loco & latitudine capitis Arietis cognitis ipsius eclipticę mobilis, declinationem eiusdem capitis inquirít, per 2. Problema tabule directionum Ioannis de monteregio. Deinde uerò ex inuenta declinatione respondẽtem arcum eiusdem eclipticę mobilis inuenire iubet, per ingressum arealem in tabulam declinationis Solis. At quoniam ipsę tabulę declinationum ad unius tantum eclipticę obliquitatem constructa sunt, graduum uidelicet 23. m. 30. æqualis igitur uidetur, supponere eclipticarum obliquitates, angulum nempe $d b c$, obliquitatis eclipticę fixę, æqualem esse putat angulo $f a c$, obliquitatis eclipticę mobilis, exteriorem interiori in descripta ab eo figura. Ex quo infertur duos eclipticarum arcus qui ab ipsis sectionibus a & b sunt, usque ad concursum occidentalem, uni semicirculo equalis esse, quod est impossibile. Partes enim sunt duorum quadrantum, qui ad eum maximum circulum terminantur, qui per eclipticarum polos uenit. Negat autem Albertus latitudinem regionis aliter cognosci posse quam per locum Solis, aut eius declinationem, & propterea ex altitudine Solis meridiana ignorato loco Solis tempus uernalis æquinoctii cognosci non posse, quemadmodum Marcus Beneuentanus assererat. Sed certè nullus modus aptior esse potest ad æquinoctia cognoscenda. Nam ex maxima & minima altitudine Solis quę in regione inuenitur, distantia cognoscitur inter duos tropicos, cuius dimidium si auferatur à maxima, uel addatur minime, altitudinem cognosces Equatoris supra Horizontem, quę complementum existit latitudinis regionis. Quapropter cum Sol tantam habuerit meridianam altitudinem supra Horizontem, in æquinoctiali circulo esse concludes. Ita in tertio libro Epito. Ioannes de monte regio æquinoctia obseruare iubet. Demonstratio porrò quam idem Albertus attulit ex Marco Beneuentano, ad ostendendum equationes motus octauę spherę in ipsis Alphonsi tabulis scriptas arcus esse eclipticę octauę, certissima est, si modò Theoricam eiusdem motus uelut tradita est à Purbachio intelligamus, maximum nempe circulum per polos duarum eclipticarum uenientem

nientem per caput Arietis nonæ transire semper. Idem demonstravit Vernerus in libro de Motu octauæ sphaeræ, & annotatum fuit à Ioanne de monteregio problemate 62. tabulæ primi mobilis. putat tamen Albertus eclipticarum polos & caput Arietis octauæ in eodem circulo magno semper esse, idq; statim apparere si una sphaera intra aliam inclusa, caput Arietis octauæ in paruo circulo circunducatur: & ita infringi existimat Marci demonstrationem. Cæterum ipso eodem instrumento omnia accidentia ostendi poterunt, quæ iuxta Purbachij expositionem hunc accessus et recessus motum consequuntur, & alia rursus quæ cum neutra conueniant positione. Si enim octauam sphaeram ita moueri intellexeris, ut semper eius ecliptica paruum circulum contingat in ipso initio Arietis quod circa eundem paruum circulum circumuoluitur, atque non solum cum idem Arietis initium in puncto Borealissimo, aut Australissimo fuerit collocatum, aliam intueberis figuram motus, quæ cum neutra positione conueniat. Sed si interea dum caput Arietis octauæ in paruo circulo circunducitur, eclipticam octauæ eclipticam nonne interfecare cogas, in initijs Cancræ & Capricorni eiusdem octauæ, transibit utiq; unus atq; idem maximus circulus per caput Arietis octauæ & eclipticarum polos, & ea habebitur figura motus, quæ tradita est ab Alberto. At si facta fuerit intersectio in initijs Cancræ & Capricorni nonæ, erunt semper eclipticarum poli in maximo circulo per initium Arietis nonæ ueniente, quemadmodum traditum est à Purbachio. Cuius Theorica motus accessus & recessus stellati orbis ipsis tabulis magis conueniens uidetur. Esto enim in subiecto schemate a, caput Arietis eclipticæ nonæ b, caput Arietis octauæ, quod in primo quadrante parui circuli positum intelligatur h, punctum Borealissimo in eodem. Sitq; in eclipticæ canone c, initium Capricorni, k uerò Cancræ. Veniat autem maximus circulus per b & c, arcum a h interfecans in e. Erit igitur ex Theodosij demonstrationibus libro primo de sphaeris arcus b c, quadrante maior, & anguli ad punctum e recti. Quapropter ex Theorica Purbachij ecliptica octauæ positionem habebit b e c. Descendat autem à puncto b, arcus maximi circuli b g, ad rectos angulos super eclipticam nonæ, sitq; d g, quadrans, & per ipsa puncta b & d, maximus ueniat circulus arcum a h in-




terfecans in f. Quadrans igitur erit arcus b d, & angulus d b g, rectus erit, & proinde secundum Alberti imaginationem ecliptica octauæ positionem habebit b f d. Cum enim caput A-


rietis

rietis fuerit in b, erit caput Capricorni in d. Aequatio igitur quæ in tabulis arcui b h respondet, uel est b c uel est b f, uel denique est a g: manifestum est autem Abacum Alphonsinum conuenire cum quantitate arcus b e, ceteri duo maiores sunt. Angulus enim b f e, acutus est, & idcirco maior erit b f ipso b e, angulus etiam g b k acutus est: & propterea minor erit g k ipso b k, quibus detractis à quadrantibus a k & e k, minor relinquetur b e quàm a g. Et proinde positio eclipticæ b e ex Purbachij traditione, magis conuenit cum tabulis Alphonsi, quàm positio eclipticæ b f d, quam Albertus commentus est. In eo tamen Purbachius ab Alphonso recessit, quoniam arcum a g, æquationem posuit, quæ in tabulis scripta est, cum sit potius b e, neque id putamus eum ignorasse. Sed fortasse, animaduertit ueram æquationem motus octauæ sphaeræ arcum esse eclipticæ nonæ, quippe in qua medius motus augium & stellarum fixarum computatur, differentiam uero illius ab arcu eclipticæ octauæ per exiguam esse, tabularum porrò compositores æquationes idcirco supputasse in ipsa ecliptica octauæ, quia minori opera id facere potuerunt. Est enim sicut sinus totus ad sinum rectum anguli b a e, medium motum subtendentis: sic sinus rectus arcus a b, ad sinum rectum arcus b e. Quapropter sinum rectum arcus a b, nauem uidelicet graduum perducemus in sinum rectum arcus anguli mediij motus accessus et recessus, à producto uero reijciemus quinque ultimas Ziphras, si tabula utamur semidiametrum supponente partium æqualium 100000. & ueniet in quotiente sinus rectus arcus b e. Per tabulam igitur sinuum rectorum arcus ipse b e, cognitus erit. Hac profecto arte prædicta æquationum tabula composita fuit, ex qua elicere poteris quantus sit arcus b g, latitudinis capitis Arietis octauæ. Enim uero si intelligas punctum h, Borealissimum esse, & z Orientale: erit igitur arcus b e, æquatio h b & b g, latitudo puncti b. Contra uero si conceperis h, punctum Orientale, & z Borealissimum, erit b g, æquatio arcus b z & b e, latitudo eiusdem puncti b. Quando igitur h, punctum supponitur Borealissimum, tabulam æquationis ingrediaris cum numero graduum quos continet b z, id est cum quadrantis complemento, & æquatio ei respondens erit latitudo puncti b. Hæc autem regula in seruire non poterit ijs qui octauæ sphaeræ æquationes arcus eclipticæ nonæ definiunt, sed ea nihilominus usus est Albertus Pighius. Cuius lapsus statim intelliges, si punctum b, caput Arietis octauæ in medio quadrantis posueris, inter h & z. Aequales igitur erunt h b & b z: est autem arcus a g, in tabulis (ut ipse putat) æquatio arcus h b. Si igitur tabulam æquationum ingrediaris cum numero graduum quos continet b z, æquationem offendes a g, & proinde arcus b g, latitudo puncti b æqualis erit a g secundum Albertum. At inæquales esse ex eo concludes, quoniam

in omni sphaerico triangulo ex arcibus maximorum circularum constituto tres eius anguli duobus rectis sunt maiores. Angulos uero g , trianguli $a g b$, rectus est, & $g a b$, recti dimidium: reliquus igitur $a b g$, maior erit dimidio unius recti, & idcirco $a g$, maior ipso $b g$, non sunt igitur aequales. Ipsam uero quam attulit Marci demonstrationem non satis intellexisse, ex eo apparet, quod sinum rectum illius arcus eclipticæ nonae qui æquatio est secundum Purbachium in tabulis Alphonsi, æqualem putat esse sinui recto argumenti motus octauæ sphaeræ. At idem sinus argumenti sinus rectus est illius arcus quem Beneuentanus æquationem censet esse in eisdem tabulis: æquales igitur erunt inter se ipsi sinus æquationum Beneuentani & Purbachij. Et quoniam uterque arcus minor est quadrante, æquales igitur erunt ipsi arcus, qui tamen inæquales ostensunt supra dicta illa Beneuentani demonstratione. Albertus autem deceptus fuit ob Geometriæ imperitiâ. In quadrante enim parui circuli $a b c d$, cuius centrum a polus g , sit (inquit) d , punctum latitudinis Septentrionalis, $a f b$, semidiameter sinus rectus arcus $b h g$, nouem graduum eclipticæ fixæ. Capite igitur Arietis octauæ posito in c erit $c d$, argumentum motus octauæ sphaeræ, cuius sinus $c e$, perpendicularis est ad semidiametrum $a e d$. Equidistans igitur $c e$, semidiametro $a f b$. Præterea $e f$ sinus arcus $b c$, perpendicularis est ad semidiametrum $a f b$. Quapropter quadrilaterum $a e c f$, parallelogrammum est, atque rectangulum, & $a f$ æqualis $c e$, sinus autem $c f$, sinus etiam rectus est arcus $c h$, circuli magni per polos eclipticæ fixæ & caput Arietis octauæ transeuntis, quæ est latitudo capitis Arietis octauæ ab ecliptica fixa. Hactenus uera sumit Albertus, & rectè syllogizat, sed quæ sequuntur inspiciamus. Quapropter à puncto (inquit) h , eclipticæ fixæ per quem transit arcus circuli prædicti, ad punctum f descendens recta $h f$, perpendicularis est tam ad $c f$ quàm ad $d f$, lineas rectas. Ita enim existimat. Et quoniam recta $a g$, ueniens à polo g in centrum a , perpendicularis est etiam ad $a f$, æquidistantes igitur concludit esse $a g$ & $f h$. Recta autem $a f$, æquidistans est $h z$, sinui recto arcus $g h$. Quapropter consequens est parallelogrammum esse $a z h f$: æqualem itaque concludit $h z$ ipsi $a f$, & proinde æquales esse inter se sinus $h z$ & $c e$, per communem sententiam. Cæterum in eo fallitur Albertus, quoniam putat $h f$, perpendicularem esse ad $a f$, aut æquidistantem rectæ $a g$. Ipsa enim recta linea $h f$, in communi existit sectione plani maximi circuli $c h$, & plani eclipticæ $g h b$. ea igitur in rectum producta per sphaeræ centrum transibit. Eo



bit. Eodem modo quia recta linea a g, in communi est sectione plani eclipticæ, & maximi circuli uenientis per d & g, uel quia centrum parui circuli cum eiusdem polo connectit, in rectum idcirco producta transibit per ipsum spheræ centrum. Concurrunt igitur f h & a g, in eodem centro, & propterea non sunt equidistantes, neque angulus a f h, rectus est, sed potius obtusus equalis quidem uni recto qui ad a, unâ cum uno acuto qui ad centrum spheræ ob concursum duarum a g & f h, arcum subtendit g h. Sinus itaque h z, maior ostenditur quàm a f, & idcirco maior quàm c e, & propterea equatio in ecliptica non est maior quàm in ecliptica octauæ, quemadmodum à Beneuentano fuerat demonstratum. Intellexit autem Albertus sinum equationis ab Alphonso de signatæ sinum esse illius argumenti cui est respondens, sed sinum equationis à Purbachio definitæ sinui argumenti equalem esse putauit. Sed siue ad eclipticam nonæ, siue ad eclipticam octauæ equationes supputes, exquisitissimam reperiens differentiam, & quæ fortasse unum integrum minutum nunquam superet. Causa est quòd sicut sinus rectus arcus d e, equationis nempe conceptæ infixæ eclipticæ ad sinum arcus b t, equationis in ecliptica octauæ (utamur enim schemate quod ex Marco attulit Albertus) ita sinus totus ad sinum arcus b l, complementi uidelicet latitudinis capitis Arietis octauæ. At hæc ratio minor est semper ea quam sinus totus habet ad sinum graduum 81, quæ tamen per exigua est, maior est enim b l quàm l g. Ceterum



si libeat ad eclipticam fixam supputare, ex argumento b g, cognosces arcum a b, qui relinquitur ex quadrante, cum quo si ingrediaris tabulam equationis Alphonsi, cognosces arcum b e, latitudinis capitis Arietis octauæ. Deinde sinum rectum graduum 81. multiplicabis in sinum totum adiectione quinque Zipharrû, si tabula uteris semidiametrum supponente


partium 100000. productum diuidas per sinum arcus b l, uidelicet complementi latitudinis b, & ueniet in quotiente sinus rectus complementi arcus d e. ipse igitur d e, innotescet. Huius operationis demonstratio est, quæ in spherico triangulo b d e, quoniam angulus b e d rectus est, & unumquodque latus quadrante minus, erit igitur sicut sinus totus ad sinum rectum complementi arcus b e: sic sinus complementi d e, ad sinum complementi arcus b d. Quapropter si quod sit ex ductu primi in quartum, diuidatur per secundum, prodibit ex partitione tertium, sinus uidelicet rectus complementi arcus d e, arcus igitur per tabulam sinuum rectorum cognitus erit, & d e, qui relinquitur ex quadrante notus etiam erit. Declinationem uerò eclipticæ fixæ constituit idem Albertus graduum 22. m. 45. hoc uidelicet

argumento.

argumento. Supposita eiusdem fixæ declinatione graduum $23. \bar{m}. 51.$ multis ac uarijs argumentationibus mobilis eclipticæ declinationem colligit ad annum 1519. graduum $24. \bar{m}. 36.$ Tum uerò ad hunc modum ratiocinatur. Qualium partium ponitur declinatio fixæ $23. \bar{m}. 51.$ talium ostenditur declinatio mobilis prædicto anno $24. \bar{m}. 36.$ ergo qualium partium fuit declinatio mobilis $23. \bar{m}. 28.$ talium est declinatio fixæ $22. \bar{m}. 45.$ per decimam sextam sexti Euclidis, adiutorio tabulæ sinus recti. Fuit autem eodem tempore declinatio mobilis $Gr. 23. \bar{m}. 28.$ Declinatio igitur fixæ gradus continet $22. \bar{m}. 45.$ At in priori syllogismo duo sumit quæ ab eo non sunt demonstrata, coniuncta nempe fuisse capita Arietum octauæ & nonæ spheræ tempore natiuitatis Christi, & aliam esse figuram motus octauæ spheræ secundum Alphonsum, quam quæ tradita est à Purbachio. Præterea in ipso eodem syllogismo ipsam mobilis eclipticæ declinationem, quæ ignota proposita est, cognitam sibi sumit graduum $23. \bar{m}. 30.$ tantam enim habet tabula declinationum Ioannis de Monte regio, & proinde errat. Posterior uerò syllogismus Sophisticus est. Illa enim decima sexta sexti Euclidis arcibus angulorum trianguli ac commodari non potest. Nam si ad annum 1519. talem concipias spheræ constitutionem, qualem ab eo descripta figuratio repræsentat, ut sit f



bd , semicliptica fixa f ad mobilis, arcus æquinoctialis abg , intersecet mobilem in a , fixam in b . Angulus igitur d , per tabulas Alphonsi cognitus erit, latus etiam bd , per ea quæ idem Albertus supponit, patefiet. Iam igitur si angulus dbg , declinationis eclipticæ fixæ cognitus subiiciatur, reliqua latera trianguli abd , cum reliquis angulis innotescant, & omnino datum erit ipsum triangulum. Quapropter si seruato angulo d , cū latere bd , angulum declinationis fixæ minorem posueris ipso dbg , minorem quoque fieri angulum declinationis mobilis necesse est. Equinoctialis uerò aliam habebit positionem cbk , & aliud habebitur triangulum cbd . Quod si proportionales sunt quatuor angulorum arcus, sicut arcus anguli dbg , declinationis fixæ, ad arcum anguli dab , declinationis mobilis, in priori habitudine, sic in posteriori arcus anguli dbk , fixæ ad arcum anguli dc mobilis,



lis, tribus horum cognitis quartus arcus innotescet, per ipsam decimam sextam sexti. Cæterum prædictos arcus proportionales esse, ex eadem decima sexta ostēdi non potest. Perperam igitur ratiocinatur Albertus in differentibus angulis duorum triangulorum, qualium partium ponitur declinatio fixæ 23. m. 51. talium declinatio mobilis inuenta est anno 1519. 24. m. 36. Ergo qualium fuit declinatio mobilis 23. m. 28. talium est declinatio fixæ 22. m. 45. per decimam sextam sexti. Tabula autem sinus recti nulli usui esse potest ad id inferendum, quin impossibile est eorundem angulorum sinus rectos proportionales esse. Est enim sicut sinus rectus anguli dbg , declinationis fixæ ad sinum anguli $da b$, declinationis mobilis in priori habitudine: sic sinus $a d$ ad sinum $b d$, rursus in posteriori sicut sinus anguli $db k$, declinationis fixæ ad sinum anguli $dc b$, declinationis mobilis, sic sinus $c d$ ad sinum $b d$. Maiorem autem rationem habet sinus $a d$ ad sinum $b d$, quam sinus $c d$ ad eundem $b d$, quia cum uterque ipsorum arcuum $a d$ & $c d$, sit maior quadrante, maior erit sinus $a d$, quam sinus $c d$, & propterea maiorem rationem habebit sinus anguli $db g$, ad sinum anguli $da b$, quam sinus anguli $db k$, ad sinum anguli $dc b$, non sunt igitur proportionales. Iam uerò si nulla facta mutatione in ipso triangulo $a b d$, uelit Albertus ad hunc modum ratiocinari, angulo $db g$ gradus habente 23. m. 51. erit angulus $da b$ Gr. 24. m. 36. Igitur si nulla mutatione facta in lateribus & angulis, idem angulus $da b$, concipiatur Gr. 23. m. 28. ipse primus angulus $db g$, intelligetur Gr. 22. m. 45. præter manifestum impossibile quod eiusmodi argumentatio includit, aliud sequitur absurdum, nempe ipsos quatuor angulorum proportionales arcus, sinus rectos proportionales habere, in ea quidem ratione quæ inter sinus $a d$ & $b d$. Oppositum tamen eadem tabula sinuum rectorum ostendit. Præterea cur non licebit similiter argumentari de duobus angulis interioribus eiusdem trianguli? Qualium uidelicet partium ponitur angulus $a b d$, 156. m. 9. is enim relinquatur detracto ex duobus rectis angulo declinationis fixæ, talium inuentus est anno 1519. angulus $da b$, declinationis eclipticæ mobilis 24. m. 36. Ergo qualium fuit declinatio mobilis 23. m. 28. talium est ipse angulus $a b d$, 148. m. 57. per ipsam decimam sextam sexti Euclidis. Sed angulus declinationis eclipticæ mobilis erat Gr. 23. m. 28. ex observationibus Purbachij. Ergo angulus $a b d$, graduum est 148. m. 57. Et proinde de




H clina

clinatio fixæ gradus continet 31. m. 3. quam simili argumento concludit Gr. 22. m. 45. Igitur contradictio. Ipsum uero Alberti Sophisma tum planè dissolutum erit, & fallacia argumentationis aperta, cum eius sensus apertus fuerit, qui certè hic est. Si arcus declinationis eclipticæ fixæ gradus habet 23. m. 51. fuit igitur arcus declinationis eclipticæ mobilis anno 1519. graduum 24. m. 36. Quapropter diuiso hoc arcu declinationis eclipticæ mobilis in partes aliquanto maiores, & idcirco pauciores, ut sint uidelicet 23. cum 28. sexagimis unius partis, erunt in arcu declinationis fixæ earundem partium uiginti duæ cum sexagesimis 45. per cōmune documentum numerorum proportionalium. Hoc quidem rectè infertur ex his quæ posita sunt. Sed quod ait ulterius, minorem repertam fuisse declinationem eclipticæ mobilis, quia graduum 23. m. 28. & ideo declinationem fixæ gradus tantum habere 22. cum m. 45. hoc concludi non potest ex prædictis, sed partium esse 22. cum sexagesimis 45. quæ tamen partes paulo maiores sunt quàm gradus. Quòd si anno 1519. inuenta fuit declinatio eclipticæ mobilis Gr. 23. m. 28. illud solum concludere poterat, non esse declinationem fixæ Gr. 23. m. 51. Cuius quidem quantitatem facile est inuenire ex eis quæ supposuit idè Albertus. Nam si supra dicta figura à puncto b, ducatur arcus circuli maximi bn, ad rectos angulos in a d. In triangulo igitur rectangulo bnf, latus bf cognitum erit. Ex quadrante enim lf, sub tracto arcu bl, graduum 19. m. 56. quem admodum per tabulas Alphonsi supputauit Albertus ad annum 1519. notus relinquetur bf. Angulus etiam f, cognitus est, quia arcus hl latitudo capitis Arietis ipsas semiclipticas per æqualia diuidit secundum eundem Albertum, est quæ 1. Gr. 59. m. latus igitur bn, unico syllogismo innotescet. Deinde uerò ex complemento ipsius bn, & complemento anguli f, angulus fbn, patefiet. Eodem prorsus modo ex eodem complemento lateris bn, & complemento anguli nba, declinationis eclipticæ mobilis cognita, Gr. uidelicet 23. min. 28. angulus nba, cognitus erit, quem subtrahemus ex angulo fbn cognito, & angulus abf, declinationis eclipticæ fixæ notus relinquetur ad memoratum annum, graduum uidelicet 22. min. 44. quæ quidem fixæ declinatio proximè (fateor) accedit ad eam quam inuenit Albertus, sed certioribus syllogismis inuenta est. Posito autem tempore Ptolemæi arcu bl, (ut ipse censet) Gr. 2. min. 2. Arietis primi mobilis, ipso uerò arcu hl, latitudinis capitis Arietis octauæ Gr.

8. min.

8. min. 56. se. 28. erit arcus b f, qui relinquitur ex quadrante Gr. 87. min. 58. & erit angulus f, Gr. 8. min. 56. se. 28. Angulus porro n a b, declinationis octauæ erat eodem tempore Gr. 23. min. 51. se. 20. Angulus igitur a b f, declinationis eclipticæ fixæ similibus syllogis mis reperietur Gr. 21. min. 51. se. 40. qui antea à nobis inuentus fuit eadem methodo Gr. 22. min. 44. ab Alberto autem Gr. 22. min. 45. Et quoniam non est maior fides adhibenda obseruationibus Purbachij, quam Ptolemæi, in inuestigatione maximæ Solis declinationis: palàm igitur est temere Albertum in narratione Alphonsinæ positionis de motu octauæ spheræ, declinationem eclipticæ fixæ posuisse graduum 22. min. 45. Non enim minus sequitur ad eas quas accepit hypotheses de conuento capitis Arietis nonæ & decimæ spheræ anno dominicæ incarnationis, ipsam declinationem fixæ graduum esse 21. min. 51. se. 40. quam graduum 22. min. 44: aut 45. Beneuentanus uerò qui (ut Albertus ait) declinationem eclipticæ fixæ tantam esse putat, quantam inuenit Ptolemæus mobilis eclipticæ declinationem, caput autem Arietis nonæ posuit anno 1519. in 28. Gr. 8. min. Piscium secum ipse aperte pugnat: quemadmodum mox ostendemus. Esto enim a b c, semicliptica Borealis primi mobilis æquinoctialem interfecans in puncto a. Arietis initio, & in c initio Libræ. Semicliptica item Borealis octauæ spheræ, tempore Ptolemæi idest annis 140. post Christum redemptorem natum, positionem habuerit d b e: sectio igitur uernalis fuit, autumnalis uerò e. Angulus d b a, gradus habuit 8. min. circiter 56. tanta enim fuit eodem tempore latitudo capitis Arietis octauæ, qua insensibiliter maior erat arcus ipsius anguli d b a, semiclipticas inter b, & oppositum punctum per medium secans. Angulus igitur a b e,


relinquit Gr. 171. min. 4. Et quoniam secundum Marcum Beneuen. æquales erant inter se duo anguli d b e & b a e, angulus autem b e a ipsi b d e est æqualis: æquales igitur erunt inter se per communem sententiam



duo anguli b a e, b e a. Arcus porro circuli maximi b f, ad rectos incidat angulos in æquinoctialem super puncto f: duo igitur anguli a b f, e b f, æquales inuicem erunt. Quapropter angulus a b f, graduum erit 85. min. 32. Angulus uerò b a f, ex supra dicta hypothesis Beneuentani, Gr. habet 23. min. 51. se. 20. quantam inuenit Ptolemæus maximam Solis declinationem: eius igitur complementum gradus habebit 66. min. 8. se. 40. Et quoniam sicut sinus totus ad sinum complementi lateris b f: sic sinus anguli a b f, ad sinum complementi anguli b a f: per documentum igitur numerorum proportionalium & tabulam sinus recti complementum ar-

H a cus b f,

cus b f, graduum inuenitur 66. min. 32. se. 30. Igitur arcus ipse b f, Gr. 23. min. 27. se. 30. Ex cognito autem latere b f, & ei opposito angulo b a f, si nu toto interueniente, sinus lateris a b, per ipsum commune documentum numerorum proportionalium innotescet. partiū uidelicet 98430. ubi semidiameter subiicitur 100000. Minus est autem quadrante ipsum a b quia a f quadrante minus est, similiter & b f, quadrante minus. Per tabulam igitur sinus recti ipse arcus a b, graduum inuenitur 79. min. 50. Est autem initium Cancrī eclipticæ nonæ in puncto b, communi eius intersectione atq; d b eclipticæ octauæ: caput igitur Arietis eiusdem nonæ erat tempore Ptolemæi ante a, initium Arietis primi mobilis gradibus 10. min. 10. id est in Gr. 19. min. 50. Piscium. Et quia motus nonæ ab anno 140. ad annum 1519. est Gr. 10. min. ferè 8. fuit igitur ipso anno 1519. caput Arietis nonæ in Gr. 29. min. ferè 58. eiusdem signi, duobus tantum min. ante caput Arietis primi mobilis. Et proinde non in Gr. 28. min. 8. Piscium, quod Albertus ait, Marcum Beneuentanum asseruisse. Sed nec sine absurdo dicere poterat, caput Arietis nonæ prædicto anno 1519. duobus minutis fuisse ante caput Arietis primi mobilis. Nam consequens est, ut deinde post paucos annos ipsa duo capita Arietis coniuncta fuerint. Quapropter ea tunc fuit sphaerarum constitutio, ut posito a, Arietis initio ipsarum eclipticarum nonæ atq; primi mobilis & a b qua-




drante, circuloq; maximo a c, per polos eclipticæ octauæ, et primi mobilis ueniēte, ipsam igitur octauæ eclipticam positionem oportuit habere de b. Ut sit punctum d, in quo æquinoctialem secat d a f, punctum uerò e ubi intersecat a c: Quadrans igitur est e b, & idcirco duo latera a b & d b, tri-

anguli a b d, semicirculo maiora sunt. Et propterea angulus b d a, declinationis eclipticæ octauæ maior quàm b a f, declinationis fixæ. Et idcirco si ipse Beneuentanus declinationem fixæ posuit Gr. 23. min. 51. maior igitur fuit declinatio octauæ in eo tempore quàm Gr. 23. min. 51. Quod quidem obseruatis repugnat. Albertus porro in eo magis culpandus est, quòd etiam si ea illi concedantur quæ ante demonstrationem assumpsit de conuentu capitum Arietis, & figura motus octauæ sphaeræ, nondum tamen potuit quod in Apologia, & decima propositione libri de æquinoctijs contendebat demonstratione inuenire, quantus uidelicet arcus eclipticæ octauæ intercipitur inter punctum uernalis æquinoctij & punctum

punctum ipsius eclipticæ octauæ, quod est cum capite Arietis primi mobilis in eadem longitudine. Et propterea in exemplo saltem id ipsum modo, & quædam alia, firmissima atq; clarissima demonstratione ostendemus. Ecliptica primi mobilis abc , eclipticam octauæ agf , secet in a caput Arietis nonæ esto d , quadrans parui circuli ec , caput Arietis octauæ f , eius latitudo fi , anno 1465. à Christi natiuitate, quando Sol per tabulas inueniebatur in initio Arietis. Arcus uerò ed , arcum af , in puncto k interfecet, & æquinoctialis gbh , eclipticam octauæ secet in g , eclipticam autem primi mobilis in b . Quapropter si figuram motus trepidationis teneamus quam Albertus tradidit, af & ai quadrantes erunt. Et quoniam tempore natiuitatis Christi b & d , puncta coniuncta fuerunt, ut Albertus ipse putat, arcus igitur bd , numeratione cognitus erit.

Arcus etiam ef , motus accessus & recessus cognitus, igitur arcum di , quem æquationem appellat, cognitum reddemus, uel loco illius æquationem ex tabulis sumentes de bitam ipsi ef , uel in triângulo sphærico dfi ex df , & angulo fdi , notum facientes eundem arcum di .



Et propterea arcus bi , quem augem̄ cōm̄munem dicunt esse, cognitus erit. Quem quidem auferemus ex quadrante ai , & notus relinquetur arcus ab . Deducemus autem à puncto b , maximi circuli arcum bl , ad rectos angulos super gk . Et quoniam arcus fi , latitudo capitis Arietis octauæ magnitudinem definiens anguli a , cognitus est: ipse igitur angulus a , cognitus erit. At in triangulo sphærico rectangulo $q̄ab l$, sicut sinus totus ad sinum rectum anguli a , sic sinus rectus lateris ab , ad sinum rectum lateris bl , horum uerò tria nota sunt, quartum igitur innotescet, id est sinus rectus arcus bl : ipse igitur arcus bl , per tabulam sinum rectorum cognitus erit. Simili prorsus syllogismo in triangulo gbl , ex sinu toto & sinu ipsius bl , cum sinu anguli $bg l$, qui quidem in eo tempore graduum erat 23. min. 28. sinus lateris bg , innotescet, & per tabulam prædictam sinuum rectorum ipse arcus bg patefiet, distantia uidelicet inter Vernam sectionem & initium Arietis primi mobilis in Equatore sumpta. Deinde uerò quoniam sicut sinus totus ad sinum complementi arcus bl , sic sinus anguli abl , ad sinum complementi anguli a , quorum quidem primum, secundum atq; quartum cognita sunt: tertium igitur innotescet, id est sinus rectus anguli abl , simili syllogismo in triangulo blg , sinus rectus innotescet anguli gbl . Quare per eandem tabulam sinuum duo anguli abl & gbl , patefient. Subtrahemus itaq; minorem à

maiori, & cognitus relinquetur angulus abg , declinationis eclipticæ fixæ xx . Ab ipso denique puncto b , maximi circuli arcum bm , ad rectos angulos excitabimus super ab eclipticam af , in puncto m intersecantem. Casdet autem ipsum m inter l & k , propterea quòd arcus al , quadrante minor est: & proinde angulus abl acutus. Quem quidem auferemus ex recto abm , & cognitus relinquetur angulus lbm . In triangulo itaque rectangulo blm , quoniam sicut sinus totus ad sinum complementi lateris bl , sic sinus anguli lbm , ad sinum complementi anguli blm , cognita sunt autem primum, secundum atque tertium, quartum igitur innotescet. Quare per tabulam sinus recti arcus complementi ipsius anguli blm cognitus erit, qui si subtrahatur ex gradibus nonaginta, arcus eiusdem anguli blm notus relinquetur. Ex angulo autem recto abm , angulum auferemus abg , qui iam innotuit, & cognitus relinquetur gbm . Et quoniam in triangulo bgm , sicut sinus anguli gmb , ad sinum anguli mgb : sic sinus rectus lateris bg , ad sinum lateris gm , & tria horum sunt cognita, quartum igitur innotescet. quare per tabulam sinuum arcus ipse gm patefiet. Est autem punctum m in eadem longitudine cum b , propterea quòd bm per polos transit eclipticæ primi mobilis per 17. propositionem primi libri Theodosij. Et idcirco prædicto anno 1465. quando Sol erat in initio Arietis primi mobilis, arcus gm , solaris itineris eclipticæ uel octauæ, qui erat inter uernam sectionem & ipsum initium Arietis primi mobilis cognitus erit, quod demonstrandum suscepimus. Quem quidem arcum si rectè calculaueris graduum inuenies 5. min. 14. se. 20. arcum bg , æquinoctialem Gr. 5. min. 40. se. 52. angulum abg , declinationis fixæ Gr. 22. min. 36. ferè. Quòd si figuram motus trepidationis teneas qualem Purbachius finxit, ad & ak quadrantes erunt: arcus autem dk paulo maior quàm fi , quem tamen cognoscere poteris in triangulo rectangulo dfk ex df & kf cognitis. Et idcirco angulus a paulo maior erit. Arcus autem bd motus nonæ cognitus erit numeratione, quem auferemus ex quadrante, & cognitus relinquetur ab . Deinde uerò ut antea syllogisabis, & tantam ferè inuenies distantiam puncti m à sectione uerna. Vt trouis autem modo, imparem reperies prædicto anno declinationem fixæ ei quæ similibus syllogismis reperitur ad annum 140. à Christi natiuitate. Neque ullus alius locus dabitur capiti Arietis nonæ in ecliptica primi mobilis sine absurdo. Et propterea non esse ei assignatum locum in tabulis arbitramur, nec radices motus augium & stellarum fixarum ad æras positas esse. Cum præsertim eis ignoratis, ipsarum fixarum loca ex eisdem tabulis haberi possint. Cæterum constat ex his quæ modò demonstrauius, quod si octaua sphaera aliquo trepidationis motu agitur, is tamen esse non potest qui adscribitur Alphonso.

Recita

Recitat Ioannes Schonerus fragmentum cuiusdam epistolę Ioannis de Monteregio, in qua inuenisse ait ex fundamentis Alphonsi, quod anno millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, quando Sol per uulgatum calculum reperiebatur in capite Arietis, erat tunc arcus eclipticę inter eius uerum locum & æquinoctialem comprehensus graduum ferè sex, atq; idcirco non penitus declinatione carebat. cum autem illud (inquit) spectet ad iudicia annua, quomodo uitabit errorem Astrologus, si caput anni, radicem prædictionis suę prorsus ignorauerit? & reliqua. Magna profectò est apud nos summi illius uiri authoritas, sed quoniam id concludi non potest, nisi supposita coniunctione capitum Arietis nonę spherę, & primi mobilis, tempore natiuitatis Chrissi, quod ex Alphonso non constat, eam idcirco sententiã recipere nolumus. Cum præterea idem autor in Calendario cum gradu Solis in tabula reperto, qui non est alius, quàm qui ex tabulis Alphonsi elicitur, statim tabulam quantitatis dierum ingredi iubcat, sine ulla refartione. Præterea quod anno 462. tertia die Ianuarij cum latitudinem urbis Romę ex Solis obseruatione inuestigasset, declinationem quę uero eius loco ex tabulis Alphonsi elicto respondet, altitudini meridiana adiecit. Ex quibus planè intelligitur, initium supputationis motus astrorum in tabulis Alphonsi, apud eundem Ioannem de Monteregio, sectionem esse uernam eclipticę octauę spherę, non caput Arietis eclipticę primi mobilis, tametsi contrarium ex prædicta epistola colligatur. Vt cunq; tamen ipse senserit, nos certissimum putamus, caput illud Arietis à quo in ipsis tabulis Alphonsi, initium supputationis motus astrorum sumitur, sectionem Vernam esse ipsius eclipticę octauę spherę, quod hoc argumento deprehendes. Ptolemæus 17. anno Adriani obseruauit Solem in sectione Autumnali 7. diem mensis Athir Ægyptiorũ, horis 2. post meridiem. Fluxerant autem anni Romani ab initio annorum Christi 131. dies 68. horarũ 2. Radix mediũ motus Solis ad ipsum initium annorum Christi secundum Alphonsum signa continet 4. Gr. 38. m. 21. ad meridianum Toleti. Et quoniam Alexandria orientalis est, meridianorum uerò differentia duarum ferè horarum est, cum duobus tertijs unius horę, detrahemus idcirco m. 6. se. 36. mediũ motus Solis in tanto tempore ab ipsa radice, & relinquentur signa 4. Gr. 38. m. 14. se. 24. ad meridianum Alexandria. His adiungemus medium motum Solis cui ex tabulis Alphonsi elicitur, ad annos 131. dies 68. & horas 2. Et reiectis integris reuolutionibus relinquentur signa 3. Gr. 2. m. 42. Sol igitur in sectione Autumnali distabat Alphonsi calculo à principio Arietis Gr. 182. m. 42. secundum medium motum, sed secundum Ptolemæum distabat tunc à sectione Verna Gr. 182. m. 10. Distantia enim Solis à maxima eccentrici longitudine Gr. ha-

bet 116. m. 40. & quoniam maximam longitudinem posuit in Gr. 5. m. 30. Geminorum: fuit igitur secundum medium motum distantia Solis à Verna sectione Gr. 182 m. 10. Et totidem etiam reperies si supposita eadem radice medium motum Solis per tabulas ipsius Ptolemæi numeraveris. Est igitur differentia, minuta tantum 32. quibus medius motus Solis Alphonsi medium motum Solis Ptolemæi præcisè excedit in tanto tempore. Et idcirco sectio Verna apud Ptolemæum caput Arietis est, ad quod in tabulis Alphonsi astrorum motus referuntur. Idem rursus ostendere poteris alio exemplo. A principio annorum Nabonasarum ad initium annorum Christi fluxerunt secundum Alphonsum anni Romani 746. & dies 310. In tanto autem tempore Sol (reiectis integris reuolutionibus) mouetur gradibus 307. m. 30. se. 18. per tabulas Ptolemæi. Radix Christi secundum Alphonsum signa continet 4. Gr. 38. m. 21. Quibus addemus integrum circulum, & à tota summa auferemus Gr. 307. m. 30. se. 18. & relinquentur Gr. 330. m. 50. se. 42. Sol igitur in primo anno Nabon. die primo mensis Theoth secundum Ægyptios, in meridie distabat à capite Arietis tabularum Alph. ipsis Gr. 330 m. 50. se. 42. Tunc igitur retinebat m. 50 se. 42. primi Gr. Piscium secundum medium motum ad meridianum Toleti: sed ad meridianum Alexandriae m. 44. se. 6. Et quoniam Ptolemæus libro tertio capite octauo, eum posuit in min. 45. primi gradus Piscium, constat igitur caput Arietis in tabulis Alphonsi, sectionem Vernam esse eclipticæ octauæ, siue initium signorum apud Ptolemæum. Ex his intelliges, non rectè Georgium Purbachium in Epitome unum diem detraxisse à tempore inter Nabonasarem, & Christum, & eundem addidisse tempori inter Christum & Ptolemæi considerationem. Nos enim sequuti Alphonsum, ostendimus omnia inuicem congruere. Et quod etiam multis inuenimus obseruationibus, testari fas erit. Cum enim Astrolabium quoddam rectè fabrefactum nacti essemus, cuius diameter duorum palmorum erat, haud paucis annis æstiuo tempore, Solem obseruauimus, minimamq; distantiam à uerticali puncto Conimbricæ, graduum præcisè reperimus 17. Et quoniam maxima Solis declinatio nostro tempore Gr. continet 23. m. 30. ferè, concludimus idcirco latitudinem Conimbricæ, Gr. 40. m. 30. ferè. Postea uerò anno à Christo nato 1555. labente, die 14. mensis Septembris minimam ipsius Solis à uerticali puncto distantiam reperimus Gr. 40. m. 40. Declinabat igitur in meridie illius diei m. 10. ad Austrum, & quia circa puncta æquinoctialia declinat Sol in una hora m. unum: fuit igitur in sectione Autumnali 14. die Septembris, 10. horis ante meridiem, quando uidelicet per tabulas reperiebatur in ipso ferè initio signi Libræ. Quare non est aliud ipsum initium Libræ in tabulis, quàm sectio Autumnalis,

Tabula

TABVLA DECLINATIONIS SOLIS

maximam subijciens declinationem Gr. 23. m̄. 30.


Aries		Taurus		Gemini	
Libra		Scorpius		Sagittarius	
gr.	Gr.	m̄.	Gr.	m̄.	Gr.
0		11		30	20
1		24	11	51	20
2		48	12	12	20
3	1	12	13	33	20
4	1	36	12	53	21
5	2	0	13	13	21
6	2	23	13	33	21
7	2	47	13	53	21
8	3	11	14	13	21
9	3	35	14	32	21
10	3	58	14	51	22
11	4	22	15	10	22
12	4	45	15	28	22
13	5	9	15	47	22
14	5	32	16	5	22
15	5	55	16	23	22
16	6	19	16	40	22
17	6	42	16	57	22
18	7	5	17	14	22
19	7	28	17	31	23
20	7	50	17	47	23
21	8	13	18	3	23
22	8	35	18	19	23
23	8	58	18	34	23
24	9	20	18	49	23
25	9	42	19	4	23
26	10	4	19	18	23
27	10	26	19	32	23
28	10	47	19	46	23
29	11	9	19	59	23
30	11	30	20	12	23
Virgo		Leo		Cancer	
Pisces		Aquarius		Capricorn.	

I & pro

& proinde non est aliud initium Arietis, quam sectio Verna, quod nos quidem testari operæpretium erat. Cum igitur Solis declinationem oportuerit inuenire, necesse non erit quinque gradus addere uero loco ipsius ex Alphōsi tabulis elicito, ut Albertus Pighius, Schonerus, et quidam alij censent. Sed subiectam tabulam ingrediemur. In qua quidem laterales numeri descendentes eorum signorum sunt, quorum nomina in fronte tabulæ scripta sunt, laterales uerò ascendentes eorum quæ in calce. Et in area eiusdem tabulæ sub eo signo in quo Sol existit quæsitam inueniemus declinationem. Sin autem uero motui Solis, minuta aliquot ultra gradus integros adheferint, duplici igitur introitu, ut fieri solet in alijs tabulis Astronomicis, pro ratione eorundem minorum ad 60. proportionalis pars quærenda erit, de differentia ipsius duplicis introitus. Et ea pars proportionalis adiungenda est numero graduum & min. primi introitus, si signum sub quo Sol defertur, in fronte tabulæ repertum fuerit, aut diminuenda, si in calce eiusdem tabulæ. Numerus enim hac arte inuentus, quæsitæ erit declinatio. Quòd si recentia aliqua obseruatione, ingressus Solis in Vernalem, aut Autumnalem sectionem exploratus fuerit, & anni quantitas exactissimè inuenta, poteris deinde ex uerissimo loco Solis cognito, ipsius declinationem per hanc tabulam certissimo calculo inuenire.

De declinatione partium eclipticæ per instrumentum. Cap. 5.


EX instrumentis quoque non solum globosis, sed etiam ex planis, declinationes partium eclipticæ cognosci possunt. In plana enim superficie dorsi Astrolabij circulus *abcd*, circa cætrum *e* descriptus, sit is qui eclipticam representat. Sit *a* punctum initium Arietis, *b* Cancræ, *c* Libræ, *d* uerò Capricorni. Punctum datum esto *f*, cuius oporteat declinationem inuenire. Sumatur igitur in quadrante *b* arcus *cg*, æqualis ipsi *af*, & coaptata regula aliqua, aut filo aliquo extenso, ipsis punctis *f* & *g*, signabimus eius intersectionem, & semidiametri *eb*, quæ in hoc exemplo sit *k*. Sumemus deinde ex quadrante *a* arcum *bl*, maximæ declinationis eclipticæ, & ipsius termino *l*, applicabimus regulam Astrolabij, quæ super centro *e* uoluitur,



uitur,


uitur, sitq̄ eius posito $l e y$. Tum uerò regulam aliam, aut filum rectissimè extensum tali arte applicabimus puncto k , ut æquidistans fiat ipsi $l e y$. tunc autem cognosces æquidistare, cum æquales arcus hinc inde reserauerit: sit igitur eiusmodi situs $m k n$. Aio arcum $l m$ aut $y n$, declinationem esse puncti f . Cum igitur circulus ipse $a b c d$, in gradus sit diuisus, ex arcu $a f$ cognito, declinatio $l m$, prædicto modo innotescit. Operatio facilis est, demonstratio uerò difficilis non erit. Diameter enim $a c$, communis sectio est plani æquinoctialis, & plani eclipticæ, diameter autem $b d$, communis sectio plani Coluri solstitiorum eclipticæ. Recta linea $f g$, communis sectio plani eclipticæ & plani circuli æquidistantis æquinoctiali, qui quidem per f describitur. Hoc enim ostendit 16. undecimi Euclidis. Intelligamus modò in ipso plano Coluri solstitiorum sectorem quendam, cuius basis est arcus maximæ declinationis eclipticæ. Vnum duorum laterum eius $e b$, alterum uerò recta quædam linea huic equalis, quæ in communi est sectione plani æquinoctialis, & plani eiusdem Coluri. Supradictum igitur planum circuli æquidistantis per f descriptum, dum planum eclipticæ secat super $f k g$, ipsum sectorem unà secabit, super quadam recta linea, quæ latus $e b$ intersecat in k , reliquo uerò lateri eiusdem sectoris æquidistat, quod per ipsam 16. propositionem 11. libri ostendes. At ex arcu maximæ declinationis qui sectoris basis existit, arcum abscinde æqualem declinationi puncti f , quemadmodum ex poli definitione & communi sententia concludes. Quoniam uerò eidem sectori similis & æqualis est sector $b l e$, in plano eclipticæ, à nobis imaginatione descriptus, commune habens latus $e b$, in quo punctum idem permanet k : recta igitur $k m$, lateri $e l$ parallela, arcum similiter abscindet $l m$ declinationi puncti f æqualem, quod erat demonstrandum. Quòd si à puncto b rectam $b o$, ad rectos angulos super $e l$ excitaueris, per 2. igitur sexti Euclidis, & compositam rationem atq̄ permutatam concludes, sicut $e b$ sinus totus ad $b o$, sinum rectum maximæ declinationis se habet: ita $e k$ sinus rectus arcus $a f$ ad $o r$, sinum rectum declinationis puncti f , quod in libro Crepusculorum alio modo demonstrauimus. Possunt etiam declinationes partium eclipticæ in unum planum deduci, ea quidem arte qua usus est Vitruuius nono libro. Circulus enim $a b c d$, circa centrum e descriptus, atq̄ in quadrantes diuisus, Colurum solstitiorum representet, sit $a c$ eius communis sectio cum æquinoctiali. Sumantur autem in quadrantibus $a b$ & $a d$, due maxime Solis declinationes $a f$ & $a g$, & ducta recta linea $f g$, super h puncto medio, intervallo uero $f h$ aut $h g$, circulus in ipsius plano describatur $f y g k$, qui eclipticam representabit, y Arietis initium, f Canceri, k Libræ, g Capricorni. Quemadmodum igitur in sphaera circuli æquidistantes qui eclipticam intersecant,

abscindunt ex arcu maximæ declinationis arcus æquales declinationibus eorum punctorum eclipticæ, per quæ in dem æquidistantes scribuntur, ita nimirum recta linea l m,




diametro a c, æquidistans ex arcua f, maximæ declinationis Borealis, arcum abscindit a r, æqualem declinationi puncti l in primo quadrante, aut puncti m in secundo. Recta similiter n o, eisdem diametro æquidistans, arcum resecat a t qui æqualis est declinationi puncti o in tertio quadrante, aut puncti n in quarto.

Cum igitur libuerit declinationem puncti l inuenire, arcum k m sumemus æqualem arcui y l, & regulam applicabimus ipsis punctis l & m, ut sit æquidistans rectæ a c. Nam statim eius intersectio cum arcu Coluri quesitam ostendet declinationem. Huius quidem instrumenti & operationis Geometrica demonstratio hæc est: Sit in subiecta figura unius semicirculus eclipticæ, uel Boreus, uel Austrinus a b c, semicirculus æquinoctialis qui cum eo oritur, sit a e c. Diuidantur hi in quadrantes, notis b & e, estoq; b e arcus Coluri Solstitionum inter æquinoctialem, & alterum tropicum, una uidelicet maxima Solis declinatio, & à centro mundi ad ipsa b & e puncta, rectæ ducantur lineæ d b & d e. Præterea à puncto b, ad semidiametrum d e perpendicularis ducatur b f, & producta d e in rectum, super centro f interuallo autem b f, in plano eiusdem Coluri Solstitionum, semicirculus describatur g b k, cuius quidē partes g b & b k, quadrantes esse necesse est. Sumatur igitur ex g b arcus quicumq; g l, & à puncto l recta linea excitetur l m ipsi g k æquidistans, quæ quidem arcum b e maximæ declinationis secet in o puncto, rectam uerò b f in t. Dico arcum e o æqualem esse declinationi puncti terminantis eum eclipticæ arcum y ab altera sectione æquinoctialis inchoatum, cui proportionalis est arcus g l in quadrante g b. Veniat enim per rectam lineam l m, planum æquinoctiali æquidistans, cuius & plani eclipticæ communis sectio sit recta n p. Erit itaq;



itaq;

itaque harum duarum rectorum linearum communis sectio punctum unum, quod quidem dicatur r , in utroque plano consistens eclipticæ & Coluri. Sed communis sectio deducti plani, et spheræ, erit circulus $n o p$, per primam propositionem primi libri Theodosij. Ducatur autem à polo mundi per n circulus maximus, qui æquinoctialem secet in z . Erit idcirco arcus $n z$, declinatio arcus eclipticæ $a n$ æqualisque arcui $e o$, quem recta $l m$ separat ex $b e$. Hoc autem per poli definitionem & communem sententiam constabit. Sed arcus $g l$ & $a n$ similes, proportionalesque esse, hinc innotescet, quod sicut $d b$ semidiameter eclipticæ, ad $b f$ semidiameterum circuli $g b k$, sic $d r$ ad $f t$ per secundam propositionem sexti libri Euclidis, & compositam proportionem, atque per mutatam. At uero recta $d r$ æqualis est $n q$, sinu recto arcus $a n$, quia æquidistans est recta $n p$ ipsi $a c$, per decimam sextam propositionem I. libri Euclidis. Recta autem $f t$ æqualis est $l x$, sinui uidelicet recto arcus $g l$. Igitur ecliptica & circulus $g b k$, arcibus $a n$ & $g l$ proportionales sunt. Sumimus enim in presenti, quod si in duobus circulis semidiametri, & duorum arcuum sinus recti proportionales fuerint, ipsi quoque arcus suis circulis proportionales erunt. Hoc autem facile demonstrabitur. Nam anguli super centrīs eorundem circulorum constituti, ipsosque arcus subtendentes, æquales sunt per 7. propositionem 6. libri Euclidis. Arcus igitur similes sunt, quod erat assumptum. In hac uero demonstratione, quemadmodum in superiori uides, sicut se habet sinus totus $b d$ ad $b f$, sinum maxime declinationis, sic $d r$ sinus arcus $a n$ ad $f t$, sinum declinationis $e o$, que quidem puncto n respondet. In triangulo itaque spherico rectorum quoque $a n z$ ex angulo a , & latere $a n$ cognitis, latus $n z$ prædicta arte innotescet, in unius circuli plano. Ostenditur etiam sinus rectorum angulorum, & oppositorum laterum, proportionales esse. Est autem huiusmodi instrumenti ea commoditas, quod gradus declinationis multo maiores se offerunt, quam gradus eclipticæ. Si enim arcum maxime declinationis graduum posueris 23. m . 30. erit inter ipsos gradus ratio ferè dupla sesquialtera, adeo ut duo gradus Coluri, quinque gradibus eclipticæ ferè sint æquales, & idcirco unus eclipticæ gradus, uiginti quatuor minutis in arcu maxime declinationis æqualis erit. Poteris autem idem instrumentum multo facilius construere, si describatur in primis ecliptica, deinde uero arcus declinationis maxime. In semicirculo enim $a b c$, ponatur a initium Arietis, b Canceri, c Libræ, qui iterum semicirculus pro Australi semicirculo inservire poterit, tum uero arcum sumemus $b e$, duplum maxime declinationis, & per ipsa b & e puncta rectam lineam ducemus, cuius intersectio cum $a c$, in rectum producta centrum erit circuli describi per b , Colurum representantis Solsticiorum. Erit igitur arcus $b f$, una maxima Solis decli-




natio. Hinc aliquando sumpta nobis fuit occasio describendi circulare planisphaerium, idem omnino efficiens, quod tabula primi mobilis Ioannis de Montereio. Sunt enim in area illius modi planisphaerij arcus descripti 89. Quorum omnium unus est communis terminus in *b* puncto, reliqui uerò termini sunt in diametro *ac*. Arcus autem centro uicinisimus uenit tantum est gradus, & qui hunc sequitur duorum graduum, & ita in ceteris suo ordine, à centro igitur qui distantissimus est, gradus sui circuli continet 89. Regula igitur ipsi diametro *ac*, in quolibet situ æquidistans, numeros arcuum ostendit, uni transversali respondentes. Resecat enim ex *ab* laterales, sed ex *fb* in præsentī figura arcuales, ipse autem *fb* transversalis est. Sed de his alio in loco abundius.

De Instrumentis quibus astrorum altitudines, & distantiae capiuntur.

Cap. 6.

VTuntur nauæ pendulis Astrolabijs, quia non possunt in mari quietum, stabilem uè habere horizontem. Prisci uerò Astronomi omnia instrumenta quibus astra obseruabant, super libra sa facie horizontis erigebant. Sic enim linea perpendiculi instrumenti in nullam partem inclinari poterat. In pēdulis uerò Astrolabijs, fortasse altera pars regulæ quæ altiorem situm habet, & proinde grauior est, quem admodum de libris demonstratum est à lordano, qua parte instrumento adhæret, aliquantulum ipsum à rectitudine separabit. Construes igitur pendulum Astrolabium sine dioptra regula uè, ad hunc modum. Fabricetur ex metallo circularis armilla mediocris magnitudinis, quadratis superficiebus, instar circulorum materialis sphaeræ, latitudo & crassitudo pares, unius digiti. In caua eius superficie secundum mediam longitudinem circulus describatur *abc*, cuius centrum intelligatur *d*. Huic respondeat in curua exteriori superficie circumferentia circuli *kl*. Punctum uerò *f* in ea sumatur supra *a*, secundum rectitudinem diametri *ae*. Et armilla suspensoria è qua Astrolabium pendet, connectatur cum clauicula ipsi *f*. Tum uerò ex circumferentia *abc*, arcum sumes *esag* unius quadrantis dimidium, atque ei æqualem *ab* in altero semicirculo. Esto




Esto autem punctum *c*, oppositum puncto *b* per diametrum, & semicirculus *b e c*, secetur in æquales nonaginta partes, quibus quidem debiti numeri ascribantur, initio supputationis facto in *b*. Resecetur deinde ex ipsius instrumenti crassitudine secundum mediam longitudinem, portio quædam in formam obtusissimi anguli *h g k*, & in puncto *g* angustissimum relinquatur foramen, quod radios Solis admittat. Quoniam uerò propter ipsam portiunculam, quæ ab instrumen-

to ablata est, leuius id circo relinquitur ex eadem parte, diameter igitur *a e*, à linea perpendiculi necessario discedet, & propterea tantumdem metalli adimere oportebit ex altera parte. Cum igitur absoluto instrumento altitudinem Solis supra horizontem cognoscere libuerit, suspenso ipso Astrolabio ex armilla, partem in qua est foramen, Soli radianti obijcias, statim enim eius radius in semicircumferentia *b e c*, quæ sitam altitudinem supra horizontem ostendet. Sunt autem altitudinis gradus in hoc instrumento duplo maiores quàm qui fierent, si super centro regula uolueretur, ut in consuetis uidemus Astrolabijs. Æqualium enim angulorum is qui ad circumferentiam circuli fit, duplam arcum continet, quàm qui in centro.

Et non solum ex instrumentis erectis supra planum horizontis, sed etiam ex iacentibus, dum modo ei æquidistant, altitudo Solis deprehendi potest. Circularis enim tabula *a b c d*, cuius circumferentia in Gr. 360. ut solet, sit diuisa, horizonti collocetur æquidistans, & fabricetur ex quavis dura materia rectangulum triangulum Isoscelesq; *f g h*, cuius quidem duo latera *f g* & *g h*, quæ rectum continent angulum, semidiametro descripti circuli sint equalia. Rectum autem ponatur ipsum triangulum eidem circulari tabulæ, sicq; coaptetur, ut latus *g h* ex amussim conueniat cum *a e*, circuli semidiametro, sitq; simul *g* cum *a* punctum uerò *h*, simul cum *e*: punctum igit; ferit in sublimi. Præterea erigat; hastula quædam, recta ad idem planum, super quouis puncto diametri *b d*. Cum igitur libuerit altitudinem Solis supra horizontem inuenire, instrumentum ipsum circumuolues, donec hastulæ umbra in rectam *b d*, sit extensa. Tunc enim umbra lateris *f h*, siue *f e* in quadrate *a b*, altitudinem quæ sitam indicabit, à puncto *b* in *a* supputatam. Reliqua autem pars quadrantis usque ad *a*, distantia erit inter Solem & uerticale punctum. Huius operationis demonstratio hæc est. Plana enim superficies circuli *a b c d*, quæ horizon-

ti pos

ti posita est æquidistans, in rectum intelligatur extensa, ad eas partes ad quas umbræ proijciuntur, & umbra trianguli rectanguli a f e, ad ipsum planum recti, in eodemq; plano extensa, sit triangulum a k e, recta a f umbram proijciat a k, & rectæ e f umbra sit e k, quæ quadrantem a b secet in



l. Igitur quoniam radij solares apud terram censentur æquidistantes, recta linea a k et umbra hastulæ extensa in longitudinem rectæ lineæ e b, æquidistantes erunt. Angulus autem a e b rectus est. Rectus igitur est angulus e a k, atqui rectus est e a f, rectus igitur erit angulus f a k, per 3. definitionem undecimi libri Euclidis. In duobus igitur triangulis a k e & a f k, quoniam a e latus unius, æquum est a f lateri alterius, et a k latus commune est, duo uerò anguli ipsis æquis lateribus contenti æquales, nē per recti, duo idcirco anguli a f k & a e k, inter se æquales erunt, per quartam propositionē primi libri Euclidis. Est autem angulus a f k, cōtrapositus ei qui ad pun-

ctum f, arcum subtendit distantię inter Solem & uerticale punctum, quapropter angulus a e k, similiter arcum a l in quadrante subtendet a b. Reliquus autem b l, arcui altitudinis Solis supra horizontem similis erit, quod erat demonstrandum. Ex hac demonstratione habes, quòd si huius modi instrumentum quadratam formam habuerit, ut in eo possit duci recta a k, circulum ipsum contingens in a puncto, non erit opus si lo hastulae, cuius umbra extendatur in rectam b d. Sed ipsum instrumentum eò usque circumuoluemus, donec umbra rectæ a f extendatur in rectam a k, sic enim umbra rectæ e f arcum altitudinis Solis supra horizontem ostendet. Latera autem trianguli f g h, si duplo longiora feceris, ut sit latus g h æquale diametro a c, atq; ei ex amussim conueniat: semicirculum igitur a b c diuides in partes æquales nonaginta, & erunt idcirco gradus altitudinis Solis duplo maiores. Quòd si hoc idem instrumentum ad eum

ad eum modum constructum, rectum posueris supra horizontis planū, & Soli ita obieceris, ut umbra rectæ a f quæ non recta iam, sed uersa erit in rectam a k sit extensa, erit arcus a l altitudinis Solis supra horizontem, reliquus uero b l, erit arcus distantia inter ipsum Solem & uerticale punctum. Hac enim ratione umbra recta atq; uersa permutantur, ut intelletis duabus Solis altitudinibus, quæ 90. gradus perficiant, tãta erit unitus et eiusdem gnomonis umbra recta, sub una earum altitudinū, quanta fuerit uersa quæ alteri respondet. Cæterum sub una atq; eadem Solis altitudine supra horizontem, siue gnomones æquales ponantur, siue inæquales, sic se habet umbra recta ad suum gnomonem, sicut quiuis alius ad suam umbram uersam. Demonstratio huius facilis est per quartam propositionem sexti Euclidis. Per commune igitur documentum numerorum proportionalium, ex umbra recta uersam cognosces, & uicissim ex uersa, rectam.

Vulgatum instrumentum quadrantis quo nauæ utuntur, aptissimum est ad altitudines Solis & aliorum astrorum capiendas, sed pro filo cum perpendiculo, ponatur regula cum pondere sibi adiuncto in altero extremo, tali artificio, ut ea facies quæ ad centrum instrumenti dirigitur, recta semper maneat supra planum horizontis. Subsultat enim filum, & detinetur interdum in eodem loco, etiam si obseruator ipsum quadrantem cõuoluat. Atq; ea de causa incertæ reperiuntur altitudines, quæ quadrantibus capiuntur. Accidit tamen aliquando instrumentum rectè fabricatum esse, & astra diligenter obseruata, sed deprehensas altitudines nondum exactas esse. Neq; id ob aliam causam, nisi quia propter instrumenti paruitatem, nō possunt eius partes ulterius in minutias partiri, adeo ut ultra graduum integrum numerum, quantum altitudinis accrescat, æstimare non possis. Inuabit igitur intra instrumenti ambitum in ipsius area, quadraginta quatuor circulos super eodem centro describere. Exterioris quadrans in 90. æquales partes secetur. Ei propinquior in 89. & qui hunc sequitur in 88. & ita deinceps suo ordine, quemadmodum in libro Crepusculorum docuimus. Ita enim existimo Claudium Ptolemæum fecisse. Nam si maximam Solis declinationem idcirco (ait) reperisse partium 23. m. 51. se. 20. quia ea proportio inuenta fuisset totius circuli ad arcum inter tropicos, quam 83. habent ad 11. Constat igitur aliquem quadrantem intra ambitum instrumenti descriptum, in ipsas 83. æquales partes distributum fuisse, quarum arcus inter tropicos 44. continebat. Neq; enim tanta fuit illius instrumenti quo Ptolemæus utebatur magnitudo, ut in eo prima atq; secunda minuta notari possent.


Astronomico radio utuntur nauæ ad cognoscendum quanta sit altitudo stellæ polaris supra horizontem. Sed difficile admodum est cer-

K tam

tam altitudinem ita inuenire. Aptissimum tamen instrumentum est ipse radius ad inueniendum distantiam inter duo astra, quorum intercapedo quadrante maximi circuli minor fuerit. Eius fabricam atque usum tradidit Ioannes de Montereio in libro de Cometa. Diuidenda est fustis longitudo in quotlibet æquas partes. Longitudo uerò uersatilis pinacidij ex eisdem partibus sumi debet, & construenda est tabula quædam numerorum, per quam ex data proportione inter duo latera trianguli re-ctanguli angulum rectum continentia, magnitudo illius anguli cognoscatur, qui breuiori lateri opponitur. Qualis est ea tabula quam Georgius Purbachius Mathematicus præstantissimus pro usu Geometrici quadrati composuit. Conspectis igitur duabus stellis per pinacidij extremitates, numerus partium dimidiæ longitudinis pinacidij multiplicetur in 1200. tot enim partium supponitur prædicti quadratilateri. Productum diuidatur per numerum partium qui sunt in fuste, inter situm pinacidij & oculum obseruatoris, cum quotiente uerò intrabimus ipsam tabulam Geometrici quadrati. Nam numerus in ea e regione repertus, erit arcus dimidiæ distantia inter obseruatas stellas: quo duplato integra earum intercapedo patefiet. Exemplum. Anno Christi 1475. die 17. Octobris, obseruauit Bernardus Vualther Astronomico radio Martis & Saturni distantiam. Et qualium partium uersatilis pinacidij longitudo erat 210. talium longitudo fustis inter oculum & pinacidij situm reperta fuit 807. Distantiam igitur ipsorum planetarum in hunc modum inueniemus. Numerum 105. id est dimidium longitudinis pinacidij multiplicabimus in 1100. latus nempe quadrati Geometrici, & fiet 12600. Hunc itaque numerum diuidemus per 807. & uenient ex partitione 156. $\frac{108}{807}$. uel multiplicabimus 210. longitudinem pinacidij in 1200. productum uerò diuidemus per 807. & quotientis sumemus dimidium, quod est 156. $\frac{108}{807}$. Cum hoc igitur tabulam ingrediemur Georgij Purbachij, et arcum ex ea eliciemus graduum 7. m. 24. se. 47. Quem duplabimus, & colligemus tandem Gr. 14. m. 49. se. 34. maximi circuli, pro distantia inter Martem & Saturnum prædicto tempore obseruationis. Huius operationis demonstratio facilis est. Esto enim recta a b fustis longitudo, oculus obseruatoris sit in a, & pinacidium c d in situ e, arcum distantia Martis & Saturni ex amussim occupet. Sit autem reperta a e, talium partium 807. qualium c d est 210. & eius dimidium c e, 105. Qualium igitur partium fuerit eadem a e 1200. talium erit c e 156. $\frac{108}{807}$. per commune documentum numerorum proportionalium. Et idcirco per tabulam Georgij Purbachij arcus anguli ca e, reperietur Gr. 7. m. 24. se. 47. Duplus igitur arcus qui angulo respondet ca d, gradus habebit 14. min. 49. se. 34. Minor tamen repertus est à Ioanne Schoneero in hoc eodem exemplo

emplo. Quia cum $312. \frac{216}{807}$ pinacidi longitudine eandem tabulam Ge-

orgij Purbachij ingressus fuit. Et propterea angulus ea arte ab eo inuen-



tus non est ca d, qui arcum distantiae Mar-

tis & Saturni subtendit, sed alius minor. Re-

cta enim cd in rectum producat, & suma-

tur ex ea cf, æqualis ipsi ce aut e d, & conne-

ctatur af. Erit igitur e f talium partium

$312. \frac{216}{807}$ qualium a e 1200. Et proinde an-

gulus quem ex supradicta tabula Schone-

rus elicuit, est e a f, quem minorem ostende-

mus esse ipso ca d. Latus enim af maius est

ipso a e, & idcirco si angulus e a f, bifariam

sectus fuerit, recta linea angulum dispescens

basim e f, secabit inter c & e, ne accidat im-

possibile contra tertiam propositionem 6. libri Euclidis. Et propterea

per communem sententiam multo minor erit angulus fa c, angulo c a e.

Æquales sunt autem inter se duo anguli ca e & d a e, totus igitur angulus

e a f minor erit angulo ca d, distantiae nempe Martis & Saturni, quod

demonstrandum erat.

Aduertendum est autem quòd Martis, Iouis, atque Saturni, & stella-

rum fixarum à uerticali puncto interualla, instrumentis deprehensa, pro-

pter ingentes à terra distantias, ad ipsius terræ semidiametrum compa-

ratas, æquales ferè angulos subtendunt in centro ipsius globi terreni, ijs

qui in eiusdem globi superficie ad obseruatoris oculum, insensibiliter e-

nim differunt, in Luna tamen atq; in Sole aliter fit. Obseruauit enim Pro-

lemæus instrumento regularum distantiam Lunæ à uertice, & ex uero

loco eius, atq; latitudine, numeratione repertis, declinationem inuenit.

Rursus ex inuenta declinatione & distantia eiusdem Lunæ à meridie co-

gnita, diebus equatis, uerum interuallum reperit inter ipsum Lunare cor-

pus & uerticale punctum. Quod quidem detraxit ab eo quod obserua-

tione repertum fuerat: sic itaq; conclusit quanta esset aspectus diuersitas

tempore dictæ obseruationis. Deinde uerò ex his distantiam centri cor-

poris Lunæ à centro terræ, in partibus quibus semidiameter terræ est u-

na, Geometrico syllogismo reperijt, & ex eadem obseruatione, propor-

tionem semidiametrorum eccentrici, & epicycli Lunæ, atq; eccentrici-

tatis ad semidiametrum terræ. Solis autem & Lunæ diametros uisuales,


quoniam nullis instrumentis satis exactè reperire poterat, ex duabus igi-

tur Lunaribus eclipsibus admodum ingeniosè inuestigauit. Quare dif-

ficile non fuit proportionem ostendere semidiametri terræ ad semidia-

metrum corporis Lunæ. Ex his igitur diametrum Solis, & centri eius à

centro terræ distantiam in partibus quibus semidiameter terræ est unâ, deprehendit proportionem etiam trium corporum Solis terræ & Lunæ ad se inuicem. Et propterea ad inueniendum deinceps in quolibet situ aspectus diuersitatem, necesse non fuit astra ipsa obseruare, sed ex data Solis aut Lunæ à centro terræ distantia, & elongatione eius à polo horizon- tis, diuersitatem aspectus in circulo altitudinis Geometrico syllogismo inuestigare docuit, quarum maxima est in Luna Gr. unus m. 43. tabulasq; construxit diuersitatis aspectuum. Quanquam interim possimus (quemadmodum ipse fecit) obseruatione simul & numeratione, ipsam Lunæ aspectus diuersitatem inuenire. Solis porro diuersitas aspectus quoniam multò minor est, maxima enim secundum numeros Ptolemæi minuta duo tantum continet cum secundis 51. non potuit idcirco sicut in Luna obseruatione inueniri. Itaq; quanta sit distantia Solis à terra, concludere non potuit ex aspectus diuersitate, hanc enim admodum difficile erat instrumentis inuenire, propter sui paruitatem, sed e contrario ex distantia ipsius à centro terræ, quam supradicta arte cognouit, quamq; inuariatam posuit, aspectus diuersitatem inuenit. Ex his igitur palàm est, astrorum altitudines instrumentis deprehensas, eorum quæ supra Solem sunt, pro ueris accipiendas esse. At in ipso Sole diuersitas aspectus, quantum attinet ad latitudines locorum, pro nihilo habenda est. In Luna autem nullo pacto negligenda, nisi ea prope Zenith constituta fuerit. Ex quibus etiam apparet Hieronymum Cardanum nò satis aduertisse quæ in quarto libro de Subtilitate scripsit, de ijs quæ ex astrorum radijs cognosci possunt. Cuiuscunq; nempe sideris, & quacunq; hora, altitudinem à centro terræ, ex cognita proportione umbræ ad gnomonem inueniri posse. Quasi uerò omnia astra ita illustrare possint obiecta corpora opaca, ut ex aduersa parte manifestæ umbræ proijciantur, quod quidem præterquam Soli, atq; Lunæ, nulli conceditur astro. Centrum terræ ponita, eius semidiameter sit $a d$, planum horizon- tis æquidistans $b c$ uirga $d e$, perpēdicularis sit super ipsum planum, astrum uerò f radium mittat $f e h$, & umbra $d h$, in ipso tempore notam habeat proportionem ad $d e$. Quapropter angulus $d e h$ cognitus erit, & idcirco $a e f$, qui relinquitur ex duobus rectis, cognitus quoq; erit. Sumatur (inquit) per planisphærium ipsius f , sideris altitudo supra horizontem, cuius differentia à Gr. 90. arcus erit anguli $f a e$ ut ipse putat, & idcirco reliquus angulus $a f e$, ignorari non poterit. Iam igitur in



trian-

M. CCLXXXVIII. & ad tantam altitudinem uapores ascendunt. En uis
des humani ingenij subtilitatem quousq; perueniat? Vitellionem haud
ignoro deceptum esse, qui ascendere tantum ad LII. passuum millia tra-
diderit, cum quintuplo plus ac dimidio quam dixerit ascendant, uerum
cum ambitum terræ contrahat, & passus ob id etiam maiores faciat alia
quanto, non tamen usq; ad quartam partem debitæ altitudinis deducere
eam potest. Quod si ut ad summum deducatur Crepusculum per duas
horas ante diem fiat, erit angulus c in circumferentia qui æqualis est g,
partium LX. & C. CXX. quare linea a e quæ est altitudo uaporum, erit pas-
suum millia DCCLXXII. & hoc est maximum ad quod ascendere ua-
pores possint è terra spatium.

Hactenus Cardanus, quem statim ostendemus insigniter deceptum
esse, non Vitellionem, qui pulchram illam demõstrationem de summo
rum uaporum altitudine ab Allacen mutuatus est. Cuius quidem libel-
lum de Crepusculis unà cum quodam alio de eadem re à nobis conscri-
pto, annis ab hinc uiginti impressioni dedimus. Causa erroris Cardani
ea fuit, quòd putauit summos uapores Crepusculum efficientes esse ad
e, at non sunt ibi. Primus enim radius in initio Crepusculi matutini refle-
xum lumen nobis ostēdens est f g e, ipsa uerò reflexio in horizonte sit in g
igitur non in e. Nam quis unquam uidit lucem Crepusculinam supra
uerticem esse? est enim a centrum sensibilis horizontis. Distantia itaque
summorum uaporum à terra multò minor est quam a e. Sed ut hæc facie-
lius intelligantur ipsam summorum uaporum altitudinis demonstra-
tionem, quemadmodum à nobis in libro prædicto de Crepusculis tradi-
ta est recensebimus. Sphæra cuius centrum a esto in subiecta figura Sola-
re corpus, sphæra cuius centrum b esto terræ globus. Intelligatur autem
circulus quidam maximus a p R q super b centro mundi descriptus in
teruallo a b, per horizontis polum ductus, & Solis centrum, apud initium
um Crepusculi matutini, communis sectio plani huius concepti circuli
cum Sole, esto circulus c d e cum terra uerò circulus f g h, ab arcue c r a-
dijs Solares procidant c l, e l terram contingentes super punctis g h. Igi-
tur sub arcu g f h, pars terreni globi radijs Solaribus illustrata compre-
henditur, sed sub reliquo arcu g h, ea pars quæ umbra obcæcata est. Esto
præterea punctum R horizontis polus, & connectatur b R circulum f g h
secans super puncto t, in quo centrum uisus collocatur: recta deinde p q
per centrum mundi ueniens esto communis sectio horizontis & descri-
pti circuli a p R q, recta uerò z t u, eiusdem circuli communis sectio, & al-
terius cuiusdam circuli, in quo sensibilis horizon, concepto illi horizon-
ti quod per centrum mundi transit, æquidistantis. Igitur duæ rectæ li-
neæ p q, z u æquidistantes sunt, per 16: propositionem undecimi libri
Euclidis

Euclidis. Angulus uerò κb p̄ rectus est, quia $R p$ quadrans: igitur angulus $b t u$ rectus etiam, quod item per primum librum Theodosij concludi posset. Recta idcirco $z u$, circulum tangit in puncto t , per correlarium 16. propositionis 3. libri Euclidis. Quoniam uerò ab aëre puro, tenui quæ non fit luminis reflexio, concipiamus igitur animo sphaeram uaporum à terra mari quæ ascendunt, qui aërem usque eò spissant, condensant quæ, ut Solis lumen reflexionem efficere possit. Nam quod ultra hanc sphaeram uersus cælum est, quanquam nocturno tempore illuminetur à Sole, ob reflexionis defectum uisibile non est. Esto autem $y r s$, arcus circuli maximi huiusmodi sphaeræ, super b centro descripti, in eodem quæ plano existens, in quo maximus terræ circulus $f g h$, eum quæ secet recta $z u$ super puncto r . Igitur quamuis ante Crepusculum matutinum ab omni puncto arcus $r s$, lumen Solis reflecteretur: nullus tamen radius peruenire potuit ad r centrum uisus, quia sub recta linea $t u$, nulla alia recta linea sumi potest, quæ circulum non secet $f g h$, quemadmodum super 16. propositione 3. libri Euclidis demonstratur. Erat idcirco terræ globositas impedimento, quo minus uideretur quod sub ipsa recta linea $t u$ collocabatur. At etiam quidquid intraturbinatam terræ umbram $g l h$ continetur, aspici non potest. Primum igitur punctum quod illuminatum apparet, in principio crepusculi matutini, cum illucescit, est r . Nam neque in eo aëre tenuissimo liquidissimo quæ existit, qui lumen Solis nobis minime reddit, neque intra terræ umbram, neque sub sensibilis horizontis planicie. Itaque connectatur $b r$ recta linea, quæ circulum terræ secet in o puncto, erit idcirco recta linea $o r$, summa uaporum altitudo, qui à terra in sublime attolluntur, cuius longitudinem in hunc modum perscrutabimur. Angulus $p b t$ rectus existit, angulus uerò $a b p$ depressionis Solis sub horizonte notus supponitur ex obseruatione, graduum uidelicet 19. secundum Allacen, & Vitellionem: totus igitur angulus $a b t$ notus erit, ab hoc autem angulum subtrahemus $a b g$, quem quidem supponimus cognitum, utpote qui dimidium arcus maximi circuli terræ subtendat à Sole illustratum, & ideo angulus $g b t$ notus relinquetur. Porro angulus quem $b g$ cum recta $g l$, circulum contingente ad punctum g efficit, rectus est, per 18. propositionem 3. libri Euclidis, angulus etiam $a d t$ rectus, igitur bina triangula $b r g$, $b r t$ æqualia habent latera per 47. propositionem primi, & communem sententiam: æquiangula idcirco sunt ipsa triangula, per 8. propositionem primi, & angulus $t b r$ dimidium est anguli $t b g$: at innotuit iam ipse angulus $t b g$, innotescet igitur $t b r$ quare reliquus angulus $t r b$, trianguli $b r t$ cognitus erit. Est autem sicut sinus rectus anguli $t r b$, ad sinum totum, ita recta $b t$ ad rectam $b r$, & harum quatuor quantitatum duæ primæ notæ sunt, tertia uerò recta nempe


pelinea

pelinea br , quot stadia habeat cognoscitur, supposito numero stadiorum totius orbis fg ex Ptolemaeo, aut Eratosthene, supposita etiam portione eiusdem circuli ad diametrum ex Archimede. Quare per commune documentum numerorum proportionalium, numerus stadiorum rectae br cognitus erit, ab eo autem auferemus numerum stadiorum semidiametri, & relinquetur nota or , distantia uidelicet qua editissimi uapores à terra absunt, quod inuestigandum proposuimus.

Quae autem praemittuntur à nobis in memorato Crepusculorum libro demonstrata, tria sunt. Primum, si luminosum sphaericum aliud sphaericum corpus illuminat, necesse est extremos radios luminosos utramque sphaeram contingere. Quod si procidentes radij utrumque corpus contingunt, eos extremos esse, longissimosque, necesse est. Secundum, luminosum sphaericum sphaerici minoris plusquam dimidium illuminat, sub eodemque cono comprehenduntur, uerticem habente in minorem sphaeram. Demonstrauit haec Vitellio in secundo libro, sed multo melius Aristarchus Samius in libro de Magnitudinibus & distantijs Solis & Lunae. Tertium uero, ex cognita distantia centrorum praedictarum sphaerarum, & ratione semidiametrorum, tum inter se, tum ad ipsam distantiam, arcum maximi circuli minoris sphaerae sub quo pars illuminata comprehenditur, certis numeris indicare. Hoc autem ex prioribus concluditur de propositis sphaeris Solis atque Lunae. Rectae enim lineae ae , ae connectantur, & ex ae , recta abscindatur ei aequalis bh terrae semidiametro, & connectatur bi , similiter ex ac recta linea abscindatur ck , aequalis semidiametro bg & connectatur bk . Et quoniam duo anguli ad e & h puncta, recti sunt, per 8. propositionem 3. libri Euclidis, quadrilaterum igitur be , rectangulum est, atque parallelogrammum, & eodem syllogismo concludes, quadrilaterum bc rectangulum esse. Anguli igitur ad i & k puncta, recti sunt, & idcirco per 8. & 47. propositionem primi libri Euclidis, duo anguli abi & abk aequales erunt. Quadrantes sunt autem duo arcus hm & gn , propterea quod anguli hbm & gbn recti sunt, arcus igitur nm differentia est, qua semicirculus terrae ab eo arcu sub quo illuminata pars comprehenditur, superatur, arcus uero fm aut fn , illius differentiae dimidium, cuius quidem quantitatem facile erit certis numeris indicare. Nam bh & ei , opposita latera parallelogrammi equalia sunt ad inuicem, at proportio rectae ab tum ad ae , tum ad bh nota supponitur, proportio igitur eiusdem ab ad ai cognita erit. In triangulo autem rectangulo aib , sicut recta ab ad recta ai , sic sinus totus se habet ad sinum rectum anguli abi : ipse igitur sinus rectus arcus anguli abi cognitus ueniet, & per tabulam sinus recti, eiusdem anguli arcus qui est mf innotescet, & proinde totus arcus mn patefiet. Ut si sphaera maior

de Obser. Reg. & Instr. Geom. Lib I. 81

maior sit Sol, minor uerò terra, quoniam secundum sententiam Albategni, qualium partium semidiameter terræ est una, talium est a e quinque & dimidium, & a b 1108. in medijs longitudinibus: earundem igitur partium erit a i, quatuor & dimidium. Multiplicabimus itaq; 4. cum semise in 100000. sinum totum, productum uero diuidemus per 1108. & uenient ex partitione partes sinus recti 406. quibus respondent in tabulâ



14. m. ferè. Sol igitur in medijs longitudinibus terram illuminat sub arcu maximi circuli gradus continente 180. m. 28. ferè.


Porro ut quanta sit ipsa summorum uaporum à terra altitudo, facilius computari possit, intueri oportet, quòd si Sol non prius nos illumina-

L. nare

nare inciperet, quàm æqualem arcum similem uero haberet occultationis sub horizonte differentia quadrantis maximi circuli terræ & dimidij arcus illuminati, ne utiquam Crepusculum matutinum efficeret, lamberet enim eius supremus radius horizontem. Atqui matutinum crepusculum efficit: igitur priusquàm sub æquali arcu occultetur ipsi differentia quadrantis & dimidij arcus illuminati, nos illuminare incipit. Est itaq; semper arcus occultationis Solis sub horizonte, apud initium Crepusculi matutini, aut uespertini finem, maior differentia quadrantis & dimidij arcus illuminati. Ipsa igitur differentia ab arcu occultationis subtracta, arcum relinquet æqualem ei qui inter punctum in quo radius Solis globum terrenum tangit, & centrum sensibilis horizontis interiacet, quem admodum in ipsa figura animaduertere licet. Nam duo anguli nbg , pbt recti sunt, à quibus detracto communi angulo pbg : duo igitur anguli nbp , gbt æquales relinquentur. porro idem ipse angulus nbp relinquitur, subtracto angulo abn , differentia quadrantis & dimidij arcus illuminati, ab angulo abp occultationis Solis, in principio crepusculi matutini, idem enim iudicium habetur de angulis, & de arcubus. Quoties igitur summam uaporum altitudinem metiri libuerit, differentiam semidiametrorum Solis & terræ in sinum totum multiplicabimus, quinque Ziphras adiuciendo, productum uero diuidemus per distantiam centrorum, & proueniet sinus rectus differentia quadrantis & dimidij arcus illuminati, eius arcum subtrahemus ab arcu depressionis Solis, & relinquetur arcus inter centrū sensibilis horizontis, & punctum illud in quo radius Solis terrenum orbem tangit: deinde dimidij huius arcus complementum sumemus, & per ipsius complementi sinum rectum, diuidemus eum numerum, qui ex ductu sinus totius in numerum stadiorum semidiametri terræ fit. Equidem proueniet ex partitione, summorum uaporum distantia à centro terræ, sublato igitur numero stadiorum semidiametri, suprema ipsa altitudo in quam uapores attolluntur, nota relinquetur: differentia enim quadrantis & dimidij arcus illuminati $m. 14.$ inuenta est, eam igitur auferemus à gradibus $19.$ occultationis Solis, & relinquentur $Gr. 18. m. 46.$ huius arcus dimidium est $Gr. 9. m. 23.$ cuius quidem complementum $Gr. 80. m. 37.$ sinum rectum habet $98661.$ Multiplicentur autem in sinum totum stadia $40090.$ quæ (si sententiam Eratosthenis de ambitu terræ cum Cardano recipiamus) semidiameter continet, fientq; $4009000000.$ Diuidatur is numerus per $98661.$ & uenient ex partitione $40634.$ stadia, ab his auferemus $40090.$ & relinquetur summa uaporum altitudo stadiorum $544.$ siue $M. pass. 68.$ At secundum calculum Allacen tantum reperies $M. pass. quinquaginta duo:$ propterea quòd ambitum terræ posuit $M. pass. 24000.$ Quod quidem

dem cum nautarum obseruationibus maximè conuenit.

Existimat autem Cardanus angulum $f g d$, partium esse 19. ac si esset in centro terræ, idè fieri propter maximam Solis distantiam ad terræ comparationem. At ex ijs quæ à nobis ostensa sunt, liquidò apparet partium esse 18. \bar{m} . 46. desunt enim \bar{m} . 14. differentia quadrantis & dimidij arcus illuminati. Magnitudo autem distantia Solis ad terræ comparationem maximam diuersitatem facit, uelut superius diximus ex sententia Ptolemæi \bar{m} . 2. se. 51. sed secundum Albategnium \bar{m} . 3. se. 13. angulus




lus $f g d$ in figura hac Cardani, est in nostra figura $c r u$, huic autem æqualis est angulus $C S P$. quia lineæ $z u$ & $p q$, æquidistantes sunt, angulus uerò $k b p$ ipsi $c s p$ est æqualis: æquidistantes sunt enim $b k$ & $c s$, duo igitur anguli $k b s$ & $c r u$, æquales sunt per communem sententiam. Angulus porrò $a b p$ occultationis Solis ipso $b k s$, maior est, eorum enim differentia est $a b k$, minorum uidelicet 14. igitur minor est angulus $c r u$ ipso $a b p$: quare si $a b p$ ponatur 19. Gr. erit $c r u$ Gr. 18. \bar{m} . 46. neq; maior erit, aut minor, in ipsa Cardani figura prædictus angulus $f g d$, quod

erat ostendendum. Nullam equidem excusationem habere poterit, nisi dixerit non prius Solem matutinum Crepusculum inchoare, quàm radius centri in sphæram uaporum incidens, reflexionem efficiat, quasi uerò alij radij aërem illuminare non possent, cuius cōtrarium Vitellio concludit libro 2. propositione 17. ex umbrarum ratione, atq; idem Cardanus in eodem 4. libro ostendit, ex toto Sole undequaque radios prodire, argumento sumpto ex deliquijs: pars enim (inquit) quæ centro Solis opposita est, occupatur à Luna, & tum aër & parietes illuminantur. Præterea si radius centri est qui reflexionem efficere potest, non alius: uesper igitur centro Solis in horizonte constituto, initium erit Crepusculi uespertini, at non erit nisi cum primum Solare corpus sub horizonte conditum fuerit, antea enim primario lumine id est radijs directis nos illustrabat, & propterea in initio crepusculi matutini cum illucescit, alij radij sunt, qui luminis reflexionem efficiunt, non centrales.

Putat præterea Cardanus (quantum ex ijs quæ scribit intelligere possum) arcum occultationis Solis sub horizonte in circulo altitudinis, æqualem esse arcui distantia ipsius à puncto exortiuo: quando Sol sub æquinoctiali decurrit. Solem enim Crepusculū inchoare (ait) partibus 19. ante ortum, hora fermè & quarta ante Solis ipsius ascensum, & si ad summum (inquit) deducatur Crepusculum, ut per duas horas ante diem fi-


at, erit angulus occultationis Solis partium 60. in circumferentia. Quare si in circumferentia partes habet 60. in centro igitur 30. & proinde arcus occultationis in circulo altitudinis æqualis erit arcui longitudinis Crepusculi in æquinoctiali. Quod quidem his duntaxat accidere ostendemus, qui sub æquinoctiali degunt, eisdemque ipsa tantum æquinoctiali die, utpote quibus circulus æquinoctialis eadem die altitudinis circulus fiat. Esto enim in mundo circulus abc horizon, bed meridianus, æquinoctialis acf punctum e , sit verticale eorum qui extra æquinoctialem positi sunt, constituatur Sol in f puncto æquinoctialis sub horizonte, in initio crepusculi matutini, circulus verticalis esto egf cuius quidem eg quadrans, sed gf arcus occultationis Solis. Dico quod maior est cf quam



gf . Angulus enim cgf trianguli cfg rectus est, & angulus gcf complementi altitudinis poli acutus: igitur maior est arcus cf ipso gf . Sed esto circulus acf non æquinoctialis, sed ei æquidistans. Dico rursus quod minor est arcus gf quam arcus æquinoctialis proportionalis ipsi fc cum eodem ascendens. Scribatur enim per duo puncta c et f maximus circulus, cuius segmentum inter ipsa c & f puncta


sit chf , & quoniam arcus fg minor est quadrante, gradus enim continet 19. occultationis Solis sub horizonte in initio crepusculi matutini, angulus igitur ei oppositus quem $cgad$ punctum c , efficit cum arcu chf acutus est, & propterea in triangulo rectangulo cfg , ex segmentis maximorum circulorum constituto, latus fg minus erit ipso chf . At maior est eodem chf æquinoctialis arcus, qui cum arcu cf æquidistantis circuli simul ascendit, ei proportionalis existens. Igitur minor est arcus fg , occultationis Solis in circulo altitudinis, quam arcus æquinoctialis qui ab initio crepusculi matutini usque ad ortum Solis ascendit. Idem etiam accidere demonstrare poteris eademque arte, his qui sub æquinoctiali degunt, cum Sol extra ipsum æquinoctialem fuerit constitutus.

Duo autem quæ sumpsimus statim demonstrabimus, primum, quod arcus cf æquidistantis circuli cum arcu æquinoctialis sibi proportionali qui ad horizontis sectionem terminatur, simul ascendat. Esto enim æquinoctialis circuli kil , arcus im proportionalis ipsi cf , & ueniant per c & f meridiani, quorum segmenta inter ipsa cf puncta & æquinoctialem, sint cn & fl : proportionalis igitur erit arcus nl ipsi cf , per 14. propositionem secundi libri Theodosii. At proportionalis est etiam arcus im , eisdem cf per hypothesim, æquales igitur erunt inter se duo arcus im & nl , & quia



l, & quia motus æquinoctialis omni tempore equalis est, mota igitur sphaera, cum l fuerit ubi n, erit m ubi i: at cum l fuerit ubi n meridianus fl, positionem habuit cn, & erit f ubi c: igitur cum m, fuerit ubi i erit f ubi c, et proinde æquinoctialis arcus terminum habens ad i, horizontis sectionem, ipsi cf proportionalis, cum eo simul ascendit, quod erat ostendendum.

Aliud præterea quod sumpsimus demonstrabimus, arcum videlicet æquinoctialis ipsi cf proportionalem arcu chf maiorem esse. In plano enim circuli acf, cuius centrum sit o circulus maximus scribatur per c & f, cuius arcus inter eadem puncta c & f, dicatur (ut antea) chf: æquales sunt enim quanquam in diuersis planis existant, propterea quod eandem rectam lineam subtensam habent, & productis oc & of, rectis lineis ad mensuram semidiametri maximi circuli, quæ quidem sit op uel oq, ipso intervallo op aut oq, super o centro circulus maximus describatur pqr. Quapropter descriptus circulus uicem geret æquinoctialis, cuius quidem arcus pq, similis erit proportionalis uel ipsi arcui cf minoris circuli, per ultimam definitionem libri 3. Euclidis. Connectantur autem cf & pq rectæ lineæ, & erit idcirco pq maior ipsa cf, in similibus triangulis rectilineis opq & ofc, arcus igitur pq maior erit arcu chf, quod erat ostendendum.



De Distantia polaris stellæ à polo mundi arctico, & de eius uero loco. Modus etiam examinatur, quo nauæ utuntur ad inueniendum altitudinem poli supra horizontem per stellam minoris ursæ. Cap. 7.

EAm stellam quæ in extremitate caudæ minoris ursæ posita est, idcirco polarem esse dicunt, quia est nostro tempore arctico polo uicinissima: tribus enim tantum gradibus cum m. 30. ab eodem polo distare nostræ ætatis nauæ affirmant. Sed si uerus est stellarum fixarum motus Ioannis Vernerii calculo repertus per tabulas Alphonsi quatuor gradus continet ea distantia cum min. ferè 9. nostro tempore id est anno 1500. At si sententiam Albategnij recipiamus, aliquanto minorem præ-


L 3 dictam

dictam distantiam pones, quam si sequaris Alphonsum, futurum tamen aliquando, ut dimidia circiter parte unius gradus recedat eadem stella ab ipso mundi polo, quando uidelicet Geminorum signum in quo modo est absoluerit. Est enim eius latitudo graduum 66. minima uidelicet reliquarum omnium eiusdem imaginis, distantia igitur à polo zodiaci Boreali graduum 24. maxima. Quapropter non immerito Marinus ex Hipparcho (Ptolemæo id referente cap. 7. primi libri Geographiæ) ipsam stellam ultimam caudæ Australissimam esse dixit, cum præsertim ea ætate distantissima etiam esset à mundi polo, gradibus nempe distabat duodecim cum duabus quintis, quamuis modò sit propinquissima. Quod non aduertentes quidam Ptolemæi interpretes Borealissimam uerterunt, Græco etiam codice reclamante. In Veneri tamen translatione, & Bilibaldi priore editione Australissimam reperies. Est præterea in eodem loco aliud insigne erratum omnium interpretum, quòd pro quingentis stadijs, quinque millia & quingenta posuerunt. Hoc autem ut facilius intelligas, sensum authoris explicabo. Sub æquinoctiali (inquit) circulo habitantibus, omnia sidera oriuntur, & occidunt, inde uerò procedentibus uersus polum mundi arcticum, quædam sidera minoris urse sine occasu relinquuntur supra horizontem, sed non tota imago, donec peruentum fuerit ad loca Ocele Borealia, quingentis stadijs. In eis enim iam tota minor urse, eaque sola, primum supra horizontem apparebit sine ortu atque occasu, ultima uerò caudæ horizontem tangere uidebitur. Quoniam enim in Ocele polus Boræus eleuatur supra horizontem gradibus undecim cum duabus quintis, quingentis igitur stadijs id est gradu uno ultra Ocele, eleuabitur idem polus gradibus duodecim cum duabus quintis. Et quia tantam inuenit Hipp. distantiam extremæ caudæ urse minoris ab ipso polo: circulum igitur integrum conficiet ipsa ultima caudæ supra horizontem, quem tamen in uno puncto contingere necesse est. Erat autem eadem stella tempore Hipp. omnium aliarum eiusdem imaginis ab ipso mundi polo distantissima: tota igitur imago primum supra horizontem sine occasu relinquebatur in ipsis locis Ocele Borealioribus stadijs quingentis. Reliquis uerò imaginibus illud nondum accidere poterat, quia distantiores sunt à polo ipsa minore urse. Ex his igitur palàm est quinque millia stadia superaddita esse ab interpretibus Ptolemæi, neque plura quam quingenta in Græco codice reperiuntur.

Aduertendum est tamen, quòd posita latitudine ipsius stellæ quæ ultima est, cauda minoris urse Gr. 66. quantam Hipparchus & Ptolemæus inuenerunt, posita præterea distantia eiusdem ab initio Cancris Gr. 32. min. 30. Hipparchi tempore, tantam enim reperies si à decimo minuto primi gradus Geminorum in quo eadem stella erat tempore Ptolemæi

Gr. 2.

Gr. 2. m. 40. retrò numeraueris, quibus fixa sidera progressa fuerant ab Hipparcho ad Ptolemæum, impossibile est his positis ipsius stellæ distantiam à polo mundi Hipparchi, tēpore fuisse graduum duodecim cum duabus quintis, idēq; etiam si aliam putes fuisse maximam Solis declinationem, quàm ipsi posuerunt.



In triangulo enim sphærico abc, ex segmentis maximorum circulorum constituto, sit a polus zodiaci Boreus, b uerò ea stella quæ in extremo caudæ est, arcus a b Gr. 24. angulus a, Gr. 32. m. 30. arcus autem b c, rectus sit ad a c Colurum solstitionum: erit igitur idem arcus b c, breuissima distantia stellæ b ab ipso Coluro, graduumq; inuentus erit duodecim cum minu-

tis triginta septem. Quapropter ab alio quouis puncto eiusdem Coluri, uel supra e uel infra idē e, maiori adhuc arcu distabit eadem stella, quàm Gr. 12. m. 37. Iam uerò si in triangulo def, sit d zodiaci polus, f uerò polus mundi, arcus d f polorum distantia Gr. 23. min. 51. quantam inuenit



Hipparchus, quod testatur Ptolemæus seruato angulo d, graduum 32. m. 30. si sit d e, arcus maximi circuli uenientis per polum zodiaci & stellam: arcus autem e f ad rectos angulos incidat super d e, erit arcus e f breuissima distantia poli mundi à circulo d e, graduumq; inuentus erit 12. m. 33. Et propterea si ipsam stellam posueris aut supra e, aut infra e maiori adhuc distantia recedet à polo mundi Bo-

reali, quàm Gr. 12. m. 33. In priori autem habitudine si ponas punctum e polum mundi Borealem, multo minor relinquetur polorum distantia gradibus 23. m. 51. In posteriori uerò si ipsam stellam posueris in e, multo minorem reperies arcum d e, gradibus uiginti quatuor. Quod si uelis utramq; distantiam uariare, maximam uidelicet Solis declinationem, & complementum latitudinis stellæ, ut arcus e f aut b c graduum 12. m. 24. relinquatur, multo minorem oportebit ponere maximam Solis declinationem, & complementum latitudinis eiusdem stellæ etiam minus erit quàm posuerint Hipparchus & Ptolemæus. Et propterea nisi distantia ipsius stellæ ab initio Cancris corripatur, id est nisi minorem ponas angulum d, quàm graduum 32. m. 30. illa omnia simul stare non poterunt. Ponemus igitur distantiam stellæ à polo æquinoctialis graduum duodecim cum duabus quintis, maximam uerò Solis declinationem Gr. 23. m. 51. complementum latitudinis stellæ graduum 24. nam tria hæc ita posita sunt ab Hipp. & per sextam propositionē nostri libri Crepusculorum reperietur angulus d, distantia extremæ caudæ ursæ minoris à princi-

pio

pio Cancrigradium 30. m. 53. Erat igitur Hipparchi tempore eadem stellæ in Gr. 29. m. 7. signi Tauri. Additis autem Gr. 2. m. 40. quibus stellæ fixæ progressæ fuerunt in annis 265. usq; ad tempus Ptolemæi, locus igitur ipsius stellæ fuit tempore Ptolemæi, gradus unus min. 47. Geminarum. In septimo tamen libro magnæ compositionis astrorum posita est eadem stella in decimo minuto primi gradus eiusdem signi: differentia igitur gradus unus cum minutis triginta septem. Quare si res ita se habeat, memorata stella ulterius progressa est quàm Astronomorum calculus ostendat ipsa differentia unius gradus m. 37. omnium enim superputatio numeros Ptolemæi supponit, & proinde polo arctico propinquior est nostra çtate, quàm ipsi putant. Posset autem huiusmodi ambiguitas statim dissolui, si obseruaretur eadem stella quando maximam habet altitudinem, & quando minimam, aut si uel sola maxima, uel sola minima capiatur, eleuatione tamen poli supra horizontem præcognita, ex obseruationibus Solis meridiano tempore. Quanquam uerò exiguus error in declinatione partium eclipticæ circa puncta tropica, magnam efficiat in longitudine uarietatem, id tamen locum habere non potest in stellis magnam habentibus latitudinem. Si enim prædictæ stellæ distantiam à principio Cancrigradium posueris 32. min. 30. Hipparchi tempore, quòd necessario facies si calculo Ptolemæi usus fueris, haud minorem tamen reperiens eius distantiam à polo mundi Boreali gradibus tredecim cum duobus insuper minutis. Differentia igitur à gradibus 12. m. 24. minutorum relinquitur triginta & octo, quæ uni gradui cum minutis 37. differentie longitudinis inter Gr. 30. m. 53. & Gr. 32. m. 30. respondent. Ita denique declinationis differentia longitudinis differentie duas quintas ferè partes comprehendit, & ab Hipparchi temporibus ad nostram usq; ætatem eandem quoque ferè seruat proportionem declinationis differentia ad longitudinis differentiam, & in posterum perpetuo seruabit, donec attingat punctum polo uicinissimum. Aliud tamen putat Augustinus Ricius, qui aduersus Ptolemæum contendit, ex declinationibus stellarum ab æquinoctiali certas longitudes deprehendi non posse: quia minima (inquit) declinationis particula magnam, notatuq; dignam in longitudine uarietatem efficit, quod non est omnino uerum. Minus autem probabile errasse Ptolemæum gradu uno minutis sex, in locis Solis, & Lunæ, & stellarum fixarum, quod conatus est ostendere idem Augustinus leui admodum atq; fallaci argumento, cuius summa hæc est Ptolemæus (inquit) motum Solis tardiolem esse credidit, quàm ipsa postea experientia patefecit. Annienim quantitatem posuit 365. dies & quartam, minus 300. parte diei. Posteriores uerò sicut Alphonsus, & alij, certius, eundem dierum numerum cum quarta minus 136. parte diei.

Differens

Differentia igitur motum inter calculum Ptolemæi & Alphonsi (si rectè numeraueris) erit in annis 265. gradus unus, minuta sex. Quoniam uerò nullus modus certior esse potest, quo stellarum fixarum motus cognoscantur, quàm ex coniunctione Lunæ cum aliqua stellarum fixarum, uel ex distantia inter Lunam & stellam instrumentis comprehensa, nam ex loco Lunæ locus stelle innotescet, ea enim arte Ptolemæus, deprehendit locum stelle cordis Leonis in medio tertij gradus Leonis, ubi igitur erratum fuerit in loco Lunæ, illuc etiam errabitur in loco obseruatæ stellæ. Quantus autem fuerit lapsus in loco Solis, tantus erit in loco Lunæ, eius enim locus non nisi ex distantia ipsius à Sole deprehendi potuit. Ptolemæus igitur quoniam in 265. annis quibus ipse Hipparchus fuit posterior in loco Solis Gr. 1. min. 6. errauit, in motu stellarum fixarum tantundem erroris commisit. At huius argumentationis solutio est, quòd Ptolemæus diligentissime obseruauit ingressus Solis in æquinoctialia puncta, cuius obseruationes & radices motuum nisi ueras supponeret recentiores, certam anni quantitatem statuere non possent. Instrumentorum igitur adminiculo exquisitissimè inuenit tempus quo Sol occupabat principium Libræ. Et quoniam eisdem fermè temporibus stellarum fixarum cõsiderationes ab eo factæ fuerunt, quamuis igitur motum Solis paulò tardiolem crediderit, quàm iuniores posuerunt, non potuit idcirco in paucis illis annis & à radice parum distantibus, motum Solis supputando, errore sensibili labi. Hæc autem ut lucidius constent obseruationem factam à Ptolemæo circa stellam cordis Leonis referemus, quod & ipse Augustinus facit. Anno secundo Antonini die nono mensis Pharmoti Ægyptiorum in Alexandria Sole occidente, horis quinque m. 30. post meridiem, considerauit Solem et Lunam per instrumentum, & distantia Lunæ à Sole uisa fuit Gr. 92. m. 7. se. 30. Post mediam uerò horam cum iam occubisset, stellam quæ in corde Leonis est distare à Luna perspexit Gr. 57. m. 10. ad successionem signorum, in circulo per medium ligniferi ducto. Erat autem Sol in Gr. 3. m. 3. ferè signi Piscium. Quapropter uidebatur Luna in Gr. 5. m. 10. ferè Geminorum. Additis igitur 15. m. propter eius motum in dimidio horæ, & detractis quinque propter aspectus diuersitatem, relinquitur tandem ipsius Lunæ locus in Gr. 5. m. 20. Geminorum, quando Sol iam erat sub horizonte. Stella igitur cordis Leonis quia tunc distabat à Luna, Gr. 57. m. 10. ad successionem signorum, gradus duos m. 30. Leonis obtinebat. At Augustinus contendit Solem tunc fuisse in Gr. 4. m. 36. Piscium, Lunam uero iuxta prædictam à Sole distantiam in Gr. 6. min. 26. Geminorum, & cor Leonis in Gr. 3. m. 36. Leonis, uno enim gradu & sex minutis affirmat Solem eo tempore ulterius fuisse progressum. Ceterum nos apertissimè os-


stendemus locum Solis repertum à Ptolemæo, istius obseruationis tem-
 pore, uerè deprehensum esse, quod ex alijs & diligentissimis ab eo factis
 obseruationibus ita constabit. Inter alias æquinoctiorum obseruationes
 exquisitissimam fecisse (ait) in Autumno anno 17. Adriani, 7. die mensis
 Athir, secundum Ægyptios, post meridiem duabus proximè horis æ-
 qualibus. Colligit autem à prima die primi anni regni Nabonasaris usque
 ad expositum Autumnale æquinoctium annos Ægyptios 879. & dies
 66. & æquales horas 2. Et quoniam secundo Antonini anno fluxerant
 anni Ægyptij 885. post initiū regni Nabonasaris, quod in quinto libro
 ait: fuerunt igitur à regno Nabonasaris, usque ad supradictum tempus
 considerationis stellæ cordis Leonis anni Ægyptij 885. dies 218. horæ
 5. cum semisse. A quibus si detraxeris annos 879. dies 66. horas 2. relin-
 quentur anni 6. dies 152. horæ 3. cum semisse quibus posterior fuit obser-
 uatio stellæ cordis Leonis obseruatione æquinoctij. Si igitur ad id tem-
 poris spatium, medium motum Solis supputaueris per tabulas Ptole-
 mæi, reperies ultra integras reuolutiones Solem perambulasse Gr. 148.
 m. 30. & quoniam tempore æquinoctij illius Autumnalis distabat Sol
 ab auge secundum medium motum Gr. 116. m. 40. erat enim aux in Gr.
 5. m. 30. Geminorum, & differentia ueri motus & mediæ Gr. 2. m. 10. igitur
 secundo Antonini anno quando stella cordis Leonis obseruabatur,
 distabat Sol ab auge secundum medium motum Gr. 265. m. 10. quibus
 addendi sunt Gr. 2. m. 23. æquationis, siue differentiæ, & conflabitur ar-
 cus graduum 267. m. 33. ueri motus initium sumens ab auge. Erat igitur
 Sol in Gr. 3. m. 3. signi Piscium, in quo etiam loco inuentus fuit à Ptole-
 mæo ipso tempore obseruationis. Sed si per tabulas Alphonsi medium
 motum Solis supputaueris ad annos sex & dies 152. & horas 3. cum se-
 misse, qui intercesserunt inter illas duas obseruationes, reperies Gr. 148.
 min. 31. se. 40. antea uerò per tabulas Ptolemæi, reperti fuerunt Gr. 148.
 min. 30. differentia igitur min. 1. se. 40. Et idcirco Sol secundum calcu-
 lum Alphonsi, reperiri debuit in Gr. 3. min. 4. se. 40. Piscium, Luna simi-
 liter & stella cordis Leonis ulterius progressæ erant 1. min. 40. se. non
 gradu uno min. sex, ut Augustinus Ricius. Idem rursus alio modo osten-
 di potest. Secundus annus Antonini fuit 462. à morte Alexandri, quod
 ex capite secundo liquet 3. libri magnæ compositionis Ptolemæi: quan-
 do igitur stellam cordis Leonis obseruabat, erant à morte Alexandri an-
 ni Ægyptij 461. dies 218. horæ 5. cum semisse: fuit autem obseruatio illa
 quam commemorauimus Autumnalis æquinoctij, post annos à morte
 Alexandri 455. dies 66. & horas 2. quemadmodum colligitur ex 8. cap.
 ipsius 3. libri. Idcirco si minor numerus à maiore subducatur, adhuc re-
 linquentur anni sex, dies 152. & horæ 3. cum semisse, & propterea idem
 habebis

habebitur locus Solis, sicut in priori exemplo. Hæc autem congruere reperies cum exactissima alia obseruatione, quam Ptolemæus fecit æquinoctij Autumnalis, nona die mensis Athir, post unum proximè horam à Solis ortu, 3. Antonini anno 463. à morte Alexandri. Erant enim elapsi anni 462. dies 67. horæ 19. Differentia igitur inter supradictum tempus obseruationis factæ circa stellam cordis Leonis, & istud Autumnale æquinoctium, dies 214. & horæ 13. cum semisse, medius motus Solis in eo tempore per tabulas Ptolemæi Gr. 211. m. 29. quibus addemus Gr. 148. m. 30. medium nempe motum inter primam obseruationem Autumnalis æquinoctij, & tempus quo stelle cordis Leonis considerationem fecit, & conflabuntur Gr. 359. m. 59. Ad completas igitur Solis reuolutiones inter duo prædicta æquinoctia tantum deest unum minutum. Et proinde quadrant examussim obseruationes Ptolemæi, cum loco Solis ab eo reperto. Sed si iam uelis per tabulas Ptolemæi, uerum locum Solis inuenire ad secundum annum Antonini, nonamq; diem mensis Phar, & horas 5. cum semisse post meridiem, supra radicem Nabonasaris, & ab initio annorum eius computando secundum signorum successionem, usque ad expositum tempus, in eundem prorsus locum incidēs, nempe Gr. 3. m. 3. signi Piscium. Nam tæetsi Ptolemæus, tardio rem posuerit Solis motum, quam repertus est à iunioribus, & ob id uera esse non possit radix illa, quam à 17. anno Adriani, Autumnaliquæ æquinoctio, per partes circuli signorum retrocedendo, in m. 45. primi gradus Piscium collocauit, ad initium regni Nabonasaris, sitq; insignis lapsus: certum est tamen, quod si eic' em radici æqualem motum adiunxeris, ipsi temporum differentia respondentem, in eundē rursus locum zodiaci incidēs, quem ab auge distare reperit Gr. 116. min. 40. Hinc uerò progrediendo, & per easdem tabulas æqualem motum computando ad secundum Antonini annū, & ad ipsam diem atq; horam obseruationis cordis Leonis, uerum locum iterum reperies Gr. 3. min. 3. signi Piscium. Sed quod totam controuersiam dirimit, Ptolemæus non numeratione, sed instrumento & obseruatione locum Solis inuenit ad id tempus, & idcirco ultra Gr. 3. adiecit min. 3. propter aspectus diuersitatem, quæ non erat negligenda apud horizontem. Potuit enim distantiam Solis à meridiano per gradus horizontis, ex umbra gnomonis deprehendere, simul & distantiam à uerticali puncto. Altitudinem uerò poli in Alexandria cognitam habebat, & idcirco in sphærico triangulo ex duabus lateribus, & angulo eisdē comprehenso cognitis, tertium latus & reliqui anguli innotescunt. Sic igitur distātia Solis à meridiano per gradus æquinoctialis, & declinatio ad idē tempus ignorari nō possunt. Ex declinatione uerò locū Solis inuenire facile erat: sed solo armillarū instrumēto omnia hæc cognoscere potu

it, absque numerorum ductionibus & diuisionibus. Quoniam uerò inter ipsas duas obseruationes Autumnalis æquinoctij (quemadmodum ex ijs quæ adduximus apertissimè liquet) intercesserunt anni septem Ægyptij, dies una, & horæ 17, ad quod quidem tempus si iterum atque iterum æqualem motum Solis per tabulas Ptolemæi supputaueris, unum tantum minutum ad exactas circulationes deesse reperiēs. Inconsiderate igitur Hieronymus Cardanus in libello de Temporum restitutione scripsit, octo præcisè solaribus annis non Ægyptijs, unam ab alia distare. Cum enim priorem obseruationem factam collegisset ex octauo cap. 3. libri annis Ægyptijs à morte Alexandri 455. diebus 66. & horis 2. idest septima die mensis Athir hora secunda, quoniam posterior fuit anno 463. à morte Alexandri nona die eiusdem mensis, minorem igitur numerum annorum subtraxit à maiori, & quoniam relinquuntur octo, putauit idcirco octo Ægyptios annos intercessisse, ex quibus una cum duobus diebus differentie inter septimam & nonam diem mensis Athir, octo anni solares siue Romani restituerentur. Non aduertit autem quòd quando prior obseruatio facta fuit, elapsi erant à morte Alexandri 455. & annus agebatur 456. sed quando posterior annus agebatur 493. & elapsi erant 462. sic igitur septem anni relinquuntur differentie. Sed neque si octo anni intercessissent, solares poterant esse, quia non posset fieri reditus in annis octo à secunda hora post meridiem, ad horam unam post ortum Solis. Quod cum ipse animaduerneret, supponamus (inquit) obseruationes illas quantum ad horas exactas non fuisse, non enim fieri potuit, ut intra spatium octo annorum, secunda obseruatio primam horis septem præcessisset. Sed mirum quòd Ptolemæus, utramque obseruationem exactissimam prædicet, tanto reperto lapsu in octo annis. Videat igitur Cardanus quo modo ea quæ infert concludi possint, & nos unde digressi sumus reuertamur.

Animaduertendum est igitur quòd quemadmodum ex cognita altitudine poli supra horizontem, cuiusuis stelle in meridiano existentis declinatio patefit, ita uicissim ex declinatione stelle altitudo poli innotescit. Ceterum nautæ quoniam paucas admodum stellas cognitatas habent, per eam tantum quæ est in extremitate caudæ minoris ursæ, & duas postremi lateris quadrilateri eiusdè imaginis, quæ in tota fermè plaga hac Boreali tota nocte conspicuæ sunt, altitudinè poli arctici inquirunt. Et quia non qualibet nocte eadem stellæ ad meridianum perueniunt, quosdam propterea canones habent, quos ab aliquo fortasse imperito Mathematico acceperunt, ex quibus eliciunt quantum polaris stelle altitudo, in quolibet ipsius situ, maior sit, aut minor poli Borealis eleuatione. Sic igitur quauis nocte, non semel tantum, sed sæpius, ex explorata polaris stelle altitudo

læ altitudine, & cognita distantia eiusdem à situ meridiani, poli elevationem manifestam fieri putant: falluntur tamen sæpissimè. Nam cum stella extra meridianum posita est, non una atq; eadem differentia in omni horizonte depressior est, aut elevatior. Esto enim meridiani segmentum $d g$ quadrāte minus, in quo d polus mundi arcticus, g uerò uerticale punctum unius loci: ducatur autem à puncto d arcus circuli maximi $d b$, ad rectos angulos in ipsum $d g$, & ponatur polaris stella in situ a inter d & b



præterea maximo circulo scripto per a & g , super horizontis polo g interuallo uerò $a g$, circulus describatur in sphaeræ superficie meridianum secans in c erit igitur $d g$, complementū altitudinis poli, $a g$ uerò complementum altitudinis stellæ a quare $d c$, differentia erit altitudinis poli d , & altitudinis ipsius stellæ polaris a : quam quidem differentiam ostendemus in omni horizonte necessariò uariari.

Esto enim f uerticale punctum alterius loci inter g , & eundem polum, & scripto maximo circulo per a & f super f polo horizontis, in interuallo $a f$ circulus scribatur $a e$. Erit igitur arcus $d e$, differentia altitudinis poli & altitudinis stellæ polaris a . Maior est autem $d e$ ipsa $d c$, quamuis igitur idem sit stellarum situs, eademq; seruetur habitudo ad situm meridiani, non seruabitur tamen eadem differentia altitudinis poli & stellæ polaris in omni climate, quod ostendere uoluimus. Quòd autem punctum e longius distet à polo d quàm c , ex eo liquet, quòd duo arcus $a f$ & $f g$, simul accepti maiores sunt ipso $a g$, & propterea $e f$ & $f g$, maiores erūt quàm $c g$. Detracto igitur communif g , maior relinquetur $e f$ quàm $c f$, & idcirco punctum e longius distabit à polo d quàm c , quod erat in demonstratione assumptum. Certiorem igitur modum inferius trademus, quo possimus, quo libuerit tempore altitudinem poli inuenire.

De Inuenienda altitudine poli per meridianas altitudines Solis & stellarum fixarum. Cap. 8.

CAnones quibus nauæ uti solent ad inueniendum meridiano tempore poli altitudinem supra horizontem, clarius & certius in hunc modum perstrinximus. Declinatio quam Sol habet ipsa considerationis die, auferatur ex quadrante, si Borealis reperta fuerit, eidem uerò adiungatur si Australis, numerus enim qui uel detractio relictus fue-

rit, uel additione cōflatus, distantia erit Solis à polo mundi arctico. Tum uerò eadem obseruationis die uel per Astrolabium, uel quoduis aliud instrumentum ad id aptum minimam distantiam Solis à uerticali puncto explorabis, quam ex inuenta Solis distantia à polo arctico auferes, si uerticale punctum inter Solem & ipsum arcticum polum positum fuerit: addes autem, si Sol inter eundem polum & uerticale punctum constitutus reperiatur: nam numerus graduum & minutorum qui huiusmodi detractio, aut additione prodierit, distantia erit uerticis puncti à polo mundi arctico, ex qua statim innotescet loci latitudo, cui æqualis est altitudo manifesti poli supra horizontem. Etenim si eiusmodi distantia quadranti æqualis reperta fuerit, erit uerticale punctum in æquinoctiali circulo. Si inæqualis, differentia eius à quadrante erit loci altitudo, Borealis quidem, si inuenta distantia minor fuerit quadrante, Australis uerò si maior. Quo'nam autem modo cognoscere possis, sit né Sol inter polum mundi arcticum & uerticale punctum, an è contrario uerticale punctum inter Solem & eundem polum, difficile tibi non erit. Nam si conuersa facie ad Solem ipso obseruationis tempore, quando uicinissimus est uerticali puncto, uideris eum cum mundo circumuolui à sinistra in dextram, certum habebis uerticale punctum positum esse inter ipsum Solem & arcticum polum. Sed si à dextra in sinistram, Solem igitur inter uerticale punctum & eundem polum arcticum constitutum esse non dubitabis. Nautæ uerò idem cognoscunt ex umbris, & nautico instrumento. Sed modus noster simplicior est, & facilior, ac nullius instrumenti egens. Id porrò relinquebatur dicendum, si Sol supra uerticem repertus fuerit, qualis quantaq; fuerit ipsius Solis declinatio, talis atq; tanta erit loci latitudo. Aduertendum est præterea quòd in locis Borealissimis, que inter polum mundi arcticum & circulum à zodiaci polo motu diurno descriptum, posita sunt, cum Sol est in signis Borealibus, dies aliquot neque oritur, neque occidit, sed intra quatuor & uiginti horas duas altitudines meridianas habet, alteram maximam, alteram minimam: poteris igitur non solum per maximam, quemadmodum dictum est, loci latitudinem inuenire, sed etiam per minimam, alio tamen modo. Distantiam enim Solis à polo auferes à maxima distantia inter punctum uerticale & Solem, id est à complemento minimæ altitudinis, & relinquetur arcus distantia inter ipsum uerticale punctum & eundem mundi polum, & propterea loci latitudo ignorari non poterit. Similiter operandum est in locis Australissimis inter circulum alium à zodiaci polo descriptum & Australem polum positis. Distantiam namque Solis ab ipso Australi mundi polo auferes à complemento minimæ altitudinis, & relinquetur distantia inter uerticale punctum & eundem Australem polum. Vbicunq; autem acci-

tem acciderit, per aliquod temporis spatium altitudinem Solis supra horizontem nec augeri, neque minui: scito polum mundi supra uerticem esse. Horum demonstrationes facillimæ sunt: ex communibus enim sententijs quæcunq; hoc in loco tradidimus, statim concludi poterunt. Diuersitatem aspectus Solis in circulo altitudinis in huiusmodi observationibus negligendam censemus. Et eadem prorsus arte, qua per altitudines Solis meridianas siue maximas, siue minimas, altitudo poli supra horizontem (quemadmodum docuimus) inuenitur, poteris etiam nocturno tempore, per altitudines stellarum meridianas ipsam poli elevationem deprehendere. Nam idem est omnino modus, & eadem operandi ratio.

De Inuenienda loci latitudine per radium meridianum
antiquus canon noster. Cap. 9.

Obseruabimus Solem quando maximam altitudinem supra horizontem habuerit, quod quidem faciemus meridiano tempore. Tum uerò si umbræ corporum rectorum supra planum horizontis, ad eandem partem proiectæ fuerint, ad quam Sol declinauerit ipsa considerationis die: complementum igitur maximæ altitudinis declinationi adiungemus, & conflabitur numerus graduum & minutorum latitudinis loci, eiusdem nominis aut Borealis, aut Australis, cum declinatione Solis.

Sed si umbræ ad oppositam partem projiciantur, tunc conferenda erit declinatio Solis cum cõplemento maximæ altitudinis ipsius. Quod si æqualia inuenta fuerint, uertex loci sub æquinoctiali circulo erit. At si inæqualia, minus à maiori auferatur, & relinquetur loci latitudo, eiusdem nominis cum declinatione, si ipsa declinatio maior reperta fuerit, oppositæ tamen denominationis, si minor.


Quando Sol declinatione caret, complementum maximæ altitudinis est ipsa loci latitudo, siue distantia uerticis ab æquinoctiali circulo, et ad eam partem, ad quam projiciuntur umbræ. Vtrum uerò umbræ ad Septentriones projiciant, an potius ad Austrum, ex acu nautica cognosces. Et quãdo deniq; Sol supra uerticem fuerit, ipsa Solis declinatio, si quam tunc habuerit, erit loci latitudo.

Examinatur modus Petri Appiani, quo in Cosmographia usus est,
ad inueniendum altitudinem poli omni die, per horam
cognitam. Cap. 10.

Doctrina illa Petri Appiani ad inueniendum altitudinem poli per horæ cognitionem, nullum usum habere potest. Quicunq; enim altitudinem poli ignorauerit, horam quoq; necessaria

rio igno

rio ignorabit. Patet hoc intelligenti fabricas solarium horologiorum, & Astrolabij usum. Sed si iam per alia horologia aut mobilium rotarum, aut fluentis arenæ, aut aquæ, tempus à meridie fluxum cognitum fuerit, consequens est instans meridiei ex radio Solis exactè cognitum fuisse, & proinde latitudinem loci quæ quidem altitudini poli æqualis est, multo exactius per radium Solis meridianum cognosci potuisse, quemadmodum in capite præcedenti docuimus. Quin tamen si hora exactè cognita fuerit, gradus etiam Solis cognitus, & altitudo eius supra horizontem deprehensa, certissima tamē nos demonstratione ostendemus, nondum per tria hæc altitudinem poli in uniuersum cognosci posse. Esto enim in mundo polus Boreus *a*, quadrans meridiani *ab*, quadrans circuli declinationis Solis *ac*, declinatio Solis arcus *dc*, Sol ipse *d* arcus *bc*, æquinoctialis circuli horas ante meridiem aut post meridiem ostendat, ponatur quæ is quadrante minor, ut angulus *a* sit acutus. Ducatur autem à puncto *d* maximi circuli arcus *df*, ad rectos angulos in meridianum *ab*. Erit igitur arcus *ad* maior arcu *af*, esto autem *de* segmentum paralleli diurni inter meridiem & Solem, & sumatur inter *e* & *f*, punctum quoduis *k* & supra *f*, sit punctum *g* æquali distans intervallo à perpendiculari *df*, ut



sit arcus *fg* æqualis arcui *kf*, & scribatur per *d* & *k*, item per *d* & *g* maximi circuli. Manifestum itaq; est per similem propositionem 4. primi Ele. Euclidis arcus *dk* & *dg*, inter se æquales esse. Quapropter si Sole ita constituto, uerticale punctum unius loci ponamus *k*, alterius uerò loci nempe Borealis ponamus *g*: æquales erunt Solis altitudines supra horizontem in utroq; loco, & eadem erit hora, siue distantia à meridie, quæ uidelicet ostendit

arcus *bc*, distantie Solis à meridiano per æquinoctialem: maior tamen erit latitudo *bg* latitudine *bk*, & idcirco poli altitudines inæquales. Et proinde incertum erit ubi nam sit uerticale punctum illius loci in quo facta fuerit huiusmodi obseruatio, sitne in *k* utrum in *g*. Quoniam uerò interiores anguli ad *g*, & ad *k* æquales sunt ad inuicem, & uterque acutus: tendit idcirco altitudinis circulus *gd*, in quadrante horizontis Australis, sed *kd* in Borealem, æquali tamen recessu à sectione duorum horizontum & æquinoctialis, in diuersas partes. Quare si positio lineæ ortus & occasus æquinoctialis, in horizontis plano examussum cognita fuerit, poteris ex umbra Solis ipso obseruationis tempore distantiam ipsius horizontalem cognoscere, & idcirco ubi nam sis patefiet. Cæterum hoc

expo


expositis non constat. Ioannes de Monteregio Proble. 19. tabula primi mobilis illa tria tantum sumit ad inueniendum distantiam Solis horizontali à circulo uerticali, & uno quidem syllogismo arcum patefacit df , alio uerò angulum fgd aut $fk d$, quem detrahit à Gr. 90. ut relinquatur distantia Solis horizontalis à uerticali circulo, qui per Oriens & Occidens æquinoctiale incedit. Cæterum quoniam expositis constare non potest, sit ne inuenta distantia Borealis, an Australis, uertice enim existente in k Borealis est, at in g Australis: iubet igitur ut per præcedens Proble. eiusdem tabule primi mobilis, altitudo Solis in circulo uerticali red datur nota. Nam si ea maior reperta fuerit proposita Solis altitudine, quam scilicet habet in d , memorata distantia Borealis erit, sed si minor, Australis. Veniant enim per g & k uerticales gl & kl , secetq; uerticalem kl parallelum à Sole descriptum in m : uerticalem uerò gl , eundem secet in n . Manifestum igitur est quod si Sol constituatur in d ante meridiem, & referatur ad uerticale punctum g , maiorem altitudinem habebit supra eius horizontem, quam quando erat in n puncto uerticalem circuli gl , & idcirco horizontalis distantia Australis reperietur. Sed si referatur ad k minorem altitudinem habebit supra horizontem, quam cum peruenerit ad punctum m uerticalem circuli kl , & distantia horizontalis Borealis erit. Et propterea si altitudo quam Sol habet in uerticali circulo cognita fuerit, utrum inuenta ipsius Solis distantia Borealis sit, an Australis, ignorari non poterit. Cæterum quoniam ad cognoscendum quanta sit Solis altitudo in circulo uerticali, altitudinem poli supra horizontem cognitam sibi sumit. Quatuor igitur supponit cognita, ut prædictam distantiam inueniat, altitudinem poli, Solis declinationem, & altitudinem ipsius supra horizontem, atq; horam. Sat tamen si uerit tria tantum cognouisse, altitudinem uidelicet poli, Solis declinationem, & aut horam, aut altitudinem Solis supra horizontem. Itaque concludimus neq; per illud instrumentum cuius usum tradit in Cosmographia Appianus, neq; per quoduis aliud, ex tribus illis quæ assumit, altitudinem poli supra horizontem in uniuersum inuenire posse.

Jacobi Ziegleri modus ad inueniendum altitudinem poli
per distantiam Solis horizontalem à meridiano
examinatur. Caput. II.

Iacobus Zieglerus in Commentario à se edito in secundum librum Naturalis historię Plinij, capite de Canonica operatione sphaera à Planetis per obseruationes de cœlo, docet canone primo situm meridiani inuenire, per altitudinem poli cognitam ex prolixitate diei, ab horologiorum indicatione. Deinde uerò sexto Canone ex situ meridiani

N cognit


cognito, per gradum Solis, & eius altitudinem supra horizontem, elevationem poli inquirat. Sed neque hic modus Ziegleri aliquem usum habere poterit. Nam si non alio modo situm meridiani inuenire docet, quam per elevationem poli cognitam ex magnitudine diei, quomodo igitur qui ipsam poli altitudinem ignorauerit, situm meridiani cognoscet? Quod autem docet septimo Canone, quam uidelicet arte situ meridiani atque poli altitudine ignoratis, possit utrumque inueniri, per altitudinem Solis duntaxat, & eius declinationem, magna est allucinatio. Nam in infinitis propemodum locis terræ in una eademque die, id est sub eadem gradu Solis declinatione, æquales habentur altitudines Solis supra ipsorum locorum horizontes, atque etiam in uno atque eodem temporis instanti, sed poli mundi altitudines aliæ, atque aliæ erunt, multoque inter se inæquales: distantia item Solis à meridianis eorundem locorum, tam quæ sumuntur in æquinoctiali, quam quæ in horizonte, aliæ atque aliæ. Quod Zieglerus non aduertens, totam (inquit) machinam conuertamus in pede, ad quandam similitudinem mediæ cœli, polum quoque mundi leuamus ex horizonte, & inter hoc agendum obuertamus itidem spheram inerraticam, motu in polis meridiani declinationum, contra Solem concepturi radios per meatus dioptræ, & hos motus tentemus, donec sit radius conceptus, ubi fuerit, eo meridianus stabit in situ meridiani cœlestis, & polus mundi in altitudine, qualem postulat locus in quo observatio fit. Sed fallitur insigniter, nam inuentis eo modo (ut putat) altitudine poli, & situ meridiani: cum igitur neque unam, neque alteram distantiam Solis à meridiano cognitã sibi sumat, licebit idcirco nobis super gradu Solis & ei opposito tanquam polis, spheram ipsam inerraticam obuertere, radij autem Solis ea facta motione nihil minus per meatus dioptræ concepta erunt, variabitur tamen prior situs meridiani, & prior altitudo poli. Sic igitur qualem situm, aut qualem altitudinem poli nobis eligamus, neuiquam constabit. Hoc autem in subiecto schemate facilius intelliges, in quo quidem circulus abc sit horizontis armilla, gradus Solis in ipso globo sit f , meridiani uerò situs ea Ziegleri arte inuentus sit afg , in quo uerticale punctum sit d , polus mundi Boreus a : arcus igitur ae poli altitudo, ef declinationis puncti f complementum, gradum enim Solis ponimus in semicirculo eclipticæ Boreali, & erit fg altitudo Solis, quam quidem meridianam esse consequens est. At spheram ipsam inerraticam obuertamus super f gradu Solis, & ei opposito, tanquam super polis. Omnia igitur puncta eiusdem spheræ præter f , & oppositum eclipticæ punctum, mutabuntur. Polus igitur Boreus e circulum describet bec , & quod uerticale erat circulum dhk , Solis tamen altitudo fg eadem erit, quæ antea: quia immota est horizontis armilla abc , & immotus quoque gra-




que gradus Solis f . Intelligamus igitur polum mundi e , huiusmodi motu peruenisse iam ad l : circulus itaque declinationis puncti f situm habebit $f l$. Ducto autem circulo maximo per d & l , qui horizontem secet in m & n , is erit situs meridiani, si recte operatur Zieglerus, arcus uero $l n$ erit altitudo poli Borei supra horizontem. Et quia maior est arcus $d l$ arcu $d e$, per 28. propositionem secundilibri Theodosij: minor igitur relinquetur $l n$ ipso $a e$,

per communem sententiam. Sic igitur non solum alium habebis meridiani situm, sed aliam poli eleuationem. Sed si deinde intellexeris eundem mundi polum arcticum peruenisse ad o , ducto maximo circulo per d & o , qui horizontem secet in p & r , simili argumento concludes, situm circuli declinationis gradus Solis, esse $f o$ altitudinem Solis atque declinationem nihil mutari, situm tamen meridiani esse $r d o p$, altitudinem poli mundi supra horizontem arcum $o p$, minorem quidem quam $l n$. Quare patet praedicta Ziegleri arte nihil certi inueniri posse. Et eodem prorsus modo ostendemus, quod quamuis situs meridiani cognitus detur, quemadmodum ipse sumit sexto canone, nondum tamen in uniuersum altitudo poli inueniri poterit. Leuetur inquit B polus ex S horizontis, donec decretus gradus Solis ueniat sub decretam sectionem altitudinis & uerticis. Et deprehensa est B , poli altitudo secundum arcum $B S$. Ceterum ostendemus nos decretam sectionem altitudinis & uerticis, inaequalibus poli eleuationibus communem esse. Esto enim horizontis aramilla circulus $A S C$, meridiani situs $S D G$, polus horizontis D uerticis quadrans per Solem uenientis ipso considerationis tempore sit $D E F$, esto autem punctum F , in quadrante horizontis Boreali. Arcus igitur $F S$, cognitus erit ex radio Solis. Ponatur altitudo Solis $E F$ minor declinatione, sed ipsius declinationis complementum maius ponatur arcu $E O$, qui in meridianum ad rectos angulos incidit super O puncto. Quibus quidem ita positus leuetur (uelut iubet Zieglerus) polus mundi arcticus ex S , horizontis & meridiani sectione, donec decretus gradus Solis ueniat sub E , sitque tunc polus mundi sub B : erit igitur arcus $B S$, poli Borei eleuatio supra horizontem. At quoniam minor posita est Solis al-

N a titudo




titudo declinatione: maius idcirco erit DE altitudinis complementum, BE declinationis complemento. Maior etiam positus est ipsa BE quam EO, & propterea si manente meridiano, manente etiam horizonte, & uerticali DEF, sphaera ipsa inerratica uertatur, motu facto super gradu Solis & ei opposito, tanquam super polis, polus B circulum describet, meridianum secantem inter O & D, secet igitur in K. Quapropter cum polus B, fuerit sub K, idem habebitur meridianus, idem uerticallis DEF, eadem Solis altitudo EF, & complementum declinationis KE idem etiam erit: nam B & K æquidistant interuallis ab ipso E. Cæterum altitudo poli erit KS priore maior, & distantia Solis à meridiē in æquinoctiali maior etiam erit. Duo enim anguli supra basim BK, Isoscelis trianguli BEK æquales sunt, atque acuti, angulus igitur DKE obtusus erit: quare duo anguli KBE & DKB, simul sumpti duobus rectis erunt æquales. Vt si exempli gratia angulus KBE, quæ fuerit horarum, erit angulus DKE horarum septē, & idcirco si ultra ea quæ posita sunt, spatium temporis ante meridiē, aut post meridiem minus sex horis esse cōstaret: certum igitur haberetur, altitudinem poli in eo loco in quo huiusmodi obseruatio fit, arcum esse BS: si uerò maius sex horis, arcum esse KS, sed ex assumptis neutrum horum liquere potest, & propterea ipsius poli eleuatio incognita relinquetur. Hoc adhuc manifestius intelliges in hunc modum. Sit in globo arcus cn meridiani segmentum, punctum c polus mundi Boreus, arcus cm, æqualis ponatur arcui KD superioris figure, & cn æqualis BD, & sit ad punctum c angulus mcp, quem maximus circulus cp, efficit cum cn, æqualis angulo DKE, & angulus ncq æqualis angulo DBE: arcus autem cp & cq æquales sint inter se, ipsique BE & KE æquales, & circuli maximi scripti intelligantur per m & p, & per n & q, quapropter uterque ipsorum arcuum mp & nq, æ-



qualis erit DE, & proinde æquales inuicem erunt iidem ipsi arcus mp & nq, anguli autem cmp & cnq, æquales inuicem erunt, ipsique angulo KDE æquales. Si itaque Solem posuerimus ad p, & uerticale punctum ad m, habebitur quidem Sol ipse in quadrante Boreali, sub complemento altitudinis mp, & complemento declinationis cp, &

cp, & à meridie distans tanto æquinoctialis arcu, quantus est angulus mcp. Cum autem motu primæ sphæræ peruenerit ad q, n̄s qui uerticale punctum habuerint ad n, sub eodem uerticali circulo, & eodem altitudinis complemento uidebitur, distantia uerò à meridie ea erit quã angulus ostendit n c q. Quod si ad polum c cum meridiano cz, angulum feceris z c q, æqualem angulo m c p, arcum q̄ c z æqualem posueris c m, & circulum maximum scripseris per z & q, Solem uerò intellexeris iam peruenerisse ad q: in ipso igitur instanti duobus locis terræ quæ sub z & n sunt, sub eodem uerticali circulo, & eadem altitudine uidebitur supra horizontem, quamuis ab ipsis meridianis inæqualiter distet per æquinoctialem. Petrus etiam Appianus pronuntiato 69. ex altitudine Solis & Azimuth, eleuationem poli inuenire conatur, per 39. & 40. & 41. sed est petitio principij. Nam in 39. & 40. horam postulat, & in 41. ipsam poli eleuationem.

Præterea annotatione dignum censemus, proprium esse omni loco posito inter æquinoctialem & circulum Cancræ, cum Sol uicinior fuerit polo mundi arctico, quàm uerticale punctum, ipsum Solem habere in uno atq̄ eodem circulo ex uerticalibus bis ante meridiem, & bis similiter post meridiem, ita ut ex quo horizontis loco cum exoritur, leuatur, ex eodem rursus ante meridiem radios mittat. Quapropter gnomonum umbras in ipsis locis necesse est retrocedere, citra miraculum. Esto enim in mundo circulus Cancræ, aut quiuis alius Solis parallelus Borealis a b c, & in eo segmentum a b, sit quadrante minus, & per a & b puncta, circulus maximus scribatur, cuius segmentum inter ipsa eadem puncta a & b



quadrante minus quoq̄ erit, hoc enim superius ostensum fuit, capite 6. de Instrumentis quibus astorum altitudines capiuntur, ad finem illius. Esto præterea circumferentia d a b e, eiusdem maximi descripti circuli quadrans, & sit f punctum polus mundi Boreus, & per d & f maximus scribatur circulus: circumferentia igitur d f, quadrante minor erit. Nam si circumferentia a b, diuisa intelligatur per medium in puncto g, & à polo f

maximorum circulorum segmenta ueniant ad a & b & g: anguli igitur

qui ad g recti erunt: est autem a f quadrante minus, & a g similiter quadrante minus: quare f g quadrante minus erit, & est d g quadrante minus, circumferentia igitur d f quadrante minor erit. Item quoniam f g quadrante minus est, angulus igitur f a g acutus erit, & idcirco angulus d a f obtusus. At angulus a d f acutus est, quia f g minus est quadrante: maior igitur est circumferentia d f quàm a f, & idcirco ipsa circumferentia d f parallelum secet a b c in puncto h, inter d & f. Sit autem d f k maximus circuli quadrans, & super d polo interuallo ipso d k, semicirculus scribatur k e l, cuius quidem sectio cum Solis parallelo a b c, sit in m puncto. Et ponemus punctum d supra uerticem esse loci cuiusdam Borealis, in quo altitudo poli supra horizontem est arcus f k, altitudinis complementum d f semicirculus Orientalis horizontis k e l, meridianus uerò f d l, punctum meridiei cum Sol parallelum describit a b c, est punctum h i d uerò in quo exoritur, est m sub uerticali circulo d m, qui rursus eundem secat parallelum in puncto n inter a & h. Quod si à uerticali puncto d, maximus circulus ductus fuerit, qui parallelum a b c, contingat in puncto o quemadmodum Theo. docet, erit eius quadrans d o p, is uerticis qui ceteris maxime à meridiano recedit: reliqui uerò arcum semidiurnum h b m, in duobus locis secabunt. Sol igitur in exortu, atque puncto n ante meridiem sub uno atque eodem circulo ex uerticalibus uidebitur, sed in n altitudinē habebit m n: in a uerò & b sub uerticali d e, sed altitudines inæquales erunt, nā minor est b e ceteris a e. Distātia igitur solis horizontalis à meridiano ab exortu usque ad o ante meridiem, perpetuò augetur, sed ab ipso o usque ad n minuitur. Quare propter si gnomon rectus ponatur ad horizontis planum, cum Sol fuerit in exortu, proiecta umbra quæ infinita tunc censetur, distabit à linea meridiana, circumferentia æquali similiue ipsi k m, at cum in b proiecta umbra distabit ab eadem meridiana linea, circumferentia æquali similiue ipsi k e: porro cum in o quàm maxime distabit ab ipsa meridiana linea circumferentia nempe æquali similiue k p. Deinde uerò appropinquare incipiet eidem meridiana, nam in a tantum distabit quantum in b, in puncto autem n eodem spatio quo in m, ex quo loco ad meridianam perueniet lineæ regressu. Post meridiem uerò similis seruabitur ordo progrediendi, & regrediendi. Non est igitur absurdum, si in ijs locis progrediantur umbræ, & retrocedant. In hac tamen plaga nostra Boreali quæ citra tropicum Cancrī posita est, id citra miraculum fieri non posset, quemadmodum iussu Dei legitur accidisse in signum salutis regis Ezechia. Et ex hoc habes altitudinis poli cognitionem, cum Solis declinatione, & ipsius distantia per horizontem à meridiano, non sufficere ad horæ cognitionem. Sol enim in a & in b, æqualiter distat à meridiano per horizontem, arcu uidelicet e k, sed inæqualiter per æquinoctialem. Nam angulus

b f d,

sup - 2/1


multo maior est angulo $a f d$. Sed uera sunt nihilominus horologia solaria: in horizontalibus enim quibus plerumque utimur, umbra mundani axis quæ horam ostendit, nunquam regreditur. Sed in quibus stylus rectus est ad horizontis planum, non ex recessu tantum umbræ à meridiana linea horam dignoscimus, sed ex ipsius umbræ magnitudine. Et ex hac figura præterea intelliges ex cognitis poli elevationibus duorum locorum, & situ quem eorum distantia seruat ad alterum meridianum, non posse in uniuersum cognosci ipsam distantiam, nec meridianorum differentiam, quanquam hæc per organum meteoroscopium iactet Ptolemæus se inuenisse. Ponemus enim uerticale punctum unius duorum locorum esse d , alterius uerò positum esse in parallelo $m o h$, altitudines poli dentur cognitæ: situs etiam quem distantia seruat ad meridianum $d f$ cognitus supponatur, sitque is quem ostendit angulus $e d f$: interuallum igitur eorundem locorum uel erit $d a$, cum tanta longitudinis differentia, quantam ostendit angulus $a f d$, uel fortasse erit $d b$, quod quidem maius existit ipso $d a$, cum longitudinis differentia quam indicat angulus $b f d$, & propterea incertum erit ubinam sit uerticale punctum loci Borealis, sitne in a utrum in b . In spherico enim triangulo ex segmentis circulorum maximorum constituto, siue etiam in rectilineo, quamuis duo latera dentur cognita cum acuto angulo contento à tertio latere, & maiori duorum datorum laterum, nondum tamen per hæc ipsum latus tertium, & reliqui anguli innotescunt. Et hac etiam de causa, per ea quæ uel Appianus cognita sumit, uel Zieglerus, altitudo poli cognosci non potest. Ioannes uerò de Montereio problemate 46. tabule primæ mobilis, per latitudines duorum locorum, & angulum positionis, differentiam longitudinis inuestigandam proponit. Cæterum inter operandum inter capedinem datorum locorum cognitam sibi sumit, ex qua quidem atque latitudine primæ loci & angulo positionis, latitudinem secundæ loci, & longitudinis differentiam inquirat. Hæc autem ex ipsis assumptis cognosci posse, ars Geometrica docet: quanquam idem autor Methodum quandam elegerit non satis idoneam ad inuentionem quæsitæ. Nam prius quam secundæ loci latitudinem inueniat, indagare cogitur, sitne ipse secundus locus Borealis, an Australior: idque ex anguli positionis qualitate. Constat tamen ex supra scripta figura quod g , locus Borealis est quam a, b uerò æqualis latitudinis Borealis, sed quicumque positus fuerit inter b & e Australior erit, eodem existente positionis angulo $f a e$. Atque ex his intelliges 13. propositionem primæ libri Menelai de Triangulis sphericis, ueram non esse in uniuersum, quemadmodum proposita est. Ita enim habet: cum æquantur duo anguli duorum triangulorum ex arcibus circulorum magnorum super superficiem spheræ, & æquatur arcus

continentes duos angulos alios utrorumque, scilicet omnis arcus suo relativo, & est unusquisque duorum angulorum reliquorum non rectus: tunc arcus reliquus unius duorum triangulorum est æqualis arcui reliquo alterius, & duo anguli reliqui sunt æquales duobus angulis reliquis, omnis angulus suo relativo. Cuius exemplum (inquit) est ut sint duo trianguli abg & der . Super superficiem sphaeræ, & sit angulus a æqualis angulo d , & arcus bg æqualis arcui er , & arcus ga æqualis arcui dr , & sunt arcus continententes duos angulos gr , & unusquisque duorum angulorum b & e sit non rectus. Atque ait arcum ab æqualem esse arcui de , & angulum g æqualem angulo r , & angulum b æqualem angulo e . At quoniam in demonstratione æquales angulos a & d , in primis sumit non rectos: eos igitur ponamus acutos. fieri igitur poterit, ut duorum b & e , unus acutus sit, alter uerò obtusus:



quare conclusio non sequitur, nisi ponamus utrumque ipsorum b & e , recto esse maiorem, aut utrumque recto minorem. Hanc etiam laterum & angulorum trianguli habitudinem parum aduertit

Nicolaus Copernicus Turinensis, in eo potissimum occupatus, quoniam uidelicet modo ueterem ac penè oblitam Aristarchi Samii Astronomiam de terræ Mobilitate, & Solis atque octauæ orbis quiete, quam Archimedes in libro de Arenæ numero commemorat, Methodo radicibus ac demonstrationibus Ptolemæi in lucem denuò reuocaret. Octaua enim propositio capitis 14 primi libri Revolutionum, in quo de Sphaericis triangulis agit, ita habet. Si bina triangula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, alterum alteri, & angulum angulo æqualem, siue quem latera æqualia comprehendunt, siue qui ad basim fuerit, basim quoque basi, ac reliquos angulos reliquis habebunt æquales. Sed quòd posterior pars uera non sit, facili ostendemus demonstratione. In sphaerico enim triangulo abc , bina latera ab & ac sint æqualia, basim uerò bc producemus in d ; sit tamen circumferentia cd semicirculo minor, & per puncta



æta a & d , maximi circuli circumferentiam duces mus ad : in duobus igitur sphaericis triangulis abd & acd , duo latera ab & ad trianguli abd , æqualia sunt duobus lateribus ac & ad , trianguli acd & angulus adb , communis existit, ad basim uidelicet utriusque trianguli. Quapropter basis bd trianguli abd : æqualis erit basi cd trianguli acd , per ipsam

ipsam octauam Nicolai Copernici, pars toti, quod est impossibile. Et idem absurdum sequitur de duobus angulis $b a d$ & $c a d$: est enim unus pars alterius. Angulus etiam $d b a$ semper erit inæqualis angulo $d c a$, nisi latera $a b$ & $a c$, quæ posita sunt æqualia, quadrantes fuerint: ea igitur ponamus minora quadrantibus, & erit idcirco angulus $d c a$ acutus, $d b a$ obtusus, et erit $a d b$ acutus. Et quod igitur undecima propositione docet, omne triangulum cuius duo latera fuerint data cum aliquo angulo, datorum efficitur angulorum & laterum, allucinatio est. Et similiter lapsus est propositione 6. de rectilineis triangulis. Trianguli enim cuius duo latera cum uno tantum angulo qui ad basim data sunt, reliquum latus cum reliquis angulis cognosci non poterit, nisi datus angulus aut rectus fuerit, aut obtusus, aut si acutus: maius tamen datorum laterum subtendat. Nam si aliter proponatur, non constabit ex positis sitne acutus reliquus angulus qui ad basim, an obtusus ille, qui cum eo duos rectos angulos complet, & proinde ipsa quoque basis ignota relinquetur. Nec minus lapsus est in 12. quæ ita habet. Adhuc autem si duo anguli utcumque dati fuerint, cum aliquo latere, eadem euenient. Construatur enim triangulum sphericum $b c g$, in quo duo latera $b c$ & $c g$, coniuncta uni semicirculo sint æqualia, & extenso latera $b g$ usque ad a , circulus maximus scribatur per a & c , trianguli quoque $a b c$ duo anguli $c a b$ & $c b a$, dentur cogniti, cum latere $a c$ quod angulo $c b a$ oppositum est, atque nondum per hæc quæ cognita supponuntur, reliquus angulus & reliqua latera cognita erunt. Nam quoniam duo latera $c b$ & $c g$, coniuncta uni semicirculo æqualia sunt: angulus igitur $a b c$ angulo $b g c$ æqualis erit. Quapropter




trianguli quoque $a c g$, duo anguli $c a g$ & $a g c$ cogniti supponuntur, & latus $a c$ angulo $a g c$, oppositum sumitur cognitum: in utroque enim triangulo $a b c$ & $a g c$, eadem hypotheses sunt. Quare nondum per ea quæ cognita sumuntur, cognosci poterit utrum reliquus angulus qui ignotus erat, sit $a c b$ an $a b g$, & utrum reliqua latera quæ ignota erant, sint $c b$ & $a b$ an $c g$ & $a g$.

Vtrum uerò rationibus illis quibus Ptolemæus usus est ad ostendendum terram in circulum minime moueri, ipse Copernic. satisfaciat, cum ait non solum terram, sed etiam terra, & omnia graua, ubicunque posita fuerint, naturalii motu ab occasu in ortum ferri: rectum autem eis superuenire, quando extra loca naturalia quomodolibet peregrinantur, atque non aliter cum recto manere circularem, quam cum ægro animal, Philosophorum est disputare. Nam nihil moueri fatebitur uel à medio, uel ad medium, quin circa idem medium quoque feratur. Hæc autem idcirco commentus est: ut rationem reddere posset, cur si terra in orbem fe-

ratur, nihilominus grauia corpora sursum proiecta, ad subiecta sibi loca ad perpendicularum redeant. Quòd autem ad Astronomiam attinet, Solis & terræ loca commutat, & ut Solem atque inerrantes stellas immobilis faciat, triplicem motum terræ tribuit in eccentrico orbe, unà cum binis librationibus, ut in omni ætate stellarum fixarum obseruationes sibi inuicem congruere possint, instar duarum trepidationum quas Ioannes Vernerus ob eandem causam finxit. Lunam non sine ratione collocat in epicyclo epicycli, centrum minoris in circumferentia maioris. Cæterùm aduerto totum minorem intra maiorem includi oportere, ne cœlum rumpatur, si id commodum esse putet. Et quoniam eccentricos orbis ponit: alios igitur ponere necesse erit, qui planetarum sphaeras mundo concentricas compleant. Quare iudicio meo id solum contendere debuit, quoniam uidelicet modo ex suis & aliorum obseruationibus, tabulas cœlestium motuū exactiores reddere posset. Quod quidem assequi poterat, octaua sphaera mota, Sole etiam moto, terra tamen in medio mundi immobili existente, ut in communi Astronomia. Sed de his aliàs, & nos ad institutum reuertamur.

Si ex figura superius depicta cognoscere uelis pro data loci altitudine, & data Solis declinatione Boreali, quā nū retrocedant umbræ in superficie horizonti æquidistante, & quanto tempore: per duo igitur puncta f & m , maximus circulus scribatur, item per f & o punctum contactus. In sphaerico igitur triangulo $f m k$, quoniam angulus ad k ex concursu meridiani & horizontis rectus est, & $f k$ eleuatio poli datur cognita, cum $f m$ declinationis complemento: reliquum igitur latus, &

reliqui anguli ignorari non poterunt, circumferentia igitur $k m$, quæ distantia est Solis à meridiauo per horizontem, id est complementum latitudinis ortus, & angulus $k f m$ ei oppositus, qui magnitudinem ostendit arcus seminocturni patefient, & propterea reliquus angulus $d f m$, arcus semidiurni notus relinquetur. In triangulo autem $d f o$, quoniam angulus $d o f$ rectus est, idcirco ex $d f$, complemento altitudinis poli, & $f o$ complemento declinationis cognitis, reliquum latus & reliqui anguli innotescunt: sic igitur $d o$ complementum altitudinis Solis, quando fuerit in puncto o à meridiauo



ridiano quàm maximè declinante, & angulus $f d o$ qui ipsam ostendit distantiam à meridiano per horizontem: angulus etiam $o f d$ qui distantiam eiusdem demonstrat per æquinoctialem, ignorari non poterunt. Ab ipso uerò angulo $f d o$, angulum auferemus $f d m$, qui cognitus est propter cognitam circumferentiam $k m$, & cognitus idcirco relinquetur angulus $o d m$, cui quidem circumferentia subtenditur $m p$ regressions umbrarum. Exempli gratia sit circumferentia $f k$, graduum 12. quanta uidelicet est eleuatio Borealis poli supra horizontem in ciuitate Cananor Indiae intra Gangem regum Lusitaniae: arcus uerò $h o m$ sit segmentum paralleli capitis Cancrì, complementum igitur ipsius arcus $k m$, id est latitudo ortus capitis Cancrì graduum erit 24. $m. 3.$ & ipse $k m$, Gr. 65. $m. 57.$ angulus autem $k f a$, arcus seminocturni Gr. 84. $m. 44. se. 20.$ arcus igitur semidiurnus Gr. 95. min. 16. ferè. Altitudo Solis $o p$ Gr. 31. min. 26. arcus $k p$, qui magnitudo est anguli $f d o$, Gr. 69. min. 38. à quo auferemus $k m$, & relinquetur $p m$ Gr. 3. $m. 41.$ regressions umbrarum. Quanto autem tempore ipsæ umbræ regrediantur, & quantum Sol eleuetur supra horizontem in altero regressions termino, facile erit cognoscere in eadem figura. Nam in rectangulo triangulo $f k m$ ex $f k$ & $f m$, cognitis, cognoscetur angulus $k m f$. Eum uerò auferemus ex recto $d m k$, qui ex concursu fit uerticalis $d m$ cum horizonte, & cognitus relinquetur angulus $f m n$. Iam igitur in Isosceli triangulo $m f n$, quoniam anguli ad basim, cum duobus æqualibus lateribus cognoscuntur: ipsa igitur basis quæ altitudo Solis est supra horizontem, & angulus $n f m$ patefiat. Et idcirco angulus $d f n$, qui relinquitur ex $m f d$ notus erit, & proinde tempus ante meridiem cognitum. Fateor tamen me quæsiuisse ab ijs hominibus qui ad ea orbis loca crebro adeunt, quæ inter æquinoctialem & circulum Cancrì posita sunt, utrum in ipsis locis quando Sol in Cancro est, manè & serò umbras corporum rectorum supra horizontem aliquantisper regredi uidissent: at se hoc minimè conspexisse responderunt, nec mirum, nam quia per exiguus est umbrarum regressus, idcirco non aduerterunt. At latere eos non debuit umbrarum longitudinem in spatio quatuor horarum nimium contrahi ante meridiem, post meridiem uerò quam longissimè produci, nulla interim circulari motione percepta circum gnomonis pedem. Nam iuxta prædictam demonstrationem angulus $d f o$, Gr. continet 60. min. 44. igitur angulus $o f m$, inuenitur Gr. 34. min. 32. $m n$ Solis altitudo in n Gr. 55. angulus porrò $n f m$, Gr. 60. min. 28. igitur angulus $d f n$

Grad. 34. minut. 48.


O 2 De uaria

De Varia Solis habitudine ad uerticale punctum in differentibus locis
terræ, ante meridiem & post, quod Zenit Solis
appellant. Cap. 12.

Non parum conferre existimamus ad altitudinem poli per radi-
um Solis inueniendum, eam habitudinem intelligere quam Sol
ipse habet ad Zenit capitis, ante meridiem & post, pro diffe-
rentibus zodiaci locis, & diuersa poli altitudine supra horizon-
tem, quod quidem facile intelligi poterit, ex his quæ mox à nobis dicenda sunt.

Cum enim Sol declinationem habuerit Borealem, his qui longius à Bo-
reali polo distiterint, tota die uersabitur in uerticalibus circulis Boreali-
bus, siue loci latitudo sit Australis, siue Borealis. Fieri enim non poterit
ut Sol ipsa die circulum uerticalem attingat ortus & occasus æquinoctia-
lis, qui Boreales uerticales ab Australibus determinat. his autem qui sub
ipso Solis parallelo positi fuerint, similiter tota die uersabitur in Boreali-
bus, in instanti tamen meridiei supra uerticem erit.

Cæterum his quorum uerticale punctum ipsi polo Boreali uicinius est,
quamdiu Solis altitudo supra horizontem declinationi æqualis fuerit,
aut ea minor, erit ipse Sol in Azimuth Boreali. Esto enim polus mundi
Boreus a uertex loci in quo sumus b, Solis parallelus c d e meridianus e a
d. Super b facto polo, interuallo b f æquali circumferentiæ a d, circulus
describatur in sphaeræ superficie, qui parallelum c d e idcirco secabit, quia
niam maior est b f quàm b d. Esto autem una eorum sectio in c & per a
& c, item per b & c maximi circuli scribantur: æquales igitur erunt a c &
b c. Et idcirco cum Sol propter motum primæ sphaeræ peruenerit ad c:



erit eius latitudo supra hori-
zontem æqualis declinationi.
Et quia in triangulo Isoscelia
b c, duo latera æqualia a c & b
c minora sunt quadrantibus:
anguli igitur ad a & b supra ba-
sim, acuti erunt, & propterea
uerticalis b c in quo Sol, Borea-
lis erit. Esto autem punctum g
inter e & c, in Solis parallelo,
punctum uerò k inter c & d: de-
scriptis igitur circulis maxi-
mis per b & g, item per b & k,
erit b g maior quàm b c, sed b k
minor, per 25. propositionem secundi libri Theo. Igitur quamdiu Sol
minorem

minorem habuerit altitudinem declinatione, erit inter e & c ut in g: quæ propter angulus a b g acutus erit, & uerticalis b g in quo Sol, Borealis, quod demonstrandum erat.

Et habeat rursus Sol declinationem Borealem, uertex uerò loci sitis tem propinquior ipsi polo Boreali, sed altitudo Solis supra horizontem maior sit declinatione. Dico quòd ex positis constare non potest, in quonam uerticali sit Sol, sitne in uerticali ortus & occasus æquinoctialis, utrum in Boreali, an in Australi. Nam quoniam angulus c b d obtusus est, describatur igitur circulus maximus b k, qui rectos angulos incidat in meridianum super b puncto: angulus igitur d b k rectus erit, & ipse b k uerticalis ortus & occasus æquinoctialis: quare cum Sol fuerit in k in ipso eodem uerticali erit, at cum inter c & k in Borealibus, inter k uerò & d in Australibus, quod erat ostendendum. Tunc autem Sol erit in uerticali ortus & occasus æquinoctialis, quando tãtam habuerit altitudinem supra horizontem, ut eius sinus rectus eam seruet proportionem ad sinum declinationis, quam sinus totus ad sinum altitudinis poli. Quando igitur minorem altitudinem habuerit, erit in Borealibus: at quando maiorem, in Australibus. In triangulo enim spherico a b k, quoniam angulus k b a rectus est, & eius latera minora sunt quadrantibus: igitur sicut sinus rectus complementi arcus b k, ad sinum complementi arcus a k sic sinus totus ad sinum complementi arcus a b: at uerò arcus b k complementum eleuatio est Solis supra horizontem, quando est in uerticali b k, complementum uerò arcus a k, est declinatio eiusdem ab æquinoctialis sed complementum arcus a b loci latitudo est: & propterea quando Sol prædictam habuerit altitudinem, in uerticali circulo erit ortus & occasus æquinoctialis, quando uerò minorem, in Borealibus, sed quando maiorem, in Australibus.

Ex hac demõstratione colligitur, quod si Sol est in Borealibus signis, & uel in uerticali ortus & occasus æquinoctialis constitutus est, uel in aliquo ex Australibus, habebit in ijs locis quæ propinquiora sunt eadem polo Boreali, maiorem altitudinem supra horizontem, quàm sit eius declinatio in ipsa die.

Infertur etiam quod ubicunque uerticale punctum positum fuerit, Sole existente in Borealibus signis, quando uel eius altitudo supra horizontem uel minor fuerit declinatione, uel ei equalis, erit ipse Sol in Azimuth Boreali.

Præterea colligitur quod Sole existente in Borealibus signis, & in Australi Azimuth, maior erit eius altitudo supra horizontem, quàm declinatio, & minus distabit ipse polus Borealis à uerticali puncto, quàm à Sole.


Sole autem incedente per Australia signa, facile erit intelligere ex his quæ dicta sunt, quas habitudines habeat ad uerticale punctum. Nam his qui longius distant ab ipso polo Australi, tota die uersabitur in Australibus: his etiã qui sub ipso Solis parallelo positi fuerint, similiter tota die uersabitur in Australibus. Cæterum in instanti meridiei supra uerticem erit. Porro his quorum uerticale punctum ipsi polo Australi uicinius fuerit, quandiu Solis eleuatio declinatione minor fuerit, aut ei equalis, erit ipse Sol in Australi Azimuth: sed si maior fuerit ipsa Solis eleuatio declinatione, fortasse erit in uerticali circulo ortus & occasus æquinoctialis, & fortasse in Borealibus, & fortasse in Australibus. Tunc autem erit in uerticali ortus & occasus æquinoctialis: quando tantam habuerit altitudinem supra horizontem, ut ipsius altitudinis sinus rectus eam seruet proportionem ad sinum declinationis, quam sinus totus habet ad sinum altitudinis poli in eo loco. Quando igitur minorem hac habuerit altitudinem, in Australi erit Azimuth: at quando maiorem, in Boreali.

Et ex his similiter concludes, quòd si Sol est in Australibus signis, & uel in uerticali ortus & occasus æquinoctialis constitutus, uel in aliquo ex Borealibus, habebit in his locis quæ propinquiora sunt eidem polo Australi maiorem altitudinem supra horizontem, quàm sit eius declinatio in ipsa die.

Infertur etiam quòd si Sol in Australibus signis existit, quandiu eius altitudo supra horizontem uel minor fuerit declinatione, uel ei equalis: erit (ubicunq; nos simus) in Australi Azimuth.

Infertur etiam ex supra dictis, quòd si Sol fuerit in Australibus signis & in Boreali Azimuth, eius altitudo supra horizontem maior erit declinatione, & minus distabit ipse polus Australis à uertice, quàm à Sole.

Quando autem Sol æquinoctialem circulum percurrit, omnibus oritur & occidit in uerticali ortus & occasus æquinoctialis, sed per reliquum diei tempus Borealibus fit Australis, Australibus uerò Borealis. His autẽ qui sub ipso æquinoctiali circulo positi sunt, tota die radios mittit per eandem rectam lineam ortus & occasus æquinoctialis, quam Lusitani rumbum Lestis & Oëstis appellãt, in meridie uerò supra uerticem fit. Sit enim circulus $abcd$, rectus horizon eorum qui uerticem habent ad e punctũ, æqualis bed meridianus uerò aec : circulus autẽ bfd , sit uerticis eorum qui sunt ad Borealem plagam: at bgd uerticis eorum qui sunt ad g Australem. Igitur quoniam anguli af & g recti sunt, si ab ipsis punctis uerticibus f & g , circuli maximi ducti fuerint, ad punctum quod uis æquinoctialis inter d & e , quod sit k aut inter e & b , acutos angulos efficient ipsi maximi circuli cum meridiano. Sol igitur in d oritur in uerticali circulo ortus & occasus æquinoctialis, in k uerò eleuatus, his qui sunt



sunt ad f est in Australi Azimuth f k: ijs autem qui sunt ad g, est in Boreali g k. Cæterum ijs qui sub Æquatore degunt, tota die uersabitur in uerticali equinoctiali: quare per rectam lineam radios mittet, quæ communis sectio est æquinoctialis & horizontis.

Et quoniam cognito situ meridiani, positio Solis respectu uerticis pñcti, siue distantia ipsius à meridiano per horizontem, ex umbris gnomonum cognoscitur: caue igitur ne te decipiat


quod Ioānes Stoflerus scribit in sphaeram Procli, capite de Circulis sphaeræ. Hanc enim putat diuersitatem esse inter umbras eorum qui temperatas habitant Zonas, & illorum qui intra tropicos positi sunt, quod nobis quia extra tropicos positi sumus, Sole ex oriente in principio Cancris, obiectum corpus umbram projiciat uersus occasum Solis brumalem, ex oriente autem in Capricorno, projiciatur umbra in occasum Solis æstiuum, & simile iudicium erit de Solis occasu: cæterum qui inter tropicos positi sunt, eo (inquit) die quo Sol per Zenit eorum transit, umbram matutinam habent rectam in occasum Solis eiusdem paralleli proiectam, sicut pomeridiana recta in ortum ad horizontis punctum, super quo Sol oriebatur, extenditur. Sed reuera inter horum umbras & illorum talis diuersitas nusquam reperitur. Quinimo omnibus habitationibus commune est, cum Sol exoritur rectam gnomonis umbram in oppositum eclipticæ punctum extēdi. Sole igitur cum Cancris principio ex oriente, ijs qui sub ipso tropico Cancris positi sunt, projicitur umbra in occasum Solis brumalem, non in occasum eiusdem Cancris, id est in plagam Borealem, ut existimat Stoflerus. Quoniam enim gnomonis recta umbra in communi sectione posita est plani horizontis, & illius uerticis, qui per Solem transit, maximi autem circuli sphaeræ se inuicem per æqualia secanti: necesse igitur est, ut Sole oriente cum ipso Cancris principio, gnomonis umbra projiciatur ad oppositum sphaeræ punctum, quod quidem ipsi uerticali circulo, & horizonti, & eclipticæ etiam commune est. Sed neq̄ styli umbra in horizontali horologio eorum qui sub Cæcro positi sunt, in occasum ipsius Cancris projicitur. Quoniam enim Sol ipsa die ante horam sextam illis oritur: matutina igitur umbra in Austro-

lem horizontis quadrantem occidentalemq̄ extensa erit.

Ad

Ad inueniendum altitudinem poli per radios Solis, quando meridiani situs datur cognitus. Cap. 13.

IN globo aliquo absolutæ rotunditatis circulus maximus describatur a b c d, hunc circulum officio horizontis fungi uolumus, eius polus sit e. Describatur præterea in eiusdem globi superficie meridia-



nus a c e: & uterq; circulus in partes æquales secetur 360. Fabricetur autem ex quavis dura materia circulus unus maximus, siue circularis armilla, quæ super ipso e polo, & ei opposito uertatur, globi conuexitati contigua, cuius quidem facies illa quæ ad polos horizontis dirigitur, similiter in gradus more solito diuidat. Huiusmodi uerò circularis armilla meridianum & uerticalem quemcūq; representabit. Quan-

do igitur altitudinem poli supra horizontem per radios Solis inuenire libuerit, si meridiani positio cognita fuerit: erit huiusmodi res per ea que in superiori capite dicta sunt, inuentu facilima. In plana enim aliqua tabula circulari horizonti æquidistante, super cuius medio umbilicas umbram proijciens ad rectos angulos insideat, cuius item circumferentia in gradus diuisa sit, & in qua recta linea meridiana sit designata, per distantiam umbræ ab ipsa linea meridiana ipso obseruationis tempore, quantum Sol à meridiano distet per horizontem, deprehendemus. Per Astrolabium uerò uel quadrantem, quot gradibus eleuatus cernatur supra horizontem. Ipsam igitur Solis distantiam à meridiano computabimus in horizonte globi, ab a in b: sitq; exempli gratia arcus a f, mobilem deinde circulum maximum, siue circularem armillam ad f punctum trahemus, in situ f e g: inuentam porrò Solis altitudinem mox in ipso uerticali mobili computabimus, ab f in e & in globi superficie notabimus puncto k. Hac nimirum arte perinde collocatum habebitur in superficie globi ipsum k, atq; Sol in mundo positus est. Ut igitur intelligamus in quo nam puncto meridiani a c e, manifestus mundi polus existat, complementum declinationis Solis eodem obseruationis tempore, per tabulam declinationum cognitum, inter circini pedes comprehēdemus, & uno eiusdem circini pede manente super k tanquam polo, alterum circūducemus, circulo descripto in ipsa globi superficie. Quod si Sol extiterit ipso obseruationis tempore in Borealibus signis, sed in Australi Azimuth, minus igitur distabit Sol à uertice, quàm à Boreali polo, ipse etiam polus minus distabit

stabit à uertice, quàm à Sole, per 6. documentum. Quapropter descriptus circulus super *k*, meridianum secabit duobus in locis, supra e ut in *o*, & infra e ut in *l*. Polus itaq; Boreus erit in *o*, ad eam nempe meridiani partem, in qua angulus qui efficitur cum uerticali e *k* obtusus est, & proinde arcus *o c*, eleuationis poli arctici cognitus erit.

At si Sol est in Borealibus signis, & in uerticali circulo ortus & occasus æquinoctialis: polus igitur Boreus minus distabit à uertice, quàm à Sole: ipse etiam Sol minus distabit à uertice, quàm à polo. Quapropter descriptus circulus super *k*, duobus in locis meridianum secabit, paribus interuallis distantibus à uerticali puncto, & in utrovis eorum polus Boreus collocari poterit. Ipso igitur interuallo à gradibus 90. sublato, arcus eleuationis poli arctici supra horizontem cognitus relinquetur.

Cæterum Sole adhuc existente in Borealibus signis, si in Azimuth Boreali repertus fuerit, paribus præterea interuallis distiterit à uerticali puncto, & à Boreali polo: descriptus igitur circulus super *k*, meridianum secabit in duobus locis, quorum alter erit polus Boreus, alter uero uertex loci in quo ipsa obseruatio fit, & idcirco distantia inter uerticale punctum & Borealem polum cognita erit, si quadrans inuenta fuerit, uerticale punctum in æquinoctiali erit, si quadrante maior, excessus supra quadrantem erit altitudo Australis poli: sed si fuerit quadrante minor id quod relictum fuerit ex quadrante, altitudo erit Borealis poli.

At si Sol existit in Borealibus signis, & in Boreali Azimuth, ueruntamen minus distat ipso obseruationis tempore à uerticali puncto, quàm à polo Boreali: circulus idcirco descriptus super *k* puncto, ipsum Solẽ representante, in duobus locis meridianum secabit: uerticale autem punctum inter ipsa sectionum loca positum erit, quod ex eis quæ in superiori capite diximus, facile ostendes, locus uero arctici poli ea erit sectio, quæ ad eam partem est, in qua Solis Azimuth cum meridiano acutum efficit angulum. Cognita igitur distantia inter uerticale punctum & polum Borealem, altitudo manifesti poli supra horizontem ignorari non poterit.

Sed si Sol declinationem habet Borealem, & in Boreali Azimuth constitutus reperitur: minus tamen distat à Boreali polo, quàm à uerticali puncto, necesse est descriptum circulum super *k*, aut meridianum contingere, aut in duobus locis secare. Si contingit, locus poli Borealis erit in ipso contractu, & idcirco cum distantia inter uerticale punctum & ipsum polum Borealem, quæ quidem minor est quadrante, cognita fuerit, erit arcus qui relinquitur ex gradibus 90. eleuatio poli arctici supra horizontem, distabitque ipse Sol à meridie horis sex. Esto enim *a f* distantia Solis à meridiano per horizontem, ipso tempore obseruationis, et circulus descriptus super *k* puncto, Solem representante, meridianum con-

tingat in r: locus igitur poli Borei erit in ipso r. At quoniam kr uenit à



polis meridiani per 6. propositionem 2. l. Theo. anguli igitur ad r recti erunt, per 19. primilibri. Est autem arcus ek quadrante minor, & kr quoque quadrante minor: qua propter reliquum latus e r trianguli e k r, quadrante similiter minus erit. Arcus igitur cr eleuatio erit poli Borealis, & quia angulus e k r rectus est: distantia igitur Solis à meridie sex horarum erit.

Ceterum si circulus descriptus super k, meridiatum secet, in duobus igitur locis eum secabit, ut in i & l: quare Boreus polus aut erit in i, aut in l. Et idcirco si exploratum fuerit, eum locum in quo huiusmodi obseruatio fit, in plaga Australi esse, quanta tamen sit ipsius Australis poli eleuatio ignoramus, poterit hoc ex eadem obseruatione cognosci. Nam polus Boreus in nullo alio loco esse poterit, quam in l. Circuli enim maximi scripti



intelligantur per k & i, item per k & l: in triangulo igitur Isosceli i k l, ex segmentis maximorum circulorum constituto, duo anguli supra basim il acuti erunt: angulus igitur r i k obtusus. Et quoniam Sole incedente per Borealia signa, ihs qui in plaga sunt Australi, ante sextam horam occidit, & post sextam oritur: non poterunt igitur Borealem polum habere adi, sed potius ad l, in quo loco angulus c l k, distantiae Solis à meridie, acutus est. Detra-

cto itaque quadrante ex arcu el, qui est inter Zenith & polum Borealem, nota relinquetur distantia ab æquinoctiali uersus Australem polum, & proinde quanta sit in eo loco eleuatio poli Austrini cognita erit.

Veruntamen si ubinam positus sit locus ipse, in quo ea obseruatio facta est, prorsus ignoramus, non poterit prædicto modo altitudo poli deprehendi. Quin & si compertum fuerit eundem locum positum esse in Boreali plaga, nondum tamen ex datis cognosci poterit, quanta sit ipsius poli arctici altitudo. Illud tamen certum erit, eundem Borealem polum aut esse in i aut l. Ad i autem erit, si distantia Solis à meridie maior fuerit sex horis: at ad l, si sex horis minor fuerit. Ceterum utrunque ignotum proponitur, poli altitudo, & distantia Solis à meridie.

Et propterea ut utrunque constare possit, facta priore obseruatione, in qua Sol positus est ad k sub cognito uerticali ek post paruum temporis morulam, iterum Solem obseruabimus, qui exempli gratia amplius eleua-

eleua-

eleuatus reperiatur in uerticali e o. Quare super o puncto Solem representante in posteriore situ, circulum describemus ad mensuram prioris, in tertiallo nempe æquali complemento declinationis. Secabit igitur hic posterior circulus meridianum aut in y aut in l, & in alio quodã puncto. Nam in utroq; y & l secare nõ potest, ne accidat impossibile 7. ppositio



nis primi Euclidis. Secare autem in altero eorum necesse est, quia aut in y aut in l, polus arcticus positus est: secet igitur in y atq; in m, & erit idcirco ipse arcticus polus in y. Quapropter cognita distantia e y, inter punctum uerticale, & polum Boreum, altitudo manifesti poli supra horizontem ignorari non poterit. Tempus uerò ante meridiem, ex angulo cognoscetur e y o, super mudi polo in posteriore obseruatione, in priore uerò ex angulo e y k, & idcirco parua illa temporis mora similiter innotescet.

Porro quonam modo sit operandum quando Sol per Australia signa incedit, ex eisdem regulis deprehendes. Nam si ipso tempore obseruationis, in Boreali extiterit Azimuth: facto igitur polo super puncto Solem representante, interuallo autem æquali complemento declinationis, circulum describemus in ipsius globi superficie, & locus Austrini poli, quẽadmodum in primo Canone inuentus erit.

At si in Azimuth ortus & occasus æquinoctialis, locus Austrini poli, quemadmodum in secundo inueniri poterit.

Si in Australi Azimuth positus reperitur, & æquidistat interuallis à uerticali puncto & à polo Austrino, inueniemus quemadmodum in tertio distantiam uerticalem puncti ab ipso polo Austrino, & ex ea altitudo manifesti poli innotescet.

Si in Australi Azimuth, minus tamen distat à uerticali puncto quàm à polo Austrino, inueniemus quemadmodum in quarto distantiam uerticalem ab ipso Austrino polo, ex qua quidem altitudo manifesti poli patefiet.

Si in Australi rursus Azimuth, cæterum minus distat à polo Austrino, quàm à uerticali puncto, tangitq; descriptus circulus meridianum, locus Austrini poli erit in ipso contactu: distantia uerò Solis à meridie Grad. 90. comprehendet, quibus in æquinoctiali circulo sex horæ debentur. Sublato autem interuallo inter uerticale punctum & ipsum polum Austrinum ex uno quadrante, altitudo eiusdem Austrini poli cognita relinquetur.

At si non tangit, sed secat, in duobus igitur locis ipsum secabit meridianum.

dianum. Quare si compertum fuerit eum locū in quo ipsa obseruatio fit, in Boreali plaga positum esse, sed quanta sit Borealis poli eleuatio ignoramus, poterit hoc ex eadem obseruatione deprehendi. Nam locus Austrini poli in ipso globo, ea erit sectio, quæ remotior fuerit à uerticali puncto, & idcirco inuento loco Austrini poli, quanta sit Borealis poli eleuatio per doctrinam sexti canonis patefiet.


Cæterum si ubi nam positus sit locus ipse, in quo huiusmodi obseruatio fit, prorsus ignoramus, non poterit prædicto modo altitudo poli cognosci. Quin & si compertum fuerit, eum positum esse in Australi, plaga nondum poteris ex datis, quanta sit Austrini poli altitudo deprehendi.

Et propterea post aliquam temporis morulam, iterum Solem obseruabimus, et quemadmodum in octauo canone, altitudo manifesti poli supra horizontem innotescet.

Quando uerò Sol nullam habuerit declinationem ab æquinoctiali circulo, facilimum erit altitudinem poli inuenire. Nam si in Australi Azimuth repertus fuerit, polus manifestus Boreus erit. At si in Azimuth Boreali Austrinus erit manifestus polus. Describemus igitur maximum circulum in ipsius globi superficie, polo facta super puncto Solem repræsentante, sectio enim uerticali puncto uicinior locum manifesti poli ostendet.

Ad inueniendum altitudinem poli per radios Solis, etiam si meridiani situs ignoretur. Cap. 14.

IN plana illa circulari tabula qua in præcedenti capite usi sumus, quam in ea recta linea meridiana designata non sit, Sole lucente situs umbræ gnomonis notetur, & per Astrolabium in eodem temporis momento Solis altitudo supra horizontem deprehendatur. Deinde uerò post aliquam temporis morulam similem faciemus obseruationem, rursus enim situm umbræ notabimus, & Solis altitudinem supra horizontem capiemus. Nam ex ipsis duabus Solis eleuationibus, & umbræ progressu per circularis tabulæ circumferentiam, non erit difficile altitudinem poli inuenire. Umbrarum enim differentiam inter ipsas duas obseruationes, in horizonte globi supputabimus, à quo libuerit puncto exordientes. Sit autem exempli gratia arcus hm , mox uerò ad punctum h , mobilem uerticalem traducemus in situ he , & altitudinem Solis prioris obseruationis computabimus ab h in e , cuius quidem finis notetur puncto n . Eadem arte uerticali eodem translato ad m in situ em , & altitudine Solis posterioris obseruationis computata, finem notabimus puncto p .



et p. Puncta itaq; n & p, perinde collocata erunt in globo, respectu puncti e, at que Sol in mundo respectu uerticali puncti. Quare ut positionem alterius poloꝝ mundi ad ipsum uerticale punctum cognoscamus, arcum complementi declinationis Solis in ipso obseruationis die, inter circini pedes comprehendemus, & su

per ipsis n & p, punctis factis polis, duos circulos describemus, quorum sectiones sunt in q & r punctis. Ille igitur polus mundi à quo Solis declinatione denominationem sortitur, cuiue Sol in ipso obseruationis tempore uicinior est, uel erit in q uel in r. Si est in q Solis parallelus erit p u z n, & arcus meridiani inter e, uerticale punctum & ipsum mundi polum erit e q. Sed si est in r Solis parallelus erit p s, x n, & arcus meridiani inter uerticale punctum et eundem mundi polum erit er. In utro autem eorum punctorum sit, hac arte cognoscemus. Nam si conuersa facie ad Solem moueri cernatur à sinistra in dextram, punctum idcirco uerticale positum esse dicemus inter polum mundi Borealem & Solis parallelum, ipsumque Solis parallelum inter uerticale punctum & polum Australem, uel in eodem Solis parallelo ipsum uerticale positum erit. Si à dextra in sinistram contrarium pronuntiabimus: nam cum hoc acciderit, positus erit Solis parallelus inter polum Borealem & uerticale punctum, & idem uerticale inter Solis parallelum & polum Australem, uel in ipso Solis parallelo. Quare si polus mundi qui eo tempore Soli uicinior est, Borealis fuerit, & uertatur ipse Sol à sinistra in dextram, certum erit locum Borealis poli esse ad q, & proinde arcus e q cognitus fiet: ex quo quidem manifesti poli eleuatio illico patefiet. Sed si à dextra in sinistram uerti cernatur, quod quidem ex umbrarum circuitione facile cognoscet, polus Boreus erit ad r, & meridiani segmentum inter eundem polum & uerticale punctum erit er, ex quo quanta sit manifesti poli eleuatio, & situs meridiani innotescet. Similiter autem ratiocinandum, quando polus Soli uicinior Austrinus fuerit. Cognito autem hac arte situ meridiani, quanta fuerit in utraq; obseruatione distantia Solis horizontalis ab ipso meridiano, ignorari non poterit. Atq; ex hoc quantum nautici instrumenti meridiana linea à uero meridiano recedat, statim cognoscet, si supra medium ipsius stylum ad rectos angulos erexeris. Quod quidem nautis non tantum uti

le, sed apprimè necessarium, ut quorsum nauigando tendant, uerosq̃ locorum situs, intelligant. Cæterum in quibus locis gnomonum umbræ ante meridiem & post, progredientur, & deinde regrediuntur, quod superius commemorauimus, regula hæc nostra de habitudine uerticæ puncti ad Solis parallelum, & mundi polos, operantem fallere poterit. Sol enim exoriens ad m in figura capitis X I. ñs qui sunt ad d, in uerticæ li cernitur d n m: quando autem peruenerit ad o, in uerticæ li uidebitur d o p. Quæ autem dexterioribus spectantur radijs, dexteriora apparent, quæ uerò sinisterioribus, sinisteriora uident, per suppositiones perspecti uæ Euclidis ab m: igitur usq̃ ad o uerti uidebitur à sinistra in dextram, umbræ uerò gnomonum alterno motu à dextra in sinistram, at ab o usq̃ que ad h meridiani sectionem, à dextra in sinistram reuolui uidebitur, nam ad n perueniens, ad uerticæ li redibit d n m: umbræ igitur à sinistra in dextram. Quapropter ut nihil erroris aut ambiguitatis in nostra hac poli mundi inuestigatione relinqui possit, tertiam facere oportebit obseruationem, in qua Solis altitudo notetur, cum differentia inter duas postremas umbras. Et eadem arte qua antea usi sumus, punctum signabimus in globo, quod in postrema hac obseruatione Solem representet, super quo facto polo, ad eandem mensuram complementi declinationis circulum describemus, qui quidem duos priores circulos in altera duarum sectionum secabit, nempe uel in q, uel in r: in utraq̃ uerò impossibile, nisi Sol declinatione caruerit. At ubi secauerit, ibi locus erit illius poli, qui in ipso obseruationis tempore Soli uicinior fuerit. Quando igitur Sol per æquinoctialem incedit, tertia obseruatione opus non est: nam Borealibus tota die à sinistra in dextram uertitur, Australibus uerò à dextra in sinistram: ñs autem qui sub ipso æquinoctiali positi sunt, nec à dextra in sinistram nec à sinistra in dextram, umbræ enim gnomonum in unam rectam lineam proijciuntur.


Ad inueniendum altitudinem poli per radios Solis situ meridiani & declinatione Solis ignoratis. Cap. 15.

Quando uerò non solum meridiani situs, sed etiam declinatio Solis ignoratur, non erit difficile ex eis quæ docuimus, utrumque notum efficere. Tres enim faciemus Solis obseruationes in tanto temporis interuallo, quantum sufficiat ut ipsius Solis altitudines sensibili differentia crescant, aut decrescant, & in quo progressus umbræ per circularis tabulæ circumferentiam sit manifestus. Tum uerò quemadmodum in præcedenti capite operati fuimus, trium umbrarum differentias in horizonte globi supputabimus, & mobilem uerticæ

calem

de Obser. Reg. & Instr. Geom. Lib. II. 119

calem traducendo ad tres earum situs, tresq; altitudines Solis in eodem uerticali mobili computando, tria puncta in globo notabimus, quæ quidem tres Solis situs respectu uerticis puncti representabunt. Et quia in parallelo Solis posita esse necesse est eiusmodi tria puncta: polos igitur illius circuli qui per eadem tria puncta uenit, secundum præcepta Geometricæ artis inueniemus: ipsi enim duo poli mundi erunt, Boreus nempe & Austrinus. Exempli gratia, ponatur uerticis mobilis in quo libuerit situ, qui sita e b, & sita c altitudo Solis prima obseruatione reperta, a d uerò in horizonte globi, sit arcus ille, quem gnomonis umbra per circuli ferentiam plani instrumenti inter primam & secundam obseruationem pertransiuit. Translato igitur mobili uerticali ad d sit d f, altitudo Solis secunda obseruatione reperta. Inde porro eodem uerticali translato ad g sit d g, arcus pertransitus ab ipsius gnomonis umbra inter secundam & tertiam obseruationem, arcus uerò g h esto Solis altitudo ipsa tertia obseruatione reperta. Tria igitur puncta e f & h, respectu puncti e collocata erunt in globi superficie, perinde atq; Sol tribus illius obseruationibus in mundo repertus est. Quare ut polos mundi inueniamus, circulumq; describamus, qui per ipsa tria puncta ueniat, non alia arte operandum erit, quàm ea qua communiter uti solent, ad inueniendum in uno plano centrum circuli, qui per tria data puncta ueniat, quæ in una recta linea non sunt: & demonstratio huius similis erit demonstrationi illius. In hac enim ducendi sunt arcus maximorum circulorum per quælibet duo puncta, in illa uerò rectæ lineæ. Ratiocinamur illic per 8. & 4. primi libri Euclidis; hîc uerò per propositiones similes 4. & 8, quas quidem Menelaus



us demonstraui in 1. lib. Triangulorum sphaericorum. Super punctis l
taq; c & f, interuallo maiori quàm est dimidium c f, quadranti tamen mi
nori,


noris decussationes faciemus ad i & k , ipsis autem k & i , punctis circulari
 rem aliquam armillam mobili uerticali similem coaptabimus, penes quam
 circulum maximum in ipsa globi superficie describemus lki . Eodem
 modo super f & h , interuallo maiori quam est dimidium fh , duas alias fa-
 ciemus decussationes m & n , & ipsis m & n punctis eadem circulari ar-
 milla coaptata, circulum maximum describemus lnm . Horum uero
 duorum maximorum circulorum una sectio fit in puncto o supra hori-
 zontem, & altera in l sub horizonte. Aio itaque ipsa l & o , puncta duos es-
 se mundi polos, arcticum nempe, & antarcticum, ita ut super o aut l , de-
 scripto circulo per c transeat etiam per f & h . Qui polus uicinior inuen-
 tus fuerit puncto uerticali e ipse erit manifestus: remotior uero sub hori-
 zonte occultus: arcus igitur e & o complementum erit altitudinis poli, cir-
 culo maximo descripto per ipsa e & o puncta, qui horizontem secet in p
 & q . Si arcus maximi circuli inter e & o , quadranti æqualis inuentus fue-
 rit, uersabitur Sol ipsa die in æquinoctiali, sed si quadrante minor, aut ma-
 ior, repertus fuerit, differentia à quadrante erit Solis declinatio. Cum igi-
 tur ad eum modum quanta sit manifesti poli eleuatio, & quanta sit Solis
 declinatio innotuerit, si in qua Zodiaci medietate Soleo tempore uerse-
 tur cognitum fuerit, non solum ex his qualis ipsa declinatio sit patefiet,
 sed etiam quinam sit mundi polus, qui eleuatus cernitur, Boreus ne, an
 Austrinus. Situm uero meridiani per distantiam umbræ à puncto p aut
 q , quemadmodum in præcedenti capite cognosces.

Rursus declinatione Solis & meridiani situ ignoratis altitudinem
 poli in plano unius circuli inuenire. Cap. 16.

IN primis commemoranda est dispositio & habitudo quorundam cir-
 culorum sphaeræ, polorum & centrorum eorundem circulorum in
 uulgato planisphaerio Ptol. Centrum enim æquinoctialis pro polo
 manifesto ponitur. Rectæ lineæ ab ipso centro ueniētes uice circulorum
 maximorum sunt, qui per polos mundi ducuntur. Rectus igitur horizon
 recta quædam linea existit. Pro reliquis circulis circuli ponuntur, sed
 non una atque eadem magnitudine. Eorum centra alibi sunt, quam ubi is-
 psorum poli. Obliquorum porro horizontum & ei æquidistantium cen-
 tra, & uerticalia puncta, in recta meridiana posita sunt. Sed quanquam
 horizontis & ei æquidistantium idem polus, centra tamen non sunt eas-
 dem: at ex cognito situ siue poli, siue centri horizontis, centra & diame-
 tri æquidistantium circulorum, quos Almicantarath Arabicè uocant,
 cognita erunt, & uicissim ex cognita diametro cuiusuis eorundem æqui-
 distantium habitudo atque distantia poli horizontis à mundi polo pate-
 fiet.

fiet. Quæ cum ita sint, licebit cum opus fuerit, polos mundi cum polis horizontis commutare, æquinoctialem cum obliquo horizonte, æquidistantes æquinoctiali cum ijs qui ipsi horizonti æquidistant: meridianos etiam cum uerticalibus, ut qui erat rectus horizon, uerticalis fiat ortus & occasus æquinoctialis. In qua quidem commutatione una tantum recta linea quæ meridiani uice fungitur, per polos mundi & horizontis transiens in suo permanet officio. Ex quo facile erit intelligere, quam arte possimus in planisphærio ex cognita diametro atq; situ cuiusuis circuli, eorum qui æquinoctiali æquidistant, distantiam poli mundi à polo horizontis inuenire. In planisphærio enim æquinoctialis abc , ponatur pro horizonte, & in partes æquales 360. secetur, centrum d quod erat mundi polus, sit modo ipsius horizontis polus, siue uerticale punctum. Ducantur autem per ipsum centrum duæ diametri occultæ, se inuicem ad rectos angulos secantes, & à termino unius qui initium dicatur primi quadrantis eiusdem circuli in singulas partes secundi quadrantis rectæ ducantur lineæ, cuius sectiones cum altera diametro punctis quibusdam signentur, quemadmodum facere consueuimus, cum in uulgato planisphærio Ptol. circulum Cancræ, & quosuis æquidistantes ex æquinoctiali deducimus. Diuisa igitur ad eum modum una ex semidiаметris in 90. partes, Astrolabij indicem siue ostensorem ad eandem mensuram in eisdem partibus, eisq; apertis diuidemus, quibus debitos numeros apponemus. Eritq; ipse ostensor uice mobilis uerticalis, cuius ad miniculo Solis altitudines in planisphærio notentur. Quando itaq; ex tribus Solis altitudinibus, & duabus umbræ differentijs, altitudinem poli supra horizontem cognoscere operæpretium fuerit, supputabimus in circulo abc à quo libuerit puncto exordientes, exempli gratia ab e umbræ curriculum inter primam obseruationem & secundam, quod quidem sit ef , & à puncto f similiter umbræ curriculum inter secundam & tertiam postremam ué, quod sit fg : mobili deinde uerticali siue ostensore posito in situ de , primam supputabimus Solis altitudinem ab a in d , quæ sit in eh , in situ uerò df , secundam altitudinem fi : at in situ dg , tertiam gk . Ipsa igitur tria puncta hik , eam habitudinem habebunt in planisphærio ad punctum d , quam Sol in mundo ad uerticale. Per præcepta igitur artis Geometricæ centrum inueniatur, super quo describatur circulus, qui per eadem tria puncta ueniat, quod sit l . Quapropter si ad mensuram lh aut li aut lk circulus kmh , descriptus fuerit, ipse erit Solis parallelus eadie in qua prædictæ obseruationes factæ sunt. Connectatur autem dl recta linea, quæ utrinque producta circumferentiam horizontis secet in o & n punctis. Et erit id circo ipsa recta linea no , pro meridiano posita: & proinde meridiani situs cognitus erit. Nam tot gradibus atq; minutis gnos-

monis umbram distare necesse est à meridiano in postrema obseruatione, quot sunt in arcu og . A puncto autem d planisphærij centro, super no , recta excitetur linea ad rectos angulos in eodem plano, & utrinque producat ad longitudinem diametri, sitque ea pq : erit igitur ipsa pq , pro circulo uerticali posita ortus & occasus æquinoctialis. Ducantur à puncto p ad r & s , sectiones paralleli Solis, & meridianæ, rectæ lineæ horizontem secantes in t & u , & arcus tu per æqualia secetur in z : præterea ab ipso p ad z , recta ducatur linea meridianum secans in x : erit igitur qz , distantia inter Zenith & polum mundi manifestum: ipsum autem punctum x , eundem polum in planisphærio repræsentabit. Quare si circulus abc meridianus intelligatur, erit quærticale punctum, z uerò manifestus mundi polum: arcus porro zu , distantia ipsius paralleli, quem gradus Solis describit, ab eodem mundi polo, & idcirco ipsa Solis declinatio cognita erit. Cuius quidem altitudo meridiana erit ou , orientalis interseccio eiusdem



paralleli Solis & horizontis sit in y : erit igitur horizontis arcus qy , latitudo ortus. Duo arcus zA & zB sint quadrantes: erit igitur in hoc exemplo Au , loci Solis declinatio ad manifestum polum, quæ quidem manifesta erit, etiamsi maxima zodiaci obliquitas ignoretur. Ducantur ab eodem puncto p rectæ lineæ ad A & B rectam no , ulterius productam secantes in C & D . Erit igitur CD , æquinoctialis diameter. Quare si super E puncto medio circulus describatur, per p transibit & q , & fungetur in planisphærio æquinoctialis officio. Arcus porro

Aq , est loci latitudo: at zn poli altitudo supra horizontem. Similiter si indicem ostensorem ué qui pro uerticali mobili positus est, in situ posueris no , numerus partim inter n & x , ipsam quoque ostendet poli altitudinem


nem supra horizontem, Od uerò latitudinem. Non sunt hæc ad operandum difficilia: ea porrò quæ sumuntur ad inuentionem quæsi per pauca sunt, & in promptu omnibus, nempe lucente Sole, ipsius altitudinem supra horizontem deprehēdi posse, atq; umbræ gnomonis curriculum in plano horizonti æquidistante. Quæ inueniuntur plura, scituq; dignissima, Astronomiæ & Cosmographiæ fundamenta.

Nocturno tempore altitudinem poli supra horizontem inuenire. Cap. 17.


SI stella aliqua cognitæ declinationis in meridiano reperta fuerit, id est in maxima aut minima altitudine, poteris ex ea altitudinem poli non aliter, quàm per radios Solis inuenire. Si non, duarum stellarum cognitarum quæ in diuersis uerticalibus constitutæ sint, altitudines capiantur, & in astrifero globo quo Astronomi utuntur, super eisdem stellis tanquam polis cum complementis ipsarum altitudinem duo circuli describantur, quorum sectiones duæ erūt, & quia in altera earum erit uerticale punctum loci in quo obseruatio fit, utra earum accipienda sit, ex stellarum conuersione cognosces, quemadmodum superius in capite 14. de Sole diximus. Quare distantia ipsius uerticalis puncti ab æquinoctiali, quæ quidem altitudini poli æqualis existit, cognita ueniet.

De Instrumento, quo utraq; Solis distantia à meridiano per æquinoctialem uidelicet & per horizontem inuenitur, & de umbrarum ratione ad gnomonem. Cap. 18.

Solaribus horologijs rarò utuntur nautæ, propterea quòd nauigando non diu permanent sub una poli mundi eleuatione. Scæpius uerò Solem obseruant, ut cognoscant, in quonam uerticali siue Azimuth sit constitutus: idq; sola deprehendunt æstimatione nautici instrumenti ad miniculo, non ex radio Solis, neque ex umbris gnomonum. Quare non erit inutile Solare construere horologium, quo utraq; Solis distantia à meridiano, per æquinoctialem uidelicet & horizontem deprehendatur. Horizontalis enim horologi circulo in horaria spatia (ut solet) diuiso, super a meridiei puncto, ad eandem mensuram circulus unus describatur, & in 32. æquales partes diuidatur, ductis ex centro lineis ad sectionum puncta: eritq; huiusmodi circulus pro eo nautico instrumento, quod Hispani acum appellant. Deinde super ipso a stylus c d, erigatur ad rectos angulos super horologi plano, tanta proceritatis ut filum quod centro b, & uerticali d innecti debet, efficiat cum a b ad punctum b, angulum altitudinis poli in data regione. His enim ita



clivatio ad partes occulti poli inuenitur. Præterea semel æquales, si à diuersa, quando uidelicet tanta fuerit Solis altitudo supra horizontem, quanta ipsius declinatio ad manifestum polum. Ponamus enim meridianum a b c, æquinoctialis semicirculum e c : horizontis uerò d f polum manifestum a Zenith b, Solem in g constitutum in eadem mundi parte esse in




qua Zenith, & ante meridiem, aut post. Veniat autem per Solem circulus declinationis a i, altitudinis uerò b k: duo igitur arcus a g & b g, iuncti semicirculo sunt minores, & id circo in triangulo a g b exterior angulus g b d, interiore b a g maior erit. Et proinde d k Solis distantia à meridiano per horizontem maior erit quàm e i, distantia ipsius per æquinoctialem. Idem concludes, eadem parte, si Sol in æquinoctiali circulo constitutus fuerit. Porro eisdem circulis descriptis, ponamus Solem ad partes occulti poli declinare, & arcum g k altitudinis, arcui g i declinationis æqualem esse. Duo igitur arcus b g & a g, iuncti uno semicirculo sunt æquales: quapropter exterior angulus e b g, æqualis erit interiori b a g, in eodem triangulo a g b, & proinde distantia d k per horizontem, distantia e i per æquinoctialem æqualis erit. Sed ponamus arcum g k, altitudinis Solis minorem esse g i, declinationis arcu. Igitur duo arcus b g & a g, iuncti uno semicirculo sunt maiores: quare exterior angulus mi-

nor

paratis, si ipsum instrumentum in plano aliquo posueris horizonti æquidistante: recta præterea a b in meridiani situ posita fuerit, styli c d umbra in circulo cuius centrum est a Solis Azimuth, fili uerò umbra in horologio, horam diei indicabit.


Putant autem nauæ distantias Solis à meridiano per horizontem, & per æquinoctialem computatas, æquales inter se semper esse, falluntur tamen: quia semel tantum sunt æquales, si ab eadem parte meridiani computentur, nēpe quando tanta est Solis altitudo supra horizontem, quanta de

clivatio ad partes occulti poli inuenitur. Præterea semel æquales, si à diuersa, quando uidelicet tanta fuerit Solis altitudo supra horizontem, quanta ipsius declinatio ad manifestum polum. Ponamus enim meridianum a b c, æquinoctialis semicirculum e c : horizontis uerò d f polum manifestum a Zenith b, Solem in g constitutum in eadem mundi parte esse in qua Zenith, & ante meridiem, aut post. Veniat autem per Solem circulus declinationis a i, altitudinis uerò b k: duo igitur arcus a g & b g, iuncti semicirculo sunt minores, & id circo in triangulo a g b exterior angulus g b d, interiore b a g maior erit. Et proinde d k Solis distantia à meridiano per horizontem maior erit quàm e i, distantia ipsius per æquinoctialem. Idem concludes, eadem parte, si Sol in æquinoctiali circulo constitutus fuerit.




polum manifestum a.

Igitur sphaerici trianguli a g b duo latera a g & b g, aequalia erunt inter se: quapropter duo anguli g b a & b a g, aequales inuicem erunt, et proinde horizontis arcus f k, quo Sol ab angulo a b est mediae noctis, arcui aequinoctialis e i quo a meridiano in oppositas partes distat, aequalis erit.



Porrò si has per horizontem & per aequinoctialem distantias inter se cõferre libuerit, quando Sol est in exortu, aut occasu, facile erit hoc cognoscere in subiecta figura. Sol enim declinationem habens ad partes manifesti poli, in puncto l ponatur horizontis, in exortu uidelicet, aut in occasu. Arcus igitur b l quadrans erit, sed a l quadrante minor: quare duo arcus b l & a l, iuncti uno semicirculo minores sunt. At in puncto m horizontis, quando declinat ad partes alterius poli, duo arcus b m & a m, iuncti uno semicirculo maiores sunt. Igitur angulus d b l, distantiae per horizontem maior erit angulo b a l, distantiae per aequinoctialem ad partes puncti meridiei. Et proinde angulus l b a, reliqua distantiae per horizontem, minor erit angulo l a f, distantiae per aequinoctialem ad partes anguli mediae noctis. Contrarium huius accidit, quando Sol est m: ceterum si ponatur in puncto n, ortus aut occasus aequinoctialis, aequales inuicem erunt ipsae distantiae e n & d n: sunt enim quadrantes.



Illud uerò hoc in loco de ratione umbrarum ad gnomonem ostendemus, quod superius commemorauimus, has tres nempe longitudes, umbram rectam, etiam gnomonem, & umbram uersam, proportionales esse: sicut enim recta umbra ad suum gnomonem, sic gnomon quicumque ad suam uersam umbram,

bram. Esto enim bd , recta linea in superficie horizonti æquidistante, recta ab sit gnomon, perpendicularis existens ad idem planum, proiecta ab eo umbra bc , præterea esto de umbra uersa in muri superficie, qui rectus



existat ad horizontis superficiem, recta uero dc sit gnomon ipsam proiciens: radius Solis sit ae , siue gnomones ab & dc sint æquales, siue inæquales, nihil enim refert. Aio ab , ad bc & de , ad dc in eadem esse ratione. Æquiangula sunt enim duo triangula abc & cde : igitur latera habent proportionalia, que circum æquales angulos, sicut ab ad bc , sit de ad dc per 4. propositionem 6. Euclid. Quanquam uero non eodem radio ae sed differentibus, in eodem temporis momento umbræ distinguantur, eadem nihilominus habebitur demonstratio, propter triangulorum similitudinem. Nautæ uero nostri temporis


paruam umbrarum cognitionem habent, nec ex eis distantiam uerticalem puncti ab æquinoctiali eliciunt. Prisci uero Mathematici (ut apud Vitruuium 9. libro) proportionem duntaxat umbrarum meridianarum ad gnomones tempore æquinoctij, horizontum notabant obliquitates. Cognita enim proportionem gnomonis ab , ad umbram bc latus ac , rectum angulum subtendens, cognitum erit per 47. propositionem primi libri Euclidis. At sicut ac ad bc , sic sinus totus ad sinum rectum anguli bac : igitur per commune documentum numerorum proportionalium ipse sinus rectus anguli bac innotescet, & per tabulam sinus recti arcus eiusdem anguli patefiet, qui distantia est Solis à uerticali puncto: & idcirco loci latitudo cognita erit. Per tabulam uero Georgij Purbachij Geometrici quadrati idem inuenies sine extractione radicis quadratæ, hoc uidelicet modo. Si umbra minor est gnomone, partes quæ in ea sunt per 1200. multiplicabis, productam diuides per numerum partium gnomonis: cum quotiente uero prædictam tabulam ingrediaris, & magnitudinem inuenies arcus anguli bac . Exemplum, ratio gnomonis ad suam umbram rectam æquinoctij tempore in meridie est sicut 9. ad 8. Romæ, ut ait Vitruuius: multiplicabimus igitur 8. in 1200. productum uero diuidemus per 9. & uenient 1066. & duæ tertiæ, cum quibus elicio ex ipsa tabula Gr. 41. min. 38. latitudinis urbis Romæ, quam quidem Ioannes de Montereio ex altitudine meridiana, & declinatione Solis, inuenit Gr. 42. min. 4. aut 8. Sed si recta umbra maior fuerit gnomone, multiplicabis gnomonis partes in 1200. productum uero diuides per bc , & cum quotiente eliciemus ex eadem tabula arcum anguli acb , altitudinis Solis supra horizontem: igitur distantia à uerticali puncto cognita erit. Quando

autem

autem umbra par fuerit gnomoni, tanta erit altitudo Solis supra horizon-
tem, quanta distantia ipsius à uerticali puncto, graduum nempe 45.

Præterea annotatione dignum censemus, receptum esse à Geometris
radios Solis apud terram parallelos apparere, similiter & gnomonum
umbras: cæterum non quosuis, sed eos tantum qui longissimè à terra cõ-
currunt. Oppositum tamen putant Georgius Valla, Iacobus Ziegler-
us cum Plinio; nam eos radios qui uel à gnomonibus proijciunt um-
bras, uel per foramina tabellarum dioptrę Astrolabiij ingrediuntur, non
solum parallelos uideri (aiunt) sed esse: umbras quoq; gnomonum uerè
æquidistantes esse. Et idcirco non erit alienum à præsentis instituto mem-
bratim isthæc tractare, examinareq;. Aduertendum igitur est quòd in nu-
meri radij solares paralleli ad terram mittuntur, & quantouis interuallo
in terrena superficie à se inuicem distantes. Quoniam enim qualium par-
tium in diametro Solis sunt quinque & dimidium, talium semidiameter
terrę una duntaxat est. Si itaq; duæ lineæ parallelæ ipsam terram comple-
ctentes ad Solem usque ductæ fuerint, intra ambitum partis illuminatæ
neutra earum corpus solare continget, sed secabit potius. Constat autem
ex perspectiua lumē Solis per rectas lineas luminosas, quas radios appella-
nt diffundi, & idcirco dubium non est innumeros radios à Sole ad ter-
ram dimissos parallelos esse. Innumeri etiam solares radij in terrę super-
ficie, & prope terram concurrunt. Ductis enim à quouis terrenę superfi-
ciei puncto duabus lineis rectis Solem contingentibus ad diuersas par-
tes, quotquot inter has rectę lineę ab eodem puncto uersus Solem ductę
fuerint, solare corpus secabunt, per quas quidem lumen Solis in idem co-
incidentię punctum deferri palam est. At quia Geometrę radios Solis
non simpliciter parallelos dixerūt, sed apud terram: patet igitur eos neq;
illorum qui uerè sunt paralleli, neque horum qui apud terram concur-
rūt meminisse. Quos igitur radios apud terram parallelos apparere sup-
posuerunt, non erit difficile intelligere. Constat enim ex perspectiua à se-
gmento Solis nobis obiecto cum Solarem altitudinem Astrolabijs ob-
seruamus, dimissos radios ad obiectum foramen tabellarum dioptrę, a-
liquanto antè coincidere in formam mucronis: deinde uerò à congressu
inuerso turbine obiectum foramen permeantes, ampliore base lucere, at-
que ita radius centri idemq; conorum axis solaris altitudinis efficitur in-
dagator. Et quoniam ad differentes terrę partes fiunt coni radiorum So-
lis, atq; axes: patet igitur à differentibus Solis partibus ad differentes ter-
rę partes radios trāsmitti, solaris altitudinis indagatores, sed qui ad cõ-
mune unum coincidentię punctum concurrunt, quod centrum Solis ex-
istit, hoc autem primum ostendere uoluimus. Eos item radios qui à gno-
monibus iaciunt umbras longissimè à terra, concurrere ad hūc modum
osten-

ostendemus. Centrum terre sit a , Solis uero b , connectaturque recta linea a b , & per eam planum agatur solare corpus atque terrenum secans: communes igitur sectiones huius concepti plani & corporis Solis atque terre circuli maximi erunt per primam & sextam primi libri Theodosij, qui sint cde & fgh . Extremi autem radij solares terram illuminantes sint ci & di , quos quidem necesse est utrunque corpus Solis & terre contingere, per ea que Aristarchus, Allacen, & quamplures alij demonstrarunt. Terra enim non solum radijs illis qui à centro proficiscuntur illuminatur à Sole, sed ijs etiam qui à circumferentia mittuntur. Contingant itaque ipsi radij ci & di , Solare corpus in c atque d , terrenum uero in f & g , recta autem ab , cum fuerit extensa cum eisdem concurret in i : illuminabitur igitur terra secundum fgh , maximi circuli segmentum. A puncto autem quouis k inter a & i , recta linea ducatur circulum Solis cde contingens in puncto l ante c : non enim contingere potest supra, ne accidat impossibile contra ultimam communem sententiam, solas duas rectas lineas superficiem non concludere, circulum uero terre secet kl in m . Quapropter concurret ipsa kl cum ci , recta linea ipsos Solis & terre circulos tangente, ante ipsum punctum c apud Solem. Et eadem arte ostendes à quolibet alio puncto præter k quod inter a & i fuerit, rectam lineam ductam quæ ipsum maximum Solis circulum contingat, cum eisdem ci & kl , apud Solem concurrere. A puncto autem o , quod prope terram existit in recta linea ml , recta ducatur linea usque ad centrum terreni globi, quæ circulum fgh in n puncto secet, & ipsum n locum quendam esse intelligemus in terrena superficie, in quo Sol eleuatus cernitur supra horizontem, rectam uero no gnomonem, per cuius uerticem o radius Solis ueniat lo , umbram distinguens mn , in terrena superficie. Angulus itaque mon , aut ei contra positus quem no , in rectam producta efficit cum ipso radio lo , angulum subtendet distantie Solis à uertice loci n . Iis autem qui fuerit ad h , radius Solis bh , in centrum terre ad perpendicularum incidens, in nullas horizontis partes umbras proieciat, sed sub gnomonum pedibus occultas. Concurret igitur ipse perpendicularis radius bh , cum radio lo , in puncto k sub terre centro, non apud Solem. Idemque fieri intelligatur, & eadem umbrarum rationes erunt, in omnibus locis qui æqualibus interuallis ipsi hn , aut hm distiterint à loco h . Hoc enim facile concipies, si à puncto l rectam lineam adduxeris lp , quæ rectam bk ad rectos angulos secet in puncto r , rectangulumque triangulum kr , manente kr circumduci intellexeris. Ea enim arte conus quidam descriptus erit, cuius axis erit kr & triangulum ab axe erit kpl , basis uero circulus cuius diameter lp , & semicircumferentia qp . Huius conus pars alter conus erit basim habens in terreno globo circulum, cuius diameter est recta ms , ad rectos



rectos angulos
 secans rectam a
 h, terre semidia
 metrum, semi-
 circumferentia
 uerò m t s. Et id
 circo quotquot
 rectæ lineæ du-
 ctæ fuerint à co
 ni uertice k, ad
 circumferentiã
 l q p. Solare cor
 pus contingens
 in punctis eius-
 dem circumfe-
 rentiæ, sed glo-
 bum terrenum
 secabunt in pũ-
 ctis circumferẽ
 tis m t s. Conne-
 ctantur autem in
 Sole ipsa conta-
 ctuum puncta
 cum eius cẽtro,
 & constituta e-
 runt triangula
 equilatera & æ-
 quiãgula rectã-
 gulo triangulo
 k b l, per octauã
 propositionem
 primi Euclidis
 omniumq̃ com-
 mune latus erit
 bk, reliquorum
 uerò laterum q̃
 æqualia sunt ra-
 dio k l, partes
 abscondantur:
 rectæ k o equas
 R les,


les, & ab earū terminis ad punctū a, rectæ ducantur lineæ. Triangula itaq̃ hac arte cōstituta erūt ipsi triāgulo a k o, æquilatera atq̃ æquiāgula. Et p̃pterea in omnibus locis positus in semicirculo m t s, solares radij qui gnomonum umbras distinguūt, æquales distantias Solis à uerticalibus com- monstrabunt, & concurrent ad k, commune conincidentiæ punctū, quod etiam reliquis locis alterius semicirculi accidere necesse est. Sic igitur patet quod solares radij umbras determinantes in illis locis quorum uertices in uno atq̃ eodem circulo maximo per centrum Solis ueniente, uel ante ipsum Solem, uel post eum positi fuerint, ad Solis partes concurrent, non autem in ipso Sole. Sed in quibus ipsa uerticalia puncta æqualibus circumferentijs distiterint ab ipso Sole, sub centro terræ coincident. Hinc fieri necesse est, ut cum radio quocunq̃ qui umbram distinguit, innumeralij radij concurrant apud Solem, & innumeri sub centro terræ. Proinde qui neq̃ primi generis sunt, neq̃ secundi, quoniam in uno plano non sunt, neq̃ paralleli sunt, neq̃ concurrunt.

Ipsos autem Solis radios apud terram parallelos apparere, demonstratum inuenimus à Vitellione, & in libro de Cōpositione diuersorum speculorum incerti authoris. Id ipsum nos tamen multo exactius ostendemus in hunc modum. Duo solares radij æqualesq̃ a b & a c, ad superficiem terræ uenientes in puncto a concurrant, siue in Sole, siue prope Solem, siue sub centro terræ, quorum æquales partes b d & c e apud terram, insensibilis sint quantitatis respectu longitudinis eorundem radiorum a b & a c, & connectantur b c & d e. Dux igitur rectæ lineæ b c & d e, æquidistantes erunt, per secundam propositionem sextilibri Euclidis: & idcirco equiangula erunt atq̃ similia duo triangula a b c & a d e. Quapropter sicut a b ad a d, sic b c ad d e, & per conuersionem rationis sicut a b ad b d, sic b c ad excessum quo ipsa eadem b c, superat rectam d e. At qui imperceptibilis quantitatis est ipsa b d, si conferatur cum a b uel a d: igitur imperceptibilis erit quantitatis differentia rectarum b c & d e, si cum utrauis earum conferatur. Æquales itaque apparent b c & d e, & quia sunt æquidistantes: dux igitur b d & c e, quæ æquales positæ sunt, æquidistantes apparebunt. Rectæ enim lineæ æquidistantes annuere & quasi concurrere uidentur, quando earum interuallum minui uidet̃, magisque sibi inuicem uidet̃ur appropinquare: quemadmodum ostensum est ab Euclid. 6. propositione Perspectiuæ, & à Vitellione libro quarto. Et idcirco quando equalia apparuerint concurrentium linearum interualla, neq̃ annuere, neq̃ abnuere uidebuntur ipsæ concurrentes lineæ, & omnino




mnino parallelę apparebunt. Et propterea bd & ce , rectę lineę apud terram æquidistantes uidebuntur. Nihil autem refert siue ipsas bc & de , pro interuallis sumas rectarum bd & ce , siue perpendiculares ab earum terminis ductas. Concludes etiam si uoles per 33. propositionem primi Euclidis ueluti Vitellio, & in ipso Speculorum libro.

Idem aliter experimento probatur in eodem libro. Radius enim ab , in Astrolabio cuius centrum est b , altitudinem Solis demonstrat cd , horizontis linea bd in rectum producat, & in eodem plano in quo est ipsa Astrolabij facies, aliud Astrolabium suspendatur, centrum e habens in eadem recta linea. Itaq; radio Solis ef per e centrum ueniente, in eodem instanti altitudinis arcus gk , equalis ipsi cd apparebit: anguli igitur abd & feg equales. Quapropter duo radij ab & ef , paralleli apparebunt



per 28. propositionem primi libri Euclid. quod erat demonstrandum. Ceterum hanc posteriorem ostensionem non probamus. Concurrant enim ipsi duo radij in puncto l Solis centro, & sumantur radij bl , duę æquales partes lm & ln , & a punctis m & n ipsi rectę be , duę excitent æquidistantes lineę mo et np . Dupla igitur erit nl ipsius ml , & idcirco ppter similitudinę triangulorū lnp

& lmo dupla erit np ipsius mo , & propterea inæquales apparebunt: non igitur uidebuntur æquidistare ipsę nm & po , productis tamen np & mo , usque ad q & r angulus lpq , æqualis reperietur per Astrolabium angulo lnp , & angulus lor angulo lmo , propter insensibilem differentiam: æquales sunt enim anguli lnp & lmo angulo abd , anguli etiam lor & lpq , æquales ipsi feg . Sed neq; si duę rectę lineę uisę fuerint æquidistantes, coalterni anguli, aut exterior interiori, ob id ipsum æquales reperti erunt per Astrolabium. In triangulo enim equilatero longissimorumq; laterum abc , æquales sumantur partes bd & ce , imperceptibilis tamen quantitatis, si cum ipsis ab & ac conferantur, & connectatur de . Differentia igitur duarum rectarum bc & de imperceptibilis erit, si cum utrauis earum conferatur, & idcirco æquales apparebunt eadem bc & de , rectę lineę, & quia sunt æquidistantes: duas igitur bd & ce , æquidistantes apparere, quemadmodum in prima figura concludes. Constat tamen quod producta bc ad h , & Astrolabij centro posito tum




ad b tum ad c, multo maior inuentus erit exterior angulus a c h, ipso interiore a b c duplus enim est ad eum. Quare non propterea quòd radij Solares æquidistantes apparent, æquos angulos efficere uidentur in centro Astrolabij, exteriorem interiori cum horizontis linea, neq; e contrario. quia huiusmodi anguli æquales reperiuntur per Astrolabium, ipsi solares radij paralleli apparebunt. Propterea uerò anguli æquales apparēt in Astrolabijs aut Sciotheris instrumentis, tametsi inæquales sint: quoniam angulus quem ijdem radij uel in Sole uel prope Solem efficiunt, quo quidem exterior interiore superat, propter sui paruitatem imperceptibilis est. Quanquam uerò Erathostenes supposuerit radios Solis æquidistantes, & idcirco coalternos angulos ad gnomonis uerticem, & ad centrum terræ, æquales esse conluserit, in obseruatione illa quam in Alexandria fecit, ad inueniendum quantum esset totus terreni globi circuitus secundum maximum circulum, nihilominus uera est demonstratio nostra, ex qua colligitur radios Solis in ipsa Erathostenis obseruatione sub centro terræ coincidere, angulum uerò factum ad gnomonis uerticem coalterno qui ad centrū terræ quarta circiter parte unius gradus minorem esse, & proinde arcus ipsius anguli qui in centro terræ, graduum erit septem cum m̄.27. Quare si inter Syenem & Alexandriam quinque millia stadia sunt: in toto igitur terreni globi circuitu stadia erunt duntaxat 241610, non 250000. Sit enim meridies ad unguem ijs qui sunt in Syene, & Alexandria: hæc enim duo loca sub uno atque eodem meridiano posita sunt, communes uerò sectiones ipsius meridiani & solaris corporis, nec non & terreni, circuli sit a b c & d e f, centrum Solis g: terræ uerò h & connectatur g h. Sit q; in Syene gnomon d i, rectus ad horizontem, uerticale punctum a. Sit Alexandria ubi est k, agatur q; recta linea per h & k, usq; ad meridianum ubi est punctum l, quod supra uerticem est: gnomon uerò ad horizontem rectus k m. Ex magnitudine itaq; anguli d h k, concluditur ratio similium arcuum d k, a l ad suos circulos: ipsius uerò anguli magnitudo ex binis radijs solaribus deprehenditur, quorum alter qui est g i à centro Solis missus unam rectam lineam efficit cum gnomone d i, ac terræ semidiametro d h: incidit enim ad perpendicularum, & propterea nullam admittit umbram in eodem gnomon meridiano tempore. Alter Solis radius est qui ad Alexandriam missus per punctum m transit, quod est gnomonis fastigium, umbram q; determinat k n, in cavitare hemicycli, solare q; corpus contigit in puncto b, cum recta uerò g h concurrat in puncto r. Concurrere enim

neceffe

setur: propterea quod angulus $h g m$, diuersitatis aspectus Solis, qui ipso-
rum duorum angulorum differentia est, in eo situ insensibilis quantitatis
est. At uerò idem exterior angulus $g m l$, angulum superat $b m l$ angulo g
 $m b$: angulus igitur $g h m$, eodem $b m l$ maior erit ipsa differentia $g m b$.
Æqualis est autem angulus $k m n$ contrapósito $b m l$, angulus itaque $g h$
 m angulum $k m n$, ipsa eadem differentia superabit, quæ est angulus $g m$
 b . Atqui ipse angulus $k m n$, quinquagesimam sui circuli partem subten-
dere repertus fuit ab Erathostene, id est Gr. 7. \bar{m} . 12. angulus uerò $g m b$,
quarta circiter pars unius gradus est, per ea quæ Ptol. in quinto libro ma-
gnæ compositionis demonstrauit, quod etiam statim concludere poteris
in triangulo rectangulo $b g m$, ex ratione $b g$ ad $g m$ cognita, nempe
sicut 5. cum semisse, ad 1210. Et idcirco ipse idem angulus $g h m$, angu-
lum superat $k m n$, ipsa quarta parte unius gradus, & proinde gradus se-
ptem continebit idem angulus $g h m$, cum \bar{m} . 27. totq̄ erunt in arcu $d k$,
siue in $a l$. Et quia ut Erathost. ait ipsa distantia $d k$, quinque millium est sta-
diorum: erunt igitur in toto terreno circuitu stadia 241610. quod erato-
stendendum. At si non ex umbra gnomonis, sed ex radio Solis per fora-
mina tabellarum dioptræ Astrolabij, aut quadrantis ingrediente distan-
tiam uerticis à Sole Erathost. explorasset, maiorem fateor reperisset hu-
iusmodi distantiam ipsa quinquagesima sui circuli parte, frustra tamen
postulasset ad suam demonstrationem dimissos radios à differentibus
partibus Solis parallelos esse, à centro enim ipsius ueniunt eiusmodi ra-
dijs, ex quibus in Astrolabijs altitudinem Solis deprehendimus, nō à dif-
ferentibus partibus. Deducantur autem à centro terræ duæ rectæ lineæ
Solem contingentes in punctis o & p , terram uerò secantes in s & t : angu-
lus igitur $p h o$, diametri Solis uisualis dimidium circiter unius gradus
continebit: & idcirco in toto terræ spatio $s t$, gnomones meridiano tem-
pore sine umbris uidebuntur, & ob eam causam Erathostenem dixisse
puto, Cleomede referēte, Sole in Syene ad perpendicularum posito, immu-
nes esse gnomones ab umbra, ad tercenta stadia. Ex his etiam palam est,
altitudinem Solis per Astrolabium deprehensam, ea minorem esse quæ
ex ratione umbræ ad suum gnomonem concluditur, tantam uerò esse is-
psarum altitudinum differentiam, quantum est id quod relinquitur, de-
tracta diuersitate aspectus Solis à semidiametro eiusdem uisuali. Cuius
rei quidem miror Ptol. minimè nos admonuisse, cum in libro secundo
magnæ compositionis astrorum ex ratione umbræ ad gnomonem, So-
lis altitudinem inuenire docuit.


Nunc uerò post tractationem de radijs, gnomonum umbras in ter-
reni globi superficie proiectas ostendemus parallelas non esse, sed uide-
ri: propositis enim duabus umbris duorum gnomonum ad perpendicu-
lum

lum positorem, si radij solares ipsas umbras distinguentes primi generis sunt, hoc est, si uerticalia puncta gnomonum in uno sunt plano maximi cuiusdam circuli per centrum Solis uenientis, nec concurrēt ipsorum gnomonum umbræ, neq; parallelæ erunt, sed fiet ex eis in longitudinem productis una duntaxat linea circularisq; non duæ. At uerò si radij solares propositas umbras distinguentes secundi generis fuerint, eas concurrere ostendemus, parallelas tamen apparere. Sint enim ad perpendicularum positi super terreni globi superficie duo gnomones æquales ab, cd , quorum uerticalia puncta æqualibus distent intervallis à Sole, radij solares umbras distinguentes sint ae, cf , proiectæ uerò umbræ in terreni globi superficie be, df . Dico ipsas umbras be, df , ulterius productas in utraq;



que partes concurrere, sed tamen parallelas apparere. Quoniam enim radij ae, cf secundi generis sunt: in planis igitur erunt maximorum circulorum per uerticalia puncta gnomonum, & centrum solaris corporis, & centrum terre uenientiū: quapropter umbræ be, df in communibus erunt sectionibus eorundem planorum in globo terræ: & idcirco ipsæ umbræ be

df , arcus erunt maximorum circulorum terreni globi per primam propositionem atque sextam primi libri Theod. Et proinde si eadem umbræ be, df in continuum producantur, ad utrasque partes concurrent, quod in primis ostendendum erat. Cæterum quod parallelæ appareant, in hunc modum demonstrabimus. Quoniam enim gnomonum umbræ & earum intervalla cum amplitudine superficie globi terreni collata rectæ apparent lineæ, & in plana superficie existentes: sumantur itaq; ipse eb & df , pro rectis lineis, & connectantur bd, ef & ac . At æquales sunt gnomones ab, cd per hypothèsim, & producti concurrunt in centro terræ: igitur ob angulorum æqualitatem, & similitudinem triangulorum, communem angulum habentium in ipso centro terræ, recta ac basis unius rectam bd , basim alterius insensibiliter superabit: quemadmodum de solaribus radijs superius demonstrauius. In duobus autem triangu-




lis ae, cf, d , duo anguli abe, cdf æquales sunt ad inuicem: duo præterea anguli bae, dcf , his contraposti qui æquales etiam sunt: igitur reliqua ipsorum triangulorum latera, alterum alteri cum reliquis angulis æqualia erunt per 26. propositionem primi libri Euclidis. Et proinde radij ae, cf æquales sunt, qui ulterius producti fuerint, sub centro terræ con-

rae concurrent in cuiusdam conii uertice, uelut superius fuit ostensum. Ob angulorum igitur aequalitatem & similitudinem triangulorum communem habentium angulum ad idem punctum, uerticem ipsius conii, recta a c basis unius insensibiliter superabit rectam e f basim alterius: aequales igitur apparebunt ipsae b d, e f per communem sententiam: insensibili enim differentia a recta a c superantur. Connectatur autem d e, & per 8. propositionem, & 27. primi libri Euclidis, ipsas e b, f d ostendes parallelas apparere. Melius tamen meo iudicio id ex eo inferes, quod ipsae aequales rectae lineae e b & f d, paribus uideantur distare interuallis, nempe e f & b d, quemadmodum superius de radijs Solis conclusimus.

Et non solum gnomonum umbrae quae in connexa superficie terrae mi globi extensa sunt: sed etiam quae in una plana superficie iaciuntur, parallelae uidebuntur, si modo ipsi gnomones a ratione perpendiculari parum distiterint. Quoniam enim in rectam lineam producti in centro terrae coincidunt: non potest igitur uterque eorum ad unum idemque planum ad rectos angulos esse. Repetatur itaque praecedens figura, & ponamus gnomonem a b, ad rectos angulos super superficie aequidistante horizon-
 ti locis, gnomonem uero c d, eidem plano incumbere, sed tamen a rectitudine insensibili differentia declinare, item paribus in mundo interuallis eorundem gnomorum uertices a Sole distare. Recta igitur c d usque ad centrum terrae extensa maior erit ipsa a b, ad idem centrum perducta, insensibili tamen differentia: rectae autem a b & c d aequales positae sunt: duae igitur rectae lineae a e & b d pro parallelis habebuntur, per 2. propositionem 6. Euclidis. Iam igitur in similibus triangulis quemadmodum de radijs solaribus ratiocinati sumus, rectam a c concludemus in sensibili differentia super re rectam b d. In duobus porro triangulis a b e & c d f: quoniam anguli ad b & d, puncta propter insensibilem declinationem gnomonis c d, a rectitudine aequales supponuntur: duo item anguli b a e & d c f, is contra positi qui pares distantias subtendunt inter uertices & Solem, aequales sunt, ipsi etiam gnomones a b & c d, aequales positi sunt: reliqua igitur latera eorundem triangulorum reliquis lateribus aequalia erunt, alterum alteri per 26. propositionem primi libri Euclidis: & idcirco duo radii a e & c f aequales erunt. At hos sub centro terrae concurrere, ad uerticem cuiusdam conii basim habentis in solaris corporis superficie superius ostensum fuit: igitur propter interuallorum immensam longitudinem, ipsi a e & c f cum eisdem collati insensibilis quantitatis existimabunt: & idcirco in similibus triangulis quorum basis a c & e f, rectam a c concludemus sicut antea in sensibili differentia superare rectam e f. Ostensum porro fuit ipsam quoque rectam b d, insensibiliter superare: duae igitur b d & e f, pro equalibus habebuntur. Et idcirco duo b e & d f, quonia pa-
 ribus

ribus distant interuallis parallelæ apparebunt. Vel si mauis id inferre ex elementis Geometricis primi libri Euclidis, connectatur $b f$ aut $e d$: & quoniam $b e$ & $d f$ æquales ostense sunt: per 8. igitur propositionem & 27. ipsius primi libri, duas rectas lineas $b e$ & $d f$. parallelas apparere concludes. At concurrere necesse est ad partem $b d$, si in rectum producantur, quod quidem non erit difficile demonstrare. Radius enim $a e$, si ad uerticem usque concepti conii productus intelligatur, maiorem rationem habebit ad $a e$, quam recta $a b$, usque ad centrum terre extensa habet ad ipsam $a b$: & idcirco in duobus illis triangulis quorum communis basis est $a c$, oppositus uerò angulus in uno eorum ad uerticem conii est: in altero autem ad centrum terre, maiorem rationem habebit $a c$, ad eum excessum quo rectam superat $e f$, quam ad eum quo rectam excedit $b d$, per conuersionem rationis & 13. quinti, & proinde minori differentia superabit ipsa eadem $a c$, rectam $e f$ quam rectam $b d$, & propterea maior erit $e f$ quam $b d$. Ex quo quidem statim concludes ipsas $b e$ & $d f$, concurrere ad partem $b d$. Connectatur enim $d e$, & quoniam in duobus triangulis $e f d$ & $e b d$, duo latera $b e$ & $d f$ equalia ostensa sunt: latus autem $d e$ commune est utriusque triangulo, sed basis $e f$ trianguli $e f d$, maior est base $b d$ trianguli $e b d$: angulus igitur $e d f$ ipsius trianguli $e f d$, maior erit angulo $b e d$ trianguli $e b d$, per 25. primi Euclidis. Ad punctum itaque terminum recte $e d$, faciemus cum ipsa $e d$ angulum $d e g$, æqualem ipsi angulo $e d f$, per 23. propositionem ipsius primi libri Euclidis: & idcirco duæ recte lineæ $d f$ & $e g$, parallele erunt per 27. propositionem eiusdem primi libri




Euclidis: & proinde duo anguli $e f d$ & $f e g$, duobus rectis æquales erunt per 29.

Atqui angulus $f e b$, minor est ipso angulo $f e g$: duo igitur anguli $e f d$ & $f e b$, minores erunt duobus rectis, & idcirco ipsæ duæ rectæ lineæ $f d$ & $e b$, concurrent ad partes $b d$, per quintum postulatum,

quod quidem demonstrandum suscepimus. Supposita porro sententia Erathostenis de ambitu terreni globi, & Archimedis demonstratione de circuli de mensione, quando gnomon $c d$ à rectitudine discesserit decima parte unius gradus, id est minutis 6. interuallum $b d$, inter duas umbras $b e$ & $d f$, nomen ferè millia passuum continebit: quando uerò uno dumtaxat minuto à rectitudine declinauerit, erit ipsum interuallum passuum ferè 1500. Angulus enim quem duo gnomones $a b$ & $c d$, in centro terre coincidentes efficiunt, ipsi declinationi gnomonis $c d$ æqualis existit, ipsæque umbrarum distantiam subtendit.

Lemma



Simplex autem ad ostendendum umbras $b e$ & $d f$, concurrere ad partem $b d$, quod maiorem rationem habet recta $a e$, usque ad uerticem concepti conii extensa, ad radius $a e$ quam recta $a b$, usque ad centrum terræ perducta, ad gnomonem $a b$. Hoc autem in subiecta figura ostendemus. Centrum enim terræ sit k , Solis uerò l gnomon $a b$, & connectatur $k l$, quæ in rectum producat ad partem k radius $a e$, in utramque partem productus, Solem contingat in m , & cum



recta $k l$ sub centro terræ coincidat in n , umbræ quæ distinguit $b e$, in plana superficie æquidistante horizonti loci b , & ipsius gnomonis $a b$, longitudo producta intelligatur usque ad k . Dico quod maiorem rationem habet $a n$ ad $a e$, quæ $a k$ ad $a b$. Quoniam enim angulus $b k l$, arcum subtendit complementi altitudinis Solis supra horizontem: acutus igitur est, & reliquus idcirco $b k m$ obtusus erit. A puncto itaque k super $a k$, in plano trianguli $a k n$ recta $k i$, ad rectos angulos excitetur. Igitur propter æqualitatem angulorum & similitudinem triangulorum $a k i$ & $a b e$, sicut est $a k$ ad $a b$, sic erit $a i$ ad $a e$, maior est autem $a n$ ipsa $a i$: maiorem igitur rationem habebit $a n$ ad $a e$, quam ipsa $a i$ ad eandem $a e$: & idcirco maiorem habebit rationem $a n$ ad $a e$, quæ $a k$ ad $a b$, per 12. propositionem quinti libri Euclidis ex Campano, quod erat assumptum. Et in hac quoque figura poteris alio modo ostendere rectam $b d$, minorem esse recta $e f$. Nam sicut est $a b$ ad $b k$, sic $a e$ ad $e i$, atqui $a e$ ad $e i$, maiorem habet rationem, quam $a d$ ad $e n$: igitur $a b$ ad $b k$, maiorem rationem habet quam $a e$ ad $e n$: igitur tota $a k$ ad $b k$, maiorem habebit rationem quam $a n$ ad $e n$. At uerò sicut $a k$ ad $b k$, sic in similibus triangulis $a c$ ad $b d$, & sicut $a n$ ad $e n$, sic in alijs similibus triangulis $a c$ ad $e f$: igitur maiorem rationem habebit $a c$ ad $b d$ quam $e f$, & proinde minor erit $b d$ ipsa $e f$.

Et reliquas quoque umbras quas ceteri radij distinguunt, qui neque primi generis sunt, neque secundi, parallelas non esse, sed uideri, eadem methodo ostendemus. In locis enim a & b , gnomones $a c$ & $b d$, umbras proijciant $a e$ & $b f$, radij uerò $c e$ & $d f$, qui eas distinguunt neque primi generis sint, neque secundi, id est neque existant in plano unius maximæ circuli

culi per uerticalia puncta eorundem locorum, & centrum solaris corporis, atque terreni globi uenientis, nec æquales distãtias à uerticibus ostendant, sed angulus a c e quem radius c e, cum gnomone efficit a c angulo b d f quem radius d f, cum gnomone efficit b d minor sit. Dico ipsas umbras a e & b f, parallelas non esse, sed uideri. Nam quoniam a e maximi circuli terræ segmentum esse, superius ostensum fuit: extendatur igitur ad partem Soli oppositam, & in eodem maximo circulo locus g, intelligatur a cuius uertice tanto interuallo Sol distet, quanto recedit à uertice




locib. Gnomon igitur g h in ipso loco g, umbram proficiat g k in eodem instanti, radius uerò Solis ipsam distinguens umbram, erit h k. At ex his quæ à nobis superius ostensa sunt, ipsos radios d f & h k, secundi generis esse constat: duæ igitur umbræ b f & g k parallelæ apparebunt: sed si in continuum producantur concurrent. Ipsa porrò umbra a e, in maximo circulo est in q̄ g k: concurret igitur cum b f & e i parallela appa-

rebit, quod erat ostendendum. Aduertendum est autem, quòd quæ de umbris gnomonum equalium ostendimus, demonstrari etiam possunt de umbris gnomonum inæqualium: maioris enim gnomonis & minoris umbræ in eadem linea extensæ sunt.

Instrumentum fabricare, quò absque numerorum tabulis cordas, atque sinus datorum arcuum, nec non & rationem equinoctialis ad quemuis equidistantium inuenire possis, & quædam alia. Cap. 19.

IN plana quauis tabula semicirculus describatur à b c, & in nonaginta æquales partes diuidatur. Et super puncto c termino diametri a c, regula quædam uoluatur ipsi diametro a c equalis, cuius ea facies quæ ad punctum c, dirigitur in 60. æquales partes diuisa sit. Igitur cum dati arcus sinum rectum inuenire libuerit, numerum graduum qui in eo fuerit, in semicirculo supputabimus à puncto c in a. Sit exempli gratia finis ubi b. Regulam idcirco traducemus ad ipsum b in situ c f. Nam quot sexagesimæ fuerint in c b, tot habebit sinus rectus dati arcus. Huius demonstratio facilis est. Super puncto enim a interuallo a c, circulus quidam descriptus intelligatur qui sit c f g, & ab ipso centro a recta linea ducatur per b, quæ ipsius concepti circuli circumferentiam attingat in puncto h. Et quoniam angulus a b c, in semicirculo rectus est: recta igitur linea b c, sinus rectus erit arcus ch. At uerò sicut rectus angulus a b c, ad acutum b a c, sic semicirculus a b a ad arcum b c. Item sicut rectus angulus



qui in centro *a*, constitutus fuerit, ad ipsum acutum *b a c*, sic quadrans circuli *c f g* ad arcum *ch*: omnes porro anguli recti & quales inuicem sunt. Igitur sicut semicirculus *a b c*, ad arcum *b c*: sic quadrans circuli *c f g*, ad arcum *ch*. Et idcirco quot semicirculi *a b c*, nonagesimæ in arcu *b c* sunt, tot quadrantis circuli *c f g*, erunt in arcu *ch*. Tot autem supputauimus in semicirculo, quot erant in proposito arcu: igitur inuentus est ea ar-
tedati arcus sinus rectus, quod

erat ostendendum. Concludere etiam poteris duos arcus *c b* & *ch*, & quales esse. Nam sicut circulus ad circulum, sic diameter ad diametrum: quadrans igitur circuli *c f g*, & semicirculus *a b c* æquales erunt. Ostensum est autem semicirculum *a b c* ad arcum *b c*, & quadrantem circuli *c f g*, ad arcum *ch* in eadem esse ratione: igitur sicut semicirculus ad quadrantem, sic *b c* ad *ch* permutatam, & proinde æquales erunt ipsi arcus *c b* & *ch*, quod ostendere uoluimus. Aduertendum est autem, quod hac arte inuenitur sinus rectus dati arcus uno quadrante minoris. Auerò si propositus arcus maior quadrante fuerit, auferendus erit ex 180. & residui sinum rectum inueniemus. Nam una & eadem recta linea detracti & relictæ sinus rectus existit.

Et quoniam semidiameter cuiusuis circuli æquinoctiali æquidistantis sinus rectus est distantia eiusdem à polo mundi uicinior: cum igitur rationem æquinoctialis circuli ad quemuis æquidistantium cognoscere operepretium fuerit, sinum rectum inueniemus illius arcus, quo datus circulus æquinoctiali æquidistans à polo uicinior abest. Nam sicut numerus partium qui in inuento sinu repertus fuerit ad 60. sic se habebit datus æquidistans ad æquinoctialem.

Præterea quoniam eadem est ratio duorum quorumcunque circulorum, & similium partium: quoniam igitur modo gradus circulorum æquinoctiali æquidistantium in gradus maximi circuli sint conuertendi non erit difficile inuenire. Nam diametrum *a c*, unum esse gradum æquinoctialis ponemus: & erit idcirco quælibet ipsius diametri sexagesima minutum unum. Quapropter quot sexagesimæ repertæ fuerint in sinu recto distantia dati paralleli à polo uicinior, id est quod habuerit sexagesimas

gesimas semidiameter dati paralleli, tot minuta unius gradus æquinoctialis gradus unus dati paralleli continebit. Deinde uerò eadem minuta multiplicando in numerum graduum qui in proposito arcu dati paralleli sunt, summam colligemus graduum & minorum maximi circuli qui in ipso arcu dati paralleli sunt.

Et eadem prorsus arte cognosci poterit, quot Italica milliaria in terrena superficie uni gradui respondeant dati circuli æquinoctiali æquidistantis. Ponemus enim (ut supra) diametrum ac , unum esse graduū maximi circuli: & erit idcirco una ipsius sexagesima unum Italicum milliaria, ut sint in uno gradu milliaria 60. ita enim receptum uidemus. Quapropter quot sexagesimæ repertæ fuerint in semidiametro dati paralleli, tot Italica milliaria gradus unus eiusdem paralleli continebit. Quòd si alijs mensuris præter milliaria uti libuerit, diuidenda erit diameter ac , regulæ uero longitudo in eum numerum partium, qui uni gradui maximi circuli secundum datam mensuram respondet: deinde uerò, ut antea, operabimur.

Iam uerò si sinus rectus detur cognitus, sed arcus ille cui respondet ignoretur, numerum sexagesimarum dati sinus recti in regula instrumenti supputabimus, initium sumendo ab ipso c puncto, finem uerò nota aliqua signabimus, & deinde regulam ipsam tam diu circumducemus, donec imposita nota ad semicirculi circumferentiam ueniat. nam arcus inter ipsam notam & punctum c , quot gradus arcus ille qui quærebatur comprehendat, nobis ostendet.

Porro si arcus detur cognitus, sinus uerò uersus ignoret, minor quadrante si fuerit, sinum rectum complementi inuenies, quem quidem auferes ex 60. & sinus uersus dati arcus cognitus relinquetur. Sed si maior quadrante fuerit, illius arcus quo quadrantem superat, sinum rectum inuenies, quem partibus 60. addes & conflabitur numerus partium sinus uersi, qui proposito arcui respondet.

Igitur si sinus uersus detur cognitus, arcus autem cui respondet ignoretur, ipsum sinum uersum auferes à 60. si sexagesimarum numerus qui in eo sunt minor fuerit quàm 60. sinus enim rectus relinquetur, qui complemento quæsiti arcus respondet. Cum igitur arcus ipsius sinus recti modo supra dicto inuentus fuerit, eum auferemus à gradibus 90. & cognitus relinquetur arcus ille qui dato sinui uerso respondet. Sed si datus sinus uersus maior fuerit quàm 60. auferantur ab eo 60. & relinquetur sinus rectus cuiusdam arcus, quo quidem quæsitus arcus quadrantem superat. Inueniatur igitur arcus qui eidem sinui recto respondet, & quadranti adijciatur, arcusque conflabitur, qui quærebatur.

At si arcus fuerit cognitus, corda autem ignoretur, dimidij propositi

arcus sinum rectum inquiremus, quo geminato ipsius propositi arcus corda patefiet.

Sed si corda cognita fuerit, arcus uerò ignoretur, eum inueniemus arcum, cui quidem propositæ cordæ dimidium tanquam sinus rectus respondeat. Quo geminato, arcus qui querebatur, innotescet. Respondet autem una atq; eadem corda duabus circumferentijs, quarum una est semicirculo minor, altera uero maior quæ circulum complet. Regulæ porro longitudinem circuli uel maximi semidiametrum in hoc instrumento in 60. æquales partes secauimus more Ptolemæi. Sed quia recentiores Mathematici complura problemata multo facilius quàm Ptol. absoluunt, sola uidelicet multiplicatione ac diuisione 4. quantitatum proportionalium, quarum una sinus totus semper est: semidiametrũ igitur circuli regulæ uel longitudinem in 100. partes aut mille si diuiseris, citius ipsas multiplicationes ac diuisiones perages.

Datis latitudinibus & longitudinibus, duorum locorum eorum intercapedinem metiri. Cap. 20.

DVobis modis hoc cognosci potest, aut numeris, aut instrumento. Numeris uerò hac arte. Velenim data loca sub uno meridiano posita sunt, uel sub uno parallelo, uel sub diuersis meridianis & parallelis. Si sub uno meridiano, & uel ambo sunt Borealia, uel ambo Australia, sublata minori latitudine à maiori, arcus meridiani qui relictus fuerit, distantia erit uiatoria inter ipsa data loca. Sed si sub eodem meridiano posita sunt, unus tamen Australis est, alter uerò Borealis, ipsas duas latitudines in unam summam colligemus, & distantia uiatoria prodibit nota.


At si sub uno parallelo posita sunt, differunt autem meridianus, corda differentia longitudinis ipsorum locorum in sinum rectum complementi altitudinis poli multiplicetur, productum uerò diuidatur in 60. & ueniet in quotiente numerus partium quem corda arcus circuli maximi per ipsa data loca uenientis continet. Maximi enim circuli semidiametrum 60. equalium partium subiicimus. Corda porro cognita existente arcus ignorari non potest: et idcirco ipse maximi circuli arcus, qui per eadem loca scribitur, cognitus erit. Demonstratio huius facilis est. Nam sicut se habet æquinoctialis semidiameter ad propositi paralleli semidiametrum, sic recta subtendens arcum differentia longitudinis in æquinoctiali, ad rectam subtendentem arcum differentia longitudinis in eodem parallelo, quod quidem per 14. se. Theod. & quartam 6. Euclidis concludes. At sinus rectus complementi altitudinis poli comple-

menti

de Obser. Reg. & Instr. Geom. Lib. II. 143

mentiue declinationis dati paralleli, semidiameter est eiusdem paralleli: igitur si harum quatuor quantitatum proportionalium secundam in tertiam multiplicaueris, productum uero per primam diuiseris, quarta illi co nota prodibit. Et quia una atque eadem recta linea arcum differentie longitudinis in dato parallelo subtendens, arcum etiam subtendit maximi circuli per eadem loca uenientis: idcirco cum ea cognita fuerit in partibus semidiametri maximi circuli, arcus ille cui respondet ignorari non poterit, & proinde distantia uiatoria inter eadem loca patefiet. Petrus Appianus & Stoflerus & quidam alij hoc putant absoluisse, cum gradus differentie longitudinis qui in ipso parallelo inter data loca sunt, in gradus maximi circuli conuerterint, & ipsos denique gradus maximi circuli in milliaria, aut stadia, aut alias quasuis mensuras. At non aduertunt quod eo modo distantiam uiatoriam quæ quidem segmentum maximi circuli esse debet, non inueniunt, sed tantum quot milliaria aut stadia paralleli arcus inter eadem loca comprehendat.


Quando uero duo data loca diuersos habent meridianos, & diuersos parallelos, maiori negotio præsens problema absoluitur. Quidam enim in sphaerico rectanguloq; triangulo datorum locorum intercapedinem perinde metiuntur, atq; in rectilineo sumptis uidelicet radicibus quadratorum duorum laterum rectum angulum ambientium. Alij hoc idem eadem methodo inuestigant, sed exactius, conuerso imprimis uno latere trianguli quod paralleli segmentum existit, in partes maximi circuli. His autem duobus modis sine sensibili errore uti possumus in exiguis distantijs, in magnis uero alia arte utendum erit. Quare Ioannes Vernerus & Ioannes de Montereio ut certissimis numeris locorum distantias inuenirent, multo aliter rem hanc tractarunt. Vernerii modus hic est. Sint duo data loca sub diuersis meridianis $a b c$ & $a d c$ posita, uertex loci à circulo æquinoctiali distantioris sit b , uertex uero loci qui ab ipso æquinoctiali minus recedit, sit d segmentum paralleli loci b inter ipsos meridianos sit $b e$, segmentum uero paralleli loci d inter eosdem meridianos sit $d f$, arcus maximi circuli inter b & d , cuius quantitatem cognoscere uolumus sit $b g d$, & recta subtensa $b d$, rectæ uero $b e$ & $d f$, datorum parallelorum segmenta subtendant: at duæ rectæ $b f$ & $e d$, duos æquales arcus meridianorum inter eosdem parallelos. Et quoniam ipsæ rectæ lineæ $b f$ & $e d$ æquales, cognitos arcus subtendunt: per tabulam igitur de arcu & corda innotescent. Paralleli porrò cogniti sunt, & eorum segmento inter meridianos comprehensa etiam



etiam cognita: duæ idcirco rectæ lineæ $b e$ & $f d$, in partibus qualium æquinoctialis, aut meridiani diameter est 120. arte paulò ante tradita cognitæ erunt. Deinde à punctis b & e , super rectam $f d$ perpēdiculares sint $b h$ & $e i$: recta igitur $b e$ rectæ $i h$ æqualis erit, & recta $b h$ rectæ $e i$ æqualis in parallelo grammo $b e i h$, per 34. primi libri Euclidis. Quare in duobus triangulis rectangulis $b f h$ & $e i d$, duo latera $f h$ & $i d$, equalia erunt, per 47. propositionem eiusdem primilibræ, & communem sententiam si ab æqualibus æqualia auferantur. Igitur utraq; ipsarum $f h$ & $i d$, dimidium erit differentiæ duarum rectarum $d f$ & $b e$. Cognitæ sunt autem ipsæ $d f$ & $b e$: igitur dimidia differentia cognita erit, qua subtracta à recta $f d$ recta $d h$, cognita relinquetur. In rectangulo autem triangulo $b f h$ detracto quadrato rectæ $f h$, quæ iam innotuit ex quadrato rectæ $b f$, quadratum rectæ $b h$, cognitum relinquetur. Similiter quadratum rectæ $d h$, notum existit: igitur in rectangulo triangulo $b d h$, quadratum lateris $b d$, rectum angulum subtendētis, quod quidem per 47. propositionem primilibræ Euclidis, eisdem duobus quadratis æquum est, cognitum erit. & proinde ipsum latus $b d$, ignorari non poterit. Quare per tabulam Ptol. de arcu & corda, $b g d$ maximi circuli segmentum inter data loca comprehensum patefiet, quod erat ostendendum. Cæterum in hac demonstratione, quod præcipuū erat, & imprimis ostendendum, sine quo reliqua constare non possunt, id à Venero prætermisum est. Operæpretium enim erat demonstrare duas rectas lineas $b e$ & $f d$ parallelas esse, quod quidem per 16. propositionem 11. libri Euclidis illico concludes, si modo ostensum fuerit, easdem rectas $b e$ & $f d$, in uno plano positas esse, sed non liquet. Quare ut hoc ipsum demonstremus, centrum sphæræ ponemus k , ipsorum uerò meridianorum communē sectionem rectam $a c$, mundanum axem, & in plano meridiani $a b c$ recta $k l$, rectos angulos efficiat cum ipso axe $a c$, item recta $k m$, in plano meridiani $a d c$: rectos quoq; angulos cum ipsa $a c$, & uerticale pūctum b , uergat ad partes poli a , uerticale uerò d , ad oppositum polum qui est c : cæterum magis recedat b , ab æquinoctialis puncto l quàm d ab m : ita enim modo ponemus. Esto porrò arcus $l n$, equalis ipsi $f l$ aut $d m$, & connectatur $f n$, que rectam $k l$ secet in o , item connectantur $f k$ & $d k$. Quapropter rectilineus angulus $n o k$ rectus erit, rectus etiam est $a k o$: igitur parallelæ sunt duæ rectæ $f n$ & $a k$. In has autem incidit recta $f k$. Quare duo anguli $k f n$, & $a k f$ duobus rectis erunt equalis, per 29. propositionem primilibræ Euclidis. Duo igitur anguli $b f k$ & $a k f$, duobus rectis minores erunt: & idcirco duæ rectæ $b f$, & $a k$ concurrent ad partes $a b$, per quintum postulatum. Similiter demonstrabitur duas rectas $d e$, & $a k$ concurrere ad partes $a c$. Concurrent autem $b f$, & $a k$ in puncto r , dico duas rectas $d e$, & $a k$ in ipso quoque puncto

extrahatur. Cæterum si secundum librum Elementorum Euclidis, consulas, multo breuiori calculo id ipsum problema absolues. Postquam enim rectas lineas $b e$, $f d$ in partes diametri maximi circuli cõuerteris, unam in alteram multiplicabis, producto uerò quadratum addes recte $b f$ aut $e d$. nam collecti radix quadrata ipsa recta erit $b d$: quare arcus $b g d$, per tabulam de arcu & chorda cognitus erit. Demõstratio facillima est. Nam duarum rectarum $f d$ & $b e$, differentia in duas æquales lineas diuisa est $f h$ & $d i$, quibus abiectam intelligas $h i$. Quapropter quod ex ductu totius $d f$, in adiectum fit, unà cum quadrato $f h$ aut $d i$, æquum erit ei quadrato quod ex $d h$, per 6. propositionem ipsius 2. libri Euclidis. In rectangulo uerò triangulo $b h d$, quadratum recte $b d$, æquum est quadratis quæ fiunt ex $d h$ & $b h$, per 47. propositionem primi libri. Quadratum igitur ex $b d$, æquum erit ei quod fit ex $d f$ in $h i$, una cum quadratis ex $f h$ & $b h$. At ipsis duobus quadratis ex $f h$ & $b h$, æquum est quadratum ex $b f$: igitur quadratum ex $b d$, æquum est ei quod fit ex $d f$ in $h i$, siue $b e$, cum quadrato ex $b f$. Et proinde multiplicabis $b f$ in se ipsam, producto uerò addes id quod fit ex $d f$ in $e b$: collecti enim radix quadrata erit recta $b d$.

Illud autem relinquitur inuestigandum, quonam uidelicet pacto distantia uiatoria sit inuenienda, quãdo data loca diuersos habent meridianos, & oppositos parallelos, quod quidem omnium facillimum est. Nam rectam lineam arcum paralleli subtendentem, qui inter datorum locorum meridianos est, in partes diametri maximi circuli cõuertemus, & in se ipsam multiplicabimus, producto uerò addemus quadratum recte subtendentis arcum meridiani inter eosdem parallelos interclusi: collecti enim radix quadrata, ea erit recta linea quæ arcum maximi circuli subtendit inter eadem duo loca. Meridianus loci o sit $a o c$: at loci p in opposito parallelo constituti meridianus sit $a p c$, segmentum paralleli loci o , inter ipsos meridianos sit $o q s$, recta subtensa $o s$. Segmentum paralleli loci p , inter eosdem meridianos sit $p z u$, recta subtensa $p u$, arcus uerò $o u$, inter eosdem parallelos recta subtensa sit $o u$, sphaeræ axis sit recta $a c$, meridianorum communis sectio. Et quoniam ipse axis $a c$, ad plana omnium parallelorum rectus existit, & per eorum centra transit per 12. propositionem primi libri Theodosij: sit igitur punctum t , cẽtrum illius paralleli, qui uergit ad polum a , punctum uerò x , cẽtrum illius qui uergit ad polum c : communes porrò sectiones meridiania $o c$, & eorundem parallelorum usq; ad centra t & x , sint $o t$ & $u x$. Quapropter ipsæ rectæ lineæ $o t$ & $u x$, parallelæ erunt per 16. propositionem 11. Eucl. Et quoniam rectæ lineæ æquas & parallelas coniungentes, æquales sunt & ipsæ, atq; parallelæ, per 33. propositionem libri Euclidis: duæ igitur $o u$ &



et x , æquales sunt & parallelæ. Quando uerò una duarum rectarum parallelarum ad rectos angulos fuerit alicui plano, altera quoque ad rectos angulos erit eidem plano per 8. propositionem 11. libri Euclidis. Rectus autem est axis $a c$, parallelorum planis: igitur recta $o u$, plano paralleli centrum habentis ad punctum x , ad rectos angulos erit. Et idcirco rectilineus angulus $o u p$, rectus erit per 2. definitionem unde similis libri. Quapropter quadratum rectæ $o p$, duobus quadratis ex $o u$ & $u p$, æquum erit, cognita autem sunt ipsa quadrata: igitur quadratum ex $o p$ cognitum erit, & proinde ipsa recta linea cognita, & arcus $o p$, per tabulam Ptolemæi de arcu & chorda cognitus quoque erit, quod erat inueniendum.


Ioannes de Montereio problemate 45. tabulæ primi mobilis ex proportione sinuum in triangulis spheris, datorum locorum intercedentem deprehendit. Quilibet enim ingressus siue lateralis, siue arealis, quatuor numeros proportionales complectitur, quorum maximus qui est sinus totus, eam habet rationem ad sinum rectum arcus numeri transversalis, quam sinus arcus numeri lateralis, ad sinum arcus illius numeri arealis, qui dextrorsum iuxta eundem lateralem collocatur. Quare nil refert siue secundum regulam numerorum proportionalium, numeros multiples atque diuidas, & quotientis arcum ex tabula sinuum rectorum elicias, siue tabulam ipsam primi mobilis ingrediaris. Sint igitur duo loca quorum uertices a & b , in meridianis $c a d$ & $c b d$, latitudinem in æqualium. Cæterum uel ambo Borealia, uel ambo Australia, differentia longitudinis eorum sit arcus æquinoctialis $f g$, polus uerò manifestus c . Igitur



cum differentia longitudinis cognita supponentur, angulus $a c b$, dabitur notus. Item quia latitudines dantur cognitæ, earum complementa $a c$ & $b c$, cognita erunt. Quare in triangulo $a b c$ basis $a b$, locorum intercedens in hunc modum patefiet. A puncto a , latitudinis minoris in meridianum $c b d$, maximi circuli segmentum $a e$, ad rectos angulos ueniat. Igitur sicut sinus totus ad sinum rectum anguli c , differentie longitudinis: sic sinus rectus arcus $a c$, complementi minoris latitudinis ad sinum rectum

arcus ae , & permutatim sicut sinus totus ad sinum rectum ac , complementi latitudinis minoris: sic sinus anguli c , differentiae longitudinis datorum locorum, ad sinum rectum arcus ae . Quapropter arcus ipse ae , notus prodibit in area tabulae, quem quidem inuentum primum appellat. Repertus enim erit iuxta lateralem ac , si transuersalem acceperis ipsam longitudinis differentiam. At iuxta lateralem arcum qui longitudinis est differentia, si transuersalem intellexeris minoris latitudinis complementum. Nam utrouis eorum licebit uti pro transuersali, quanquam ad moneat idem author, duorum numerorum maiorem semper quaerendum esse in fronte tabulae. Quoniam uero sicut sinus totus ad sinum complementi arcus ae , sic sinus complementi arcus ce , ad sinum complementi arcus ac : tertius autem proportionalis terminus ignotus existit, tabulam igitur intrabimus areatim cum complemento inuenti primi, & minori latitudine: complementum enim arcus ce quod est eg , in latere tabulae offendet: igitur subtracto eg ex bg , latitudine maiori notus relinquetur be , quem inuentum secundum agnominat. Quare si ipse numerus in descendentem repertus latere, aequalis inuentus fuerit maiori latitudini, scito inuentum primum distantiam esse uiatoriam inter duo data loca, arcum que deductum ad rectos angulos ex a , in meridianum cbd , incidisse in b , uerticem loci maioris latitudinis, non in e inter b & g . Accidet etiam aliquando ut cadat inter b & c : tunc uero quod in latere tabulae reperitur, maius est latitudine maiori. Quapropter semper minus a maiori auferendum est, ut inuentum secundum relinquatur. At quoniam (utcumque cadat ipse arcus rectos angulos faciens cum cbd , siue supra b , siue infra) sicut se habet sinus totus ad sinum complementi inuenti primi, sic sinus complementi inuenti secundi, ad sinum complementi arcus ab . Quartus uero proportionis terminus ignotus existit: ipsa igitur complementa lateraliter in tabulam mittemus, & in area ipsius iuxta numerum lateralem, complementum eiusdem arcus ab offendemus. Quo quidem ex 90 . gradibus subtracto, nota relinquetur ab , datorum locorum intercapedo, quando longitudinis differentia minor fuerit quadrante. Ita enim authoris praecipuum intelligere oportet. Poteris autem si uis simpliciore methodo uti ad hunc modum. A puncto b latitudinis maioris arcus bh , maximi circuli ad rectos angulos deducatur in ac . Quapropter in triangulo rectangulo sphaericoque bhc , sicut sinus totus ad sinum rectum acuti anguli c , differentiae longitudinis, sic sinus rectus arcus bc , complementi latitudinis maioris ad sinum rectum arcus bh . Intrabimus igitur tabulam lateraliter cum differentia longitudinis, & complemento latitudinis maioris, & in area ipsius tabulae inueniemus arcum bh , quem inuentum primum appellabimus. Et quoniam in eodem triangulo sicut


se ha



se habet sinus totus ad sinum complementi inuenti primi, sic sinus complementi arcus ch , ad sinum complementi bc , tertius uerò proportionis terminus est ignotus, & reliqui tres noti sunt. Ipsam igitur tabulam areatim ingrediemur cum secundo & quarto, & in latere tabulæ tertium reperiemus, quo quidem subtracto ex quadrante arcus igitur ch , notus relinquetur. Ipsum itaq; ch , auferemus ex ac , minoris latitudinis complemento, & relinquetur arcus ah , quem inuentum secundum appellamus. Deniq; in rectangulo sphericò & triangulo abh , cum complementis inuenti primi atq; secundi, lateraliter tabulam

ingrediaris, & inuenies in area ipsius tabulæ complementum arcus ab , q; subtracto ex 90. ipse arcus ab cognitus relinquetur. Ex quibus habes quod si ambo loca, uel Borealia sunt, uel Australia, & longitudinis differentia quadrante minor, datorum locorum intercapedo quadrante minor erit.

Sed ponamus rursus differentiam longitudinis minorem esse quadrante, locum uerò qui uerticem habet ad a , Borealem esse, eum uerò qui ad b Australem, & arcus ak , ad rectos angulos incidat in cb . Igitur tabulam ingrediemur lateraliter cum differenti



tia longitudinis & arcu ac , complementi latitudinis Borealis, uelut author iubet, et in area tabulæ reperietur arcus ak , quem inuentum primum appellat. Cuius inuenti complementum cum complemento arcus ac , id est cū latitudine Boreali, areatim in tabulam mittemus: numerus enim qui in latere tabulæ occurret, qui est kg , latitudini Austrinæ adiectus, quæ est bg , inuentum secundum dicitur. Quare si trianguli rectanguli akb , duorum datorum laterum ak & bk , complementa lateraliter in tabula mittantur, numerus anguli communis ex quadrante deptus, notam relinquet circumferentiam ab , datorum locorum intercapedinem, dū modo inuentum secundum quadrante minus repertum fuerit.

Nam si quadrans, necesse est quadrantem quoque esse $a b$, sed si quadrante maius: erit similiter $a b$, quadrante maior. Et idcirco cum ipsum inuentum secundum maius quadrante fuerit, ipsa segmenta $b c$ & $a b$ prolongabimus, donec concurrant in i : subtracto autem inuento secundo ex semicirculo $b k i$, notus relinquetur arcus $k i$. Igitur cum complementis duorum arcuum $a k$ & $k i$, lateraliter tabulam ingrediemur, & in area reperiemus complementum arcus $a i$, cui adiecto quadrante arcus $a b$, notus prodibit. Hæc autem idcirco adnotauimus: ut intelligant nemini licere ipsa tabula primi mobilis uti sine problematum demonstrationibus.

Sed pergamus, & longitudinis differentiam maiorem quadrante ponamus, semicirculo tamen minorem, siue ipsa duo loca a & b , ab æquinoctiali recedant ad eandem mundi partem, aut Borealem, aut Australem, siue ad diuersas. Ab altero autem polorum qui sit c , magis recedat a quàm b : duos igitur arcus $a c$ & $a b$, prolongabimus, donec concurrant in f , & à puncto b , arcum maximi circuli deducemus $b e$, ad rectos angulos in $c f$.




In triangulo igitur rectangulo $b e c$, sicut sinus totus ad sinum arcus acuti anguli $b c e$, qui quidem arcus relinquitur sublata longitudinis differentia ex semicirculo: sic sinus distantiae $b c$, qua b à polo c distat, ad sinum arcus $b e$. Quapropter tabulam lateraliter ingrediemur cum eo quod relinquitur subtracta differentia longitudinis ex semicirculo, & ipso arcus $b c$: in area enim eiusdem tabulae arcum offendemus $b e$, qui dicatur inuentum primum. Deinde uerò cum complementis arcuum $b c$ & $b e$, ipsam eandem tabulam areatim ingrediemur, & in latere reperiemus complementum arcus $c e$, quo subtracto ex quadrante, arcus $c e$ notus relinquetur, quem addemus arcui $a c$, & conflabitur arcus $a e$, inuentum secundum. Iam uerò si proposita loca a & b , uel ambo sunt Borealia, uel ambo Australia, fueritque inuentum secundum æquum quadranti, quadrans quoque erit arcus $a b$, datorum locorum intercapedo: sed si quadrante minus, erit idem $a b$, similiter quadrante minor. Quare tabulam lateraliter ingrediemur cum complementis inuenti primi atque secundi: in area enim complementum quaesitae distantiae inueniemus, quo ex 90 . gradibus sublato distantia ipsa cognita relinquetur. Cæterum si uel ipsis duobus locis in eadem mundi parte constitutis, inuentum secundum maius quadrante repertum fuerit, uel ad di-

uer-


de Obser. Reg. & Instr. Geom. Lib. II. 151

uersas mundi partes eadem loca declinauerint, hac una uia progrediendum erit: inuentum enim secundum ex semicirculo auferemus, notusque relinquetur arcus ef , cum cuius complemento, & inuenti primi complemento tabulam lateraliter ingrediemur, & in area offendemus complementum arcus bf . Quod quidem quadranti adijciemus, & totus arcus ab , datorum locorum intercapedo patefiet. Ponamus rursus data loca latitudines habere inæquales, differentiam uero longitudinis quadranti æqualem: quare angulus acb , rectus erit. Et propterea tabulam lateraliter ingrediemur cum ipsis latitudinibus, numerum uero in area tabule repperitum à quadrante auferemus, & relinquetur quæsitæ distantia, si ipsa duo loca in eadem mundi parte, uel Australi, uel Boreali sunt constituta. Eundem uero quadranti adijciemus, si unus eorum fuerit Borealis, alter uero Australis, & conflabitur arcus quæsitæ distantia. Sint enim duo lo-




ca a & b , in eadem parte mundi constituta, uel Boreali, uel Australi a f , latitudo unius, bg alterius. Igitur sicut sinus totus ad sinum complementi arcus ac , quod quidem est af , sic sinus complementi arcus bc , quod est bg , ad sinum complementi arcus ab . Quapropter in tabulam lateraliter mittemus ipsas locorum latitudines, & offendemus in area complementum arcus ab , quo quidem complemento ex quadrante detracto, nota reliquetur ipsa distantia ab . Sed sit unus locus Borealis, alter

uero Australis: arcus igitur ac & ab prolongabimus, donec concurrant in i . Quapropter in rectangulo triangulo bci , sicut sinus totus ad sinum complementi arcus bc , sic sinus complementi arcus ci , ad sinum complementi arcus bi . Est autem latitudo bg , complementum arcus bc , & quia ac semicirculus est, & arcus fc quadrans: latitudo igitur af cum ci , alterum quadratem restituet. Quapropter tabulam lateraliter ingrediemur cum ipsis latitudinibus, & in area offendemus complementum arcus bi , quod quadrati adijciemus, & conflabitur ab , datorum locorum intercapedo.




Quando uero data loca latitudines habuerint æquales, & ex eadem mundi parte siue Boreali, siue Australi, differentiam uero longitudines semicirculo minorem, tabulam ipsam primi mobilis lateraliter ingrediemur

mur cum complemento latitudinis, & dimidio differentiae longitudinis. Nam numerus qui in area repertus fuerit, dimidium interualli erit inter eadem loca: quo geminato integram habebis intercapedinem ipsorum locorum. Esto enim $a m b$, arcus paralleli inter duo loca a & b , maximi circuli segmentum inter eadem sit $a n b$. A polo c ueniat $c n$, arcus ma-



ximi circuli segmentum $a n b$, ad rectos angulos secans super puncto n . Quapropter acutus angulus $a c n$, dimidium est anguli $a c b$, dimidiumque differentiae longitudinis datorum locorum ostendit, arcus uero $a n$ dimidium est arcus $a n b$. In triangulo igitur $a n c$ sicut sinus totus ad sinum anguli $a c n$, dimidia differentiae longitudinis, sic sinus arcus $a c$, qui complementum est latitudinis, ad sinum arcus $a n$. Et idcirco laterali ingressu arcum inueniemus $a n$, cuius duplex est $a n b$

Sed si unus locus est Borealis, alter uero Australis, & latitudines nihilominus sunt aequales, lateralis ingressus cum complemento latitudinis, et complemento dimidij differentiae, longitudinis complementum prebebit dimidij interualli. Duo enim rectangula triangula $a f o$ & $b g o$, aequiangula sunt: nam anguli ad o contrapositi sunt, ad f uero, & g recti sunt, sed $f a o$ & $g b o$ anguli idcirco sunt




æquales, quia duo arcus $a c$ & $c b$, congesti uni semicirculo sunt æquales. Igitur arcus $a o$, æqualis est ipsi $b o$ & $f o$, æqualis ipsi $o g$. Quare $f o$, dimidium est differentiae longitudinis: at $a o$ dimidium interualli inter ipsa loca a & b . Quoniam uero sicut se habet sinus totus ad sinum complementi $a f$, sic sinus complementi $f o$, ad sinum complementi $a o$: tabulam igitur lateraliter in-

grediemur cum complemento latitudinis, & complemento dimidij differentiae longitudinis, & in area ipsius tabulae complementum dimidij interualli inueniemus. Quare dimidium ipsius interualli cognitum erit: totumque igitur interuallum patefiet.

Ponamus demum locum a latitudinem habere $a f$, locum uero b sub Aequatore constitutum esse, & oporteat distantiam $a b$, inuenire. Igitur si $b f$, longitudinis differentia quadrans fuerit, punctum b polus erit circuli $c a f$: quare distantia $a b$ quadrans erit, & proinde nota. Sed si ipsa longitudinis differentia minor fuerit quadrante, erit similiter $a b$ quadrante

temi




te minor. Quapropter sicut sinus totus se habet ad sinum complementi arcus bf , sic sinus complementi af quod est ac , ad sinum complementi ab . Et idcirco lateralis tabulæ ingressus cum complemento differentie longitudinis, & complemento latitudinis loci a , complementum præbebit arcus ab : quo detracto ex quadrante, ipsa distantia ab , cognita relinquetur. Sed esto

differentia longitudinis quadrante maior, minor tamen semicirculo. Igitur auferemus ex ea quadrantem bl , & per c & l , maximum circulum descriptum esse intelligemus, qui quidem arcum ab , secet in p : quapropter quadrans erit arcus bp , & quia anguli ad præcti sunt: in triangulo igitur apc , sicut sinus totus ad sinum arcus anguli acp , sic sinus arcus ac , ad sinum arcus ap . At arcus anguli acp est fl , quo quidem differentia longitudinis datorum locorum quadrantem superat bl , arcus uero ac , complementum est latitudinis loci a : ipse autem ap , excessus quæsitæ distantie supra quadrantem. Et idcirco lateralis tabulæ ingressus cum complemento latitudinis & ipso excessu differentie longitudinis supra quadrantem, arcum indicabit ap , quem quadrantem adiiciemus, & tota distantia ab , nota prodibit.

Sed neq; maiori negotio locorum interualla inueniri poterunt, ad imitationem eorum quæ in libro de Crepusculis demonstrauius, propositione 6. Nam quando uel ambo loca Borealia sunt, uel ambo Australia, sicut se habet quadratum sinus totius ad rectangulum contentum sub sinibus rectis complementorum latitudinis datorum locorum, sic sinus uersus differentie longitudinis eorundem locorum ad quandam rectam lineam, quam non ab re argumentum intercapedis appellabimus. Nam si ea æqualis reperta fuerit sinui recto complementi differentie latitudinis eorundem locorum, intercapedo quæsitæ quadrans erit. At uero si inæqualis erit nimirum ipsarum rectarum differentia sinus rectus cuiusdam arcus, qui subtrahendus erit ex quadrante (si ipsa inuenta recta linea quam argumentum appellamus minor fuerit) ut datorum locorum intercapedo cognita relinquatur. Adijciendus autem quando eadem recta linea maior inuenta fuerit, & eorundem locorum intercapedo nota prodibit. Quando uero unus locus Borealis fuerit, alter uero Australis, agemus cum uno loco & antipode alterius, & cum eo quod relinquitur detracta differentia longitudinis datorum locorum ex gradibus 180 . inuentam autem intercapedinem ex semicirculo auferemus, & datorum locorum intercapedo cognita relinquetur. Esto enim circulus


dens. Et idcirco sicut quadratum sinus totius ad rectangulum contentum sub sinibus rectis complementorum latitudinis datorum locorum, sic sinus uersus differentiae longitudinis eorundem in æquinoctiali, ad rectam $i p$: hæc enim ratio quam sinus uersus differentie longitudinis datorum locorum ad ipsam habet $i p$, ex duabus constat rationibus. Quarum una ea est, quam ipse sinus uersus habet ad $i n$, altera uero quam eadem $i n$ habet ad $i p$. Quatuor autem magnitudinum proportionalium quando tres dantur cognitæ, quarta ignorari non potest, cognita autem existit prima magnitudo, quadratum nempe sinus totius, cognita etiam secunda rectangulum contentum sub sinibus rectis complementorum latitudinis, cognita quoque tertia, sinus uidelicet uersus differentie longitudinis. Igitur multiplicabimus secundam in tertiam, productum uero diuidemus per primam, quæ quidem partitio sola abiectioe decem ultimarum figurarum fieri poterit, si sinum totum centum mille & quas partes habere subiicias, & nota prodibit in quotiente quarta magnitudo, recta uidelicet $i p$, intercapedinis argumentum. Et quoniam $g i$, complementum differentie latitudinis nota relinquitur, detracta ex quadrante latitudinis differentia: igitur $i o$, sinus rectus eiusdem complementi, cognita erit per tabulam sinus recti. Quapropter rectam $i p$, cognitam cum cognita $i o$, conferemus. Quod si $i p$, minor reperta fuerit ipsa $i o$, ut in descripta figura: earundem igitur differentia $o p$, cognita ueniet. Quare & arcus $g l$, per tabulam sinus recti cognitus erit. Quem auferemus ex quadrante $b g$, & arcus denique $b l$, æqualis intercapedini datorum locorum cognitus relinquetur. At si ipsa $i p$, maior reperta fuerit quam $i o$, hoc idem erit: quoniam recta $l m$, meridiana secat inter rectam $g h$, & punctum oppositum ipsi b , ut in secunda figura. Quare arcum $g l$, adiciemus quadranti $b g$, & arcus $b l$, æqualis datorum locorum intercapedini notus prodibit. Quod si eadem recta linea $i p$, æqualis inuenta fuerit rectæ $i o$: circulum igitur ductum per uerticem secundi loci, cuius polus est b meridianum secare super recta $g h$, fateri necesse est. Quapropter quartus memoratæ proportionis terminus qui intercapedinis datorum locorum argumentum existit, sinus rectus erit arcus $g i$: & idcirco quadrans $b g$, eorundem locorum intercapedini æqualis erit.




Sed ut præsens problema omni ex parte absoluamus, punctum a in

V a sub

subiecta figura Borealem polum ponemus esse, b uerò Australem. Primus locus uerticem habeat ad c, in meridiano a c b, latitudineq; Borealem. Secundus locum uerticem habeat ad d in meridiano ad b, sub Australi latitudine. Ducto autem maximo circulo per c & d, qui meridianum primi loci secet in e, datorum locorum intercapedo erit c d. Et quoniam duo semicirculi a c b & c b e æquales sunt ad inuicem: detracto igitur communi segmento c b, duoreliqua segmenta a c & b e, æqualia relinquentur. Igitur ij qui sunt sub e, antipodes sunt eorum qui sunt sub c, æqualem habentes latitudinem, sed Australem. Quare duorum locorum Australium d & e, intercapedinem d e inueniemus, quemadmodum docuimus, eamque auferemus ex semicirculo c d e, & intercapedo c d, datorum locorum c & d, cognita relinquetur.



Porrò si huiusmodi locorum distantias instrumento libeat inuenire, ipsa demonstrationis figura, una cum regula atq; circino, tibi seruiet pro instrumento. Circuli enim circumferentia in gradus (ut solet) diuisa, supputetur ab c in a, numerus graduum differentie longitudinis datorum locorum, sitq; huiusmodi arcus exempli gratia c q, & ab e in q, rectam lineam occultam ducemus e q, ex qua sumemus r, æqualem i s semidiametro paralleli secundi loci, & ipsi r, puncto regulam coaptabimus, quæ super eodem puncto tam diu circumferatur, donec diametro ad æquidistet. Tunc autem æquidistabit, cum æquales arcus utrinque ex duobus quadrantibus rescauerit, eiusq; intersectione cum i k notabimus quæ sit in n. Quare recta linea in, sinus uersus erit differentie longitudinis datorum locorum, in parallelo secundi loci. Coaptabimus igitur regulam ipsi n, quam eo usque circumducemus, donec diametro gh, æquidistet in sicut in m, & detracto gl, ex quadrante, datorum locorum intercapedo nota relinquetur.



bus quadrantibus rescauerit, eiusq; intersectione cum i k notabimus quæ sit in n. Quare recta linea in, sinus uersus erit differentie longitudinis datorum locorum, in parallelo secundi loci. Coaptabimus igitur regulam ipsi n, quam eo usque circumducemus, donec diametro gh, æquidistet in sicut in m, & detracto gl, ex quadrante, datorum locorum intercapedo nota relinquetur.

Quòd

Quòd autem recta linea in sinus uersus sit differentiæ longitudinis in parallelo secundi loci, non erit difficile intelligere. Regula enim per r & n ueniens, axia d , parallela, rectam $e c$ secet in t , & centro e , interuallo uerò $e r$, circulus describatur, semidiametrum $e c$ secans in u . Et quoniam angulus $r t u$, rectus est: recta igitur $t u$, sinus uersus erit arcus $r u$. At uerò duæ rectæ $e u$ & $s i$, æquales sunt: igitur detractis ab eis $t e$ & $s n$, quæ sunt æquales, duæ rectæ $t u$ & $n i$, æquales relinquentur per communem sententiam. Quapropter recta in sinus uersus est differentiæ longitudinis in parallelo secundi loci. Quando uerò sinus uersus maior fuerit semidiametro, multò facilius inueniri poterit, ut iam nosti.

Præterea iuxta demonstrationem Ioannis Vernerii datorum locorum intercapedo in uno plano inueniri poterit, si rectilineum quadrilaterum datorum laterum construxeris, cuius duo latera opposita atq; æqualia sint rectæ subtendentes arcus meridianorum inter duos parallelos, duo uerò reliqua quæ inuicem æquidistant, duæ rectæ sint subtendentes arcus parallelorum inter ipsos meridianos.

Recta enim linea inter oppositos angulos arcum quæsitæ intercapedis subtendet.

Item in lamina tabulae Astrolabij generali eadem intercapedo inueniri poterit, qua arte ex cognita distantia à meridiano astri declinationem habentis cognitam, distantia ipsius à uerticali puncto cognoscitur. Sed operæ pretium erit eandem tabulam ultra tropicum Capricorni extendere, propter loca Australiora. Ipsius uerò generalis tabulae fabricam atq; usum conscripsit olim, impressioniq; dedit Ioannes Valsurtus Salamanticensis Astronomus. Nos autem postea ut ea citra ambiguitatem uteremur, fabricæ & usurationem demonstratione inuestigamus. Deinde uerò post aliquot annos eandem tabulam exaratam reperimus in Arabicis Astrolabijs multis antè seculis constructis, quæ clarissimus Princeps Ludouicus Portugalix infans ex manubijs attulit Tunetis urbis.

Omniū uerò facillimus modus erit, si in globo duo data loca secundum artis præcepta collocaueris, ipsorum deinde distantiam inter circini pedes comprehenderis: mox enim eo translato ad meridianum, uel æquinoctialem, quot gradus maximi circuli quæ-


situm interuallum habeat, deprehendes.

V 3 Deijs

De ijs quæ præmitti debent ad ducendum eas lineas in globo,
 quas nautæ rumbos appellant. Cap. 21.

INter initia prioris libri ostendimus eam lineam, quam nauis suo cursu intra meridianum aut æquinoctialem describit, circula rem non esse, sed ex exiguis quibusdam maximorum circulo rum segmentis constare. Quanquam aduertimus non sine ratione dici posse inflexam quandam lineam esse alterius formæ instar helicæ duabus confectam motionibus. Nauis enim lationem dum citra meridianum tum æquinoctialem cursum tenet, ex duabus lationibus, à duobus uel motoribus prouenire, fortasse quispiam suspicabitur. Vna latio est, qua nauis ipsa in illius maximi circuli plano secundum longitudinem posita, qui in optatam horizontis partem spectat, uel flatu, uel remis impellentibus, in longum fertur. Altera uerò in latus fit, siue obliquum, qua gubernator clauum tenens, nautica acu docente, nauem ipsam interim detorquet, atque eò deflectit, quæ prora spectabat, cum illiusmodi cursus institueretur. Idest quoniam mutato loco in nouos incidit meridianos, & subinde in nouos horizontes: ea idcirco arte in consimiles horizontum partes cursum dirigit. Quare si res ita se habeat, descripta linea quam rumbum dicimus, neque circularis erit, nec ex circularibus conflata. Nobis tamen aliter uidetur. Nauem enim animaduertimus aliquandiu in longum ferri, antea quam in latus deflectat: & idcirco eiusmodi lineam ex exiguis segmentis maximorum circulo rum constitutum esse, arbitramur. Nam cur nauis perpetuò in latus deferri cogetur, si quanquam in maximo circulo quo flatus spirat, breui tamen curriculo uersetur, alio proram spectare gubernator minime sentit? Veruntamen Geometriæ peritus certa atque indubitata ratione deprehendit, quantulacumque facta mutatione, impares effici angulos cum nouis, quos subit, meridianis: & proinde nauis proram alio tendere, sed latet sensui error ille. Cuius quidem causam atque rationem ut planè perspiciamus, imprimis intelligamus oportet, quòd proposito spherico triangulo abc , ex segmentis maximorum circulo rum constituto, in quo quidem angulus c rectus existat, angulus uerò a acutus, latus autem ab recto angulo subtensum quadrante non maius. Proposito etiam acuto angulo d , maiore ipso a , non erit difficile à puncto b , in subiectum latus ac , segmentum maximi circuli deducere, quod ad aliquod punctum inter a & c , cum eodem ac , angulum æqualem efficiat proposito angulo d . Ad punctum enim a terminum lateris ac , acutum angulum constituemus cae , æqualem angulo d per primam propositionem primi libri Menelai, & producto latere bc , occurrat segmento ae , in puncto e . Præterea tribus propositis rectis lineis, quarum prima sit sinus rectus segmen
 tice

ti c e, secunda sinus rectus a e, tertia sinus rectus b c, quarta inueniatur p^aportionalis in plano circuli c b e, per 12. sexti libri Euclidis, quæ quidem sit f g. Hanc autem ostendemus maiorem esse sinu recto segmenti b c, minorem uerò sinu toto. Nam quoniam angulus b a c acutus proponitur, & latus a b, quadrante non maius: igitur latus b c, qua-



drante minus erit: latus uerò a c quadrante non maius, per undecimam propositionem primi libri Gebri. Rursus in triangulo a e c, quoniam angulus c a e acutus est: subtensum igitur latus minus erit quadrante, per ipsam undecimam propositionem. Latus porrò a c, ostensum est quadrante non minus: igitur latus a e, non maius erit quadrante, per eandem 11. primi libri Gebri. Minus est autem c e ipso a e, per septimam propositionem primi libri Me-

nelai, quia minori angulo subtenditur: igitur sinus rectus segmenti c e, minor erit sinu recto segmenti a e. At sicut sinus rectus c e, ad sinum rectum a e, sic posuimus sinum rectum b c, ad rectam lineam f g: igitur minor est sinus rectus b c, ipsa recta f g. Sed quod eadem f g, minor sit sinu toto, facile erit demonstrare. Quoniam enim sicut sinus rectus segmenti c e, ad sinum rectum a e, sic se habet sinus rectus b c, ad rectam f g: igitur sicut sinus c e, ad sinum b c, sic sinus a e, ad rectam f g, per permutatam proportionem. Maior est autem sinus c e sinu b c: igitur maior erit sinus rectus segmenti a e, ipsa recta f g. Sinus uerò rectus segmenti a e, sinum totum non excedit: igitur minor erit recta f g sinu toto. Rectam itaque sumemus f h, duplam ipsius f g, cui æqualẽ coaptabimus circulo e b c, in quo quidem circumferentiam subtendat b i, semicirculo minorem. Dimidium uerò ipsius b i esto b k: sinus igitur rectus ipsius b k, æqualis erit rectæ f g.


ctæ fg per definitionem sinus recti, & communem sententiam: & proinde segmentum bk maius erit segmento bc: circulum igitur describemus super polo b ipso intervallo bk, quem necesse est secare maximum circulum ac l, duobus in locis. Sit igitur una sectio ante c, in puncto m. Dico quod alia sectio erit inter c & a. Nam non in a maiorem enim rationem habet sinus rectus anguli acuti cae, ad sinum totum, quam sinus rectus acuti anguli bac, ad eundem sinum totum. Atqui sicut sinus rectus anguli cae, ad sinum totum, sic sinus segmenti ce, ad sinum segmenti ae, & sicut sinus anguli bac, ad sinum totum, sic sinus segmenti bc, ad sinum ab, per 13. propositionem primi libri Gebri. Igitur maiorem rationem habet sinus ce, ad sinum ae, quam sinus cb, ad sinum ab. At sicut sinus ce ad sinum ae, sic sinus cb ad sinum bk: igitur maiorem habebit rationem sinus cb ad sinum bk, quam sinus eiusdem cb ad sinum ab: et idcirco minor est sinus segmenti bk, sinu segmenti ab. Et quoniam segmentum bk, ostensum fuit quadrante minus, segmentum uerò ab, positum fuit quadrante non maius: igitur minus erit bk ipso ab. Et proinde circulus descriptus per k, secare non potest maximum circulum ac in a. Si enim in a secaret, duo segmenta ab & bk, æqualia essent inter se, sed maius est ab ipso bk. Nec secare potest in alio puncto ultra a ut in n. Nam quoniam bc, minus est quadrante: in triangulo igitur nbc, angulus cnb acutus erit: at obtusus est angulus ban, igitur in triangulo abn, maius erit latus bn latere ab, per 7. primi Menelai: & proinde multò maius segmento bk. Quapropter secare non potest descriptus circulus maximum circulum ac m, ultra a nec in ipso a. Secet igitur in o, inter c & a. Igitur maximum circulum describemus per ipsa b & o puncta, qui ad o angulum efficiat boc. Dico ipsum boc acutum esse, æqualemq; proposito angulo d. Nam sicut sinus rectus ce, ad sinum rectum ae, sic sinus rectus bc, ad sinum rectum bo. At sicut sinus rectus ce, ad sinum rectum ae, sic sinus rectus arcus anguli cae, ad sinum totum. Et sicut sinus rectus bc, ad sinum bo, sic sinus rectus anguli boc, ad sinum totum: igitur sicut sinus rectus anguli cae, ad sinum totum, sic sinus rectus anguli boc, ad eundem sinum totum. Et propterea æquales sunt inter se duo sinus recti angulorum cae & boc. At acutus est cae, per hypotesin, & boc similiter acutus, propterea quòd in rectangulo triangulo bco, subiectum latus bc, minus est quadrante: igitur æquales erunt inter se iidem anguli cae & boc. Ipse uerò cae, æqualis est angulo d: æqualis igitur erit boc, eidem d. Et proinde in triangulo abc, segmentorum circulorum maximorum, in quo angulus c rectus est, angulus uerò a acutus, minorq; proposito angulo d, latus autem ab, quadrante non maius, à reliquo angulo b, in subiectum latus ac, maximi circuli segmentum bo deduximus,

mus,

mus, quod ad punctum o angulum constituit b o c, æqualem eidem proposito angulo d, quod fecisse oportuit.

Et quoniam acuti anguli a, & recti differentia in duo æqualia diuidi potest, dimidium rursus in duo æqualia, & ita deinceps in infinitum: à reliquo igitur angulo b maximi circuli segmentū ducere possumus, quod ad aliquod punctum lateris a c, angulum efficiat acutum, tam exigua differentia superantem ipsum a, ut iudicio sensus eidem æqualis appareat. Adeò ut ipsorum inæqualitas nullo instrumento internosci ualeat.

Prædicta etiam demonstrandi arte concludes, quòd in spherico triangulo a b c, segmentorum circulatorum maximorum, si latus a b, maius quadrante fuerit, a c uerò quadrans, angulus autem a b c acutus producto latere b c, exterior angulus a c d, minor erit acuto, interioreq; a b c: propterea quòd duo latera a b & a c, coniuncta maiora sunt semicirculo per hypothesim. Igitur proposito alio acuto angulo e, adhuc minore ipso



so a b c, maiore tamen ipso a c d, dico quod possibile est ab angulo a, in subiectum latus b c, segmentum maximi circuli ducere, quod cum eodem b c, æqualẽ angulum efficiat ipsi e, ad partem c. Latera enim a b & a c extendantur, concurrantq; in f, & ab ipso f, maximi circuli segmentum deducatur f g ad rectos angulos super b c, quod extra triangulum b f c, necesse est cadere: propterea quòd angulus c b f obtusus est, ipsum uerò f g, quadrante minus. Igitur quoniam a c f semicirculus est, & a c quadrans, segmentum c f quadrans quoque erit. Angulus porrò b c f acutus est, æqualis contrapposito a c d: idcirco in triangulo rectangulo c g f, in quo quidẽ latus c f, ma-



ius quadrante non est, angulus aut f c g, acutus à reliquo angulo c f g, in subiectum latus c g, maximi circuli segmentū ducere possumus arte paulò ante tradita, quod cum c g uersus g angulum acutum efficiat æqualem proposito angulo e. Esto igitur eiusmodi segmentum f h, quod quidem in puncto h angulum efficiat f h g, æqualem ipsi e, & idem f h producat̃ usq; ad a: itaq; contrappositus angulus a h c, æqualis erit eidem e. Quapropter in proposito triangulo a b c, in quo latus a c, quadrans est, a b uerò quadrante maius, angulus autẽ a b c acutus, à reliquo angulo a in subiectum latus b c, segmentum duximus a h, quod ad partem c angulum efficit a h c, æqualem dato acuto e, qui minor propositus fuit quàm acutus

X a b c,

a b c, maior autem quam exterior a c d: quod quidem faciendum propo-
suimus. Non potest autem f h cadere in puncto b. Nam angulus a b c, e-
qualis est contrapposito f b g: & propterea ipse angulus f b g, maior esset
angulo e per hypotesim, & communem sententiam: igitur non æqualis.
Neq; cadet inter b & g: maius enim esset b f ipso f h, quia obtuso angulo
subtensum, at f h acuto. Quare duo latera b f & f h, coniuncta semicircu-
lo minora fierent: & proinde multò maior angulus f h g, eodem angulo
a b c. Quapropter multo maior angulus e quam a b c, rursus contra hy-
pothesim.

Ex quo item concludes, quòd à puncto a, duci potest maximi circuli
segmentum super subiectum latus b c, quod tam exigua differentia supe-
retur ab acuto angulo a b c, ut sensum omnem effugiat, adeò ut nullo in-
strumento deprehendi possit eius modi superantia.


Igitur qui secundum artis nauigandi præcepta citra meridianum,
& æquinoctialem cursum instituunt, quanquam aliquandiu in uno atq;
eodem maximo uersentur circulo, & hac de causa de instituto cursu ali-
quantulum diuertant, aliorsum uè tendant: eius modi tamè diuerticulum
sensu percipere non poterunt. Circulus enim maximus a b c, meridianus
esto loci b, polus manifestus a: soluētibus porrò è loco b, instituatur cur-
sus secundum magnitudinem acuti anguli profectionis a b d, quem b d
maximi circuli segmentum cum meridiano efficit ad punctum b. Dedu-
catur autem ex a, maximi circuli segmentum a e, ad rectos angulos super



b d, & proponatur qui-
dam alius acutus angu-
lus f, insensibili differen-
tia excedens ipsum a b d
atque minore illa quai-
dem a b d, à recto angu-
lo superatur. Et quonia-
am in spherico triangu-
lo a b e latus a b quadrā-
te maius non est, angu-
lus autè a b e acutus, mi-
norq; angulo f: punctum igitur inueniatur in latere b e, sitq; g, in quo qui-
dem maximi circuli segmentum a g, angulum efficiat a g e, æqualem ipsi
f. Quare insensibili differentia ipse angulus a g e, profectionis angulum
a b c superabit, eritq; a g meridianus loci g. Et quoniam in quouis pun-
cto inter b & g, anguli efficiuntur cum circulis uenientibus ab a, adhuc
minores quam a g e, maiores uerò quam a b e: exterior enim angulus ad
basim trianguli maior est interiore oppositoq; quando duo latera iun-
ctim

ctim

itinerum profectioes nō solum fieri possint super maximis sphaeræ circulis : sed etiam super minoribus, nemo unquam dubitabit, si animaduertent ex centro sphaeræ maris quod centrum mundi supponimus, ad singula puncta circumferentiæ minoris circuli rectas lineas ductas, si ulterius protendas, in cœlum abire, atq; secundum eas corpora grauiâ deorsum tendere. Quare si quispiam ita positus fuerit super minoris circuli circumferentiâ, ut pedes deorsum habeat, caput uerò supra, secundum longitudinem conceptæ lineæ, poterit quidem sine ullo naturæ incommodo super eadem circumferentiâ progredi. Cæterum Mathematici admonent itinerum profectioes fieri debere super circumferentijs maximorum circulorum: propterea quòd distantia, quæ ex maximo circulo sumitur, breuissimâ est. Quoniam enim una atq; eadem recta lineâ duas circumferentiâs subtendit, unam maximi circuli, alteram minoris: idcirco si in uno plano ipsos circulos positos intellexeris, segmentum maximi intra minoris segmentum contineri demonstrabitur. Quapropter per postulatum illud Archimedis in primo libro de Sphaera & Cilindro continens contento maius esse, breuior erit distantia quæ ex maximo circulo sumitur ea quæ ex minore. Quod tamen multo euidentius Ioannes Vernerus demonstrauit in annotationibus supra Geographiam Ptole. At utrum beneficio acus nauticæ nauigando, circulum æquinoctiali ex amussim æquidistantem describamus, quemadmodum nautis uidetur, non est facile definire. Nam si nauis constituatur in a, loco proram dirigens in d, occasum æquinoctialem, & meridianum habeat b a c, æquinoctialis sit b d e, uerticalis uerò d a e, alter




lorum mundi f, & ipse uerticalis unâ cum nauis motu primi cœli feratur, manifesto apparebit, puncta d & e, æquinoctialē percurrere, nauem uerò parallelum a g h. Cæterum quāquam nauis eo motu perpetuò tendat in occasum æquinoctialem, circulumq; parallelum describat, non tamen flatus, aut remigum impulsione, secundum artis nauigandi præcepta, ac usûe nauticæ beneficio nauigasse dicetur. Nam non ma-

gis quàm qui ad Borealem polum cum nauigare conarentur, propter flatus tamen uehementiam aliò nauem impellentem, per circulum æquidistantem æquinoctiali perducti sunt. Præterea cur eiusmodi nauigationem factam dicemus à Leste in Oëstem, si nullus ad æquinoctialem progressus factus est? Cur uerò Solani flatus expetendus erit ijs qui in eodem parallelo uersari cupiunt? Tunc enim nauigatio contingit secunda, cum

quo

quo naus proram dirigit gubernator, eo flatus spirat. Atque non ob aliud, nisi quia ita spirante uento naus celerius currit. Quod si nihil discedere uolunt à parallelo, causam reddere non poterunt, cur docente acu nautica, & adiuuante remone, nauem ipsi perpetuò in occasum detorquent equinoctialem? Quamobrem sententia nostra de re hac (quæ admodum in priori libro diximus) alia erit. Eos nempe qui à Leste in Oestem citra æquinoctialem, secundum artis nauigandi præcepta nauigant, non parallelum, sed lineam quandam describere in superficie maris ex exiguis quibusdam maximorum circulorum segmentis compositam. Quamquam uerò putent se ex amussim in Oestem perpetuò tendere, sepius tamen diuertunt. Ceterum diuerticulum illud à rectitudine, nec non recessus à parallelo, propter paruitatem sensu percipi non potest. Locus enim à quo discedimus esto a, qui polum mundi b, manifestum habeat, & in parallelo a c d, positus sit. Institutus uerò cursus in data nauigatione sit à Leste in Oestem, id est ad occasum equinoctialem. Igitur ut ostendamus qualem lineam, qui ad eum modum nauigant, in superficie maris describant, à puncto a termino meridiani a b, maximi circuli segmentum ducemus a e, ad rectos angulos super ipso a b, & super polo b, interuallo quodam quod ipsum a b, imperceptibili differentia superet, parallelus quidam descriptus intelligatur, cuius quidè intersectio cum a e, sit in puncto f. Eam uerò differentiam imperceptibilem dicimus, quæ in Astronomicis supputationibus ob paruitatem negligitur, quæ uero (cum astra obseruamus) sensu percipi non potest. Sit autem b f, segmentum maximi circuli per ipsa b & f puncta ueniens.



Quapropter in recto angulo triangulo a b f latus a b, minus erit quadrante: quare angulus a f b, acutus erit. Et idcirco possibile est à puncto b, maximi circuli segmentum uenire, quod in aliquo puncto inter a & f, angulum efficiat cum a f, æqualem cuius acuto, qui maior est ipso a f b. Segmentum itaque b g cum a g, angulum efficiat b g a, imperceptibili differentia recto angulo minorem, maiorem uerò ipso a f b. Erit itaque b g, adhuc minus ipso b f. Et quoniam meridiani qui cadunt inter a & g, angulos efficiunt maiores ipso b g a, à quo qui distantior est propinquiore maior existit: idcirco qui soluunt è loco a, ac uero nautica cœli plagas indi-

cant,

cante, in occasum æquinoctialem perpetuò tendere conantur, quamdiu fuerint in a g, nihil ab instituto cursu discrepare uidebuntur. Et quia segmentum b g, insensibili differentia excedit a b: igitur quanquam reuera uersati sint in a g, in parallelo tamen se delatos esse putabunt. Intersectio porrò segmenti b g, cum eodem parallelo esto k, & in ipso parallelo arcus sumatur k i, æqualis ipsi a k. Quapropter si per g & i maximus circulus scriptus fuerit, maximus item circulus per b & i: angulum igitur b i g, æqualem esse ostendes recto angulo b a g, segmentum item a g, & quum segmento g i, per propositionem similem 4. primi Euclidis. Et idcirco circulus maximus per g & i scriptus parallelum a c d, continget in ipso i. Quare si nauis delata fuerit super segmento g i, eundem cursum tenere uidebitur, qui ab initio fuerat institutus, id est à Leste in Oëstē, locorum etiam latitudines in uniuerso segmento æquales apparebunt latitudini loci a: quare quemadmodum priori ostendimus syllogismo, nihil à parallelo loci a recessisse putabitur. Et quia ad hunc modum circa reliquum paralleli ambitum nauis cursum se habere consequens est, nihil uerò referre siue reliqua segmenta æqualia ponamus ipsi a g, siue minora, dum modo ipsum contingant parallelum: patet igitur eam lineam quam nauis in superficie maris describit, cū à Leste in Oëstem citra æquinoctialem nauigamus, parallelum non esse. Cæterum ab eo insensibiliter discrepare, differentiam uerò tanto esse minorem, quanto linea illa angulosior fuerit. Quamobrem rationi consentaneum est, ut pro huiusmodi lineis quatuor equidistantes in globo describantur. Nam si ad eum modum fractas lineas sub quantouis, certo tamen angulorum numero duceremus, quales naues à Leste in Oëstem percurrere demonstrauius, iustè obiurgandi essemus: cur non alias magis ad parallelum accedentes, plurimum uerò angulorum describantur à nobis, ut recessus à parallelo, & ab instituto cursu minor euadere possit. Si porrò qui in loco sunt latitudine carēte, & ad Lestem nauigant aut Oëstem: idcirco super æquinoctiali circulo uehuntur, quoniam meridiani cum æquinoctiali rectos angulos ubique efficiunt.

Quod possibile sit datum globum rumbis deliniare. Cap. 22.

Igitur ex supradictis liquet tales lineas in quibus globo duci posse, quales nauigando in superficie maris describimus. Eiusmodi uerò lineas uulgari nomine rumbos dicimus. Hi autem sunt rumbus Septentrionis & Austri, Lestis & Oëstis, Nordestis & Sudoëstis, Noroëstis & Suestis, & qui in medio inter hos sunt, & alij rursus inter hos & illos. Quorum quidem qui Septentrionis & Austri sunt, circuli maximi sunt, uide-


licet

licet meridiani. Qui uerò Lestis & Oëstis, æquinoctialis cum parallelis, quemadmodum demonstratum est à nobis. Reliqui autem orbiculares lineæ sunt ex segmentis maximorum circulorum compositæ. Et quoniam oportet eiusmodi segmenta angulos efficere æquales, quantum ad sensum in quibusuis punctis cum nouis meridianis, exteriores interiori, qui profectiois est, id fieri posse demonstrauimus. Quare si proposito quouis rumbo à puncto interfectionis dati meridiani cum æquinoctiali circulus maximus ductus fuerit, qui cum ipso meridiano angulum acutum efficiat proportionalem ei rectilineo, quem datus rumbus rectilineus cum meridiana efficit, & ipsius maximi circuli segmentum sumatur, qui in quouis puncto cum alijs meridianis angulos efficiat exteriores in sensibili differentia maiores: rursus uerò à termino eiusdem segmenti duo maximi circuli ducti fuerint, unus per polos mundi, alter uerò qui cum eo efficiat angulum æqualem ei qui prius factus fuerat in æquinoctialis puncto. Ab hoc autem segmentū præterea sumatur, quod in quouis puncto angulos efficiat æquales quantum ad sensum exteriores interiori, & ita deinceps per globi conuexitatem, ad unum & alterum polum, erit nimirum illius modi fracta linea per quam similis ei quam nauis super maris superficie descripserit, cum nauigatio facta fuerit secundum propositum rumbum. Et quoniam eadem prorsus arte reliqui rumbi duci possunt: igitur in quouis proposito globo eas duci lineas quas nauæ rumbos appellant, possibile est.

Tabulam quandam numerorum edere, cuius adminiculo in dato globo rumbos quoslibet describamus. Cap. 23.

Maximorum circulorum segmenta ex quibus datus rumbus constituendus est, ea magnitudine debent esse, ut duo anguli exterior & interior, quos ad suos fines cū meridianis efficiunt, tam et si sint inæquales, pro æqualibus habeantur. Ipsorum porrò angulorum differentiam unius gradus circumferentiæ horisontis subiiciemus: minores enim credibile est sensui gubernatoris occultari. Initium uerò describendorum rumborum erit in æquinoctiali circulo. Igitur ut segmenta meridianorum inter polum propinquiorem & fines eorum segmentorum, quæ datum rumbum constituunt, numeris innotescant, sit in subiecta figura punctum a, unus polorum mundi, meridiani quadrans a b, segmenta uerò b c, c e, e g, g i, rumbum constituent dati anguli profectiois a b c, ulteriusque producatur b c, ad d, c e, ad f, e g, ad h, g i, ad k. Ab ipso autem polo a, meridiani uentiant ad puncta c, e, g, i, nempe a c, a e, a g, & a i. Dico meridianorum segmenta a b, a c, a e, a g, & a i, sinus rectos habere

bere proportionales in proportione continua, eamque esse, quam habet sinus exterioris anguli $a c d$, ad sinum interioris anguli oppositi $a b c$, in sphaerico triangulo $b a c$. Nam in ipso sphaerico triangulo sicut sinus re-




ctus lateris $a b$, ad sinum rectum lateris $a c$, sic sinus rectus anguli $a c b$, ad sinum anguli $a b c$, per 13. propositionem primi libri Gebri. Atqui duo anguli $a c b$ & $a c d$ unum atque eundem habent sinum rectum: igitur sicut sinus $a b$, ad sinum $a c$, sic sinus anguli $a c d$, ad sinum anguli $a b c$. Et eodem syllogismo ostendes sicut se habet sinus $a c$ ad sinum $a e$, sic se habere sinum anguli $a e f$,

ad sinum anguli $a c e$. Et quoniam duorum triangulorum $b a c$ & $c a e$, interiores anguli æquales inuicem supponuntur, duo etiam exteriores $a c d$ & $a e f$, inter se æquales: igitur sicut sinus anguli $a c d$, ad sinum anguli $a b c$, sic sinus anguli $a e f$, ad sinum anguli $a c e$. Et proinde sicut sinus segmenti $a b$, ad sinum segmenti $a c$, sic sinus segmenti ipsius $a c$, ad sinum segmenti $a e$. Similiter autem demonstrabis quod sicut sinus $a c$, ad sinum $a e$, sic sinus $a e$, ad sinum $a g$, & in eadem ratione esse sinum $a g$, ad sinum $a i$. Quare patet meridianorum segmenta que ad ipsa ueniunt puncta b , c , e , g , i , sub una atque eadem ratione sinus rectos proportionales habere, quam quidem seruat sinus anguli $a c d$, ad sinum anguli $a b c$. Quæ cum ita sint, non erit difficile ipsa meridianorum segmenta cognita reddere. Sinum enim totum qui quadrantis est $a b$, in sinum anguli $a b c$, dati rum bi multiplicabimus adiectione quinque ziphRARUM: productum uerò diuidemus per sinum anguli $a c d$, & prodibit in quotiente sinus segmenti $a c$. Hunc uerò in se ipsum multiplicabimus: productum porrò diuidemus per sinum totum adiectione quinque ultimARUM figurARUM, & ueniet sinus rectus segmenti $a c$. Hunc autem multiplicabimus in sinum segmenti $a c$, productumque diuidemus per sinum totum prædicta arte, & ueniet ex partitione sinus segmenti $a g$. Ipsum denique sinum segmenti $a g$, multiplicabimus in sinum $a c$, productum deinde diuidemus per sinum totum, & ueniet sinus segmenti $a i$. Et ita in cæteris. Nam cum sinus rectus $a c$, cognitus fuerit, ipse erit communis multiplicator ad inueniendum reliquorum segmentorum sinus, communis autem diuisor sinus totus erit. Sinibus porrò cognitis, debiti arcus per tabulam sinuum rectorum patefient. Ipsi autem sunt meridianorum segmenta inter polū mundi & eorum segmentorum fines, quæ datum rumbum constituunt.

Deinde uerò ipsorum segmentorum datum rumbū constituentium
quantitas

quantitates, operæpretium erit metiri, & eos angulos cognoscere, qui super polis mundi eisdem segmentis subtenduntur, quod quidem proximiores ex postulat syllogismos. Esto enim $b c$, primus arcus dati rumbi ab æquinoctiali inchoatus, punctum a polus mundi uicinior, meridiani




quadrans $a b$, $a c$, uerò quadrante minus. Igitur ut ipsum $b c$, & angulum $b a c$, numeris notos reddamus, segmentum $a c$, producemus usque ad e , æquinoctialis punctum: in quo quidem cum $b e$, æquinoctialis segmento rectum angulum efficit $b e c$. In triangulo itaque $c e b$, angulus $e b c$, cognitus est: is enim relinquitur detracto angulo $a b c$, dati rumbi ex recto $a b e$, subiectum uerò latus $c e$ cognitum existit: propterea quòd $a c$, quadrantis complementum iam innotuit: igitur reliqua trianguli latera $b c$ & $b e$, cognita erunt.

Est enim sicut sinus totus ad sinum anguli $e b c$, sic sinus lateris $b e$, ad sinum lateris $c e$. Quare cum quatuor quantitatum proportionalium prima, secunda & quarta sint cognita: tertia igitur ignorari non poterit, sinus porrò cum cognitus fuerit, arcus illico innotescit. Præterea sicut sinus totus ad sinum complementi $c e$, sic sinus complementi $b e$, ad sinum complementi $b c$: per regulam igitur numerorum proportionalium sinus rectus complementi arcus $b e$ patefiet: & idcirco ipse arcus $b e$, qui angulum subtendit $b a c$, statim cognosci poterit.

Hac igitur arte quantitatem inuenies primi segmenti dati rumbi ab æquinoctiali initium sumentis, & differentiam meridianorum per ipsius fines uenientium, arcum uero æquinoctialis qui eidem respondet. At ponamus $b c$, dati rumbi segmentum esse, sed non primum: oportet atque ipsius quantitatem metiri, & meridianorum differentiam inter fines eiusdem. Igitur à polo a , maximus circulus ducatur, qui segmentum $b e$, ulterius productum ad rectos angulos secet super d . In triangulo itaque rectangulo $a d b$, acutus angulus $a b d$, cognitus supponitur: $a b$ uerò meridiani segmentum inter polum & initium arcus $b c$, iam innotuit: igitur quemadmodum paulo antè ratiocinati sumus, sinus recti $a d$ & $b d$ innotescunt, & ipsa latera per tabulam sinuum rectorum cognita erunt. Similiter uerò in triangulo $a c d$, quoniam latus $a d$, cognitum existit, & $a c$ meridiani segmentum notum supponitur: reliquum igitur latus $c d$ innotescet. Quo quidem detracto ex $b d$ ipsum $b c$, dati rumbi segmentum cognitum relinqui necesse est. Ex quo quidem angulum $b a c$, qui duobus meridianis $a b$, $a c$ continetur, differentiamque

longitudinis definit inter b & c , uno alio syllogismo statim concludes cognitum. Nam quoniam in triangulo bca , sicut sinus lateris ac ,



ad sinum lateris bc , sic sinus anguli abc , ad sinum anguli bac , per 13. propositionem primi libri Gebri. Si igitur sinum anguli abc , in sinum lateris bc , id est sinum anguli dati rumbi in sinum propositi segmenti multiplicaueris, productum uero diuersis per sinum ac : in quotiente reperies sinum anguli bac . Acutus est autem quia totus angulus $b ad$, acutus est: igitur per tabulam sinuum rectorum arcus ipsius anguli bac , notus prodibit. Quod

si propter operis facilitatem sinum totum semper interuenire uelis, quæ quatuor syllogismis nota concludimus, quinque manifestanda erunt. Vtemur autem decimaquarta propositione primi libri Gebri.

His itaque ad hunc modum demonstratis, tabula quædam numerorum exaranda erit septem columnis distincta: singulæ uero columnæ in tria spatia.

Prima columna erit primi rumbi, siue potius primæ quartæ rumbi, quam uulgari nomine dicimus Norte quarta de Nordeste, & huic oppositam Sul quarta de Sudoeste. Ex alio latere Norte quarta de Noroeste, Sul quarta de Sueste. Huius columnæ primum spatium arcus continet meridiani qui ad fines segmentorum dati rumbi terminantur.

Secundum uero spatium itinerum longitudines comprehendit segmentorum ipsius rumbi, id est quantum sit unum quodque eiusdem rumbi segmentum ostendit.

In tertio autem differentiæ longitudinis scribi debent inter fines cuiusuis segmenti eiusdem rumbi. Secunda columna ad eundem modum tribus spatijs distincta, numeros continebit qui debentur mediæ profectio, quam appellant Nornodeste Susudoeste: ex alio uero latere Nororoeste Susueste. In tertia porro numeri collocandi sunt tertiæ quartæ, quam dicunt Nordeste quarta de Norte, & Noroeste quarta de Norte, cum oppositis. Et eadem arte reliquæ columnæ erunt exarandæ. In latere uero sinistro eiusdem tabulæ numerus, & ordo sigillatim scribendus est segmentorum cuiusuis rumbi.

In prima itaque columna angulus profectio primæ quartæ gradus continet 11. minut. 15. In secunda quæ mediarum profectio num est, gradus comprehendit 22. minut. 30. In tertia profectio angulus graduum est 33. minutorum 45. In quarta graduum 45. In quin

ta gra

ta graduum 56. minutorum 15. In sexta graduum, 67. minutorum 30. In septima denique 78. minutorum 45. Quælibet igitur columna debitis numeris implenda erit, numeris lateralibus respondentibus. Hoc tamen commemorandum est, quod arcus meridiani in primo spatio positus, is est qui ad finem segmenti uenit, non qui ad initium.

Nam quoniam initium descriptionis omnium rumborum ab æquinoctiali circulo sumendum est: arcus igitur meridiani ad initium primi segmenti uenientis quadrans existit.

Quapropter numerus graduum & minutorum in primo spatio scriptus, arcus illius meridiani erit, qui ad finem primi segmenti terminatur, & ita in cæteris. Et quoniam initium sequentis segmenti præcedentis finis est: idcirco si posteriores arcus cogniti fuerint, priores ignorari non poterunt.

Sequitur dispositio tabulæ in septem partes distinctæ: numeros uerò qui intra ipsius tabulæ aream scribendi sunt, studiosi adolescentes inuenient secundum præcedentes demonstrationes, & quantum libuerit, extendent.

Y 2 Numes



De Habitudine rumborum tum ad polos mundi, tum ad
se inuicem. Cap. 24.


Rumbi Septentrionis & Austris quia meridiani sunt, per æquinoctialis polos quos polos mundi dicimus, ueniunt. Lestis uerò & Oestis quæ sunt æquidistantes, quorum maximus est æquinoctialis, per ipsos polos uenire non possunt. Reliqui uerò quoniam ex segmentis maximorum circulorum constituti intelliguntur, acutos angulos cum meridianis efficientes: idcirco nec per polos mundi transeunt, nec ab eisdem polis paribus distant interuallis, sed in infinitum produci possunt. Quanto autem magis producuntur, tanto magis polis appropinquant. cæterum in eos intrare non possunt. Nam quemadmodum in figura superioris descripta rumbus $b c e g$, acutos angulos paresque facit ad fines suorum segmentorum cum meridianis: ad intermedia uerò puncta quanquam impares, insensibili tamen differentia, ita nimirum à puncto g in i , & ab i rursus prolongari potest, & ita deinceps quantum libuerit. Ad quod uis enim dati meridiani punctum, dato angulo concepti rumbi æqualis effici potest ab ipso meridiano, cum quodam alio maximo circulo. Porro ex his quæ demonstrauimus satis constat meridianorum segmenta perpetuò minora fieri. Quare quanto magis ipse rumbus productus fuerit, tanto magis eidem polo appropinquabit: ac intrare nunquam poterit. Nam si intrat, quoniam a posuimus polum mundi uiciniorum: sit igitur



eiusmodi ingressus secundum dati rumbi segmentum $l m a$, & per a & l , meridianus scribatur $a n l$. Quapropter duo maximi circuli se inuicem per inæqualia secabunt in ipsis a & l punctis: quod est impossibile. Sunt enim $a m l$ & $a n l$, segmenta semicirculis minora, sed si contendas meridianum per a & l , puncta scriptum, eum esse qui dati rumbi segmentum habet $l m a$: iam igitur ipsum $l m a$, rumbus erit Septentrionis & Austris contra hypothesim: & idcirco in mundi polos intrare minime potest, quod demonstrandum erat.

Illi uerò rumbi quibus idem nomen commune fuerit, eam inter se habitudinem habebunt, ut æquinoctialis circuli, & æquidistantium segmenta complectantur proportionalia, non secus quam meridiani. Quanto autem magis producti fuerint, tanto magis inuicem appropinquabunt: nunquam tamen concurrere poterunt.

Magis inuicem appropinquare producti rumbi dicentur, quando longius ab æquinoctiali, inter puncta parallelorum minus spatium interceperint. Duos enim rumbos unius nominis intelligamus $b c d e f$ & $g h i k l$, à punctis b & g , æquinoctialis inchoatos, & per fines segmentorum eorundem rumborum meridianorum quadrantes scribantur, quæ admodum in subiecta figura apparet. sint autem prima segmenta $b c$ & $g h$. In duobus itaq; triangulis $a b c$ & $a g h$, angulus $c b a$, æqualis supponitur angulo $h g a$: angulus etiam $a c b$, æqualis angulo $a h g$, latus uerò $a b$, æquum est lateri $a g$: sunt enim quadrantes: igitur reliqua latera quia



minora sunt quadrantibus æqualia inuicem erunt, & reliqui anguli æquales per 16. primi libri Menel. Quapropter meridiani segmentum $a c$, æquum erit meridiani segmento $a h$. Describatur igitur per c & h , equinoctialis parallelus cuius quidem segmentum esto $c h$. Aio $b g$ & $c h$, æquinoctialis & paralleli segmenta, similia esse proportionalia ué, nempe sicut æquinoctialis ad parallelum sic, $b g$ ad $c h$. Nam quoniam duo anguli $b a c$ & $g a h$, æquales ostensi sunt: arcus igitur æquinoctialis $b m$ & $g n$, æquales inuicem erunt: quibus si adiciamus $g m$, æquales igitur erunt $b g$ & $m n$, per communem sententiam. Quapropter sicut $b g$ ad $c h$ sic $m n$, ad idem segmentum $c h$. Atqui similes sunt proportionales ué ipsi


ipsi duo arcus mn & ch , per 14. secundi lib. Theo. igitur bg & ch , proportionales erunt. Quod quidem per solam 17. propositionem ipsius 2. libri Theo. demonstrare poteris.

Idem similiter demonstrabis de segmentis reliquorum parallelorum inter eosdem rumbos comprehensis. Quoniam enim duorum triangulorum acd & ahi , latera ac & ah , æqualia ostensa sunt, & anguli supra bases cd & hi , æquales subiiciuntur: igitur reliqui anguli qui ad a æquales erunt, reliqua etiam latera, quia minora sunt quadratibus, erunt æqualia: & idcirco ad & ai æqualia erunt, similiter duo æquinoctialis segmenta mo & np , inter se æqualia erunt, & proinde totum bo , toti gp , æquum erit per communem sententiã si æqualibus æqualia addas. Vtriq; autem addemus go : & idcirco æqualia erunt bg & op . Paralleli porro descripti per d & i , segmentum esto di : proportionalia igitur erunt op & di , meridianis ao & ap comprehensa: quare proportionalia quoq; erunt bg & di . Quod autem duo segmenta ch & di , suis circulis sint proportionalia per æquam proportionem concludes, interposito bg . Sed ponamus segmentum uz , illius paralleli esse, qui scribitur per puncta quæ sunt supra d & i , & infra e & k , ostendemus nihilominus bg & uz , similia segmenta esse. Ductis enim à polo a , quadrantibus ay & ax , per ipsa puncta u & z , duo latera ad , au , triangula adu , duobus lateribus ai , az , triangula aiz , æqualia erunt: acutus autem angulus uda , angulo zia æqualis est, duo uerò angula ud , azi , obtusi sunt, per ea quæ superius demonstrauimus: igitur duo reliqui anguli da & iaz , æquales erunt. Quapropter duo segmenta oi , px , æqualia inuicem erunt: & idcirco by & gx , æqualia concludes, & propterea bg & yx æqualia erunt inter se per communem sententiã. At uerò similia sunt yx & uz : igitur bg & uz , similia quoq; erunt. Quapropter uerissimum esse concludes in uniuersum parallelorum segmenta inter rumbos unius nominis eiusdemue inclinationis proportionalia esse, quod demonstrandum suscepimus.

Quod autem quanto magis producuntur, tanto magis inuicem appropinquent, modo ostendemus. Nam quoniam arcus circulorum æquidistantium inter rumbos bf , & gl , comprehensi ipsis circulis proportionales sunt: rectæ igitur subtendentes eosdem arcus eorundem circulorum semidiameter proportionales erunt. Hoc enim facile demonstrare poteris per sextum librum Euclid. Quapropter recta subtendens circumferentiam bg , recta subtendente ch maior erit, & hæc rursus maior recta subtendente di , & ita deinceps. Idcirco si maximum circulum per puncta c & h , scriptum intellexeris, maximum item circulum per d & i , maiorem esse concludes bg , circumferentia maximi circuli inter e & h : hanc autem maiorem ea quæ continetur inter d & i , & similiter in alijs.

Et pro-

Et propterea per definitionem à nobis traditam quanto magis ipsi rum-
bi producti fuerint, tanto magis inuicem appropinquabunt, quod erat
demonstrandum. Scimus porro duarum linearum interualla ex perpen-
dicularibus sumi debere, quæ à punctis unius super alteram ducuntur. At
in huiusmodi fractis lineis rationem potius habendam esse putauimus
ad interualla punctorum inter consimiles rumbos in singulis parallelis.
Nam si duarum nauium una soluerit à loco b spatium decursura rumbi
b f: altera uerò à g, spatium decursura consimilis rumbi g l, pari celeritate
tur celeritate, palam est ex ijs quæ demonstrauius, quandiu ad eum mo-
dum delata fuerint, in eosdem parallelis simul incidere, quanto celerius
proiecta fuerint, tanto magis inuicem appropinquare. Nunquam ue-
rò concurrere etiam si in infinitum producantur, ostendemus demon-
stratione ducente ad impossibile. Super polis enim non concurrent, quo-
nia in eos intrare non posse demonstratum est. Quare si alibi concu-
runt: duo igitur eiusdem nominis rumbi b f & g l, concurrant in f, com-
parium segmentorum e f & k f, termino. Quia propter a e & a k, meridia-
norum arcus æquales erunt per ea quæ paulò ante demonstrauius in
præcedenti figura: anguli præterea e a f & f a k, inter se æquales pars &
totum, quod est impossibile. At si ipsa comparia segmenta non concu-
rere dixeris in f, sed in aliquo puncto inter e & f: sit igitur eiusmodi concu-
rsum in r, & producatu r k usque i, in pa-
rallelo puncti f. Et quoniam comparium
segmentorum terminos paribus interual-
lis ab eodem polo distare ostensum est, pun-
ctum uerò f terminum posuimus segmen-
ti e f. punctum igitur i terminus erit segmen-
ti k i. Arcus autem meridiani inter polum
a & i esto a i: igitur duo anguli e a f & i a k,
inter se æquales erunt, quod rursus est im-
possibile.




Et propterea non concurrunt, quod de-
niq̄ demonstrandum erat.

Quam habitudinem inter se habeant unius atq̄ eiusdem
rumbi segmenta. Cap. 25.

Maximorum circularum segmenta ex quibus rumbi, qui nec sunt
Septentrionis & Austri, neque Lestis & Oestis, constituti intel-
liguntur, eam habent inter se comparisonem, ut in quouis ip-
sorum rumborum ab æquinoctiali inchoato, & uersus utrumq̄ polo-
rum

rum

rum mundi prolongato, segmenta ipsi æquinoctiali propinquiora re-
motioribus maiora sint, & longitudinum atq; latitudinum differentiæ
inter eorundem segmentorum extrema puncta maiores quoq;. Adeò ut
quanto longius ab æquinoctiali quivis rumbus productus fuerit, tanto
segmenta minora fiant, & longitudinum nec non latitudinum differen-
tiæ inter extrema puncta etiam minores. Rumbi enim inchoati ab æqui-
noctiali, & uersus polum a producti, duo concipiantur segmenta b c, ui-
cinius ipsi æquinoctiali, & c d remotius: ad quorum fines arcus meridia-
norum ueniant a b, a c & a d. Dico b c, maius esse c d, & longitudinis dif-
ferentiam inter duo puncta b & c, maiorem esse longitudinis differentiã



inter c & d, similiter arcum a b, maio-
ri differentiã excedere arcum a c, q̄ a
c excedat a d. Primi demonstratio
ad hunc modum fiet. Quoniam e-
nim arcus a c, minor est ipso a b: pro-
ducta igitur ad partem e, sitq; ce ei-
dem a b æqualis. Deinde uerò à pun-
cto e termino ipsius c e, maximus du-
catur circulus qui cum eodem ce, ad
idem punctum e, angulum efficiat
æqualem angulo b a c, per primam
propositionem primi lib. Menel. Se-

cabit autem huiusmodi circulus segmentum c d, in longum productum
at non in d neq; inter c & d. Si enim secat in d, quoniã duorum triangulo-
rum a b c & e c d, duo latera a b & e c, æqualia sunt: & duo anguli unius
duobus angulis alterius qui supra ipsa latera a b & e c, æquales sunt, alter
alteri: reliquus igitur angulus a c b, reliquo e d c, æqualis erit per 14. pri-
mi Menelai. Quapropter exterior e d g, exteriori a c f, æqualis erit. Eidem
uerò exteriori a c f, æqualis est a d g: propterea quod supposuimus tan-
ta differentiã angulum a e f, superare angulum a b c, quanta huic æqua-
lem a c d, superat angulus a d g. Æqualis igitur erit angulus e d g, angulo
a d g pars tota, quod est impossibile. Et idcirco non secat in d. At inter c
& d, secare non poterit. Nã si inter c & d secat: sit igitur huiusmodi sectio
in k. Quare similibus argumentis ostendemus duos angulos e k g & a d
g, inter se æquales esse. Secet autem arcus e k, arcum a d in i. In triangulo
igitur k d i, exterior angulus i d g, interiori oppositoq; i k d, æqualis erit.
Quapropter duo latera d i & k i, coniuncta uni semicirculo æqualia erunt.
At uerò d i, multo minus est quadrante, quia totus arcus a d, quadrante
minor est: item k i multo minus quadrante, quia arcus e k, cum sit æqua-
lis a c, minor est quadrante: igitur impossibile.

Z

Et id

Et idcirco non secatur inter c & d . Secetur porro in g . Trianguli igitur $c g$, latus $c g$ æquiverit lateri $b c$, trianguli $a b c$. Minus est autem $c d$ ipso $c g$: igitur minus erit idem $c d$ quam $b c$, quod imprimis erat ostendendum. Secundum demonstrabitur in eadem figura. Duo igitur arcus $a d$ & $e g$, ad partes d & g , producti concurrant in l , producanturque $d g$ in m , ad partem g . Duo igitur anguli $e g m$ & $a d m$, angulo $a c f$ æquales erunt: & idcirco inter se æquales per communem sententiam. Quapropter duos angulos $m g l$ & $m d l$, æquales esse necesse est. Et propterea trianguli $d g l$, duo latera $g l$ & $d l$, coniuncta uni semicirculo erunt æqualia: & idcirco trianguli $e a l$, duo latera $a l$ & $e l$, coniuncta uno semicirculo maiora erunt. Quapropter exterior angulus $c a l$, interiore oppositoque $a e l$, minor erit. Eidem uero $a e l$, æqualis est $b a c$: minor igitur erit $c a d$ siue $c a l$, eodem angulo $b a c$. At ipse $c a d$, quantitatem definit in æquinoctiali circulo differentie longitudinis inter c & d , angulus uero $b a c$, quantitatem differentie longitudinis inter b & c : igitur differentia longitudinis inter b & c , maior est differentia inter c & d , quod erat ostendendum. Postremum præterea facili ostendemus demonstratione. Veniant enim per c & d paralleli, & quoniam maior est arcus $a b$ quam $a c$, & ipse $a c$ maior quam $a d$: igitur descripti paralleli meridianos $a b$ & $a c$ secabunt. Secent itaque in n & o : erit igitur $b n$, differentia latitudinis inter b & c , at $c o$, differentia latitudinis inter c & d . Dico igitur differentiam $b n$, maiorem esse differentiam $c o$. Nam quoniam demonstraui-




mus segmentum $b c$, maius esse $c d$: sumatur igitur ex eodem $b c$, segmentum $b p$, quod ipsi $c d$ æquum sit, & ex $a b$ arcus $b r$, æqualis arcui $a c$. Deinde uero per duo puncta p & r , circulus maximus scribatur, circulus item maximus per a & p . Trianguli itaque $a p r$, duo latera $a r$ & $r p$, coniuncta maiora sunt tertio latere $a p$. Ipsum uero $a p$, maius est quam $a c$: propterea quod in triangulo $c a p$, angulus $a c p$, obtusus est, $a p c$ uero acutus. Et idcirco ipsa duo latera $a r$ & $r p$, coniuncta multo maiora sunt quam $a c$. Eidem uero $a c$, æquum est meridiani segmentum $a n$: igitur maiora sunt $a r$, $r g$ quam $a n$. Commune auferatur $a r$: maius idcirco relinquetur $r p$ quam $r n$, per communem sententiam. Et quoniam $r p$ & $a d$, æqualia sunt inter se, per similem propositionem quartæ primi libri Euclidis, minor est autem $a d$ quam $a c$: minor igitur erit $r p$ quam $b r$. Quare si r , punctum polum intelligamus, & per punctum p interuallo $r p$, circulus descriptus fuerit, secabit $b r$ inter b & n . Secet itaque in q : meridiani igitur segmentum $b q$, æquum erit segmento $c o$.

Minus

Minus est autem bq quam bn : igitur & co , minus erit eodem bn . Quare differentia latitudinis inter c & d , minor erit latitudinis differentia inter b & c , quod erat ostendendum. Nihil autem refert siue bc & cd , coniuncta sumantur, siue seiuncta.

Sed si diuersorum rumborum segmenta inter se inuicem conferre liceat, facile ostendere poteris per ea quæ hoc in loco & superius demonstrata fuerunt, latitudinis differentiam inter extrema puncta primi segmenti primi rumbi, siue primæ quartæ, cuius quidem inclinatio ad meridianum graduum est $11. \text{m. } 15.$ maiorem esse latitudinis differentia extremorum punctorum cuiusuis alterius segmenti, tum ipsius primi rumbi, tum aliorum. Longitudinis uerò differentiam inter extrema puncta primi segmenti septimi rumbi, siue septem quartarum, quauis alia maiorem esse. Esto enim punctum a polus mundi, arcus bc primi rumbi, siue primæ quartæ segmentum primum, ab æquinoctialis puncto b , inchoatum: arcus autem de , sit primum segmentum cuiusuis alterius rumbi, cuius initium sit d , similiter æquinoctialis punctum. Ostendemus autem in primis latitudinis differentiam inter b & c , siue potius latitudinem ipsius c , maiorem esse latitudinis differentia inter d & e . Cæterum longitudinis differentiam inter eadem b & c , minorem esse longitudinis differentia inter d & e .



Scribantur enim quadrantes $ab, ac, ad, \& aeg, \&$ producantur, bc ad $h, \& de$ ad i . Angulus igitur ach angulum abc , uno gradu superabit, per ea quæ supposuimus. Similiter angulus aei , angulum ade , uno gradu. At uerò duo anguli ach, abc , minores sunt duobus angulis $aei \& ade$, per hypothesim. Est enim angulus abc , $Gr. 11. \text{m. } 15.$ quia tanta est inclinatio primæ quartæ ad meridianum: angulus porro ade maior subiicitur: quapropter inter sinus rectos arcuum angulorum $ach \& abc$, maior erit ratio, quam inter sinus rectos arcuum angulorum $aei, \& ade$.


Sinus nempe rectus arcus anguli ach , maiorem habet rationem ad sinus rectum arcus anguli abc , quam sinus rectus arcus anguli aei , ad sinus rectum arcus anguli ade , per ea quæ superius demonstrauius capite 3. de Inuenienda locorum longitudine ex marina charta. Atqui sicut sinus rectus anguli ach , ad sinus anguli abc , sic sinus quadrantis ab , ad sinus arcus ac , in sphærico triangulo acb : eundem enim sinus habent duo anguli exterior atq; interior qui ad c . Similiter sicut sinus rectus anguli aei , ad sinus rectum anguli ade : sic sinus quadrantis ad , ad sinus

arcus ae , in triangulo aed . Igitur maiorem habebit rationem b finis quadrantis ab , ad sinum arcus ac , quam sinus quadrantis ad , ad sinum arcus ae . Et proinde minor erit arcus ac ipso ae : arcus igitur cf , latitudinis differentia inter b & c , maior relinquetur quam eg , latitudinis differentia inter d & e . Quoniam uero differentia latitudinis inter b & c , maior ostensa est latitudinis differentia extremorum punctorum cuiusuis alterius segmenti eiusdem rumbi, similiter latitudinis differentia inter d & e , maior est latitudinis differentia extremorum punctorum aliorum segmentorum ipsius rumbi inchoati à puncto d , cuius quidem inclinatio à d e , maior supponitur inclinatione abc : igitur latitudinis differentia extremorum punctorum primi segmenti primi rumbi, sive primæ quartæ, maior est latitudinis differentia extremorum punctorum reliquorum omnium segmentorum tum ipsius primi rumbi, tum aliorum, quod erat ostendendum. Reliquum demonstrabimus eadem arte. Quoniam enim angulus ach , contrapósito bcf æqualis est: angulus item aei , contrapósito dge æqualis: quantum itaque angulus bcf excedit abc , tantum angulus dge , superabit ade , per hypothesim.

Igitur è diuerso quantum complementum anguli abc , quod est cbf , complementum superat anguli bcf , tantum complementum anguli ade , quod est dge , complementum superabit anguli dge : demonstratum est enim hoc in Arithmetiis. Minor est autem angulus dge angulo cbf , item complementum anguli dge , minus est complemento anguli bcf : igitur maiorem rationem habebit sinus anguli dge , ad sinum complementi dge , quam sinus anguli cbf , ad sinum complementi anguli bcf . Et quoniam sicut sinus totus ad sinum complementi bcf , sic sinus anguli cbf , ad sinum complementi bcf . Similiter in triangulo dge , sicut sinus totus ad sinum complementi dge , sic sinus anguli dge , ad sinum complementi dge : maiorem igitur rationem habebit sinus totus ad sinum complementi dge , quam ad sinum complementi bcf : & idcirco complementum dge , minus erit complemento bcf , & propterea arcus dge , maior relinquetur ipso bcf . Ponemus igitur d e , primum segmentum esse septimi rumbi, qui septem quartarum est: cuius quidem inclinatio ad meridiana graduum est 78 . minut. 45 . bc uero primum segmentum cuiusuis alterius rumbi, & concludemus d g , maximam esse longitudinis differentiam, uelut antea.

Proe

Collocetur propositus globus intra mobilem meridianum, cuius unus semicirculus, q̄ intra polos in duos quadrātes fecet: quadrātes uerò in gradus 90. & debiti numeri ascribātur, quorū initium sit in ipsis polis, fines autem in sectione æquinoctialis. Ipse porro æquinoctialis circulus in gradus similiter diuidatur, qui punctis quibusdam, atque lineis tantum distinguātur, absq̄ numerorū notis: quemadmodum in subiecta figura apparet. In qua quidem a b c d, interiorē circulum representat illius superficiei mobilis meridiani circularis uē armillæ, quæ per polos mundi a Borealem, & c Australem uenit. Punctum b, ipsius circuli & æquinoctialis una sit interfectio, altera nerò d. In proposito igitur globo semicirculus b d, una est medietas æquinoctialis: at a b & b c,



duo meridiani quadrantes. Diuidantur itaq̄ ipsi quadrantes in gradus, quorum initium sit in a et c, finis uerò ubi b: in quo quidem numerus 90. scriptus est. Æquinoctialis autem in Gr. 360. diuidatur, nempe semicirculus b d, in 180. & alius qui ex opposita parte relinquitur, similiter in 180. Distinguendi porro sunt ipsi æquinoctialis gradus punctis atq̄ lineis. cæterum numerorum notæ eisdem ascribendæ non sunt. Et quoniam iuxta præsens institutum rumbi omnes ab æquinoctiali ducendi


Z 3 sunt

sunt: sit igitur unius descriptionis initium punctum b , & in primis describatur in dexteram partem, quam Orientalem Borealemque supponimus, rumbus ille qui uulgo dicitur Norte quarta de Nordeste, hac uidelicet arte. Numerum graduum & minorum differentiae longitudinis, qui e regione primi segmenti in area tabulae supradictae repertus fuerit, computabimus à b in d , in æquinoctiali circulo.

Esto autem illius finis punctum e : igitur semicirculum abc , mobilis meridiani transferemus ad situm aec , in quo quidem computabimus ab a in e , numerum graduum & minorum, qui in eadem tabula e regione ipsius primi segmenti sub titulo arcus meridiani scriptus fuerit, finem uero signabimus in superficie globi nota f . Ex eadem rursus tabula numerum graduum & minorum differentiae longitudinis, & arcus meridiani desumemus e regione secundi segmenti, & ipsam longitudinis, differentiam computabimus in æquinoctiali ab e in d , & ad finem qui sit g , mobilis meridiani semicirculum transferemus, in situ agc , in quo quidem (uelut antea) numerum graduum & minorum arcus meridiani computabimus ab a in g : finem uero in superficie globi signabimus nota h , & ita deinceps faciendum erit, totumque puncta in ipso globo eadem arte imprimemus, quotus fuerit segmentorum numerus, qui in ipsa tabula scriptus fuerit. Constat enim ex ijs quae superius demonstrauimus, tabulam ipsam in infinitum augeri posse. Caeterum sat erit ad latitudinem graduum circiter 60. eam extendere, id est donec arcus meridiani in omni rumbo gradus fere 30. comprehendat. Ipsis igitur punctis in dato globo signatis, unam aliam armillam circularem parabimus, mobili meridiano æqualem. Ex qua quidem segmentum quoddam resecabimus, quod numerum graduum haud minorem comprehendat maximo qui in uniuersa rumborum tabula, sub titulo longitudo itineris repertus fuerit. Hoc igitur armillae segmento ad ducendum arcum maximi circuli à puncto in punctum in superficie globi, perinde utemur, atque planis regulamentis uti solemus, ad ducendum ab uno puncto in aliud punctum rectam lineam in uno plano. Ipso igitur sphaerico regulamento punctis b & f , ut decet coaptato, arcum maximi circuli ducemus bf , & à puncto f , in punctum h , eadem arte arcum ducemus fh , & ad eundem modum quoduis aliud punctum, eorum quae in ipso globo impressa fuere, cum sibi uicino conectemus, ut tandem rumbus ille descriptus habeatur, quem Norte quarta de Nordeste appellant. Deinde uero desumemus ex supradicta tabula primos atque tertios numeros secundae columnae, & eum rumbum ducemus consimili arte ab eodem puncto b , initio sumpto qui mediae projectionis est. Nec aliter operandum erit pro reliquis rumbis ducendis per globi conuexitatem in partes Boreales Orientalesque. Postea uero


uerò ab eodem puncto b rursus exordientes eos ducemus rumbos in occidentales partes Borealesq̄, qui æqualis his habent ad meridianos inclinationes. Hi porrò uulgari sermone dicuntur Norte quarta de Noroeste, Nornoroeste, Noroeste quarta de Norte, Noroeste, Noroeste quarta de Oeste, Osnoeste, Oeste quarta de Noroeste. Quae descriptione peracta, aliam item faciemus rumborum descriptionem, quæ à puncto d, initium sumat: præterea à punctis medijs inter b & d, alias duas in globis mediocris magnitudinis. In maioribus autem globis non tantum quatuor, sed octo descriptiones plures uel faciendæ sunt. Nam quanto plures fuerint, tanto cuiuslibet profectio paratior uia reperta erit. Absolutis autem descriptionibus rumborum Borealis hemispherij, totidem rursus faciemus in Australi, & ab eisdem punctis æquinoctialis inchoatas. Per quæ quidem puncta meridiani ducendi sunt colore nigro, ipsi et æquinoctialis: similiter & ij rumbi, qui in medio sunt inter hos, quales uidelicet sunt Nordeste & Sudoestes, Noroestes atq̄ Suestes. Mediarum uerò profectio rumbi, uiridi colore pingendi sunt: reliqui autem colore rubeo, quemadmodum in planisphærio nautarum. Circuli præterea æquinoctiali æquidistantes quanto libuerit numero & interuallo describantur, colore tamen nigro: quando quidem pro rumbis Lestis & Oestis usurpari solent.

Alijs etiam quibusdam modis rumborum descriptiones fieri poterunt, quorum unus erit si super b, tanquam polo, interuallo autem æquali primo segmento dati rumbi, parui cuiusdam circuli circumferentia in globi superficie descripta fuerit. Tum uerò mobilis meridiani semicirculus in situ a e c, constituendus erit, in quo quidem quoniam bis descriptam circumferentiam secat: pro termino igitur primi segmenti Borealiior sectio sumenda erit. Huic modo unus alius similis erit, si neglecta differentia longitudinis inter fines primi segmenti, tantisper semicirculum mobilis meridiani circumducas, donec finis arcus meridiani ipsius primi segmenti parui circuli circumferentiam attingat. Vbi enim attigerit, ibi erit alterum extremum eiusdem primi segmenti. Et eadem arte reliquorum segmentorum puncta notanda erunt.



Modus etiam aptissimus erit, si ex tenui lamina cuprea ferrea uel, aut alterius materie, sphaericum quadratam klm, fabricaueris, cuius concauum ad expositi globi conueuum sit conformatum: latera autem km & lm, rectum angulum kml, continentia maximo rumbi segmento, quod in tabula supradicta reperitur, paulo


paulò maiora sint, & in gradus maximi circuli dati globi diuidantur. Circumferentia uerò kl , in octo æquales partes secetur, & ex puncto m , ad puncta sectionum maximorum circulorum arcus ducantur mn , mo , mp , mq , mr , ms , mt . Acutus igitur angulus lmt , unius quartæ erit. At lms , duarum quartarum, lmr trium, lmq quatuor, lmp quinque, lmo sex, lmn septem, sed rectos kml , octo complectetur quartas. Quibus ita paratis, sit in subiecta figura punctum i , in æquinoctiali circulo, à quo sumendum sit initium describendorum rumborum. Atque in primis describendus proponatur rumbus Nordestis & Sudoestis. Igitur sphaericus quadrans imponatur, & eo pacto globi conuexo coaptetur, ut punctum m , sit simul cum i : mobilis autem meridiani semicirculus in situ ponatur ai , sub quo quidem tamdiu sphaericus quadrans conuertatur, circa m uel i donec circumferentia mq , sit simul cum ai . Deinde uerò ex tabula supra dicta numerum graduum & minorum desumemus magnitudinis primi segmenti ipsius rumbi Nordestis & Sudoestis, quem computabimus ab m in l , & ad finem notam in globo imprimemus, ubi z : erit igitur ip-



sum z , primi segmenti finis. Porro ut secundi segmenti finis inueniatur, eadem omnino arte utendum erit. Mobilem enim semicirculum transferemus ad situm azc , sub quo sphaericus quadrans ita globo coaptandus erit, ut m sit ubi z , & super ipso m uel z , conuertendus erit, quoad circumferentia mq siue zq , sit simul cum za , & computato numero graduum & minorum magnitudinis secundi segmenti ab m , siue z in l , notabitur in ipso globo finis secundi segmenti qui sit u . Et ad inueniendum reliqua puncta similiter operandum erit, quæ denique connectenda erunt: quemadmodum superius docuimus. Ipsi enim sphaerici quadrantis latus pro regulamento seruiet. Quod si quempiam facilitas in opere, magis quam exacta supputatio delectauerit, poteritis neglecta numerorum tabula, rumbos in dato globo describere, hoc uidelicet modo. Circumferentia mq , posita sub ai , à puncto i uel m , secundum quadrantis latus m

l , circa

l, circumferentia ducatur i l, in ipsius globi superficie. Erit enim quadrantis latus pro sphaerico regulamento: & proinde primi segmenti dati rumbi finis erit in ipsa i l, quem quidem ad hunc modum inueniemus. Trahatur sphaericus quadrans per globi superficiem, ea tamen arte ut ipsius latus m l currat super circumferentia i l: mobilis autem meridiani semicirculus circumferatur, & in omni situ transeat per m. Atque tam diu simul ferantur semicirculus & sphaericus quadrans, donec inter circumferentiam m q, & ipsum mobilis meridiani semicirculum unus tantum gradus intercedat circumferentiae k l. Quando enim illud acciderit, ubi fuerit m: ibi erit finis primi segmenti. Ponamus igitur m, translato x, & una mobilis meridiani semicirculo in situm a x c, unum gradum circumferentiae k l, intercedere inter circumferentiam q m uel q x, & semicirculi situm. Angulus igitur a x l angulum a i l, inclinationis dati



rumbi gradu uno superabit. Et idcirco punctum x, finis erit primi segmenti per ea quae supposuimus. Quapropter si circa ipsum x, sphaericum quadrantem tantisper conuerterimus, quoad circumferentia q x sub mobili iacet meridiano in situ a x: latus autem m l, ad situm ueniat x y, & in ipsa globi superficie a x in y, circumferentia ducatur, secundi segmenti finis in ipsa erit x y, qui eadem arte qua modo usi sumus, querendus erit. Et idem inueniendi modus in caeteris seruari debet.

His itaque absolutis, littoralis orbis descriptio fecienda erit in ipso globo. Et pro Leucis, & miliaribus, caeterisque mensuris consuetis, Scalae describantur ex arcibus maximorum circulorum. Et quoniam inter Hispanos sunt, qui Leucas 17. cum demidio, uni gradui maximi circuli tribuant in terreno circuitu: alij uero 16. cum duabus tertijs, idcirco si priorem sententiam amplecti libeat, arcum maximi circuli quatuor graduum in septem aequas partes diuides: unaquaeque enim earum decem Leucas comprehendet, & ad hunc modum poteris Leucarum Scalam, quantum libuerit producere. Sed si tibi posterior sententia magis placeat, gradus tres in quinque aequas partes diuides, & erit una quaeque pars similiter decem Leucarum, sed haec maiores illis.

His itaque absolutis, littoralis orbis descriptio fecienda erit in ipso globo. Et pro Leucis, & miliaribus, caeterisque mensuris consuetis, Scalae describantur ex arcibus maximorum circulorum. Et quoniam inter Hispanos sunt, qui Leucas 17. cum demidio, uni gradui maximi circuli tribuant in terreno circuitu: alij uero 16. cum duabus tertijs, idcirco si priorem sententiam amplecti libeat, arcum maximi circuli quatuor graduum in septem aequas partes diuides: unaquaeque enim earum decem Leucas comprehendet, & ad hunc modum poteris Leucarum Scalam, quantum libuerit producere. Sed si tibi posterior sententia magis placeat, gradus tres in quinque aequas partes diuides, & erit una quaeque pars similiter decem Leucarum, sed haec maiores illis.

De Usu illius globi, in quo rumbi descripti fuerint. Cap. 27.

Igitur cum globus ita comparatus fuerit, ut in Boreali hemisphærio, similiter in Australi, prædicta arterumbos depictos habeat, magno usui nauigantibus esse poterit: quemadmodum regulis quibusdam ostendemus.

I Si per duo data loca in globo posita nullus rumbus descriptus reperiatur: oporteat autem uiam indagare, qua ab uno in alterum ueniendum sit, mobilem meridianum ad unum eorum traducemus.

Quod si eo situ alterum quoque locum comprehendat, proculdubio in uno atque eodem rumbo Septentrionis & Austri ipsa loca posita erunt. Sed si differentes habuerint meridianos, quantæ sint eorundem locorum latitudines inquiremus, & ad quas mundi partes ab æquinoctiali distent. Nam si æquales repertæ fuerint, & ad eandem mundi partem, aut Borealem, aut Australem, certum erit sub uno atque eodem parallelo posita esse & proinde in rumbo Lestis & Oestis. At si neque meridianum communem habent, neque parallelum: alius erit inueniendi modus. Duorum enim datorum locorum is qui à polo arctico distantiior fuerit, commodioris doctrinæ gratia primus nuncupetur: qui uero eidem polo uiciniior, secundus dicatur. Quod si ipse secundus locus primo orientaliior fuerit: rumbus igitur qui à primo in secundum uenerit, unus eorum erit, qui in quadrantem horizontis tendunt Orientalem atque Borealem. Quare ut quoniam illorum sit, deprehendi possit, singuli tentandi erunt, hac uidelicet arte. Mobili meridiano circumducto, duo notabimus puncta in uno quoque eorum, in quibus datorum locorum paralleli ipsos intersecant rumbos. Deinde uero ipsorum datorum locorum intercapedinem inter circini pedes comprehendemus, quam quidem mox conferemus cum illis que inter notata puncta repertæ fuerint. Nam rumbus ille seligendus erit, qui uiam monstret à primo loco in secundum: in quo quidem signatorum punctorum distantia datorum locorum intercapedini æqualis inuenta fuerit. Quod si nulla eidem æqualis reperiatur, certum habebimus nullum rumbum à primo loco in secundum locum duci posse. Et idcirco uiciniissimus sumendus erit. Eum uero dico uiciniissimum, qui distantiam signatorum punctorum habet minima differentia à iam dicta datorum locorum intercapedine discrepantem. Et proinde ipsorum rumbus uiciniissimo ibitur à primo loco in quendam alium sub parallelo positum secundi loci, orientaliorem quidem ipso secundo loco, si datorum locorum intercapedo minor reperta fuerit: occidentaliorem uero, si maior. In

ior. Inde uerò non erit difficile ad destinatum locum uenire sub eodem parallelo nauigando. Nec dissimili arte rumbus inuestigandus erit à primo loco in secundum, cū ipse locus secundus primo occidentalior fuerit. Atque idem inueniendi modus seruabitur, quando à secundo in primum eundem fuerit. Et non solum ex interuallis rumbus indagari poterit inter duo data loca: sed etiam ex longitudinum differentijs, eam uidelicet quæ inter meridianos eorundem locorum reperta fuerit, cum eis conferendo quæ in singulis rumbis inter meridianos signatorum punctum fuerint comprehensæ. Quod quemadmodum absolui debeat, ex ijs quæ modo diximus facile constare poterit.

2 Si inter duo data loca in globo posita itineris interuallum metiri oportet, quod in eo rumbo sumitur, quo ab uno in alterum itur, non erit unus atque idem modus inueniendi huiusmodi distantiam. Nam si data loca in uno posita fuerint meridiano, numerum graduum qui inter eadem loca repertus fuerit, in Leucarum numerum qui uni gradui respondet, multiplicabimus: productus enim numerus ipsum itineris interuallum notum reddet. Et similis seruabitur modus quando data loca sub æquinoctiali circulo posita fuerint. Sed si sub uno parallelo extra æquinoctialem reperta fuerint, gradus differentiæ longitudinis quæ in ipso parallelo est, in gradus maximi circuli arte superius tradita conuertemus, quos in numerum Leucarum multiplicabimus, qui maximi circuli gradui debetur. ita enim quæ sita distantia in ipso parallelo nota prodibit. At si per duo data loca rumbus alius descriptus reperiatur, non Septentrionis & Austri, neque Lestis & Oestis: uelis autem interuallum inuenire in ipso rumbo, circini officio id inuenies. Decem enim Leucarum spatium inter circini pedes comprehendas, quo deinde ipsum rumbi interuallum inter data loca mensurabis: & proinde quæ situs Leucarum numerus ignorari non poterit.

3 Si rumbus factæ nauigationis cognitus fuerit, unâ cum situ radicalis loci à quo discessimus, illius uerò in quo sumus latitudo fuerit explorata, situm ipsius in globo non erit difficile inuenire. Nam si rumbus ipse per radicalem locum descriptus reperiatur, mobilem meridianum tantum diu circumducemus, donec eundem rumbum in puncto terminante latitudinem illius loci, ad quem nauigando peruenimus, interfecet. Vbi enim interfecauerit, ibi locus ipse in quo sumus positus erit. At si per radicalem locum huiusmodi rumbus in tuo globo descriptus non est, notentur in eodem ubicunque descriptus reperiatur duo puncta, tantum ab æquinoctiali remota, quantum radicalis, & is in quo sumus. Inter quæ quanta fuerit inuenta longitudinis differentia, tanta esse debet inter radicalem locum, & eum in quo sumus. Et quoniam is ipse locus in quo sumus,

mus, cognitam habet latitudinem: in globo igitur cognitum situm habere necesse est.

4 Si situs radicalis loci à quo nauigando discessimus, unà cum rumbo cognitus fuerit, & confectum ipsius rumbi spatium cognitum quoque: situs loci in quo sumus ignorari non poterit. Si enim in tuo globo rumbo factæ nauigationis per locum radicalem transit, decem Leucarum spatiolum inter circini pedes comprehensum confecti itineris mensura erit. Quapropter cum ipsum spatium circini officio mensuraueris, situs loci in quo sumus illico patefiet. Sed si rumbus factæ nauigationis per radicalem locum non transit, notetur in eo ubicunq; descriptus reperitur, punctum unum tantum ab æquinoctiali remotum, quantum ipse locus radicalis, & ad eandem partem. A quo quidem puncto initio supputationis sumpto, tantum spatium sumemus ipsius rumbi, quantum est decursum spatium, fini uerò notam imprimemus in ipsa globi superficie: quanta enim fuerit ipsius impressæ notæ ab æquinoctiali distantia, tanta erit eius loci in quo sumus latitudo, tantaq; erit inter eundem & radicalem longitudinis differentia, quanta inter illud punctum quod pro radicali sumpsimus, & impressam notam reperta fuerit.


5 Si situs radicalis loci à quo nauigando discessimus, unà cum itineris confecto spatio cognitus fuerit, illius uerò loci ad quem peruenimus latitudo fuerit explorata, situs ipsius, nec non rumbus ille quem sequuti fuimus, comperti erunt. Vel enim confectum spatium directum est interuallum inter ipsa duo loca, uel obliquum ac tortuosum secundum alicuius rumbi semitam. Si directum est: eo igitur inter circini pedes comprehenso, ad ipsius mensuram circa radicalem locum circuli circumferentiam describemus: simul autem mobilem meridianum circumducemus. Vbi enim ipsius mobilis meridiani punctum illud quod latitudinem loci ad quem peruenimus, ostēdit, descriptam circumferentiam attigerit: ibi erit ipsius loci situs. Attinget autem interdum in uno tantum puncto, quando uidelicet unus ad Boream fuerit, alter uerò ad Austrum, sub uno atq; eodem meridiano: interdum in duobus, nempe quando unus locus ad Orientem fuerit, alter uerò ad Occidentem. sed in quonam eorum simus, ex ipsa mundi conuersione, atq; facta nauigatione facile cognoscemus. Rumbus igitur inter ipsa duo loca ex primo canone patefiet. At si confectum spatium secundum alicuius rumbi semitam decursum fuerit: decem igitur Leucarum spatiolo inter circini pedes comprehenso, & initio supputationis à radicali loco sumpto, singuli rumbi tentandi erunt. In eo enim locus ipse ad quem nauigando peruenimus, positus erit, in quo finis emensi spatij parem ab æquinoctiali distantiam inuenta latitudini, & ad eandem partem sortitus fuerit. Quoniam uerò

per

per singula loca in globo posita singuli rumbi descripti nō sunt: initium igitur supputationis tum à radicali, tum ab alijs locis sumi debet, pares habentibus latitudines cum ipso radicali. Longitudinis enim differentia quæ ita computando reperta fuerit, ei æqualis erit quæ inter ipsum radicalem & eum ad quem nauigando peruenimus: & idcirco eius situs ignorari non poterit. Illud præterea commemorandum censemus, quòd euntibus ab æquinoctiali uersus mundi polos citra meridianum, atq; secundum consueta artis nauigandi præcepta redeuntibus, eadem prorsus uia esse non potest. Differentia tamen parua erit. Quòd si quispiam exactissimam rationem tenere uelit, is alias addat rumborum descriptiones, à latitudine graduum sexaginta incipientes, & in æquinoctialem desinentes.

In Problema mechanicum Aristotelis de Motu nauigij ex remis Annotatio una.

Cum olim discipulis nostris mechanicas Aristotelis quæstiones interpretaremur, nonnulla circa problema illud annotauimus, cur magis præcedat nauigium, quam remi palmula in contrarium. Arist. enim ratiocinatio obscura est: quam nos tamē ut aliquid lucis haberet, ad hunc modum explicauimus: & propter materiæ similitudinem hisce nostris libris de Nauigadi ratione adiunximus. Supponit autem ipse autor remi palmulam retrocedere, quoties nauigium in anteriora progreditur, locumq; Scalmi super quo circulari motu remus uertitur, in medio ipsius remi positum esse, ut scilicet tantum distet à manubrio, quantum à palmula. Duæ itaq; rectæ lineæ ponantur æquales a b & d e, quæ quidem in c, puncto medio se inuicem secent, & connectantur d a & b e: remus autem in initio unius remigationis positionem habeat rectam lineam a b, sitq; a manubrium, b palmula, c uerò Scalmus. Cum igitur a, remi caput in fine ipsius remigationis eò translatum fuerit d, non erit b ubi e. Si enim ibi fuerit: remus igitur positionem habebit rectam lineam d e:




& quoniam contra positi anguli qui ad c æquales sunt, & duo latera a c & d c, trianguli a d c, duobus lateribus b c & c e, trianguli b e c, æqualia etiam sunt: reliqui igitur anguli, atq; bases ipsorum triangulorum æquales erunt, per 4. propositionem primi lib. Euclidis: & propterea tantum spatium percurrerit b, quātum a: Scalmus uerò c, immotus omnino erit: & nauigium

Aa 3 uigium

uigium idcirco in quo ipse Scalmus, immotum etiam erit, contra hypothesim. supponit enim in quaestione, quod nauigium illa remigatione in anteriora moueatur, remi uerò palmula retrocedat. Scalmus porrò quamquam circularis remi motus expers sit: motu tamē nauigij commouetur. Remus igitur positionem habeat in fine ipsius remigationis rectam lineam $d z$, quæ quidem rectam $a b$, secet in t inter b & c , rectam uerò $b a$ in z . Et quoniam duo coalterni anguli $c a d$ & $c b e$, æquales ostensi sunt, & angulus $a t d$, contrapposito $b t z$, æqualis est: duo igitur triangula $a t d$ & $b z t$, æquiangula erunt, per 32. primi, & communem sententiam. Similia itaq; erunt ipsa triangula, lateraq; habebunt proportionalia per quartam sexti, sicut $a t$ ad $b t$, ita $d a$ ad $b z$. Maior est autem $a t$ quàm $b t$: maior igitur erit $d a$ quàm $b z$, quod etiam per communem sententiam neglecta triangulorum similitudine, concludi potest.

Maius itaque spatium decurrit manubrium, quam remi palmula, atq; illuc transuehetur nauigium, quo remi capulus deportatus fuerit: nauigium igitur in diuersa procedens, plus spatij quàm remi palmula transmittet. Utimur autem translatione atq; demonstrationis figura Victoris Faulti. Aduertendum est tamen, quod cum remus positionem habuerit $d z$, remi palmula erit ultra z . Nam quoniam trianguli $a d c$, duo latera $a c$ & $d c$, æqualia posita sunt: duo igitur anguli qui ad d & a sunt, æquales erunt: angulus igitur $a d t$ angulo $d a t$, maior erit: & idcirco latus $a t$, trianguli $a t d$, latere $d t$ maius erit per decimam nonam primi. Æqualis porò ostensus est angulus $b z t$ angulo $a d t$. præterea angulus $d a t$, angulo



$t b z$ æqualis: angulus igitur $b z t$, angulo $t b z$ maior erit, & propterea latus $b t$, trianguli $b t z$ latere $t z$ maius erit: tota igitur recta linea $a b t o$ $t a d z$ maior erit: & idcirco cum remus positionem habuerit rectam lineam $d z$, palmula erit ultra z . Esto igitur in k , & connectantur rectæ lineæ $b d$ & $b k$: spatium igitur decursum ab ipsa palmula, non erit $b z$ sed $b k$, quod quidem minus etiã ostendemus esse ipso $d a$. Nam quoniam duo latera $b d$ & $d k$, trianguli $b d k$, duobus lateribus $b d$ & $d e$, trianguli $b e d$ æqualia sunt, sed minor est angulus $b d k$ angulo $b d e$: minor igitur erit basis $b k$ base $b e$, per uigesimã quartam primi, quod demonstrandum erat.



Præterea quod Aristoteles ratiocinando sumit, tantum spatium conficere nauigium, quantum remi manubrium, ambiguum est. Nam remi manubrium duabus fertur motionibus: una propria circulari q; super

Scalmus: altera uerò, qua una fertur cum ipso nauigio. Spatium igitur quod omnino decursum est à remi manubrio, eo quod à nauigio confectum est, maius erit. At si paria spatia decursa esse intelligat à remi manubrio motu proprio, & à nauigio, neq; hoc difficultate caret. Nam nauigium interdum maius spatium percurret, interdū minus, iuxta remigum uires, & prout mari remi palmula immersa fuerit: remi uerò manubrium tametsi ab exiguis uiribus moueatur: haud minorem tamen ambitum describet, quàm si à multo maiore uirtute moueretur. Quapropter ut huiusmodi Aristotelis sententiam examinaremus, Theoremata quæ sequuntur, demonstrauiamus.

Propositio prima.

Si Remiges nauigium mouere possunt, maius semper spatium remi manubrium percurret, quàm nauigium.

SItem remus a c, manubrium a, Scalmus b, qui propter nauigij motum spatium percurret à b in d, in quo loco ipse remus a e, situm rectitudinis habeat e f. Spatium itaque quod a conficit, curua linea sit a e, cui recta linea respondeat a z, in rectam e f perpendicularis. Nauigium uerò idem spatium conficiet, quod Scalmus b: aio igitur ipsam a z, rectam lineam recta b d maiorem esse. Secet enim recta a c, rectam e f in g: æquiangula sunt igitur bina triangula a g z & b g d: quapropter sicut a g ad b g, sic a z ad b d, per quam sexti libri Euclidis: maior est autem a g ipsa b g: & maior igitur erit a z, quam b d, & proinde maius spatium remi manubrium percurret, quàm nauigium, quod demonstrandum erat.




Quod si à puncto b, rectam lineam utrinque ducamus h k, ad remi mensuram, rectos facientem angulos cum b d, rectam quæ a z secantem in i, manifeste intelligemus ipsam rectam a z consistare ex a i & i z, quarum prior respondet curuæ a h, quæ motu proprio manubrij descripta est: posterior uero æqualis est rectæ b d, quæ motu nauigij decursa est.

Pro

Propositio secunda.

Si remi manubrium motu proprio, & nauigium æqualia spatia pertran-
sierint, fieri non poterit, ut palmula moueatur: sed
ueluti centrum immota manebit.


ESto iterum remus a c, manubrium a, Scalmus h: tãrum autem spa-
tium conficiat nauigium, quantum motu proprio a. Dico quod
c, remi palmula immota manebit. Nam si à loco suo dimota fue-
rit: spatium igitur permeet c d ad posteriora: quo quidem decurso remus



a c, positionem rectitudinis habeat f d. Scal-
mus itaq; b, translatus erit in g. Excitetur
autem à puncto b in utramq; partem linea e
b r, ad rectos angulos super b g, & à puncto
a, recta a h super d f: itemq; à puncto e, recta
c e super e r, ipsarum uerò rectarū linearum
e r & a h, sectio sit in k, sed c e & d f, sit in z: et
quoniam a k, id spatium est quod motu pro-
prio remi manubrium permeauit, curuili-
neo enim responderet r, recta autem b g, id
spatium est, quod nauigium confecit: ipse igitur
rectæ lineæ a k & b g, æquales erunt.
Atqui in duobus æquiãgulis triangulis e b
c & b a k, uel per 26. propositiones primi Eu-
clidis, uel per 4. sexti, æquales esse concludes

a k & e c rectas lineas: quapropter æqualis erit e c rectæ b g, per commu-
nem sententiam: eidem autem b g, æqualis est e z, in parallelogrãmo per
34. propositionem ipsius primi libri: æqualis igitur erit recta e z rectæ e
c, pars toti: quod est impossibile. & propterea immota manebit palmula
c, quod erat à nobis ostendendum.

Idem aliter demonstrabis ostensoria demõstratione. Remus in prin-
cipio motus positionem habeat a b c, ducatur à puncto e, in quo remi pal-
mula, recta linea c g, rectos efficiens angulos in puncto g, cum ea recta li-
nea per quam ad motum nauigij Scalmus b mouetur, ipsa deinde recta li-
nea c g, producatuſ usq; ad e, ut sit g e æqualis a b. Rursus à puncto b, su-
per b g, ad rectos angulos recta linea excitetur k b f, in quam ueniant ex
a & c, perpendiculares a k & c f. Et quia ipsæ eadem rectæ lineæ a k & c f,
æquales sunt per 26. primi Euclidis, ipsi autem f c recta b g, est æqualis in
parallelogrammo: a k igitur æqualis erit b g, per communem sententiã.
Atqui tantum spatium conficit b, quantum nauigium, ipsum uerò nauis-
gium quantum a, motu proprio per hypothesim: conficit autẽ spatium
a k: confi-



ak : conficiet igitur b spatium bg, & quia anguli ad g recti sunt: idcirco cum Scalmus peruenerit ad g, habebit remus a c, rectitudinis situm ec, in quo loco illius remigationis finis erit. Sic igitur palmula c, à loco suo dimota non fuit, quod demonstrandum erat. Cæterum aduertendum est rectam gc, minorem esse bc, remi dimidio: sit autem earum differentia ct: igitur quo tempore Scalmus b transfertur in g, excurrit palmula c, in ipsam longitudinem ct, sed neq; ad posteriora neq; ad anteriora mouebitur: hoc enim solum demonstrare uoluimus. Fieri tamen

posse non dubitamus, ut aliquando tam dissimili impulsu, tamq; inæquali motu ferat nauigiū, ut remi palmula aliquātis per in aduersum moueat, sed confestim ad priorem locū remeabit. Neq; prius, aut posterius, Scalmus perueniet ad g, quam ipsa palmula se appellat ad c t, quasi digressa non fuisset à loco suo. Aliter enim inæqualia spatia uiderentur conficere nauigiū & remi manubriū contra hypothesein. Et quoniam cum hoc acciderit celerius ferret nauigium in fine, quam in principio: aliam igitur accessisse uirtutem præter remorum impulsu, consequens est.

Propositionis conuersio.

Huius propositionis conuersionem demonstrabis, nempe si remi palmula dimota non fuerit à loco suo, ibiq; tam diu persistat, donec remus situm rectitudinis obtineat, tantum spatium conficere manubrium motu proprio, quantum nauigium. Recta enim cf equalis est ak, per 26. primi: æqualis etiam bg, per 34. ipsius primi libri: igitur ak & bg, æquales erunt per communem sententiam.

Propositio tertia.

Si remi manubrium motu proprio duplum confecerit spatium, quam nauigium, tantum prouehetur ea remigatione nauigium, quantum palmula retrocesserit.

Remus enim incipiente motu positionem habeat ac, desinente uerò rectitudinis situm fg: Scalmus igitur b propter nauigij motu, spatium conficiet bd. Excitetur à puncto b, in utramq; partem perpendicularis ez, in quam ueniant à punctis a & c, ad rectos angulos rectæ lineæ ae & cz: spatium autem ae, à manubrio decursu motu proprio spatij bd, duplum sit: recta uerò linea ch, curuæ respondeat cg, Bb quæ

z, dimidio eiusdem a e, & quoniam a e & c z, æquales sunt: reliqui igitur c h, dimidio eiusdem a e, maior erit: & proinde minor erit b d quam c h. Nauigium igitur minus spatium decurret in anteriora, quam remi palmula in contrarium, quod demonstrandum suscepimus.

Corollarium.

EX hac & præcedenti infertur, quòd si remi manubrium motu proprio maius spatium decurrat, quam nauigium, siue id sit duplum, siue minus duplo, siue maius duplo, spatium quòd nauigium interim decurrit ad anteriora, & quòd palmula remi in contrarium similiuncta, ei quòd ipsum remi manubrium motu proprio conficit, æqualia erunt. Semper enim b d, æqualis est h z: tota uerò c z, quæ æqualis est a e, ex suis constat partibus c h & h z.


Propositionis conuersio.

Si nauigium longius progrediatur, quam remi palmula retrocedat, spatium conficiet plusquam dimidium eius quòd motu proprio remi manubrium decurrit: si minus, citra dimidium

HVIVS demonstratio ex supra dictis facile colligi poterit.

Propositio quinta.

Si celerius feratur nauigium, quam remi manubrium, mouebitur palmula in ulteriora, nilque unquam retrocedet, idque spatium decurret, quo nauigij motus motum manubrij superat.



HAbeat enim remus incipiente motu positionem a c: desinente uerò situm rectitudinis f g. Scalmus igitur b, propter nauigij motum translatus, erit in d. Sit itaque spatium b d, maius quam a h, à remi manubrio motu proprio decursum: sic enim celerius dicetur ferri nauigium, quam manubrium. Dico quòd palmula c, in ulteriora mouebitur. Nam cum Scalmus b, prouectus fuerit in d: translata erit ipsa palmula c ubi g, in rectitudinis situ, spatiumque conficiet c g curuilineum, cui respondet c k: mouebitur igitur palmula in ulteriora. Nihil autem unquam retrocedere, ostendetur in hunc modum. Eadem enim celeritate mouentur a, in h

Bb 2 & c,

IN THEORICAS PLANETARVM GEORGII PURBACHII

CHII ANNOTATIONES ALIQVOT, PER
Petrum Nonium Salaciensem.



Voniam hæc Planetarum theoricę secundum doctrinam Ptolemæi & Alphonsi idcirco à Georgio Purbachio conscriptę sunt, ut tabularum canones facilius intelligi possent: nos igitur ea tantum annotare uoluimus, quę ab interpretibus uel non satis, uel non rectę exposita sunt. Quanquam scimus pleraque eorum quę in eisdem tabulis scripta sunt, cum obseruationibus quorundam aliorum insignium Astronomorum non congruere. Theorica Solis ad hunc ferę modum à Georgio Purbachio enarratur. Sphæra Solis tribus constat orbibus à se inuicem diuisis atque contiguis. Orbis medius æqualis est crassitudinis, cui Solare corpus hæret. Connexam superficiem simul habet cum concaua supremi: concauam uerò cum cõuexa infimi. Et earum centrum extra mundi centrum positum est. Sed concaua infimi & conuexa supremi concentricę sunt mundo. Sic igitur tota sphæra Solis mundo concentrica est. Extremi orbis partim sunt eccentrici, partim concentrici: sed orbis medius totus est eccentricus.

Mouentur duo extremi orbis super centro mundi & axe zodiaci, eodem omnino motu secundum Alphonsinos, quo octaua sphæra mouetur. Et appellantur deferētes augem Solis. Quoniam enim suo motu centrum orbis Solem deferentis circa cętrum mundi circumuoluunt: augem idcirco Solis eodē moueri motu necesse est. Est autē aux Solis siue apogeon punctum in media crassitudine deferentis à centro mundi distantissimū, terminus uidelicet lineę ab ipso mundi centro per centrum deferentis ductę: oppositum uerò augis siue perigeon oppositum punctum in ipso eodem orbe Solē deferente. Et est hoc tempore Solis aux in secundo gradu Cancris, quam tamen Ptol. posuit fixa sede in sexto Geminorum.

Sol propter motum orbis medię sub ecliptica stellati orbis semper incedit æquali motu super proprio centro, minutis nempe 59. & secundis 8. fere quolibet die secundum signorum consequentiam. Et idcirco apparens motus qui ad centrum mundi refertur, inæqualis est, atq; tardior circa augem: uelocior uerò circa oppositum augis.

Linea ueri motus Solis est quæ à centro mundi ducta per centrum Solaris corporis ad zodiacum extenditur. Et uerus Solis motus siue appa-rens in zodiaco ab initio Arietis usq; ad hanc lineam computatur.

Linea mediij motus Solis est, quæ à centro mūdi usq; ad zodiacum du-citur, ei æquidistans quæ à centro deferentis ducta intelligitur ad Solaris corporis centrum. Et medius motus siue æqualis à principio Arietis us-que ad lineam mediij motus computatur. Initium Arietis appellamus Vernam sectionem eclipticæ octauæ spheræ, non imaginis initium, sed se-cundum Purbach, sectio est eclipticæ primi mobilis & æquinoctialis.

Argumentum Solis est arcus eclipticæ inter lineam augis & lineam mediij motus Solis, & est similis arcui eccentrici inter ipsam augis lineam & centrum Solis in periphæria ab ipso Solis centro annua reuolutione descripta.

Æquatio siue diuersitas inter æqualem motum & apparentem est ar-cus eclipticæ inter ipsas duas lineas æqualis motus & apparentis.

Quando nihil argumenti habetur, aut sex communia signa quæ gra-dus 180. complectuntur, nihil æquationis habetur, propter linearum ue-ri nec non æqualis motus coniunctionem.

Sole existente in linea à centro mūdi ducta super lineam augis perpen-diculari, quam quidem Purbach. mediæ longitudinis appellat. Ptol. ue-rò medium transitum maxima fit æquatio siue diuersitas. In alijs autem locis pro argumenti uarietate uersus augē & oppositū augis decrescunt.

Quando argumentum minus est 6. signis, linea mediij motus lineam ueri præcedit: & idcirco æquatio tunc subtrahitur ab inuēto medio mo-tu, ut uerus relinquatur. Sed quando argumentum maius est 6. signis li-neam ueri motus lineam mediij præcedit: & propterea additur æquatio me-dio motui, ut uerus inueniatur.


Annotatio prima.

EXactissimis obseruationibus ingressus Solis in æquinoctialia pun-cta anni quantitas cognoscitur. Per quam quidem si gradus 360. di-uiserimus, æqualis Solis motus unius diei patefiet. Et ad hunc modum tabula mediij motus Solis numeratione composita est. Ex medio autem motu cognito, & ingressu Solis in æquinoctialia & Solstitialia pūcta, lo-cus augis innotescet Geometrico syllogismo: & proportio quoq; semi-diametri deferentis ad distantiam centrorum. Atq; ex his argumenti ma-gnitude ad omnem situm, & æquatio siue diuersitas inter æqualem mo-tum & apparentem in rectilineo triangulo, in quo semidiameter deferen-tis cum distantia centrorum angulum continet distantia Solis ab oppo-sito augis: basis uerò distantia est eiusdem à mundi centro. Horum de-monstrationes apud Ptolemæum sunt in libro tertio Magnæ compo-si-tio

In theor. Planet. Geor. Purbach. annot. 199

tionis astrorum, quas ad nostra tempora usurpabimus ad hunc modum.

Orbis signorum esto $abcd$, super centro e . In quo a , sit punctum Ver-
nale, c Autumnale, b Aestiuale, & d Hyemale, rectæq; lineæ connectan-
tur ac & bd , & quia tempus ab æquinoctio Verno ad Autumnale ma-
ius reperitur anni medietate: tardius autem mouetur Sol circa augem,
quàm circa oppositum augis: patet igitur augem eccentrici esse in medie-
tate eclipticæ abc . Similiter quia tempus à Solstitio æstiuo ad æquino-
ctium Autumnale maius reperit quàm ab æquinoctio Verno ad ipsum
Solstitium: necesse est igitur locum augis esse in quadrante bc . Sit itaq;



punctum f , centrum ec-
centrici in ipso secundo
quadrante, & ducta li-
nea recta ef , occurrat
circumferentiæ eclipti-
cæ in m : eccentrico ue-
rò in r . Queritur igitur
quanta sit linea ef , quam
appellant eccentricita-
tem, & quantus sit ar-
cus bm , quo locus au-
gis distat à Solstitio æ-
stiuo, quæ quidem hac
arte patefient. Veniant
enim per f , duæ rectæ li-
neæ uidelicet ik , æqui-
distans rectæ ac & gh ,

æquidistans rectæ bd . Et quoniam Sol perambulat arcum qn , qui est à
sectione Verna ad Solstitium æstiuum in diebus $93^m.27^s.3^t$. arcum ue-
rò np , qui est ab ipso Solstitio æstiuo ad Autumnale æquinoctium in die-
bus $93^m.33^s.57^t$. quemadmodum tabula Solaris motus ad annū 1552.
Petri Pitati subiicit, quod quidem modò perinde recipiemus, ac obser-
uationibus repertum esset: arcus igitur qn , per tabulā mediū motus So-
lis, quam Alphōsus composuit: graduum erit $92^m.6^s.33^t.13^q.$
 17^r . Arcus uerò np , Gr. $92^m.13^s.21^t.3^q.45^r.4^s.55^t$. & totus arcus qn p,
Gr. $184^m.19^s.54^t.3^q.59^r.4^s.12^t$. Cuius dimidium gp , Gr. habebit $92^m.$
 $9^s.57^t.3^q.29^r.4^s.36^t$. Est autem gk , quarta circuli: igitur kp , duorum
graduum erit minut. $9^s.57^t.3^q.29^r.4^s.36^t$. Similiter arcum gp ,
qui iam innotuit, à cognito arcu np auferemus, & relinquentur minut.
 $3^s.2^t.24^q.3^r.16^s.4^t.19^q$. pro arcu ng . Secet autem recta gh , rectam ac in pun-
cto l : & erit idcirco fl æqualis sinui recto arcus kp : recta uerò el , æqua-

lis

lis sinui recto arcus ng . Ipsa igitur $f l$, partium æqualium inuenta erit 3780. qualium in semidiametro circuli eccentrici sunt 100000. & $e l$, partium earundem 99. Et quoniam quadratum ex ef , duobus quadratis ex $f l$ & $e l$, æquum est: ipsa igitur ef , partium erit 3781. & trium decimarum, qualium nempe semidiameter eccentrici est 100000. Igitur qualium eadem semidiameter est sexaginta, talium erit ipsa ef , partes 2. minut. 16. secund. 7. tert. 4. fere. Et quoniam sicut ef ad $f l$, sic sinus totus ad sinum rectum anguli $f e l$, in triangulo rectangulo $ef l$: sinus igitur reclusus ipsius anguli $f e l$, partium erit 99966. fere. Arcus itaque eiusdem anguli $f e l$, gradus habebit 88. m . 32. Vtor autem tabula sinuum rectorum Petri Appiani.

Et idcirco $b m$, gradus unus erit cum minut. 28 signi Cancrī. Quod tamen non nihil discrepat à loco augis, quàm prædictus Petrus Pitatus, iuxta calculum motus octauæ spheræ in capite tabulæ posuit. Et proinde non conueniunt sibi inuicem ex amussim hypotheses Alphonsi. Ptolemæus uerò quoniam aliud posuit temporis interuallum ab æquinoctio Verno ad solstitium æstiuum, & Autumnale æquinoctium, & aliam æqualis motus Solis quantitatē, licet hac eadem methodo usus fuerit: aliam tamen inuenit eccentricitatem, partium uidelicet duarum cum minut. 29. & dimidio fere unius minuti: locum uerò augis in medio sexti gradus Geminorum. Et quia multis antè annis idem omnino repertum fuerat ab Hipparcho: putauit idcirco ipsam Solis augem immobilem esse, similiter & distantiam centrorum. Quam obrem quòd Georgius Purbachius scribit de motu duorum orbium deferentium augem Solis, & corollarium de paruis circulis descriptis ab axe & polis orbis Solem deferentis, atque centro circuli eccentrici propter motum octauæ spheræ, ex doctrina est Alphonsi, non Ptolemæi. Quam quidem doctrinam incertissimam reperiēs, si augem Solis tempore Ptolemæi supposueris ante solstitium æstiuum fuisse Gr. 24. minut. 30. quemadmodum ipse testatur. Nam quoniam nostro tempore id est anno 1552. à Christo nato in secundo gradu est Cancrī, iuxta calculum Alphonsinorum: oportuit igitur ipsam Solis augem à tempore obseruationis Ptolemæi ad nostrum usque tempus, in annis nempe 1420. Grad. circiter uigintis sex progressam fuisse. Quos tamen octaua spheræ nec secundum Ptolemæi calculum, nec Alphonsi nec etiam Albategnī percurrere potuit. Sed si obseruationibus Albategnī magis fidendum putes, (alicuius enim Astronomi peritissimi obseruationibus inniti debuit Alphonsus, ut augem Solis astrueret octauæ spheræ motu moueri) in simile incidēs incommo- dum. Nam aux Solis reperta fuit ab Albategnio Gr. 7. m . 43. ante tropicum æstiuum, ab Alphōso autem posita fuit gradu uno minutis fere 20.

aute

In theor. Plan. Geor. Purbac. annot. 201


ante idem tropici punctum. Intercesserunt autem inter Albategni & Alphonsi considerationes anni ferè 377. Quod quidem facile concludes, si ab annis 1420. qui fluxerunt à tempore Ptolemæi vsq; ad nostrum tempus, annos detraxeris 743. qui fuerunt inter eundem Ptolemæum & Albateg. Deinde verò ab annis qui relinquuntur, annos detraxeris 300. qui fluxerunt ab anno 1252. à Christi natiuitate vsq; ad tempus presens. Quapropter si Albateg. & Alph. obseruationes de loco augis solis ueræ sunt: in spatio igitur ipsorum annorum 377. progressa fuit ipsa Solis aux Gra. 6. min. 23. tardiores tamen inuenies octauæ spheræ motum in illo tempore, siue calculum sequaris Alph. siue Albateg. Quin si loca stellarum fixarum ab Albateg. inuenta cum locis earundem conferas, quæ in tabulis Alph. scripta reperiuntur, gradus tantum quinque differentia inuenies, cum min. 38. non Gr. 6. min. 23. Et idcirco cur motus augis Solis idem sit secundum Alphonsinos, qui octauæ spheræ tribuitur, causam ipsi reddere non poterunt. Nec minus mirari debemus, quòd posuerit Alph. augem Solis tempore incarnationis Christi in 12. gradu Geminorum, cum Ptol. qui fuit Christo posterior annis ferè 137. eandem posuerit in 6. gradu eiusdem signi. Par autem dissidentia inter Arzachelem & Albateg. Cùm enim Solis augem Albategnius posuisset in 22. gradu Geminorum, Arzachel eo posterior eandem posuit in 17. gradu eiusdem signi. Tantarum uerò uarietatum inter uiros tam eximios causa fortasse fuit, quòd ingressus Solis in solstitium æstiuum difficile admodum fuit instrumentis inuenire, propterea quòd in ea Zodiaci parte imperceptibili differentia declinatio uariatur. Ex cuius quidem rei cognitione supra dicta de loco augis demonstratio pendet. Quapropter multò certiore methodo id ipsum inuenies per ingressum Solis in æquinoctialia puncta, & in principium alterius signi ipsis æquinoctijs uicini, uel per tria, quæcunque alia loca per obseruationes uerificata: quemadmodum in tertio libro Epit. subtili admodum methodo Ioannes de Monteregio inuestigare docuit. Tametsi Gebro uisum fuerit non satis exactè locum augis, & eccentricitatem ita inueniri posse, propter multiplicem numerorum multiplicationem, ac diuisionem, & radicum quadratarum extractionem.

Ex loco augis cognitio argumenti magnitudo inuenitur, & ex ipso argumento æqualis motus & inæqualis apparentis uel differentia in omni situ innotescit. Quoniam enim in supra scripta figura parallelæ sunt duæ rectæ ac & ki : angulus igitur ifr super eccentrici centro angulo aem super mundi centro æqualis est, & idcirco duo arcus ir & am proportionales sunt. At arcus am grad. 91. min.

28. continet, per ea quæ iam demonstrauiimus: tot enim relinquuntur detractis à gradibus 180. semicirculi a m c, gradibus 88. min. 32. arcus m c, igitur arcus i r gradus etiam continet 91. min. 28. eccentrici Solis. Quibus quidē gradibus atque minutis duos addemus gradus cum min. 10. arcus i q, siue k p qui iam innotuit: arcus igitur q r cognitus erit, graduum uidelicet 93. min. 38. Sol itaq; prædicto anno 1552. à Christi natiuitate cum erat inæquali motu apparentiue in initio Arietis ante ipsū Arietis initium medio motu reperiēbat gradib. duob. cū m. 10. tūc igitur retinebat gradum 27. m. 50. signi Piscium argumenti: aut habebat Gr. 266. min. 22. nam tot relinquuntur arcu augis a m detracto à gradibus 357. min. 50. mediū motus. Per hæc igitur non erit difficile radicem mediū motus Solis statuere ad æram quamcunque. Vt si exempli gratia, radicem mediū motus Solis statuere libeat ad initium annorum Christi: quoniam igitur prædicto año 1552 in sectione Vernæ id est Arietis initio fuit decima die mensis Martij circa meridiem urbis Venetæ secundum calculum Petri Pitati: fluxerunt idcirco usque ad id tempus anni Romani 1551 menses duo, & dies ferè 10. In tanto autem tempore medius motus Solis est signa communia 2. Gr. 19. mi. 33 quibus quidem detractis à Gr. 357 m. 50. id est à signis 11. Gr. 27. mi. 50. mediū motus ab Ariete inchoatis, habebimus mediū Solis motū in initio annorum Christi in meridie urbis Venetæ sig. 9. Gr. 8. m. 17. Ptolemæus uerò quoniam augem Solis fixam sedem putauit habere in Gr. 5. m. 30. signi Geminorum: inde igitur mediū motus initio sumpto, radicequē posita ad initium regni Nab. tabulas suas construxit. Quod ut efficere posset: distantiam Solis ab auge secundum medium motum inuestigauit in Autumnali æquinoctio, septimo Adriani imperatoris anno, eamquē inuenit graduum 116. min. 40. tantamq; multo facilius quā per demonstrationem illam octauī capitis ex figura superius descripta concludes, si a posueris initium Libræ, b Cancrī, c Arietis. Nam quoniam arcus cm, in illo tempore gradus continebat 65. min. 30: arcus igitur am, qui relinquitur ex semicirculo graduum erit 114. min. 30. ideoquē eccentrici arcus ei proportionalis i r, totidem gradus atque min. comprehendet. Arcus porro i q aut k p, ostensus ab eo fuit Gr. 2. min. 10: totus igitur q r, graduum erit 116. min. 40. Et idcirco quando Sol in puncto q erat eccentrici, initiumquē Libræ occupabat, à loco augis distabat ipsis Gr. 116. min. 40.

Cognito autem argumento, cognita etiā proportione semidiame-
tri eccentrici ad eccentricitatem facile est differētiā inuenire inter æ-
qualem motum & apparentem. Esto enim eccentricus Solis circulus
a b c d, super centro e, centrum mundi sit f, linea augis per ipsa centra
transien

transiens b e f d: linea uerò a c rectos angulos efficiens cum b d, super ipso f puncto, ea est quam Ptolemæus dixit transitus mediij. Purbacchius uerò mediæ longitudinis: in qua quidem cum Sol existit, maxima fit differentia inter duos motus æqualem & apperentem, magnitudo uidelicet anguli fa e, aut f c e. Quæ quidem ex proportione semidiame-



tri e c ad f e, cognita redditur. Si enim punctum c, centrum circuli eccentrico equalis intellexeris, erit recta linea e f, sinus rectus arcus anguli f c e. At qualium partium sunt in e c, 100000. talium ostensa est e f 3781. cum tribus decimis: arcus igitur ipsius anguli c e,

gradus habebit duos cum min. 10. & se. 3. ferè. Angulus itaque b e c, argumenti Solis gradus complectetur 92. min. 10. se. 3. Ptolemæus uerò quoniam maiorem reperit eccētricitatem, maximam idcirco differentiam equalis motus & apparentis duorum graduum posuit cum mi. 23. Ponamus porrò Solem in alio situ ut in g, & angulus b e g, distantia ipsius ab auge secundum medium motum cognitus supponatur: angulus igitur f e g, trianguli e f g, ex duobus rectis relictus cognitus erit: duo uerò latera f e & e g, ipsum angulum cōtinentia cognita sunt. Quapropter reliqui anguli eiusdē trianguli per 24. propositionem primi libri Gebri cogniti erunt: & proinde angulus f g e, differentia motus æqualis & apparentis notus euadet.

Annotatio secunda.


Q Vanquam motus Solis medius maior uero sit in secūda eccētrici medietate, quæ post augem est: minor uerò in prima medietate ante augem, si ab Ariete computentur: aliunde tamen si initium sumant ipsi motus, fieri posse non dubitamus, ut aliquando medius motus & uerus pares sint. Quod quidem ex ijs propositionibus, quæ sequuntur, apertum fiet.

Propositio prima.

Si alicuius temporis motus Solis æqualis in eccentrico, & apparens qui ad centrum mundi refertur, pares fuerint, punctum mediæ longitudinis transitus uel mediij intra ipsorum motuum terminos includetur.

E Sto igitur eccētricus Solis circulus a b c, cuius centrum d, linea augis a f

gis af , & arcus ce , in eccentrico sit pertransitus à Sole, dum æqualis motus atque apparens pares sunt. Dico quod punctum mediæ longitudinis erit inter c , & e : sit enim punctum g , centrum mundi, & connectantur dc , de , gc , & ge . Angulus igitur cge , subtēdit in zodiaco arcum eclipticæ à Sole pertransitum, dum æquali motu arcum eccentrici percurrit ce , ipsi eclipticæ arcui similem proportionalem uē. Cōnectatur enim ce , & circa triangulum cde , circulus describatur cde , qui necessario transibit per g , quia propter motuum æqualitatem si-




militudinem uē duo anguli edc , & egc , æquales inuicem sunt: & idcirco in eodem segmento erunt. & propterea si non trāsiret per g , sequeretur impossibile contra 16. propositionem primæ libri Eu. Transit idcirco per g : & idcirco in quadrilatero $decg$, duo oppositi anguli dgc & dec , coniuncti duobus rectis sunt æquales per 22. tertij. Acutus est autem dec , quia triangulū cde , isosceles est: angulus igitur dgc , obtusus erit. Præterea quoniam angulus dce , ad basim ipsius isoscelis tri-

anguli acutus est: æqualis porro est ei angulus dge , quippè qui in eodem segmento existat dge . Ipse igitur angulus dge , acutus erit: linea itaque recta ag , acutum angulum efficit cum ge : obtusum uero cum gc . Excitetur igitur à puncto g , super ipsa ag , recta linea gi , ad rectos angulos: cadet idcirco ipsa perpendicularis inter ge , & gc : & erit idcirco i , mediæ longitudinis punctum. Quare si alicuius temporis motus Solis æqualis & apparens pares fuerint, punctum mediæ longitudinis intra ipsorum terminos includetur, quod demonstrandum erat.

Corollarium.


EX hac inferas, quod linea gi , mediæ longitudinis motū apparentem per æqualia secat, sed non æqualem. Ostensum est enim duos angulos dec & dgc , duobus rectis æquales esse. At dec , æqualis est angulo dce , in triangulo isosceli: angulus uerò dge , eidem dce , æqualis est, quia in eodem segmento sunt: duo igitur anguli dgc & dge , duobus rectis sunt æquales per communem sententiam. Et idcirco tantum excedit obtusus dgc , rectum angulum dgi , quantum ipse dgi , angulum acutum superat dge . ostensum est enim hoc in Arithmetica. Et proinde ipsorum angulorum differentia anguli uidelicet egi & egi .

segmento existūt: angulus igitur $d o e$, angulo $d e c$, equalis est per cōmunem sentētiā: & idcirco duo anguli $d o c$, & $d o e$, duobus rectis equales erunt. Et quoniam recta linea $g i$, angulum apparentis motus



$c e g$ per æqualia secat p̄ hypothesim: tantū igitur excedit obtusus angulus $d g c$, rectum $d g i$, quantum ipse $d g i$, angulum superat $d g e$: & idcirco duo anguli $d g c$, & $d g e$, coniūcti duobus rectis sunt equales. Quare duo anguli $d o c$, & $d o e$, coniūcti duobus angulis $d g c$, & $d g e$, coniūctis equales erunt per communem sententiam. At in triangulo $d c g$, maior est angulus $d o c$, ipso $d g c$, per 21. propositionem primi libri Eu. & maior etiam est exterior angulus $d o e$, interiore $d g e$, ī tri-

angulo $g d e$, per 16. propositionem eiusdem primi libri: duo igitur anguli $d o c$, & $d o e$, coniūcti duobus $d g c$, & $d g e$, coniūctis maiores erunt. Sed equales ostensi sunt: igitur impossibile. & propterea punctum g , extra descriptum circulum minimè relinquitur. Eadem arte ostendemus intra ipsum circulum circa triangulum $c e d$, descriptum



relinqui non posse. Producat̄ur enim $g e$, donec occurrat eiusdem circuli circumferentię in p̄cto l , ut in tertia figura, & connectātur $d l$, & $c l$: duo igitur anguli $d g c$ & $d g e$, cōiūcti duobus angulis $d l c$, & $d l e$, coniūctis æquales ostendentur, ut antea. At maior est $d g c$, ipso $d l c$, per 21. propositionem primi Eu. & maior etiam $d g e$, ipso $d l e$, per 16. eiusdem primi lib. igitur duo anguli $d g c$, et $d g e$, coniūcti duobus $d l c$, & $d l e$, coniūctis maiores

erunt: æquales igitur, & maiores, quod rursus est impossibile. Et propterea circulum ipsum descriptum circa triangulum $d e c$, per g transire necesse est, ut in prima figura: & proinde duos angulos $c g e$, & $c d e$ æquales esse. Quapropter cum Sol perambulauerit eccentrici arcum $e c$, æquali motu, arcumq̄ zodiaci apparenti motu peragrauerit, à linea medię longitudinis per æqualia sectum: tantus erit illius temporis æqualis motus, quantum apprensus, quod demonstrandum suscepimus.

Propositio

Ex gradibus itaque 90. quos continet angulus rectus a g i, gradus auferemus acuti anguli e g i, dimidium nempe dati motus: & cognitus idcirco relinquetur ille Zodiaci arcus, quem subtendit angulus a g e. Et quia locus augis a per tabulas cognoscitur, locus igitur puncti e cognitus erit. Cui si addideris totum Zodiaci arcum apparentis motus, quem subtendit angulus e g c, initium & finis quaesiti arcus patefient. Et quia Zodiaci arcus quem subtendit angulus b g h, ex opposito constitutus est: uterque igitur arcus apparentis motus cognitus erit. Quantum uero Sol in e existens à puncto augis secundum motum medium distet, non erit difficile inuenire. Rectae enim lineae connectantur d e, & d c, & à puncto d recta linea ad rectos angulos deducatur d r, super g e: cadet autem inter triangulum d g e, propterea quod angulus e g d, acutus ostensus est, & acutus etiam est d e g, utpote qui minori lateri subtendatur. In triangulo itaque rectangulo g d r, acutus angulus d g r iam innotuit, recta uero d g cognita supponitur in partibus semidiametri d e: & quoniam sicut sinus totus ad sinum rectum anguli d g r, sic d g ad d r: recta igitur d r, in eisdem partibus cognita erit, ea autem sinus rectus existit arcus anguli d e r, ipse igitur arcus anguli d e r, cognitus erit. At angulus a d e distantiae Solis ab auge secundum medium motum duobus interioribus d e r, d g e, aequalis est in triangulo e d g: ipse igitur angulus a d e, cognitus erit, & proinde quantum Sol in e existens ab a, distet secundum medium motum, ignorari non poterit. Ipsum porro angulum d e g, aequationis angulum Astro nomi appellant, qui profecto aequationis angulo d c g, ad punctum c, attinenti aequalis est. in uno enim atque eodem circuli segmento existunt circa triangulum d c e descripti per demonstrationem praecedentis.

Sed ponamus aequalem motum dato tempore respondentem gradibus 180. maiorem repertum esse. Eum igitur auferemus ex 360. & cum reliquo arcu praedicto modo operabimur. Nam cum Zodiaci arcus apparentis motus, qui uno seminiculo minor est, cognitus fuerit: is igitur qui ex integro circulo relinquitur, ignorari non poterit. Vt si aequalis motus dato tempore respondens ex gradibus 360. subtractus arcum reliquerit c e, arcum igitur Zodiaci apparentis motus qui angulo subtenditur e g e, cognitum reddemus praedicta arte. Tunc autem cognitus erit, cum quantum illius termini à puncto augis distant, cognitum fuerit.

Reliquum itaque Zodiaci Sol apparenti motu percurreret in dato tempore, atque aequalis motus ipsi apparenti par erit in ipso eodem tempore.

Exempli

Exempli gratia, sit anno Domini 1592. quo ego natus sum datū tempus 60. dierum, oporteatq; arcum zodiaci inuenire apparenti motu in ipſis 60. diebus pertransitum, cui quidem æqualis motus tãti temporis par sit. Ex tabulis igitur resolutis elicio æqualem motum 60. dierum sig. 1. Gr. 29. m̄. 8. 2^a. 20. quorum dimidium Gr. continet 29. m̄. 34. 2^a. 10. tantusq; erit angulus e g i: quo subtracto ex 90. gradus relinquentur 60. siue sig. 2. minut. 25. 2^a. 50. pro distantia initij ipsius arcus à puncto augis, quam quidem angulus d g e, in zodiaco subtendit. Et quoniam augem Solis prædicto anno eadem tabulæ subiiciunt sig. 3. Grad. 1. m̄. 11. 2^a. 55. his igitur coaceruatis, initium quæsiti arcus apparentis motus à principio Arietis distare inueniemus signis 5. Gr. 1. m̄. 37. se. 45. Et erit idcirco gradus 1. m̄. 37. se. 45. Virginis. Ipsis itaq; sig. 5. Gr. 1. m̄. 37. se. 45. arcum addemus æqualis motus, nempe sig. 1. Gr. 29. m̄. 8. 2^a. 20. & colligemus tandem sig. 7. m̄. 46. se. 5. quibus distabat finis quæsiti arcus à principio Arietis. Quapropter concludemus Solem prædicto anno in spatio dierum 60. à gradu 1. m̄. 37. se. 45. Virginis ad minuta 46. se. 5. primi gradus Scorpj, apparenti motu zodiaci arcum pertransisse e medio motui parem, & in opposito zodiaci arcu similiter se habuisse. Et quoniam in eodem tempore linea mediij motus præcedebat: ut igitur intelligamus quantum Sol medio motu ab initio Arietis distabat, operæpretium erit æquationem inuenire, hac uidelicet arte. Quoniam enim maximam Solaris motus æquationem eadem tabulæ subiiciunt Gr. 2. m̄. 10. quibus quidem in tabula sinuum rectorum circuli semidiametrum subiiciente partium æqualium 100000. partes respondent 3780. Ratio igitur semidiametri eccentrici ad eccentricitatem ea erit, quam habent 100000. ad 3780. Sicut autem sinus totus ad sinum rectum anguli d gr, sic d g ad d r: multiplicabimus igitur partes 3780. quas continet d g, in 86976. que sunt in sinu arcus anguli d gr, qui iam innotuit, graduum uidelicet 60. m̄. 25. se. 50. productum uerò diuidemus per sinum totum, sola reiectione quinque ultimarum figurarum, & uenient in quotiente 3288. ferè, quibus respondet in ipsa tabula sinuum rectorum Gr. 1. cum m̄. 53. pro magnitudine anguli æquationis d e g. Æqualis est autem angulus a d e, duobus interioribus oppositisq; d g e & d e g: idcirco coaceruatis Gr. 60. m̄. 25. se. 50. cum Gr. 1. m̄. 53. conflabitur arcus Gr. 62. m̄. 18. se. 50. pro magnitudine anguli a d e: & proinde arcus eccentrici a e, illi subtensus totidem Gr. cum m̄. & se. comprehendet. At uerò ipsa a e, proportionalis existit arcus eclipticæ inter augis punctum & lineam mediij motus: ipsis igitur Gr. 63. m̄. 18. se. 50. augem Solis addemus signa nempe 3. Grad. 1. m̄. 11. se. 55. & prodibunt sig. 5. Grad. 3. m̄. 30. se. 45. Quapropter cum Sol fuerit in e, linea mediij motus erit in Gr. 3. m̄. 30. se. 45. Virginis. Vel


D d faci

tem cognita erit: & proinde distantia eiusdem ab initio Arietis cognita. Similiter cum fuerit in c, distantia eiusdem ab ipso Arietis initio patefiet. Æqualem porrò motum atq; apparentem æquales inuicē esse ex eo concludes, quòd duo anguli c d e & c g e inter se æquales sunt. Angulum uerò æquationis d e g, ex ea quæ fit in media longitudine transitu e medio, & ex angulo d g e cognitis, unico syllogismo reddetur notus. Eccentricitas enim d g, sinui recto anguli æquationis, quæ in media longitudine accidit, æqualis est: quapropter supposita ipsa mediæ longitudinis equatione graduum duorum cum min. 10. quemadmodum tabulæ resolutæ subiiciunt, talium partium erit ipsa centrorum distantia 3780. qualium in semidiametro eccentrici sunt 100000. In rectilineo autem triangulo e d g, sicut d e ad d g, sic sinus rectus anguli d g e, ad sinum rectum anguli d e g: per documentum igitur commune numerorum proportionalium ex d e & d g, & sinu anguli d g e cognitis, cognitum concludes sinum rectum ipsius anguli æquationis d e g: & proinde per tabulam sinuum rectorum idem equationis angulus patefiet. Distantiam itaq; Solis ab initio Arietis secundum motum æqualem in utrovis terminorum e & c, cognitum reddes, ut antea in præcedenti propositione.

Annotatio 3.

Sole in media longitudine existente maxima differentia fit inter æqualem motum & apparentem: in locis uerò ab ipsa secundum motum apparentem paribus interuallis remotis æquales erunt, tantoq; fient maiores, quanto linea apparentis motus ipsi mediæ longitudini uicinior fuerit: tanto autem minores, quanto remotior.

In eccentrico enim a b c, linea mediæ longitudinis sit b g i. Dico quòd in ipsis punctis b & i, maxima contingit differentia inter æqualem motum & apparentem. Ponatur Sol in quouis eccentrici puncto præter b, in semicirculo a b f, quod sit k, & connectantur d k & g k, item & d b. Ostendemus itaque maiorem esse æquationis angulum d b g, equationis angulo d k g. Ad punctum enim g, mundi cætrum angulum faciemus cum b g angulo b g k æqualem, sitq; b g l, & connectatur k l, circy



tum & apparentem. Ponatur Sol in quouis eccentrici puncto præter b, in semicirculo a b f, quod sit k, & connectantur d k & g k, item & d b. Ostendemus itaque maiorem esse æquationis angulum d b g, equationis angulo d k g. Ad punctum enim g, mundi cætrum angulum faciemus cum b g angulo b g k æqualem, sitq; b g l, & connectatur k l, circy


D d 2 lusq;

stantes & quales inuicem erūt: maior est autē ipse $d z g$, angulo $d o g$, per 6. propositionē primi Eucl. maior igitur erit $d k g$ quā $d o g$, per cōmunem sententiā: & p̄inde maior erit inter & equalē motū & apparentē differentia in k quā in o . Sole igitur in media longitudine existente maxima fit differentia inter & equalē motū & apparentem, & reliqua quae demonstranda erant. Tanta uerō differentia erit in i puncto, quanta in b . Nam quoniam recta linea $d g$ rectam $b i$, ad rectos angulos secat: duae igitur $b g$ & $g i$, & quales erunt: & idcirco duo anguli $d b g$ & $d i g$, & quales erunt per 4. primi.

De Luna.

Annotatio prima.


A Equatio centri est arcus epicycli augem ipsius ueram & mediam intercicens. Maximam porro fieri scribit Purbac. cum centrum epicycli fuerit modicum infra longitudes medias deferētis. Ea autem puncta medias longitudes dicere solet, quae per lineam rectam determinantur, quae à centro mūdi uenit in lineam augis orthogonalem. Ioannes uerō Baptista harum theoricarū antiquus expositor, & quidam alij putant, eccentrici locum in quo maxima fit æquatio centri, illud esse punctum in quo recta quaedam linea terminatur: quae quidem in puncto opposito centro eccentrici in paruo circulo cum augis linea rectos efficiēt angulos. Esto enim (inquit Baptista) eccentricus Lunæ circulus $a b c d$,



cuius centrum e , & diameter augis $a e d$, cētrum mundi f , & oppositum punctū cētro e , in paruo circulo sit g . Et à puncto f linea $f b$, & à pūcto g linea $g c$, super augis linea perpendiculares usq; ad circumferentiā eccentrici ducātur. Erit igitur linea $b f$, longitudinis mediae, & pūctum b , media longitudo: pūctū uerō c , quod quidem modicum infra mediam longitudinem est: locus (inquit) erit ubi maxima æquatio centri contingit.

Dd 3 Cg

Cæterùm allucinatur, quemadmodum in eadem ipsius figura quam descripsit, statim ostendemus. Connectantur enim rectæ lineæ $f c$ & $e c$. Præterea circa rectangulum triangulum $c f g$, circulus describatur $f c g$, cuius quidem ipsa recta linea $f c$ diameter erit per conuersionem primæ partis 31. propositionis tertij libri Euclidis: & idcirco ipsius circuli centrum in puncto medio erit eiusdem diametri $f c$: non autem in recta $e c$. Quapropter circulus ipse $f c g$, circulum $a b c d$ minimè tangit. Nam si tangit, punctum igitur contactus quod erit e , & ipsorū circulorum centra in una atq; eadem recta linea erunt per 11. propositionem tertij libri Euclidis. Atqui centrum circuli $a b c d$, est in recta $c e$: centrum uerò circuli $f c g$, est in $f c$, & propterea tangunt, sed alter alterum secat. Et quoniam quando circulus circulum secat, in duobus locis tantum secat, per 10. propositionem eiusdem tertij libri Euclidis. Esto itaq; una eorum sectio in c : altera uerò in i inter c & d , & connectantur rectæ $f i$ & $g i$. Aio igitur in quolibet puncto inter c & i , maiorem esse equationem centri, quàm in c : in ipso autem c atq; in i , equationes pares esse. Esto enim r , punctum quoduis in circumferentia eccentrici inter c & i , & connectantur $f r$ & $g r$: ipsa uerò $g r$, in rectum




continuumq; producta circumferentiæ circuli $f g c$, occurrat in puncto k , & connectatur $f k$. Duo igitur anguli $f c g$ & $f k g$, quia in eodem segmento sunt $f c k g$, inter se æquales erunt, per 21. propositionem 3. libri Euclidis. Atqui angulus $f r g$, quia exterior est in triangulo $f r k$, interiore oppositoq; $f k r$ siue $f k g$, maior est per 16. propositionem primi libri

Euclidis. Maior idcirco erit ipse angulus $f r g$ angulo $f c g$. Et proinde equatio centri in r , maior quàm in c . Duo uerò anguli $f c g$ & $f i g$, æquales inuicem sunt: in uno enim atq; eodem segmento existunt eiusdem circuli $f g c$: & propterea equationes centri in c & i æquales erunt, quæ quidem demonstranda suscepimus.

Lemma


Lemma.

QVod autem sumpsimus alteram sectionem descriptorum circulo-
rum esse in i inter c & d, non autem inter c & a, hac arte demonstra-
bimus. Nam si altera sectio ipsorum circulorum a c d & f g c, fuerit inter
a & c: esto igitur in l, & connectatur fl. Et quoniam recta f c, diameter est
circuli f g c: maior igitur est ipsa f c quàm fl. At uerò quoniam in circulo
a c d, à puncto f, quod ipsius
circuli centrum non est, due
recte linee ducte sunt f c & f
l, usque ad eiusdem circuli a
c d circumferentiam, qua-
rum quidem fl, centro pro-
pinquior est quàm f c: maior
igitur erit ipsa fl quàm f c,
per 7. propositionem 3. lib.
Euclidis. At minor osten-
sa est: igitur impossibile. Et
proinde duo descripti circu-
li a c d & f g c, in puncto c se
secant, & in alio quodam pū-
cto inter c & d: non autem
inter a & c, quod quidem su-
it assumptum.



Annotatio secunda.


QVamquã uerò in
omni puncto in
ter c & i, maior sit
centri æqua-
tio quàm in ipsis c & i: in
quolibet tamen situ inter
a & c, similiter in omni
situ inter d & i minor erit
æquatio centri quàm in c
& i. Ponatur enim epicy-
cli centrum in puncto m,
inter a & c. Dico quod ma-
ior erit centri æquatio in
c, quàm in ipso m. Conne-
ctantur



stantur enim duæ rectæ lineæ $f m$ & $g m$, & à puncto g in punctum n in quo recta linea $f m$, circumsecat $f g c$, recta ducatur linea $g n$. Duo igitur anguli $f n g$ & $f c g$, in eodem segmento sunt $f n c i g$. Et propterea æquales erunt inter se, per 21. propositionem 3. libri Euclidis. Maior est autem angulus $f n g$, quàm angulus $f m g$, per 16. propositionem primi libri. Igitur maior est angulus $f c g$ ipso $f m g$. Et idcirco æquatio centri in c maior erit quàm in m . Quod quidem demonstrandum erat. Similiter demonstrabis omnem æquationem inter d & i , minorem esse ea quæ contingit in ipso puncto i .


Annotatio tertia.

Aduertendum est præterea, quòd quamvis æquationes centri quæ fiunt inter c & i , maiores sint quibuslibet alijs quæ fiunt in ijs punctis quæ sunt inter a & c , & inter d & i : non possunt tamen omnes inter se æquales esse. Sumpto enim puncto quouis o , inter c & i , & descripto circulo per tria puncta f & g & o : uel igitur ipse descriptus circulus eccentricum secat in ipso o , aut tangit non secans. Si secat: in alio igitur loco rursus secat per 10. propositionem 3. libri Euclidis. Esto itaq; alterum sectionis punctum in descripta figura p , inter ipsa puncta c & i : et eadem igitur arte, qua usi sumus ad ostendendum æquationes factas ad puncta c & i , æquales esse inter se. Cæterum minores ijs quæ fiunt in alijs



punctis positis inter eadem c & i : maiores autem reliquis semicirculi $a c d$. Similiter ostendi poterit æquationes factas in punctis o & p , æquales inuicem esse: minores uerò eas quæ fiunt inter eadem o & p : reliquis tamen eiusdem semicirculi maiores. Non potest enim ipsum sectionis punctum quod quidem posuimus p , inter c & a cadere, nec inter d & i , præterea nec in ipsis c & i . Nam quoniam æquationes quæ fiunt in ipsis o & p punctis æquales sunt inter se: at maior est æquatio in o , facta

o facta, quàm ea quæ uel in c uel in i, uel in alijs quibusuis punctis circũferentiarum a c & d i, quemadmodum à nobis demonstratum est. Cader igitur altera sectio quæ est in p inter c & i, ne sequatur impossibile. At ponamus circulum ipsum per f & g, & punctum o, descriptum eccẽtricum non secare, sed tangere, quemadmodum in subiecta apparet figura. Erit itaque centri æquatio in ipso o facta, reliquis omnibus maior ipsius semicirculi a c d. Est enim punctum quoduis aliud in eodem semicirculo r, & connectantur fr & gr: à puncto autem t, in quo recta fr, circulum secat f g o, ad punctum g, recta ducatur linea g t: angulus igitur f t g, interiore opposito quæ g r t trianguli g t r, maior erit per 16. propositionem primi libri Euclidis. Atqui æquales inuicem sunt duo anguli f o g & f t g,



quia in uno eodemque segmento consistunt circuli f g o: maior igitur est angulus f o g, angulo g r t siue g r f. Quapropter æquatio centri in o, maxima erit earum omnium quæ in alijs punctis fieri possunt semicirculi a c d: & idcirco non omnes æquationes, quæ contingunt in punctis circumferentiæ c i, inter se æquales erunt, quod erat à nobis demonstrandum. Atque ex his simul concludes quod si circulus per f


& g, descriptus eccentricum tetigerit, in quo puncto eum tetigerit, ibi maxima fiet æquatio centri. Rursus in quo puncto maxima fuerit æquatio centri, ibi circulum per f & g, descriptum eccentricum tangere necesse est. Est enim maxima æquatio in o, & describatur circulus circa triangulum f g o: uel igitur tangit eccentricum in ipso o uel secat. Si tangit: in eo igitur puncto maxima fit æquatio. Si secat: in duobus igitur locis secat, atque in eis æquales erunt æquationes: in punctis autem intermedijs maiores contra hypothesim: quare non secat, sed tangit.

Ee Anno

per recta ai, constructū est: quadrati uerò kn latus quod est ln recte b i, est æquale: igitur in proposita recta linea a b, puncto signato c, ipsam de-
 nuò ita secauimus, ut quadratum ex a i, maiori segmento, quadratum mi-
 noris superet quadrato quod ex a c, quod faciendum erat. Numeris au-
 tem difficile non erit ipsa segmenta inuenire iuxta præsentem demon-
 strationem. Sit enim ipsa a b, recta linea partium æqualium 60. rectæ ue-
 rò a c, quadratum 600. sitq; eadem a b, ita secta in i, ut quadratum ex a i,
 quadratum superet ex b i, ipsis 600. oporteatq; inuenire quantæ sint e-
 dem a i & b i. Igitur quoniam quadratum ex a b, est 3600. detrahemus
 ex hoc numero 600. & relinquentur 3000. quorum dimidium 1500. di-
 uidemus per 60. & uenient ex partitione 25. tantaq; erit b i: & idcirco re-
 liquum segmentum a i, partiam erit 35. Quod sanè cum proposito conue-
 nit. nam quadratum ex 35. est 1225. quadratum uerò ex 25. est 625. abla-
 tis igitur 625. ex 1225. relinquuntur 600. quibus quadratum maioris se-
 gmenti quadratum superat minoris segmenti.

His igitur ita ostensis pūctum inueniemus in eccentrico, in quo ma-
 ximam fieri centri æquationem necesse est, quantumq; idem punctum
 ab auge distat, numeris indicabimus. Esto enim eccentricus Lunæ circu-
 lus a b c d, cuius centrum e, diameter augis a c, centrum mundi f: pun-
 ctum uerò oppositum centro e, à quo quidem ducitur linea augis medie
 epicycli sit g. Dico quòd in semicirculo a b c, punctum unum est in quo
 maxima fit centri æquatio, quod quidem hac arte inueniemus. Descri-
 pto super ef quadrato, rectam ponemus ei, in semidiametro e c, & qualem

dimetiēti eiusdē qua-
 drati. Quadratum igit
 ex ei, duplici qua-
 drato ex e f: æquum
 erit, per 47. proposi-
 tionem primi lib. Eu-
 clid. & communem
 sententiam. Deinde
 uerò propositam li-
 neam rectam e c ita se-
 cabimus, ut quadra-
 tum segmenti maio-
 ris quadratum supe-
 ret segmenti minoris
 quadrato ex ei, per
 præcedēs problema.
 Sit itaq; segmentum



Ee 2 ma

qualis erit: æquales porrò sunt ef & fg , per hypothæsim: duæ igitur fr & tg , inter se æquales erunt per communem sententiam. Rectam porrò connectemus kg , & in duobus triangulis rectangulis ftk & gkt , bases fk & kg , æquales inuicem ostendentur per quartam propositionem primi libri Euclidis.

At æquales posuimus ek & eo , quibus ablatis ex æqualibus er & ec , æquales relinquuntur kr & co : ipsi autem co equalis posita fuit fk : igitur fk & kr , æquales inuicem erunt per communem sententiam: & proinde tres rectę lineę kf , kg , & kr , æquales erunt inter se. Circulum itaq; describemus super k centro, interuallo autem kr , qui necessario transibit per puncta g & f .

Et quoniam circulorum $abcd$ & frg , centra k & e , in una eademq; recta linea sunt er , & ipsum r , punctum in utroq; ipsorum est: circulus igitur frg , circulum $abcd$, tanget in eodem puncto r . Non secat enim, quia per 10. propositionē tertii, & 20. primi sequeretur impossibile contra circuli definitionem. Rectas itaq; cōnectemus fr & gr : & angulus idcirco $ofrg$, maximus erit eorum qui ad reliqua puncta semicirculi abc , constitui possunt, ex lineis à punctis f & g uenientibus, per ea quę demonstrauimus in Annotatione 3. Contrapositioni porrò sunt ipsi iidem anguli eis qui in centro epicycli æquationem centri subtendunt: & proinde maxima æquatio centri in puncto r fit, quod inuestigandum suscepimus.

Lemma.


Quod autem sumpsimus trium rectarum linearum eo , co , & ef , quaslibet duas simul sumptas reliqua longiores esse: facile erit demonstrare. Nam eo & co , maiores sunt quàm ef , præterea quoniam eo , maior est quàm co : igitur eo & ef , multo maiores sunt quàm co . At quod co & ef , maiores sint quàm eo , ita ostendemus. Minor enim est f o quàm co . Nam si est ei equalis: igitur quoniam quadratum ex co , cum duplici quadrato ex ef , quadrato ex eo , æquum est: ipsi uerò quadrato ex eo , equalia sunt quadrata ex ef & fo , cum eo quod bis fit ex ef in fo , per 4. propositionem secundi libri Euclidis: duo igitur quadrata ex ef , cum quadrato ex fo , equalia erunt per communem sententiã quadratis ex ef & fo , cum eo quod bis fit ex ef in fo .

Quapropter detractis ex eis quadrato uno ex ef , & quadrato ex fo : æqualia idcirco relinquentur quadratum ex ef , & id quod bis fit ex ef , in fo : & proinde recta ef rectę fo , dupla erit per conuersionem 36. propositionis primi libri & communem sententiam, totiq; fc æqualis contra hypothæsim, nam iuxta doctrinam Ptolemęi & authoris Theoricarum æquales posuimus ef & fg , multoq; minores quàm fc , simili syllogismo ostendes maiores non esse fo ipsa co .

Quoniam enim quadrata duo ex $e f$, cum quadrato ex $c o$, quadrato ex $e o$, æqualia sunt: eidem uerò quadrato ex $e o$ æqualia etiam sunt quadrato ex $e f$ & $f o$, cum duplici eius quod fit ex $e f$ in $f o$: duo igitur quadrata ex $e f$, cum quadrato ex $c o$, ipsis quadratis ex $e f$ & $f o$, atq; duplici eius quod fit ex $e f$ in $f o$, æqualia inuicem erunt per communem sententiam. A duobus itaq; quadratis ex $e f$, atq; quadrato ex $c o$, unum quadratum auferemus ex $e f$ una, & quadratum ex $c o$, & relinquetur unum tantum quadratum ex $e f$: à quadratis uerò ex $e f$ & $f o$, cū duplici eius quod fit ex $e f$ in $f o$, quadrata auferemus ex $e f$ & $f o$, quæ quidem maiora sunt, si maius est $f o$ quàm $c o$, & maius relinquetur idcirco quadratum ex $e f$, duplici eius quod fit ex $e f$ in $f o$. Et propterea segmentum $f o$, minus est dimidio ipsius $e f$, per communem sententiam: segmentū igitur $c o$, multò minus dimidio eiusdem $e f$: quare multò maior erit recta linea $e f$ quàm $f c$, rursus contra hypothèsim: & propterea minor est $f o$ quàm $c o$: & p̄ inde maiores sunt ipsæ $c o$, $e f$ quàm $e o$, per communem sententiã, quod erat assumptum.


Annotatio quinta.

Nunc uerò consequens est, ut ostendamus quantum ab auge distet ipsum punctum r , in quo quidem maxima centri æquatio fit, quod admodum facile erit, si modo proportionem semidiametri $e c$, ad eccentricitatem $e f$, cognitam supponamus ex doctrina Ptolemæi. Quoniam enim recta $e i$, diameter posita est eius quadrati cuius re-



cta $e f$ latus est: quadratum igitur ex $e i$ cognitum erit: duplex enim est quadrati rectæ $e f$. Recta uerò $e c$, ea arte secta est in segmenta $e o$ & $c o$, ut quadratum ex $e o$, quadratum superet ex $c o$ ipso quadrato ex $e i$: quapropter ipsæ rectæ lineæ $e o$ & $c o$, (quemadmodum superius docuimus) in eisdem partibus in quibus $e c$ & $e f$, cognitæ sunt,

tae sunt, patefient. Et quoniam recta ft , dimidium ostensa est ipsius ef aut $f g$: tota igitur te cognita erit. Similiter quoniam ek aequalis posita fuit rectae eo : cognita igitur erit, item & kf , quoniam equalis est recte co , nota prodibit. Iam igitur in rectangulo triangulo ket , quoniam sicut sinus totus ad sinum rectum anguli tke , sic latus ek , ad latus te : prima autem quantitas tertia atque quarta cognitae sunt: secunda igitur quae est sinus rectus acuti anguli tke , cognita ueniet, & per tabulam sinus recti ipse angulus tke , cognitus erit. Simili quoque syllogismo in triangulo rectangulo kft , ex duobus lateribus cognitis fk & ft , cognoscetur angulus $fk t$, quem auferemus a gradibus 90 . & reliquus acutus angulus kft , cognitus relinquetur. Ipsum porro angulum $fk t$, ex angulo auferemus ekt , & cognitus relinquetur angulus ekf . Is uero exterior est in triangulo isosceles $fk i$: in quo quidem duo anguli krf , aequales inuicem sunt: duplex igitur est idem angulus ekf anguli kfr : & idcirco ipse angulus kfr , cognitus erit, quem auferemus ab angulo kft , qui iam innotuit: & angulus igitur $rf t$, distantiae puncti r , ab opposito auge notus prodibit: quare & distantia eiusdem puncti ab auge ignorari non poterit. Inuenit autem Ptolemæus rectam ef , talium partium 10 . cum m . 19 . qualium sunt in ec , 49 . cum m . 41 . recta enim af , earundem partium continet 60 . Quapropter si ipsam ec partium aequalium ponamus 100000 . erunt in recta ef , 20765 . cuius quidem quadratum si duplicauerimus, & a quadrato rectae ec , subtraxerimus: relictum uero dimidium quod est 4568814775 . partes 100000 . diuiserimus, uenient ex ipsa partitione 45688 . tantaque igitur erit recta eo : quare reliqua eo , partium erit 54312 . Et quoniam ft , dimidio rectae ef , est equalis: tota igitur te , partium erit $31147\frac{1}{2}$. Et si in partes 100000 . sinus totius multiplicauerimus: productum uero per 54312 .



partes uidelicet rectae ke diuiserimus, in quotiente ueniet sinus rectus anguli

guli

guli tke, cuius arcus inuenit̄ graduū 34. m̄. 59. se. 40. Rectā porrò ft, partium nempe 10382. cum semisse in sinum totum multiplicabimus: productum uerò diuidemus in numerum partium 45688. quem continet f k, & ueniet in quotiente sinus rectus anguli f k t, cuius arcus inuentus erit Gr. 13. m̄. 8. se. 7. quapropter reliquus angulus k f t, trianguli rectanguli k t f, graduum erit 76. m̄. 51. se. 53. Ab angulo porrò t k e, qui iam innotuit, Gr. uidelicet 34. m̄. 59. se. 40. subtractis Gr. 13. m̄. 8. se. 7. anguli f k t, gradus relinquentur 21. m̄. 51. se. 33. pro magnitudine anguli e k f, cuius quidem anguli dimidium, angulus nempe k f r, graduum erit 10. m̄. 55. se. 46. his itaq; subtractis ex gradibus 76. m̄. 51. se. 53. anguli k f t, gradus relinquentur 65. m̄. 56. se. 7. totq; comprehendet angulus r f t, distantia puncti r, ab oppositito augis: quare distantia eiusdem puncti ab auge graduum erit 114. minut. 3. se. 53. tantum igitur erit Lunæ centrum cum epicyclus constitutus fuerit in eo puncto eccentrici, in quo maxima fit centri æquatio.

Annotatio sexta.

Quanta uerò sit ipsa maxima cētri æquatio ex his quæ modo demonstrauimus, statim concludes. Angulus enim t k e, inuentus fuit Gr. 34. m̄. 59. se. 40. Atqui angulus f k t, Gr. continet 13. m̄. 8. se. 7. cui quidem æqualis existit angulus t k g, per 4. propositionem primi libri Euclidis: totus igitur angulus g k e, graduum erit 48. m̄. 7. se. 47. Et quoniam in triangulo k g r, isosceli exterior angulus g k e, interioris oppositiq; g r k, duplex est per 5. atque 16. primi libri Euclidis: ipse igitur angulus g r k, graduū erit 24. m̄. 3. se. 53. ab ijs autem auferemus Gr. 10. m̄. 55. se. 46. anguli k r f, qui angulo k f r, æqualis ostensus fuit, & relinquentur Gr. 13. m̄. 8. se. 7. pro magnitudine anguli f r g, maximæ æquationis centri. In his autem supputationibus tabula sinus recti utimur circuli semidiametrum supponēte partiū æqualiū 100000. à Petro Appiano constructa.


Annotatio septima.

Si distantiam epicycli à centro mundi cognoscere cupis, cum est in puncto r, in quo loco maximam habet æquationem centri, id facile consequi poteris deducta à puncto k, perpēdiculari k s, in lineā f r. Duæ enim rectę lineæ f s & r s, æquales inuicem erunt: angulus porrò k f r, iam notuit: igitur reliquus f k s, cognitus quoq; erit per 32. propositionem primi libri Euclidis. Atqui sicut sinus totus ad sinum rectum ipsius anguli

anguli fk s, sic recta fk ad rectam fs : quarum quidem quātitatum tres priores cognitę sunt: postrema igitur quę est fs , per cōmune documētum numerorum proportionalium patefiet. Dimidium est autem ipsa fs , rectę lineę fr , tota idcirco fr , innotescet: & proinde distātia centri epicycli à centro mundi in eo situ in partibus semidiametri ec cognita erit. Hac porro arte rectam fs , inuenimus 44859. quare tota linea fr , talium erit 89718. qualiū in semidiametro eccētrici sunt 100000.

Annotatio octaua.

Præterea annotatione dignum censemus, quod equationum centri quę sunt in circumferentia ar , uidelicet inter augem & punctū r , in quo quidem maxima contingit equatio, quęcunque factę fuerint in punctis uiciniōribus eidem puncto r , maiores erunt: quę uero in punctis distantioribus, minores. Similiter earum, quę contingunt in cr , reliquo segmento semicirculi arc , quę in punctis uiciniōribus ipsi r , factę fuerint, maiores erunt hīs quę in punctis ab eodem r , remotioribus. In ipso enim eccētrico Lunę esto r punctum illud, in quo maxima centri fit equatio, sitq; in circumferentia ar , punctum k , uiciniū eidem puncto r , quā l . Dico quod maior equatio centri continget



in k , quā in l . Rectę enim lineę fk , & gk , cōnectantur, & circa triangulum fgk , circulus describatur fgk : quē quidem ostendemus eccētricum minime tāgere, sed secare in k : & in alio uersus pūcto inter c & r . Nam si tangit in ipso k : minor igitur erit æquatio in r quā in k , per ea quę demōstrauimus in annotatione tertia: pūctum enim contactus unum tantum est per decimam tertiam decimæ tertij Eu. at maxima po-

sita fuit in r : igitur impossibile contra hypothesim. Quapropter circulus ipse fgk , eccētricum secat in k : & quoniam in duobus locis secas

Ff re neces

re necesse est, alteram sectionem ostendemus esse inter c & r . Non enim in r : quoniam si est in ipso r , duo igitur æquationum anguli $f r g$, & $f k g$, æquales inuicem erunt: minores autem ijs qui facti fuerint inter ipsa puncta k & r , per ea quæ in annotatione prima demonstrauius: & idcirco non erit in r , maxima centri æquatio contra hypothesim. Neque secare poterit eccentricum idem circulus $f g k$, in alio puncto præter k , positum inter a & r : quoniam si in alio puncto circumferentiæ $a r$ secat, maiores igitur erunt æquationum anguli in ipsis sectionum punctis, quàm in r , per demonstrationem annotationis secundæ, rursum contra hypothesim: & propterea non secat iterum in aliquo puncto circumferentiæ $a r$, & proinde inter c & r secabit. Secet igitur in puncto m : & erunt igitur æquationum anguli in k & m , punctis inuicem æquales: maiores autem ea quæ uel in l fit, uel in quibusuis alijs punctis inter a & k , & inter c & m , per prædictam demonstrationem annotationis secundæ, in punctis itaq; circumferentiæ $a r$, uicinioribus puncto maxime æquationis centri, maiores contingent æquationes, quàm in remotioribus, idem quoq; ostendemus de æquationibus factis inter c & r , quemadmodum demonstrandum suscepimus.

Annotatione nona.

LVna existente in ea recta linea, quæ à centro mundi ducta epicyclum tangit, maxima fit in quolibet situ epicycli æquatio argumenti: maior tamen contingit in situ epicycli centro mundi propinquiore, quàm in situ remotiore. Centro igitur epicycli in opposito augis eccentrici constituto, si Luna in recta linea extiterit à centro mundi ueniente, ipsumq; epicyclum contingente, maxima omnium habebitur æquatio argumenti. Esto enim eccentricus Lunæ circulus $a b c d$, cuius centrum e : mundi uero f , linea augis sit $a c$, & constituatur epicyclus in situ quouis b : ab ipso autem mundi centro f , recta linea excitetur $f g$, in eccentrici plano circumferentiæ maximum epicycli qui in eodem plano existit contingens in puncto g , & recta linea $f b$, producatur usque ad k , in circumferentiâ ipsius epicycli: corpus uero lunare ponatur in g . Erit igitur k , punctum augis ueræ. Esto autem motus Lunæ in eccentrico à loco b in d , per a : argumentum igitur uerum erit circumferentiâ $k g$, uno semicirculo minor, æquatio porro illius argumenti arcus zodiaci erit quem angulus $b f g$ subtendit, oppositum augis ueræ epicycli sit punctum l . itaque manifestum est quod à puncto f , nulla alia recta linea duci potest, quæ semicirculum contingat $k g l$, præter $f g$: aliter enim sequeretur impossibile contra ultimam sententiam

Annotatio undecima.

Quando in uno atque eodem situ epicycli inæqualibus argumen-
tis pares respondent æquationes, plus distat à fine argumen-
ti maximæ æquationis illius situs, finis argu-
menti minoris, quàm finis
maioris.

IN circulum enim abc , à puncto d , extra ipsum posito recta deducatur linea dea , per centrum eiusdem: recta idem dfg , præter centrum & recta dh , quæ eum contingat in c . Dico quod arcus cg , maior est quàm fc . Rectæ enim lineæ connectantur fc & gc : in triangu-



lo igitur cdg , exterior angulus gch , duobus interioribus oppositisq; cgd & cdg , equalis est: at uerò angulus cfg , eidem gch , equalis est per 32. propositionem tertij libri Euclidis: quia constitutus est in altera portione: æqualis igitur est ipse angulus cfg , eisdem duobus cgd & cdg , per cõmunem sententiam, & proinde maior est idem angulus cfg , quàm cgd : maior autem angulo maior respondet arcus per 33. propositionem sexti libri Euclidis: maior igitur est arcus cg , arcu cf . Posnamus itaq; ipsum circulum abc , epicyclum Lunæ d , centrum mundi a , punctum augis ueræ ag , argumentum minus af , argumentum maius, quibus quidem respondeat unus atque idem æquationis angulus adg : punctum porro c , contingente erit, in quo maxima fit æquatio argumēti in eo situ. Luna igitur constituta in f & g , equales erunt

æquationes ipsorum inæqualium argumētorum ag & af : plus autem distabit punctum g , terminus minoris ab ipso c , quàm f , terminus maioris, quod demonstrandum erat.

Annotatio duodecima.

Ostensum est in Annotatione 10. parium argumētorum æquationes ab auge eccentrici usque ad oppositum augis, ita augeri, prout centrum epicycli centro mundi uicinius fit. Quare oportebat ad inueniendum uerum motum Lunæ tot tabulas æquationum argumentorum construere, quot sunt situs epicycli, saltem per binos aut ternos gradus extensas,

Sed quia hoc operosum erat: Ptolemæus igitur facilem quandam rationem excogitauit, qua argumentorum æquationes ad omnem situm inueniri possent, quanquã ea à certissimo computo nonnihil discreparet. Quod quidẽ ut efficeret, maximas argumẽti pro quolibet situ æquationes in primis supputauit: & quia hæ quoque ab auge eccentrici ad oppositum augis perpetuo augentur, quemadmodum superius demonstrauius: maximam igitur argumenti æquationem que fit in auge à maxima oppositi augis subtraxit, differentiam uerò in 60. æquales particulas sexagesimas uel diuisit, que in tabulis æquationum minuta proportionalia appellantur.


Similiter ipsam maximam æquationem argumenti augis à maxima argumenti æquatione, que in omni alio situ contingit, subtraxit, quodq; sexagesimas siue minuta proportionalia unaqueque differentia haberet, per regulam numerorum proportionalium inuenit.

Nam sicut se habet maxima illa maximarum æquationum differentia, que in 60. particulas diuisa fuit, ad differentiam repertam in dato situ centri epicycli, sic numerus 60. ad numerum sexagesimarum, quæ ipsi situi debentur.

Huius porro proportionis tres primi termini cogniti supponuntur: quartus igitur innotescet. Hac itaque arte minuta proportionalia pro quolibet centro distantia uel epicycli ab auge eccentrici in tabula æquationum Lunę posita sunt. Subiecit autem, quod in uniuersum sicut differentia maximarum æquationum argumenti se habent inter se, sic & differentia æquationum parium, quorumcunque argumentorum in ipsis eisdem locis eccentrici: tametsi à iusta atque exacta proportione nonnihil aberretur. Quamobrem satis fecisse putauit, si tabulam unam duntaxat construeret æquationis singulorũ argumentorum pro situ augis, appositis è regione differentijs earundem æquationum, ab ijs que in opposito augis contingunt: quas quidem differentias diuersitates diametri circuli breuis appellant. Quando itaque opere precium est inuenire, quanta sit æquatio dati argumenti, per centrum Lunę inueniuntur in primis minuta proportionalia, postea uerò elicitur ex ipsa tabula æquatio dati argumẽti pro situ augis, nec nõ diuersitas diametri differentia uel ab ea æquatione quam par argumẽtum in opposito augis habet. Et quia numerus minorũ proportionalium cognitus est: per regulam igitur numerorum proportionalium quantum illius diuersitatis superaddere oporteat, ipsi inuentę æquationi in dato situ, illico innotescet.

Quoniam enim sicut 60. ad numerũ minorũ proportionalium è regione dati centri inuentum: sic diuersitas diametri è regione dati argumenti

gumentis reperta, ad eam diuersitatem, quæ dato situi debetur, & harum
 4. quantitatum primæ tres cognite sunt: quarta igitur patefiet, quam
 quidem inuentæ æquationi adijciemus, & æquatio idcirco ipsius dati
 argumenti tandem cognita prodibit. Hanc autem doctrinam minu-
 torum proportionalium, & æquationum argumentorum ex Ptole-
 mæo colliges libro 5. capit. 7. & 8. & à Ioanne de Montereio propo-
 sitione 11. Ex qua palam est, minuta ipsa 60. proportionalia sexagesimas
 non esse excessus maioris lineæ, quæ à centro mundi ad augem eccen-
 trici protenditur supra minorem, quæ ab eodem centro ita ad opposi-
 tum augis, tametsi hoc apertissimè Georgius Purb. scribit: sed potius
 sexagesimas esse excessus maximæ æquationis argumenti, quæ in op-
 posito augis contingit, supra maximam æquationem argumenti quæ
 fit in auge. Ioannes uerò Baptista cum utramque sententiam recitaret
 de minutis proportionalibus, ita ait: sed uel prima uel secunda opinio
 teneatur, operatio in hoc nullo modo fallit, quia ubi contingunt esse
 triginta minuta proportionalia, partes scilicet excessus longioris lineæ



supra breuiorem extra circumferentiam,
 ibi etiam triginta partes sexagesimarum
 diuersitatis diametri addi debent, & e-
 uerso: sed error est manifestus, quemad-
 modum mox ostendemus. Circulus em̄
 a b c, cuius centrum d, esto eccētricus Lu-
 næ, centrum mūdi sit e, in quo recta linea
 b c, cum augis linea quæ sit a f, rectos an-
 gulos efficiat: ipsorum uerò centrorum
 interuallum quod est d e, in duo æqualia
 secetur in g, & ab ipso puncto medio re-

cta linea excitetur g k, ad rectos angulos super a f, & connectantur d
 k, & e k.

In duobus itaque triangulis rectangulis d g k, & e g k, duo latera
 d k, & e k, equalia inuicem erunt per quartam propositionem primi li-
 bri Euclidis.

Quapropter centro epicycli Lunæ constituto in k, distabit à cen-
 tro mundi interuallo æquali semidiametro eccentrici: recta uerò li-
 nea a e, eccentrici semidiametrum superat interuallo d e, id est, minu-
 tis proportionalibus triginta secundum Purbachij sententiam.

In puncto igitur k, centro epicycli constituto, 30. habebuntur mi-
 nuta proportionalia.

Et proinde in ipso situ k, triginta sexagesimæ diuersitatis addi de-
 bent, dimidium nempe ipsius.

At cum

At cum centrum epicycli est in c, centrum Lunę, id est, distantia epicycli ab auge eccentrici gradus complectitur nonaginta, quib. respondent in tabula equationum Lunę m. proportionalia 26. in k: igitur ubi centrum Lunę minus est gradibus 90. pauciora debentur proportionalia minuta, quàm 26. quare centro epicycli constituto in k, multo minus diuersitatis addendum est quàm 30. sexagesimæ: & proinde errat in hoc Ioannes Baptista: quod quidem demonstrandum suscepimus. Georgius Purb. (ut puto) minuta proportionalia ita definire uoluit, ut rudiores intelligerent argumentorum æquationes ita augeri, prout centrum epicycli ad centrum mundi propius accedit.

De Marte, Ioue, atq; Saturno.

Annotatio prima.


Cum Georgius Purb. intelligeret axes orbium deferentium epicyclos trium planetarum superiorum ad axem zodiaci annue re: putauit idcirco (ut suspicor) ipsos eccentricorum axes zodiaci axem secare, quod quidem in solo Marte uerum est atq; necessarium: in Ioue autem & Saturno impossibile. Quoniam autem eccentrici Martis superficies à superficie eclipticæ declinat semper, quãtitate maxima inuariabili manente, quemadmodum de Luna dictum est: ipsam igitur eccentrici circuli superficiem eiusq; productam intelligemus, donec ad conuexum octauæ spheræ perueniat. Huius itaq; superficiæ & octauæ spheræ communis sectio circulus erit, per primam propositionem primi libri Theodosij, maximusq; per 6. eiusdem primi lib. Esto igitur in subiecta figura huiusmodi circulus a b c d, cuius centrum e, circulus uero eclipticę sit a f c g, eorum communis sectio sit diameter a c c, polus eclipticę Boreus sit i: circuli uero a b c d, polus ipsi polo i, uicinior sit k, & per ipsos duos polos i & k, circulus maximus describatur d i f, per 30. propositionem ipsius primi libri Theodosij, cuius communis sectio cum plano eclipticę sit diameter f g: cum plano autem circuli a b c d, sit diameter b d, rectęq; lineę connectantur i e, & k e, in plano circuli d i f. Et quoniam ipse circulus d i f, per duos polos i & k uenit: per reliquos igitur transibit per correlarium 13. propositionis eiusdem primi libri Theodosij: quapropter ipsos eosdem circulos a b c d, & a f c g, ad rectos angulos secabit per 19. propositionem. Et quoniam punctum i, polus est maximi circuli a f c g: circumferentia igitur i f, quadrans erit, per 24. propositionem primi libri: & idcirco circumferentia i b, minor erit quadrante. Sectus itaq; est semicirculus b i d, per

$\overline{b i d}$, per inæqualia in puncto i . Et quoniam ostensum est, ipsum semicirculum $b i d$ rectum esse ad circulum $a b c d$, super diametrum $b d$: recta igitur linea ducta à puncto i ad b , minima erit earum omnium quæ ab eodem puncto duci possunt ad circumferentiam ipsius circuli $a b c d$, per 25. propositionem secundi libri. Et proinde circumferentia $i b$, minima est earum omnium quæ ab ipso i ueniunt ad puncta quæuis semicirculi $a b c$, per 27. propositionem tertij libri Euclidis: & propterea $i b$, complementum est maximæ latitudinis circuli $a b c d$: & circumferentia $b f$, ipsa maxima latitudo siue declinatio eiusdem circuli $a b c d$, ab ecliptica. Et quoniam aux Martis punctum est in plano circuli $a b c d$, maximæ latitudinis eccentrici ab ecliptica, quemadmodum ex Ptolemæo, & ipso Purbachio liquet: recta uero linea quæ à centro mundi ad punctum augis ducitur, per centrum ipsius eccentrici uenit: punctum igitur augis & eccentrici centrum in ipsa recta linea $e b$ sunt. Esto itaque punctum l eccentrici centrum, à quo quidem in plano circuli $d i f$, recta linea excitetur $l m$, recte $k e$ æquidistans, per 31. propositionem primi libri Euclidis. Et quoniam recta ipsa linea $k e$, uenit à puncto e , centro uidelicet circuli $a b c d$ ad k , punctum eiusdem circuli polum: perpendicularis igitur erit eadē linea $k e$, supra planum ipsius circuli $a b c d$, per 10. propositionem primi libri Theodosij. & quia eidem $k e$, æquidistantem duximus rectam $l m$: ipsa igitur $l m$ perpendicularis erit supra idem planum circuli $a b c d$, per 8. propositionem libri undecimi Euclidis: & idcirco si ipsa eadem recta linea $l m$, per centrum eccentrici Martis ueniens, in utramque partem extendatur, per polos ipsius eccentrici transibit per 9. propositionem eiusdem primi libri, axisque fiet orbis epicyclum Martis deferentis. At quia recta linea $i e$, per centrum eclipticæ & polum ipsius Borealem uenit: si in rectum igitur continuumque producta fuerit, ad reliquum polum terminabitur, per 13. propositionem primi libri Theodosij: axisque erit eclipticæ. Ipsos itaque axes $i e$ & $l m$, concurrere ostendemus ad partes i & m . Nam quoniā recta $k e$, perpendicularis ostēsa est ad planum circuli $a b c d$: angulus igitur $k e l$, in plano circuli $d i f$, rectus erit per 2. definitionem 11. lib. Eucl. at uero in ipso eodem plano circuli $d i f$, cōiunctæ sunt ad punctum e , tres rectæ lineæ $k e$, $i e$ & $e l$: maior igitur est angulus $k e l$, angulo $i e l$, per 9. communem sententiam: ipse igitur angulus $i e l$, minor est recto: angulus uero $m l e$, rectus est per 2. definitionem 11. libri: quia recta $l m$, perpendicularis ostēsa est ad planum circuli $a b c d$: duæ igitur rectæ lineæ $i e$ & $l m$, cum recta $e l$, in plano circuli $d i f$, duos angulos efficiunt $i e l$ & $m l e$, duobus rectis minores: & propterea concurrēt ad partes i & m , per 5. postulatum. & pro-

Gg

inde a

inde axis orbis epicyclum Martis deferentis axem zodiaci interfecat.




quod erat in primis demonstrandum. Et ex hoc patet, quod polos orbis epicyclum deferentis à polis Zodiaci inæqualiter distare. Nam quoniam ipsi axes $i e$ et $i m$ ad partes concurrunt i & m ; igitur ad partes e & l , quanto magis protrahuntur,

tanto magis distant inter se. Quod autem in Ioue & Saturno axis orbis epicyclum deferentis axem zodiaci

secare non possit, in eadem figura ostendimus. Ceterum quoniam punctum b , maxime latitudinis deferentis est ab ecliptica: in Saturno autem punctum deferentis epicyclum maximæ declinans ab ecliptica distat ante augem, id est, contra successione signorum gradibus 50. in Ioue uero post augem est gradibus 20.


Ponamus igitur in plano circuli $a b c d$: punctum n centrum eccentrici, uel in Ioue, uel in Saturno: & ab ipso puncto n , supra idem planum recta linea per



In theor. Plan. Geor. Purbac. annot. 235

linea perpēdicularis erigatur n o, per 12. ppositionem 11. lib. Eu. ab eo
 dēq̄ pūcto n, in ipso plano circuli a b c d, per 12. 1. lib. recta linea dedu-
 catur n p, ad rectos angulos super recta linea a e, comūni sectiōe duo-
 rum circulorū a b c d & a f c g, & ab ipsa n o, per rectā n p, planū exten-
 datur o p: ipsum igitur planum o p, ad idē planū circuli a b c d rectū es-
 rit, per 18. pposit. 11. lib. Eucl. In ipso itaq̄ plano o p, data recta linea p n
 à pūcto in ea dato p, rectam lineā p r, ad rectos angulos excitabimus,
 per 11. pposit. 1 lib. rectus igitur erit ipse angulus n p r, in plano o p, at-
 qui rectus etiā est angulus n p e, in plano existens circuli a b c d: & pla-
 num o p, rectū est ad planū circuli a b c d: angulus igitur e p r, rectus es-
 rit per conuersionem definitionis 3. 11. lib. & idcirco recta linea e p ad
 ipsum planū o p, perpēdicularis erit per 4. pposit. 11. ipsam etiam e p,
 perpēdicularem esse ostēdemus ad planum circuli d i f. Nam quoniā
 ostensum est superius ipsum circulum d i f, rectū esse ad circulos a b c
 d & a f c g: horum igitur duorū circulorū comūnis sectio recta nēpe li-
 nea a c, ad planum eiusdē circuli d i f, perpēdicularis erit, per 19. pposit.
 11. lib. Cū itaq̄ recta linea e p, ad planū o p, & ad planū circuli d i f recta
 sit: parallela igit̄ erūt eadē duo plana o p, & circuli d i f, per 14. pposit.
 11. lib. Eucl. & propterea recta linea in o, quæ in plano existit o p, cū re-
 cta i e: quæ quidē in plano existit circuli d i f concurrere non poterit, e-
 tiā si infinitū producātur. Nā si cōcurrunt: plana igitur in quib. existūt
 quæ parallela ostēsa sunt, cōcurrēt, q̄d est impossibile: & idcirco recta
 linea n o, nō cōcurrit cū i e. ipsa porro recta linea n o, per centrū eccē-
 trici ueniēs si in utrāq̄ partē pducatur, per polos ipsius eccētrici trāsi-
 bit, per 9. ppositionē 1. lib. Theo. axisq̄ fiet orbis epicyclū deferētis, re-
 cta uero i e, quia per centrū eclipticæ & polū ipsius borealē uenit, si in
 rectū cōtinuūq̄ pducatur, ad reliquū polū terminabitur, per 13. ppo-
 sitionē ipsius primi lib. Theo. axisq̄ erit eclipticæ. Axis igitur orbis e-
 picyclū Iouis aut Saturni deferētis, axem zodiaci minimē secat, q̄d de
 mōstrandum suscepimus. Sed neq̄ paralleli sunt ipsi axes. Nam si pa-
 ralleli sunt, quoniā recta linea k e, perpēdicularis ostēsa est ad planum
 circuli a b c d, & ad idē planū perpēdicularis etiā est in o: duæ igitur re-
 ctæ lineæ k e, & n o, parallelæ erūt per 6. pposit. 11. lib. Eu. Quare si pa-
 rallela est i e, eidem rectæ lineæ n o, duæ igitur rectę lineæ k e & i e, que
 in centro e cōcurrunt, parallelæ erunt per 9. ppositionem eiusdem 11.
 lib. Euclidis, quod est impossibile. Et ppterea neq̄ paralleli sunt, neq̄
 concurrunt ipsi axes n o & i e, ex quibus cōcludere poteris, q̄d in uno
 plano non sunt. Nam si in uno plano sunt: aut igitur in ipso plano in q̄
 sunt concurrunt, aut æquidistantes sunt. Quare si neq̄ concurrunt,
 neq̄ paralleli sunt: in uno igitur plano minimē existunt.

Quanquam axis orbis epicyclum Martis deferentis axem zodiaci secet: illa tamen intersectio extra ipsum orbem fit, quæ longissime ab eius polo, eodē axe amplius in rectum producto. Diameter enim eclipticæ a b, cum diametro eccentrici Martis c d, angulos efficiat b c d & a e c, maximarum latitudinum ipsius eccentrici, cuius quidem centrum sit f, eclipticæ uero e. Axis porro ipsius orbis epicyclum deferentis cum eclipticæ axe concurrat in g: igitur quoniam maxima latitudo deferentis epicyclum Martis unius tantum gradus est secundum doctrinam Ptolomæi: in triangulo propterea rectangulo e f g, acutus angulus g e f, complementi maximæ latitudinis Borealis graduum erit 89. et reliquus idcirco f g e, unius gradus per 32. Propositionem primi libri Euclidis, & communem sententiam. Et quoniam



sicut sinus rectus acuti anguli e g f, ad sinum rectum acuti f e g, sic latus e f, ad latus f g: quod quidem statim concludes, si super centris e & g, circulos descriptos intellexeris intervallo e g, latus uero e f, talium partium continet sex secundum Ptolemeum qualium sunt in eccentrici semidiametro 60. Sinum igitur rectum graduum 89. id est, partes 99984. multiplicabimus in 6. productum uero diuidemus per 1745. partes uidelicet quæ sunt in sinu recto unius gradus, & uenient ex partitione partes fere 344. Qualium igitur partium semidiameter eccentrici continet 60. talium recta f g continet 344. atqui poli orbis deferentis epicyclum in superficie sunt ipsius orbis per definitionem, & propterea axis orbis epicyclum Martis deferentis cum axe zodiaci concurrat longissimè à polo Boreali eiusdem orbis, quod erat demonstrandum.


Annotatio tertia.

Quia orbis deferentes auges Iouis, Martis atque Saturni motu octauæ spheræ mouentur super axe atque polis zodiaci: puncta igitur quæ modo respectu eclipticæ Borealia sunt, Borealia semper fuerunt, atque erunt: & similiter quæ Australia ab ipsa sunt, Australia semper erunt, & fuerunt: ea uero quæ modo sunt in superficie eclipticæ

eclipticæ sectione, semper in ea fuerunt, atq; perpetuo erunt: eorundem tamen punctorum ab æquinoctiali circulo declinationes aliæ atque aliæ erunt. Sed quia orbis delator epicycli super axe suo secundum signorum successione[m] mouetur, superficies igitur eccentrici in quolibet suo puncto successiue eclipticæ superficiem secabit.

Annotatio quarta.

A Equatio centri in epicyclo æquationi centri in zodiaco proportionalis est. Angulus enim æquationis centri in epicyclo æqualis est cõtraposito, q[ui] duab. rectis lineis cõtinet, à cẽtro æquantis & à cẽtro mũdi ad epicycli centrũ uenientib. Eidem uero angulo æqualis est coalternus ille quẽ linea ueri motus epicycli & linea mediũ motus continent: ipsi igitur duo anguli æquationis centri in epicyclo,



& æquationis centri in zodiaco, æquales inuicem sunt. Maxima porro æquatio centri contingit: centro epicycli cõstituto in media longitudine deferentis, quẽ per lineam determinat quẽ à centro eccentrici deducit in lineam augis perpẽdicularẽ, propterea quod in eo loco maximus æquationis angulus efficitur: quemadmodum statim ostendemus. Eccentrici enim $abfg$, centrum esto punctum c , mũdi centrum sit d , æquantis uero

h , linea augis sit bg in quã quidẽ ad rectos angulos super centro eccentrici recta incidat linea ac . Punctum igitur a , iuxta definitionem Purbachij mediæ longitudinis est. Esto itaq; punctum quoduis præter a , in semicirculo bag , quod sit e , & recte linee connectantur ad , ah , ed , & eh . Dico quod maior est angulus dha angulo dhe . Circa triangulum enim dha , circulus describatur dha : & quoniam recta linea ac , in ipso circulo rectam lineam dh , per equalia secat, & ad rectos angulos: centrum igitur ipsius circuli dha , in eadem erit recta linea ac , per correlarium primæ propositionis tertij libri Euclidis: & quoniam punctum c , centrum uidelicet circuli $abfg$, in ipsa eadem recta linea ac existit: circulus igitur dha , circulum $abfg$, tangit in a . Non secat enim, quia per 10. propositionem tertij libri Euclidis & 20. primi, sequeretur impossibile, contra circuli definitionem.

Rectam itaq; ducemus lineam à puncto h, ad punctum r, in quo recta linea d e circulū secat d h a: angulus igitur d r h angulo d a h, equalis est, per 19. theorema 3. lib. Eu. At qui ipse angulus d r h angulo d e h maior est, per 16. propositionem 1. lib. Euclid. maior igitur erit angulus d a h angulo d e h. Et proinde æquationis angulus d a h maximus est, eorum omnium qui in reliquis punctis contingunt semicirculi b a g, ob concursum rectarum linearum à punctis d & h uenientiū, quod demonstrandum erat. Hoc aut cum demonstrare conaretur Erasmus Reinholdus, falsum quoddam theorema sumpsit. Ducta enim recta linea ab a in e, quoniā in duob. triangulis e d a & e h a, comunem basim habentibus a e, latus a d, lateri a h æquum est: latus uero e d maius latere e h: minorem idcirco cōclusit esse angulum e d a angulo e h a, ita inquiring: cum igitur duorum triangulorum e d a & e h a, duo latera a d & a h, sint æqualia, duoq; inæqualia uidelicet e d maius, & e h minus, sequitur angulum e d a, minorem esse angulo e h a. Idq; putat facile ostendi posse descripto circulo super a, tanq; centro, iuxta quantitatem a h. At quod illud non sequat, facilima ostendemus demonstratione.

In circulo enim cuius cētrum o, duæ agantur rectæ lineæ præter centrum inter se æquales a h, a d, & ex circūferentia d h a, uno semicirculo maiore recta linea d e circumferētiā auferat d h e, semicirculo non maiorem, rectæque cōnectātur e h & a e: in duobus igitur triangulis e d a & e h

a, duo latera a d & a h, sunt æqualia, duoq; inæqualia, uidelicet e d maius, e h minus, per theorema 14. tertij lib. Euclidis: anguli tamen e d a, & e h a, æquales inuicem sunt, per 19. theorema ipsius tertij libri: in eodem em segmēto sunt e h d a. Præterea super a, tanq; cētro interuallo uero a h (ut ipse iubet) circulus describat h d p, & recta linea a e, utriq; p ducta: circūferētiæ ipsiq; descripti circuli occurrat ī pūctis l & q, ī circūferentiāq;


ferentia^q h l contingēs punctum sumatur z, & rectæ lineæ coñectan-
 tur a z & e z: à puncto aut t, in quo ipso e z, circumferentiam secat e b,
 recta ducatur linea usq; ad a. In duob. itaq; triangulis e d a & e z a, duo
 latera a d & a z, sunt equalia, duo q; inæqualia, uidelicet e d maius, & e
 z, minus per 7. proposit. 3. lib. Euclidis: angulus tñ e d a, angulo e z a,
 maior est. Nam duo anguli e d a & e t a, equales inuicem sunt, quia in
 eodem segmēto existūt e t, d a, atqui ipse angulus e t a, interiore oppo-
 sito q; e z a, trianguli t a z, maior est, per 16. ppositionem primi lib. Eu.
 angulus igitur e d a angulo e z a, maior erit per comunem sent. In figu-
 ra porro superius descripta ubi duæ rectæ a h & e d, se interfecāt, pun-
 ctum ponatur k: duo q; triangula intelligātur a & k & e k h, in quibus
 duo contrappositi anguli a k d & e k h, equales inuicem sunt. Angulus
 autem d a k maior ostensus est, quàm k e h: angulus igitur k d a, angulo
 k h e, minor relinquetur, per 32. ppositionem 1. lib. Eu. & comunem
 sententiam. Et quoniam duæ rectæ a d & a h, equales inuicē sunt, per 4.
 ppositionem 1. lib. recta uerò e d, maior est quàm e h, per 7. propositio-
 3. lib. bis sumptam: in duob. igitur triangulis e d a & e h a, duo latera a
 d & a h, sunt equalia, duo q; inæqualia uidelicet e d maius, & e h minus
 angulus autem e d a, minor est angulo e h a. Quapropter si duorū tri-
 angulorum comunem basim habētium duo latera sint equalia, duo q;
 inæqualia, non magis sequitur, qd angulus maiorib. cōtētus laterib.
 sit minor, q; qd sit maior, c; qd alter alteri sit equalis. Similis lapsus fu-
 it antiqui expositoris, qui ex eisdē premisis concludere cōtendit per
 21. ppositionem 1. lib. Eucl. angulum maiorib. laterib. contētum mino-
 rem esse: cōstat tantū illud cōcludi nō posse ex ipsa 21. ppositione, que
 quidem ita habet: si à limitib. unius lateris trianguli duæ rectæ lineæ in-
 trorsum constituantur ad unum punctum conuenientes, eadē duob. re-
 liquis trianguli laterib. minores erūt, maioremq; angulū cōtinebunt.
 Et eodem etiam modo lapsus est alter Erasmus: deterius tamen. Nam
 non solum 21. pposit., 1. lib. Eucl. perperā accomodauit, sed duas line-
 as e h & a h (utor priori schemate præsentis Añotationis) idcirco pu-
 tauit minores esse duab. e d & a d, per 7. ppositionem 3. lib. Eucl. quia
 remotiores sunt à centro d, supra quo describitur circulus zodiacum
 representans ipsis lineis e d & a d: quæ ex eodem cētro zodiaci ducti
 sunt. At non ob eam causam ipsæ duæ lineæ e h & a h, duab. e d & a d
 minores sunt: sed propterea quod e h remotior est à centro c, eccentrici
 circuli ipsa a h: minor igitur est ipsa e h, quàm a h per 7. tertij.

Aequales autem sunt a h & a d, per 4. primi duob. conceptis trian-
 gulis rectangulis a h c & a d c: igitur per communem sententiam mi-
 nor erit e h, quàm a d. Similiter demonstrabitur minorem esse a h quàm
 e d. Nam

e d. Nam e d uicinior est eidem centro c, quàm a d: minor igitur est a d, quàm e d. Igitur & a h, æqualis existens ipsi a d, minor erit quàm e d, per communem sententiam. Sic igitur duæ rectæ lineæ e h & a h, minores erunt duabus a d & e d: quod quidem demonstrandum erat.

Annotatio quinta.

P Tolemæus mediocres centri epicycli à terra remotiones medias deferentis longitudes appellat: huiusmodi enim distantie tantum superant breuissimas, quæ sunt oppositi augis, quantum à longissimis superantur, quæ augis eccentrici sunt. Id autem accidit, cum centrum epicycli à centro mundi distat interuallo æquali semidiametro deferentis, & ad eum situm tabulæ equationum argumentorum constructæ sunt, atq; inde minuta proportionalia exordiantur, ut pro proportione ipsorum minorum ad 60. habeatur ad alios situs crementi atq; decrementi ratio. Cæterum Georgius Purbachius quamuis medias longitudes aliter definiert, ea uidelicet esse puncta, in quibus maxime fiunt equationes centri, quæ quidem puncta per lineam quandam rectam determinantur, quæ cum augis linea rectos efficit angulos: nihilominus affirmat ipsas æquationes argumentorum ad situm mediæ longitudinis supputatas esse. Quod inferius cum de Mercurio loqueretur aperte confirmans: equationes (inquit) argumentorum Mercurij, quæ in tabulis scribuntur, sunt quæ contingunt, dum centrum epicycli fuerit in mediocri à terra remotione, sed in alijs planetis centro epicycli in longitudine media deferentis existente fiebat. At quod in ipsis tribus planetis superioribus equationes argumentorum ad situm mediocris distantie supputatæ sint, id est, ad eum




in quo centrum epicycli à centro mundi distat interuallo equali semidiametro deferentis, non ad medias longitudes à Purb. definitas, manifesta ratione ostendemus. Esto em̄ in Marte eccentricus deferens a b c d, cuius centrum e, centrum mundi f, equantis uero g. Diameter a c, sit augis linea, quæ ad rectos angulos secet b d super ipso e, deferentis centro. Dicentur igitur duo puncta b & d, mediæ longitudes iuxta Purb.

definitionem. Connectantur aut rectæ lineæ b f & b g, & ponatur centrum epicycli in b: angulus igitur f b g, maxime equationis centri erit quæ quidem in ipsa tabula, æquationum Martis Gr. 11. m̄. 24. inuenitur.

Quæ


In theor. Planet. Geor. Purbach. annot. 241

Quapropter si à gradibus 180, duorum rectorum angulorum, quibus tres anguli trianguli b g f, equales sunt, ipsos Gr. 11. m̄. 24. auferemus: gradus igitur relinquētur 168. m̄. 36. pro duobus angulis b f g & f g b. Et quoniam hi inter se æquales sunt propter æqualitatem rectorum linearum f b & g b: angulus igitur b f g, centri ueri dimidium horū graduum atq; minutorum comprehendit, id est gradus 84. m̄. 18. quibus in tabula æquationum Martis quatuor respo- dent min. proportionalia: non sunt igitur ipsa puncta b & d, ea loca



ad quæ tabula æquationum argumentorum Martis composita est.

Idem experieris in Ioue & Saturno: & proinde ipsæ æquationes supputatæ non sunt ad longitudes medias deferentis à Purbachio definitas, quod demonstrandum suscepimus. Quòd si situm epicycli cognoscere uelis, ad quem prædictæ æquationum tabulæ exaratae sunt, à puncto medio rectorum e f, quod sit k, super ipsam augis lineam ad rectorum angulos excites rectorum lineam k o, ad circumferentiam deferentis extensam: distabit igitur ipsum punctum o, à centro mundi interuallo æquali semidiametro deferentis, quod quidem per 4. propositionem primi libri Euclidis concludes, ductis rectorum lineis e o, f o. Atqui ipsa semidiameter deferentis tantum exceditur à linea augis a f, quantum excedit lineam oppositi augis f c: centrum igitur epicycli in puncto o, in mediocri distantia à centro mundi dicetur esse. Ponatur itaq; ipsum epicycli centrum in o, & à centro mundi f, in plano eccentrici rectorum lineam ducatur f r, epicycli circulum tangens in r, per 17. propositionem 3. libri Euclidis, & connectatur o r: rectorum igitur erit angulus o r f, per 28. angulus autem o f r, maximam subtendit æquationē argumenti in eo situ. Et quoniam quailium partium semidiameter deferentis est 60. talium ostensa est à Ptole-



limum partium semidiameter deferentis est 60. talium ostensa est à Ptole-

limum partium semidiameter deferentis est 60. talium ostensa est à Ptole-

Hh

mco

mæo semidiameter epicycli 39. cum semisse: qualium igitur partium est $f o$, 60000. talium erit $o r$, 39500. & idcirco si super centro f , ad mensuram $f o$, circulus descriptus intelligatur, fiet recta linea $o r$, sinus rectus arcus anguli $o f r$. Atqui ipsis partibus 39500. in tabula sinuum rectorum sinum totum subiiciente partium æqualium 60000. partes circumferentię respondent 41. cum primis \dot{m} . 10. habet igitur maxima æquatio argumenti Martis ipsos gradus 41. \dot{m} . 10. in eo situ, in quo centrum epicycli à centro mundi distat interuallo æquali semidiametro deferentis, in o uidelicet. Et quia totidem graduum atq; minorum ea reperitur, quæ posita est in tabulis Alph. & Ptol. constat igitur non ad alium situm \dot{c} ad o , ipsam tabulam æquationis argumentorum Martis compositam esse. Idem similiter inuenies in Ioue, & Saturno, si prædicta arte hoc experiri libuerit. Quot autem gradus centrum uerum in eodem situ o comprehendat, facile erit inuenire Ratio enim semidiametri deferentis ad eccentricitatem $e f$, inuenta est à Ptolemæo sicut 60. ad 6. Quapropter $f o$ ad $f k$, rationem habebit sicut 60. ad 3. uel sicut 60000. ad 3000. Circulum itaq; descriptum intelligemus super o , tanquam centro, ad mensuram $f o$: & erit idcirco $f k$, sinus rectus anguli $f o k$, cui quidem in tabula sinuum rectorum semidiametrum supponente partium æqualium 60000. arcus respondet duorum Gr. \dot{m} . 52. eisq; detractis à gradibus 90. relinquetur angulus $k f o$, rectorum trianguli $f k o$, graduum 87. \dot{m} . 8. Et propterea centro epicycli existente in o , centrum uerum Grad. continet 87. \dot{m} . 8. quibus in tabula æquationum Martis nihil respondet minutorum proportionalium, propterea quod ad ipsum situm o composita est. Non sunt autem minuta hæc proportionalia sexagesimæ excessus distantiarum in tribus sitibus epicycli, sed maximarum æquationum, iuxta ea quæ de minutis proportionalibus Lunæ diximus.


De Venere.

Annotatio prima.

Quantus est medius motus Solis, tantus est semper medius motus Veneris: & quoniam aux eccentrici Solis in eodem loco zodiaci est secundum longitudinem in quo aux eccentrici Veneris: quantum igitur fuerit Solis argumentum, tantum erit centrum medium Veneris, & quia in tabulis Alphon. & Ptol. tanta reperitur æquatio centri, quanta est æquatio argumenti: supponitur igitur in ipsis tabulis centrum epicycli Veneris & Solem in eodẽ loco zodiaci secundum longitudinem semper esse. Nam quoniam tãtus est medius motus Solis, quantus medius motus epicycli Veneris: additis igitur

tur

tur aut detractis paribus equationibus argumenti, atq; centri, uerus motus epicycli, & uerus motus Solis æquales relinquentur: & propterea centrum solaris corporis & centrum epicycli Veneris in eodem zodiaci loco secundum longitudinem semper erunt. Cæterum quia tanta ostensa est à Ptol. libro 10. distantia centri mundi à centro æquantis Veneris respectu sui deferentis, quantam repererat Solis eccentricitatem, nempe partes 2. m. 30. earum partium quarum in semidiametris deferentium sunt 60. necesse est igitur, ut inter situm augis & oppositi augis semel tantum centrum epicycli Veneris atque Sol in eodem loco zodiaci uerè sint secundum longitudinem: quando uidelicet distantia centri epicycli à centro æquantis æqualis fuerit semidiametro deferentis. Quod quidem ut facilius ostendamus, eccentricum Veneris unà cum eccentrico Solis in superficie eclipticæ ponemus. Esto igitur eccentricus Veneris circulus a b g, linea augis a b, in qua centrum mundi c: eccentrici aut d, æquantis uerò e. & quoniam sicut c e, ad semidiametrum deferentis epicyclum, sic se habet Solis eccentricitas ad semidiametrum sui deferentis: igitur permutatim sicut recta c e, ad Solis eccentricitatem, sic semidiameter a d, ad semidiametrum orbis deferentis Solem: minor est autem




semidiameter a d, semidiametro orbis deferentis Solem: minor est igitur recta c e, Solis eccentricitate. Ponamus itaq; centrum eccentrici Solis in f, & sit centrum epicycli Veneris in g, in quo loco à centro æquantis di-

Hh z fter



stet interuallo æquali semidiametro deferentis epicylum, rectæq; lineæ connectantur $e g$ & $c g$, & à centro eccentrici Solis f , recta ducatur linea $f k$, quæ per centrum Solis ueniat, & producat $e g$ in rectum, quæ cum $f k$ concurreret: concurrere enim necesse est. Nam quoniam superficiem eccentrici Veneris in plano eclipticæ posuimus: una igitur atq; eadem recta linea à centro mundi ducta medijs motus Solis erit, unâ & epicly Veneris: & idcirco ipsæ rectæ lineæ $e g$ & $f k$, eidem lineæ medijs motus parallelæ erunt, per definitionem lineæ medijs motus: quapropter ipsæ eadem rectæ lineæ $e g$ & $f k$, parallelæ erunt per 30. propositionem primi libri Euclidis: & propterea duo anguli $c e g$ & $c f k$, exterior atq; interior, quos cum eisdem $e g$ & $f k$, recta linea efficit $c f$, æquales inuicem erunt per 29. propositionem primi libri Euclidis. Atqui duo interiores anguli $c e g$ & $g c e$, trianguli $c g e$, duobus rectis sunt minores, per 17. propositionem primi libri Euclidis: duo igitur anguli $g c f$ & $c f k$, duobus rectis minores erunt, per communem sententiam: & propterea ipsæ rectæ lineæ $c g$ & $f k$, ad partes g & k concurrent: concurrant itaq; in k . Et quoniam $e g$ & $f k$, parallelæ ostensæ sunt: æquiangula igitur sunt duo triangula $c g e$ & $c f k$: & propterea sicut $c e$ ad $e g$, sic se habere necesse est $c f$ ad $f k$, per 4. propositionem 6. libri Euclidis. Et quoniam $c e$, distantia est centri mundi à centro æquantis, recta uerò $e g$, æqualis posita est semidiametro deferentis epicylum: at $c f$, eccentricitas est orbis deferentis Solem. Ostensum præterea est, circuli æquantis eccentricitatem eam habere rationem ad semidiametrum deferentis epicylum Veneris, quam eccentricitas orbis deferentis Solem ad ipsius semidiametrum: recta igitur linea $f k$, semidiametro orbis deferentis Solem æqualis est, atqui eadem $f k$, per centrum Solaris corporis transit: punctum igitur k , cætrum Solis existit. Et propterea quando epicly Veneris centrum à centro æquantis distat interuallo æquali semidiametro sui deferentis, in una atq; eadem recta linea à centro mundi ueniente, cætrum epicly, & centrum Solis existunt, quod quidem demonstrandum suscepimus. Tunc autem centrum epicly à centro æquantis distabit interuallo æquali semidiametro deferentis, quando in termino illius lineæ fuerit, quæ à puncto medio inter centrum eccentrici & æquantis ad rectos angulos ducitur super augis lineam, quod quidem per 4. propositionem primi Euclid. statim concludes: in eo quæ situ angulus $c g e$, æquantis centri æqualis est angulo $c k f$, æquationis argumenti Solis. At quod in nullo alio situ inter b & a , recta linea ducta à centro mundi ad epicly centrum, in rectumq; extensa, per centrum Solis uenire possit: non erit difficile demonstrare. Nam si hoc possibile est: esto igitur centro epicly existente in puncto i , inter g & a , recta q; linea $c i$, à centro mundi ducta ad i , in rectum extensa

occura

occurrat centro Solis in l, & connectantur rectæ lineæ e i & f l, quas parallelas esse simili arte ostendes, qua usi fuimus ad ostendendum f k & e g, parallelas esse: & idcirco æquiangula sunt duo triangula c e i & c f l, per 29 propositionem & 32. primi libri Euclidis, latera quoque habent proportionalia per 4. sexti, uidelicet sicut c e ad c f, sic e i ad f l. At in duobus similiter triangulis equiangularis c g e & c f k, sicut c e ad c f, sic e g ad f k: igitur sicut e i ad f l, sic e g ad f k, per 11. propositionem 5. libri Euclidis. Atqui



maior est e i quam e g, per 7. propositionem 3. libri Euclidis: maior igitur erit f l quam f k, per 24. propositionem 5. libri, quod est impossibile, contra circuli definitionem: nam f, centrum est orbis Solem deferentis: Et propterea epicyclo existente in i, recta linea c i, à centro mundi ueniens per centrum Solis minimè transit, quod erat demonstrandum. Ex quo apparet minorem esse æquationem centri epicyclo in i constituto, æquatione argumenti Solis. Ducatur enim à puncto f, recta linea f l, per centrum Solis, quæ cum recta c i, concurrat in puncto l: constat igitur ex eis quæ demonstrauius duas rectas lineas f l & e i, parallelas esse, ipsasque f l & c i concurrere. Et quoniam ostensum est maiorem esse f l quam f k, ipsamque f k semidiametrum esse orbis deferentis Solem: esto igitur centrum solaris corporis punctum m, & connectantur c m. In triangulo itaque c m l, interior angulus c l m, exterior e c m f minor erit, per 16 propositionem primi libri: eidem uero c l m, æqualis est angulus c i e, per 29.




monstrare poteris. Veniat enim centrum deferentis ad punctum r, semicirculi Occidentalis: epicycli uerò centrum quoniam in diuersa mouetur, ueniat ad t, & connectantur rectę lineę tr, at, & ar: duo igitur latera ar & tr, trianguli atr, reliquo latere at, maiora sunt, per 20. propositionem primi libri Euclidis: æquales sunt autem dg & tr, quia equalium circulorum semidiametri sunt, & ad maior est quàm ar, per 8. propositionē tertij libri: maior igitur est ag, ipsis duob. lateribus tr & ra: & idcirco multo maior est ipsa ag quàm at. Et proinde cum epic. constitutus fuerit in g, distantissimus erit à mundi centro. Quòd autē necesse sit quandoque centrum epicycli in auge deferentis fuerit: etiam esse in auge æquantis, ex motuum similitudine concluditur. Nam si fieri potest, ut centrum epicycli sit in auge deferentis, quando non est in auge æquantis: esto igitur in z, & connectatur recta linea az: in qua quidem necesse est cens

circuli, graduum nempe 60. & propterea exterior angulus $d b m$, graduum erit 120. in circuli cētro: propter motuum igitur similitudinē centrum epicycli erit in m : tantum enim moueri oportet centrum epicycli super b , ab auge deferentis descendens, quantum centrum deferentis super c . Non erit igitur in l , opposito augis deferentis, termino uē lineę paruum circulum contingentis.

Quoniam uerò $a c$ & $c i$, per 29. propositionem primi libri maiora sunt quā $a i$: maior est igitur recta $a d$ quā $a i$, tota quē $a g$, maior erit quā $a k$: & propterea reliqua $a h$, minor erit reliqua $a l$. Idē similiter ostendes in omni alio situ defe. At eadem $a l$, minor erit quā $a m$, per 7. propositionem 3. libri: nam punctum a , præter centrum i , est in diametro $k l$. Recta $a g$, partes habet 69. igitur $a h$, partes habebit 51. & quoniam quadratum ex $a c$, est 36. quadratum uerò ex $c i$, est 9. quadratum igitur ex $a i$, erit 27. quare recta $a k$, partes habet 60. per Re. 27. recta igitur $a l$, 60. min. Re. 27. recta uerò $a m$, quæ breuissima distantia est centri epicycli, à centro mundi, Ioannis de Montereio calculo partium 55. m. 33. reperta est: at ipso centro epicycli in linea contingente existente, eius distantia à centro mundi inuenit partium 56. m. 22. fere: tunc autem centrum eccentrici erit inter b & i . Sed oppositum augis deferentis inter lineam cōtingentem & oppositum augis æquantis, nempe inter l & f .

Soluat itaque deferentis centrum, & circumferentiam percurrens ibi ad b , æquantis centrum perueniat: unus igitur atque idem circulus qui delator est epicycli pro æquante etiā erit in eo situ: & idcirco augis punctum idem erit quod e , spatio decurso $k e$: punctum uerò l , oppositi augis in eodem tempore redibit ad f , oppositi augis æquantis, spatio decurso $l f$: simul autem epicycli centrum erit in f . Nam quoniam duo anguli $b c i$ & $f b m$, æquales inuicem sunt, & motus centri deferentis motui centri epicycli similis proportionalis uē est, atque unā moueri incipiunt: in eodem igitur tempore angulos absoluent $b c i$ & $f b m$. Quando itaque i , simul fuerit cum b , epicycli centrum simul erit f , oppositum augis æquantis.

Inde uerò eadem lege simili quē figura motus centrum deferentis ibit ad n , punctum contactus orientale: simul autem aux deferentis ab Occidente in Orientem spatium percurret $e p$, & oppositum augis spatium $f q$: centrum igitur epicycli perueniet ad o , terminum lineę à puncto n , uenientis per centrum æquantis. In quo loco tantum distabit à centro mundi, quantum antea distabat cum erat in m , quod quidem per 4. propositionem primi libri Euclidis statim concludere poteris, propter æqualitatem angulorum qui ad b , & datorum laterum $b m$ & $b o$, que relinquuntur detractis æqualibus rectis lineis $b i$ & $b n$, ex semidiаметris



deferentis. Hinc de
 niq̄ p̄ctum n, quod
 cētrum factum est de
 ferentis, redit ad d, al
 tissimum punctū un
 dē moueri inceperat,
 eodemq̄ tēpore aux
 deferētis peruenit ad
 g, ē quo discesserat,
 spatio confecto p g:
 simul autem opposi
 tū augis appellit adh
 in una enim recta li
 nea ipsis centris æ
 quantis & deferentis
 existētibus, in eadem
 auges & opp. augis
 consistere necesse est.
 Centrum porrò epi
 cycli similiter redibit


ad g, unde in initio motus soluerat: quod in figura hac tertia ex motuum
 similitudine & æqualitate angulorum n cd & d b o, quemadmodum in
 secunda concludes.

Quod centrum epicycli in punctis m & o, minus distet à cētro mun
 di, quàm cum est in f, opposito augis æquantis, demonstraui Ioannes
 de Monteregio 9. lib. Epit. proposit. 21. hoc modo. Angulus em̄ a b o,
 tertiā partē cōtinet duorū rectorū: duo igit̄ reliqui anguli triāguli b a o,
 duas tertias continent duorum rectorū per 32. propositionem primi li
 bri Euclidis, atqui maior est angulus b a o angulo a o b, per 18. ipsius pri
 mi libri: est enim b o, partium 57. a b uerò earundem partium 3. angulus
 igitur b a o, plusquàm tertiam partem duorum rectorum comprehens
 dit: & idcirco idem angulus b a o, ipso angulo a b o maior erit: & pro
 pterea latus b o latera a o, maius erit per 19. ipsius primi libri Euclidis.
 Æquales sunt autem b o & a f, quod quidem per communem sententiam
 concludes, duabus lineis æqualibus b a & b n, detractis ex semidiame
 tris b f & n o: maior igitur erit a f ipsa a o, quod erat demonstrandum.
 Sed non satis est hoc, ut cōcludant theoriarum expositores centrum e
 picycl. in m aut o, quàm breuissimè distare à centro mundi. Demons
 traui idem autor in disputationibus aduersus Cremonensem, quòd quam
 uis centrum epicycli equali motu feratur super centro æquantis, non
 quod

quoduis aliud punctum deferentis æquali motu sup. reodẽ centro mo^a
ueri possit.

Annotatione secunda.

Quoniam semel tantum in anno cẽtrum deferentis est idem cum
centro equantis: aliàs autem semper deferentis centrum à cẽtro
mundi distantius est, quàm centrum æquãtis: rectẽ igit̃ Purb.
infert, uelocius moueri centrum epicycli Mercurij circa au
gem equantis, (uidelicet super cẽtro deferentis) tardius autem circa op
positum augis. In semicirculo enim Occidentali parui circuli sumatur
arcus di, quadrante minor, & diameter agatur il: rectilíneo uerò angu
lo dci, æqualis ponatur dbk ad b, æquantis centrum, & super i, cen
tro interuallo æquali semidiametro deferentis circulus describarur, cui
recta bk, in rectum continuumq̃ producta occurrat in m. Item super l,
centro interuallo æquali semidiametro deferentis circulus descriptus in



telligatur, cui recta bm, in alteram partem extensa occurrat in n: res
ctæ plinæ connectantur ig, im, ln & lf. Igitur cum centrum deferentis


li a apun

à puncto d discedens, spatium confecerit di, centrum epicly propter motuum similitudinem erit in m, spatium decurso gm, oualis figuræ, cui quidem in centro eccentrici deferentis epic. angulus subtenditur gim. Similiter cum centrum deferentis à centro æquantis discesserit, ad punctum q̄l peruenerit, centrum epicly propter motuum similitudinem erit in n, spatium confecto fn, oualis figuræ, cui in centro deferentis angulus subtenditur fn. In quanto autem tempore centrum epic. ab auge g, discedens spatium percurrit gm, in tanto discedens ab opposito augis f, percurrit fn: propterea quòd duo anguli contrapositioni gbm & fbn, in centro æquantis æquales inuicem sunt. Cæterum angulum gim, ostendemus angulo fn, maiorem esse: & idcirco celerius ferri centrum epic. super centro deferentis circa augem æquantis, quàm circa oppositum augis. In duobus enim triangulis imo & lno, duo latera im & ln, deferentis semidiametri æqualia inuicem sunt: & duo anguli io m & lo n, eisdem lateribus oppositi æquales: latus uerò io, angulum respiciens omi latere lo, angulum onl, respiciente maius est, & angulus ipse onl acutus est: quia minor est per 16. primi acuto angulo kbl, in maiori segmento existente. Minor igitur erit idem angulus onl, angulo omi: & idcirco maior relinquetur angulus nlo angulo mio, per 32. propositionem primi libri Euclidis, & communem sententiam. Atqui in duobus alijs triangulis cgi & cfl: quoniã duo anguli contrapositioni qui ad c, æquales sunt, & duo latera ci, cg, duobus lateribus cl, cf, alterum alteri æqualia: reliqui idcirco anguli sub quibus æqualia latera subtenduntur, alter alteri æquales erunt, per 4. propositionem ipsius primi libri: angulus igitur gic angulo flc æqualis erit. Ab angulo itaq; gic, angulum auferemus mio, & angulus relinquetur gim: ab angulo uerò flc, angulum auferemus nlo, qui maior ostensus fuit angulo mio, & angulus qui relinquitur fn: minor idcirco erit ipso gim, per communem sententiam. Et quoniam idem ostendi potest, & eadem arte, centro deferentis ueniente ad quemlibet situm inter d & i: celerius igitur fertur centrum epicly super centro deferentis circa augem æquantis, quàm circa oppositum augis, quod demonstrandum erat.

Lemma.

Quod autem sumpsimus in duobus triangulis imo & lno, quoniam duo latera im & ln æqualia sunt, & duo anguli io m & lo n, eisdem lateribus æqualibus oppositi æquales: latus uerò io, angulum respiciens omi latere lo angulum onl, respiciente maius est, & angulus ipse onl, est acutus: minorem idcirco esse eundem angulum onl, ipso angulo omi, hoc modo demonstrabimus. Circa triangulum enim imo, circulus describatur mio, & super recta im, quæ recta ln, æqualis est, triangulum

gulum describatur p i m, triangulo l n o, equilaterum per 22. propositionem primi libri Euclidis. quod eidem erit equiangulum per 8. propositionem ipsius primi libri Sitq̄ angulus p m i equalis angulo o n l, & angulus p i m, equalis n l o: & reliquus igitur m p i, equalis reliquo l o n: & p inde equalis angulo i o m, per communem sententiam. Necessesse est autem ipsum angulum m p i, in descripti circuli segmento m o i consistere, in quo angulus i o m: quoniam si uel prætergrederetur, uel non attingeret ipsius circuli circumferentiam: per propositionem igitur 16. ipsius primi libri, & 27. tertij, duos angulos m p i & l n o, inæquales esse cōcluderetur, quod est




absurdum, ducta uidelicet recta linea a puncto i, ad illud punctum in quo recta m p, circuli circumferentiam attingit. Consistit itaq̄ ipse angulus m p i, in segmento m o i. & quoniam angulus p m i acutus est: equalis enim ostensus fuit angulo o n l: in segmento igitur existit semicirculo maiori, per conuersionem 31. propositionis 3. libri: & idcirco segmentum i p, qui relinquitur ex circulo minus erit semicirculo. At equalis est recta i p recte l o, & eadem l o, minor est quam recta i o: igitur minor erit recta i p quam i o: & propterea punctum p, extra circumferentiam i o, minime existit, sed inter ipsa puncta i & o, ne accidat impossibile contra 27. tertij ex Cāpano: & idcirco angulus i m p, angulo o m i minor erit, pars uidelicet illius. at uerò angulus o n l, eidē angulo i m p equalis est: minor est igitur angulus o n l angulo o m i, qd in demōstratione erat assumptū.

Annotatio tertia.

A Equationes argumentorum, quæ in tabulis scribuntur, non solum trium superiorum planetarum atq̄ Veneris, sed etiam Mercurij, sunt quæ contingunt, dum centrum epicycli a centro mundi distat interuallo equali semidiametro deferentis. Sed discrimen in eo est, quod in illis interuallum illud media est longitudo, mediocris uere motio inter situm distantissimum & uicinissimum centri epicycli a centro mundi. Tantum enim longissima longitudo a centro mundi quæ augis eccentrici est, longitudinem superat semidiametri deferentis, quantum eadem semidiameter breuissimam longitudinem centri epicycli quæ appositi augis est, excedit: sed aliter euenit in Mercurio. Nam dum cen-

trū epicycli est in auge deferentis, quàm longissimè distat à centro mundi, partibus nempe 69. tunc autem opp. augeis quàm breuissimè distabit ab eodem mundi centro, partibus uidelicet 51. inter has uerò distantias mediocris est semidiamter deferentis. At quamuis contingat centrum epicycli in auge deferentis esse, & in alio deinde quodam situ, cuius distantia à centro mundi æqualis est semidiametro deferentis: nunquam tamen centrum ipsum epicycli à centro mundi distabit interuallo æquali breuissimæ illius distantiaæ oppositi augeis deferentis, sed maiori. In omni enim habitudine positione uerè deferentis, uicinissimum eius punctum oppositum augeis est, quod quidem per 7. propositionem 3. libri Euclidis concluditur: at distantiam oppositi augeis deferentis, dum centrum epicycli est in auge, breuissimam esse omnium aliarum distantiarum oppositi augeis in omni alia positione deferentis, ostensum fuit in prima Annotatione, per 20. propositionem primi: & idcirco maiori semper interuallo à centro mundi distabit centrum epic. quàm sit breuissima illa distantia oppositi augeis: & propterea dum centrum epic. à centro mundi destiterit interuallo æquali semidiametro deferentis, non dicetur illa distantia mediocris remotio centri epic. à centro mundi, nisi ualdè improprie loquaris, ut Purbach. in præsent. Ioannes de Montereigio ad finem 11. libri Epito. eisdem præceptoris uerbis usus est. Quo in loco scribit. In eo situ ad quem æquationes argumentorum Mercurij supputatæ sunt, centrum epic. distare ab auge æquantis Gr. fere 60. Sed menda est librarij. nam medio cursu distat ab auge æquantis Gr. 67. m. 8. ferè: uerò autem Gr. 64. m. 30. Mediocris remotio centri epic. à centro mundi partium est 62. cum m. circiter 16. media nempe inter 69. & 55. cum m. 33. ferè: sed ad eum situm æquationes argumentorum in tabula




lis scriptæ non sunt: sed ad eum in quo partibus distat 60. id est, interuallo æquali semidiametro deferentis. Esto enim in linea augeis æquantis a b, centrum mundi b: æquantis uerò c, centrum epicycli Mercurij ponatur in d, in quo loco distet ab auge æquantis Gr. 67. m. fere 8. æquatio igitur centri elicietur ex tabula Gr. 2. cum m. 38. quibus deductis ab ipso centro medio, gradus relinquentur 64. m. 30. centri ueri. His autem in tabula nihil minorum proportionalium respondet: tabula igitur æquationum argumentorum ad punctum d, deferentis constructa est: & propterea uerè Purbach scripsit, centrum epicycli distare ab auge æquantis duobus signis Gr. 4. m. 30. in ipso quidem loco ad quem tabula æquationum supputata est. Distantiam porrò centri epicycli à centro mundi in eodem situ parem esse semidiamet. deferent. ita inuenies. Quos

In theor. Planet. Geor. Purbach. annot. 255

es. Quoniam enim angulus $a c d$, centri mediij graduum est $67. \text{m}. 8.$ circumferentiæ æquantis: sinus igitur rectus arcus ipsius partes habebit $55284.$ qualium sunt in semidiametro circuli $60000.$ angulus uerò $b d c$, æquationis centri duorum graduum est, cum $\text{m}. 38.$ sinus igitur rectus partium erit $2756.$ & quoniam in triangulo $b c d$, sicut sinus rectus interioris anguli $d c b$, exterioris uè $a c d$, ad sinum rectum anguli $b d c$: sic latus $b d$ ad latus $b c$. Ratio igitur $b d$ ad $b c$, ea est quam habet numerus $55284.$ ad $2756.$ quorum quidem numerorum ratio est sicut $20.$ fere ad unum, siue $60.$ ad $3.$ At ostensum est à Ptolemæo semidiametrum deferentis eam habere rationem ad distantiam centri mundi à centro æquantis, quam $20.$ fere ad unum siue $60.$ ad $3.$ æqualis igitur est recta $b d$, semidiametro deferentis in eo situ, ad quem supputata est tabula æquationis argumentorum Mercurij.

Idem etiam ostendes alio modo. Distet enim centrum epicycli d , à centro mundi b interuallo $b d$, cum est in eo situ ad quem scriptæ sunt in tabula æquationes argumentorum, & ab ipso puncto b , recta ducatur lineab e , epicyclum tangens in e , recta q̄ connectatur $d e$.

Angulus igitur $b e d$, rectus erit: & idcirco angulus $d b e$, maximam æquationem argumenti subtendet in eo situ. Hæc autem in tabula inuenitur $\text{Gr}. 22. \text{m}. 2.$ fere, tantusq̄ erit in circuli centro ipse angulus $d b e$, cuius sinus rectus partium erit $22500.$ In circulo itaq̄ descripto super centro b , ad mensuram rectæ $b d$, quam partium subiicimus $60000.$ recta $d e$, epicycli semidiameter sinus uidelicet rectus anguli $d b e$, earundem partium erit $22500.$ & p̄ inde ratio $b d$ ad $d e$, est sicut $60.$ ad $22.$ cum semisse. Et quoniam eandem rationem habere semidiametrum deferentis ad semidiametrum epicycli à Ptolemæo ostensum est: recta igitur $b d$ æqualis est semidiametro deferentis: & idcirco dubium non est æquationes argumentorum Mercurij quæ in tabula scriptæ sunt, ad eum situm supputatas esse, in quo centrum epicycli à centro mundi distat interuallo æquali semidiametro deferentis, quemadmodum in tribus planetis superioribus, & Venere.




De passionibus Planetarum Annot. i.

De directione, statione, atq̄ regressione quinque Planetarum.

Centrum mundi sit a : centrum uerò epicycli b : ab ipso igitur puncto a , rectæ lineæ incidant in circulum reuolutionis Planetæ in epicyclo, uidelicet $a c$, per centrū transiens usq̄ ad k & $a d$, atq̄ $a e$ ipsum

le autem punctum ostensum est ab Apolonio esse i, & est statio prima, cui respondet ex altera parte anted, in fine arcus retrogradationis punctum stationis secundæ, quod sit l, in quo quidem linea ueri motus epicycli uelocius moueri incipit in sequentia, quàm linea ueri motus planetæ in præcedentia. Id autem cognosces ex æquatione quæ debetur motui argumenti in uno die, si cõferatur cum motu centri epicycli in eodem die. Nam ab e, puncto Orientalis contactus longitudinis motus minui incipit: & quanto motus argumenti uicinior est opposito augis ueræ, tanto æquatio ipsius motus argumenti maior fit: cum igitur æquatio motus argumenti motu centri epicycli in eodem tempore maior re-
 perta fuerit, planeta retrogradus erit. In circumferentia enim e c, duo ar-
 cus motus argumenti sumantur æquales, g n uicinior puncto c & o r, re-
 motior quibus æquationum anguli subtendantur in centro mundi g a
 n & o a r. Dico quod maior est angulus g a n, ipso angulo o a r. Rectæ en-
 nim lineæ a g & a o, producantur usq; ad p & q, in ipsius epicycli circũ-
 ferentia, rectæq; connectantur n p & r q. Quòd si angulus g a n, maior



non est angulo o a r: uel igitur æqua-
 lis erit, aut eo minor, si est æqualis:
 quia duo anguli g p n & o q r, æqua-
 les inuicem sunt per 27. tertij in æqua-
 libus enim circumferentijs existunt
 per hypothesim in duobus igitur tri-
 angulis a p n & a q r, duo reliqui an-
 guli a n p & a r q, æquales erunt per
 32. propositionem primi, & commu-
 nem sententiam: & propterea latera
 ipsorum triangulorum quæ sub æ-
 qualibus lateribus subtenduntur, p-
 portionalia erunt, per 4. proposicio-
 nem 6. libri uidelicet sicut a p ad a q,
 sic a n ad a r: maior est autem a p quàm
 a q, per 8. tertij: maior igitur erit a n
 quàm a r, quod quidem est impossibile cõ-
 tra eandem 8. tertij: & propterea nõ est ei
 æqualis. At minor nõ est angulus ip-
 se g a n, eodẽ angulo o a r: nã si minor
 est: ad punctum igitur a, terminum
 lineæ a o, angulum faciemus o a t, æ-
 qualem ipsi g a n, per 23. proposicio-
 nem primi, recta ducta linea a t, quæ
 K k rectam




tionum puncta æqualibus interuallis distare ab opp. augis ueræ epicycli necesse est. Capuanus uerò theoricarum expositor quoniam motum planetæ in epicyclo solum considerat, motu deferentis neglecto, stationum idcirco puncta ponit e & d, in prima figura huius Annotationis. Quæ quidem ostensoria demonstratione concludes, æqualibus distare interuallis ab opposito augis ueræ epicycli.

Auguli enim ad e & d, puncta contingentia in triangulis b a d & b a e recti sunt, per 18. propositionem tertij libri: & propterea quadrata ex a d & d e, æqualia erunt per 47. propositionē primi, & communem sententiam: & idcirco ipsa latera a d & a e, æqualia erunt. Iam igitur per 8. propositionem ipsius primi libri ostendes duos angulos d b a & e b a æquales: & proinde duos arcus d c & e c, æquales esse per 26. propositionem tertij. Sed non sunt apud Purbach. d & e stationum puncta: quoniam ait stationum puncta opposito augis epicycli magis appropinquare propter motus argumēti tarditatem: liquet autem quod etiam si motus planetæ in epicyclo tardior factus fuerit, minimè propterea mutabuntur puncta contactuum.

Arcus stationis primæ est k h i, arcus secundæ est k i l, arcus directionis est l k i, arcus retrogradationis est i c l. Igitur si arcus k h i, stationis primæ auferatur à toto circulo, arcus relinquetur i l z k, qui æqualis existit arcui k h i l, stationis secundæ, à quo quidem si arcus ipse k h i auferatur, relinquetur i c l, retrogradationis arcus: hoc autem à toto circulo deducto, arcus directionis relinquetur l k i.

Annotationis secunda.

Quoniam Purbach. ait, stationum puncta tanto uiciniora esse opposito augis ueræ epicycli, quanto centrum epicycli uicinius fuerit opposito augis æquantis, & quanto planeta maiorem habuerit epicyclum, putant propterea nonnulli causas ab eo assignatas esse, ex quibus minor arcus retrograd. proueniat. Quod quidem minimè dubitaretur, si puncta contactuum stationes essent. Nam dum centrum epicycli cuiusuis planetæ (excepto Mercurio) opposito augis æquantis eccentrici uicinius est, terris magis appropinquat. Ponamus igitur centrum epicycli distare à centro mundi a, interuallo ab, in situ distantiore punctum stationis primæ d, & oppositum augis epicycli c: in situ uerò propinquiore eiusdem epicycli centrum distare ab ipso mundi centro interuallo a e, punctum stationis primæ f, & oppositum augis g. Dico, quòd minorem est arcus f g, dimidiæ retrogradationis in situ propinquiore, quàm arcus d c, qui similiter continet di-




midium retrogradationis, sed in situ distantiore. Nam quoniam rectæ lineæ ad & a f, circulos ipsos epicycli contingunt per hypothesim: anguli igitur a d b & a f c, recti erunt: maior autem supponitur a b ipsa a e: maius igitur erit quadratum rectæ a b quàm a e. Concludes itaque per 47. propositionem primi, duo quadrata ex a d et b d, maiora esse duobus quadratis ex a f & f e: quadratum porrò ex b d, quadrato ex e f, æquum est: quadratū igitur ex a d, quadrato ex a f, maius erit: & propterea recta ipsa a d recta a f, maior etiam erit. Abscindemus itaque ex a d maiori rectam lineam d k rectæ a f, æqualem per 2. primi, & connectatur b k, quæ circulum secet in i. Per 4. igitur propositionem ipsius primi libri concludemus angulos trianguli b d k, angulis trianguli e a f, æquales esse, eos uidelicet qui sub æqualibus lateribus subtenduntur. Angulus idcirco d b k angulo a e f, æqualis erit: & propterea arcus d i & f g, æquales erunt. Atqui minor est d i quàm d c: minor igitur erit f g eodem d c.

Quapropter in situ propinquiore stationum puncta uiciniora sunt opposito augis ueræ, quàm in situ remotiore supposito, quòd stationes planetarum fiant in punctis contactuum.

Sed distantia à centro mundi sint æquales: ipsi uerò epicycli ponantur inæquales: puncta idcirco stationum in maiori epicyclo uiciniora erunt opposito augis ueræ, quàm in minore. Centrum enim utriusque epicycli positum intelligatur in b, ut eadem sit distantia ab ipso a, mundi centro, oppositum augis in minori sit c, & alterum punctum contactus ubi supponitur stationem fieri sit d, oppositum augis in maiori sit e, & alterum punctum stationis in quo fit contactus sit f. Recta igitur linea a f, epicyclum maiorem contingens cadere non potest inter a b & a d, ne accidat impossibile contra ultimam communem sententiam, duas rectas lineas superficiem non concludere, nec in rectū extendi potest cum eadem a d: recti enim sunt duo anguli qui ad d & f sunt, ex concursu linearum

nearum

nearum contingentium cum semidiamentris ipsorum epicyclorum: quare si recta af , unâ esset cum ad : tres igitur anguli interiores trianguli abf , minores essent tribus interioribus trianguli abd : quod rursus est impossibile.



Et propterea recta ipsa linea af , extra ad caâ dit, angulumq; efficit baf , maiorem angulo bad . Ex quo fit ut angulus qui relinquit abf , minor euadat quàm abd . Recta porrò linea bd , producatursq; ad maioris epicycli circumferentiam in puncto g : duo igitur arcus cd & eg , in æqualibus circulis eidem acuto angulo subtenduntur cbg . Sicut autem ipse angulus ebg , ad rectum angulum, sic arcus cd & eg , ad suorum circulorum quadrantes, per ultimam sexti: ipsi igitur arcus ed & eg , similes proportionales uè erunt: & proinde arcus ef , minor erit quàm is qui in suo circulo proportionalis est arcui cd , minoris epicycli: & propterea punctum stationis maioris epicycli uicinius est opposito augis ueræ, quàm punctum stationis minoris epicycli, quod erat ostendendum.

Annotatio tertia.

Tertia causa, quam assignant maioris uicinitatis punctorum stationum ob tarditatem motus argumenti, nihil efficere poterit, ubi eccentricus intelligatur quiescere, quia puncta cõtactuum eadem erunt, siue uelox, siue tardus sit argumenti motus, dummodo cetera ponantur paria. Et idcirco quia puncta stationum uiciniora sunt opposito augis epicycli quàm ipsa puncta contactuum, inquirendum igitur est à nobis, sit ne uerum in uniuersum quod à nonnullis assertum est de triplici causa uariationis punctorum stationis.

Et imprimis ostendemus, quòd non propterea, quòd cẽtrum epicycli propinquius est centro mundi, stationum idcirco puncta uiciniora erunt opposito augis ueræ epicycli. Sit enim a , centrum epicycli b , centrum mundi, ab breuissîma distantia centri epicycli à centro mundi, c aux uera epicycli, d oppositum augis: recta autem ae , perpendicularis sit in cd : & erit idcirco punctum e , in medio semicirculi inter c & d . A centro mundi b ad g , contingens punctum inter c & e , recta ducatur linea bg , quæ inferiore quadrantem secet in f . Igitur bf , maior erit quàm

Kk 3

bd,

dem rationis latera subtenduntur per 6. sexti libri, & ideo angulus $b k f$ angulo $g l f$, æqualis erit.

In duos itaq; rectas lineas $b k$ & $g l$, recta incidens linea $k f l$, alternos angulos æquales efficit $b k l$ & $g l k$: & propterea parallelæ erunt ipsæ rectæ lineæ $b k$ & $g l$, per 27. propositionem primi. Deducatur autem à puncto g super $a e$, perpendicularis recta linea $g o$, per 12. primi: quæ quidem in rectum producta inferiori quadrantis $d e$, occurrat in m : recta igitur linea $c d$ siue $b k$, parallela erit ipsi $g m$, per 28. primi. Atqui $g l$ & $b k$, parallelæ ostensæ sunt: duæ igitur $g m$ & $g l$, parallelæ erunt per 30. propositionem ipsius primi lib. quod quidem est impossibile. Concurrunt enim in puncto g , in quo angulum efficiunt $l g m$. nam tria puncta $l g$ & m , in circuli circumferentia existunt, non in una recta linea. Quando itaque centrum epicycli à centro mundi distiterit interuallo $a k$, stationis punctum non erit f . Eadem arte ostendemus, quòd non sit stationis punctum inter f , & illud punctum, in quo recta linea à puncto k ducta, epicyclum tangit.


Nam si est: sit igitur n stationis punctum, & producta $k n$, occurrat puncto t , in ipsius circuli circumferentia: quæ propter sicut motus planetæ in epicyclo ad motum centri epicycli, sic $k n$ ad dimidium $n t$: & idcirco sicut $k n$, ad dimidium $n t$, sic $b f$ ad dimidium $f g$: & propterea sicut $k n$, ad totam $n t$, sic $b f$ ad totam $f g$. At maiorem rationem habet $k n$ ad $n t$, quàm $k f$ ad $f l$: maiorem igitur rationem habebit $b f$ ad $f g$, quàm $k f$ ad $f l$: recta igitur linea inueniatur $f r$, ad quam $k f$, eam habeat rationem quam habet $b f$ ad $f g$: minor idcirco erit $f r$ quàm $f l$, per decimam quinti. Connectatur itaque recta linea $g r$, & æquiangulara propterea erunt duo triangula $b f k$, $g f r$, per 6. sexti. Quapropter duas rectas lineas $g m$ & $g r$, (ut antea) concludemus parallelas esse: quod quidem est impossibile. Et idcirco quando centrum epicycli distat à centro mundi interuallo $a k$, non erit stationis punctum inter f , & punctum contactus. Et quoniam in puncto d , retrogradus est: in ipso uerò puncto contactus & supra eum directus incedit: punctum igitur stationis erit inter d & f : quare propinquius erit opposito augis ueræ, quando centrum ipsius epicycli remotius est à centro mundi, quod erat ostendendum.

Et ostendemus rursus, in alia figura stationum puncta in longioribus distantijs à centro mundi propinquiora esse opposito augis ueræ epicycli. In recta enim linea $c d$, in rectum producta, & à contingente in ea puncto b , recta ducatur $b e a d e$, punctum in medio semicirculi inferiorem quadrantem secans in f . Maiorem igitur rationem habebit $b f$, ad dimidium $f e$, quàm $b d$ ad $d a$. Suscipiatur autem aliquando infra b , punctum k , arte superius dicta, sic ut minorem adhuc rationem habeat

beat

beat k ad d a, quam b f ad dimidium f e , & ponatur b centrum mundi, a centrum epicycli in opposito augis, siue in breuissima distantia à centro mundi. Tanta uerò subiiciatur tarditas motus centri epicycli, & tanta uelocitas planetæ in epicyclo, ut b f ad dimidium f e , & motus planetæ in epicyclo ad motum centri epicycli eandem habeant rationem. Igitur quando centrum epicycli à centro mūdi distiterit interuallo a b , planeta in d , retrogradus erit, & in f stationarius.

Rursus quando centrum epicycli à centro mundi distiterit interuallo a k , planeta ipse in d retrogradus erit, at in f non erit stationarius, si eadem motuum proportio seruata fuerit. Nam si in f , stationarius est: du-



catur igitur per k & f , recta linea k f , quæ quadranti superiori occurrat in z , & connectatur e z . Igitur sicut b f , ad dimidium f e , sic k f ad dimidium f z : quapropter sicut b f ad totam f e , sic k f , ad totam f z .

Duo itaq; triangula b f k & e f z , equiangula erunt per 6. sexti, & angulus f z e , coalterno b k f , æqualis erit: & idcirco a k & e z , rectæ lineæ parallelæ erunt. Tangat autem recta linea s u , circulum ipsum epicycli in e : angulus igitur a e u , rectus erit, at uerò rectus etiam est c a e : igitur parallelæ sunt a k & s u : & propterea duæ rectæ lineæ e z & s u , quæ angulum faciunt in e , parallelæ erunt per 30. propositionem primi quod est impossibile: & idcirco stationarius non erit in f . Nec erit in aliquo puncto inter f & e .

Nam si est, sit in r , & connectatur k r , quæ in rectum producatuſ usq; ad t , in epicycli circumferentia.

Igitur sicut k r , ad dimidium r t , sic motus planetæ in epicyclo ad motum centri epicycli: & idcirco sicut k r , ad dimidium r t , sic b f ad dimidium f e , & ut k r ad totam r t , sic b f ad totam f e , atqui maiorem rationem habet k r ad r t , quàm k f ad f z : igitur maiorem rationem habebit b f ad f e , quàm k f ad f z , habeat itaq; k f ad f x , minorem ipsa f z , eam rationem quàm b f habet ad f e & connectatur e x : duo igitur triangula b f k & f e x , æquiangula erunt, & duas rectas lineas a k & e x , (ut antea) parallelas esse concludes: & proinde parallelas esse e x

& s u

& s u, quæ in puncto e, angulum efficiunt u e x: quod quidem est impossibile. Et propterea non erit ipse planeta stationarius inter f & e, sed inter d & f: & idcirco stationum puncta in longioribus distantijs à centro mundi opposito augis epicycli uiciniora erunt, quod demonstrandum erat.

Fortasse quispiam suspicabitur, idcirco in maioribus distantijs stationum puncta uiciniora ostensa esse opposita augis epicycli: propterea quod proportio motus planetæ in epicyclo ad motum centri epicycli proportionem k d, ad d a, minori differentia superat, quæ sit ea quam proportionem superat, quæ est b d, ad d a. maiorem enim proportionem habet k d, ad d a quam b d ad d a. Et quoniam ductis rectis lineis à centro mundi ipsum epicyclum secantibus, proportionem linearum exteriorum ad dimidias partes interiorum perpetuò augentur à puncto d, usq; ad lineas contingentes: citius igitur in longioribus distantijs proportio exterioris lineæ ad dimidium interioris, illi proportioni æquabitur, quam motus planetæ in epicyclo seruat ad motum centri epicycli. In maiore itaque distantia epicycli à centro mundi citius quæ in minore, idem planeta à puncto d, dimidiæ retrogradationis, ad punctum stationis perueniet: & proinde in longioribus distantijs stationum puncta uiciniora erunt opposito augis ueræ. Hæc tamen ratio fallax est. Nam talis esse poterit motuum proportio: similiter & distantiarum, ut non citius Planeta ad punctum stationis ueniat in maiore distantia centri epicycli à centro mundi, quam in minore: quinimò idem sit stationis punctum, siue sit terris uicinissimum, siue distantissimum. Esto enim centrum mundi b, quando centrum epicycli terris uicinissimum est, punctum f sit, in quo recta linea ab ipso centro mundi ueniens epicyclum tangit, & à puncto g inter f, & punctum e, quod est in medio semicirculi, recta linea ducatur g h, rectæ a b parallela, quadrantem superiorem in h secans, recta quoque linea b g connectatur, quæ inferiorem quadrantem ipsius circuli epicycli in i secet: recta etiam linea connectatur h i, quæ in rectum producta concurrat cum recta a b in k. Et proportio motus planetæ in epicyclo ad modum centri epicycli ea subiiciatur, quam habet b i ad dimidium g i. Planeta igitur in d centro mundi uicinissimus retrogradus erit: in i uero stationarius. Centrum autem mundi sit k, quando centrum epicycli à terris remotissimum est: & eadem proportio motuum seruetur.

Dico, quòd planeta retrogradus erit in d, & stationarius rursus in i. Nam quoniam g h & b k, parallelæ sunt: duo igitur anguli coalterni g h i & b k i, æquales erunt: angulus uero g i h, contrapposito b i k equalis est: reliquus igitur angulus k b i, triânguli b k i, reliquo angulo i g h,

Ll

trianguli


trianguli $i h g$, æqualis erit per 32. primi & communem sententiam: & idcirco latera habebunt proportionalia ipsa triangula per 4. sexti, sicut $b i$, ad $i g$, sic $k i$, ad $i h$. Atqui sicut $i g$ ad sui dimidium, sic $i h$ ad sui



dimidium: igitur sicut $b i$, ad dimidium $i g$, sic $k i$, ad dimidium $i h$, per æquam proportionem. Et quoniam eam supposuimus motuum proportionem, quam habet $b i$, ad dimidium $i g$: igitur sicut motus planetæ in epicyclo ad motum centri epicycli: sic $k i$, ad dimidium $i h$. Et propterea ipse planeta stationarius erit in ipso puncto, quando centrum epicycli à centro mundi quàm longissimè distat, quod etiam continebat in eodem puncto, quando ipsius epicycli centrum terris uicinissimum erat. Retrogradus similiter erit in d : quoniam maiorem proportionem habet $k i$, ad dimidium $i h$, quàm $k d$, ad $d a$: & propterea maiorem proportionem necesse est habere motum planetæ in epicyclo ad motum centri epicycli, quàm $k d$, ad $d a$: ex quo concluditur in ipso puncto d , retrogradum esse. Similiter arte ostendi potest, quòd talis poterit esse motuum proportio, ut in situ propinquiore stationum puncta uiciniora sint opposito augis ueræ, quàm in situ remotiore. Esto enim punctum k , centrū mundi,

quando à centro epicycli a distanctissimum est, & ab ipso puncto k , ducatur ad punctum e , quod est in medio semicirculi recta linea ke , epic. circulum secans in f , & ea subiiciatur motuum proportio, quam habet $k f$, ad dimidium fe . Planeta igitur in f , stationarius erit: retrogradus autem in d . Esto autem cētrum mundi b , quando centrum epicycli terris uicinissimum est, & connectatur recta linea bf , quæ in rectum producta circuli circumferentiam attingat in g , & connectatur eg : planeta igitur seruata eadem motuum proportione, retrogradus erit in d : at stationarius non erit in f . Nam si est: erit igitur sicut $k f$, ad dimidium fe : sic $b f$, ad dimidium fg , & sicut $k f$, ad totam fe , sic $b f$, ad totam fg : & propterea concludemus (ut antea) duas rectas lineas $b k$ & ge , parallelas esse: quod est impossibile. ipsa enim recta linea $b k$, ei
quæ in

quæ in puncto e, circulum ipsum epicycli tangit, æquidistans est: & proinde stationis punctum non erit in f. Neque erit ultra f. nam si est ultra f: exterior igitur linea à centro b, ad punctum stationis ducta ad dimidium interioris quæ intra circulum est, eam rationem habebit $\overline{b f}$ ad dimidium fe: ea enim est motuum proportio per hypothesim: & idcirco sicut exterior linea ad totam interiorem, sic $\overline{b f}$ ad fe. at maiorem rationem habet ipsa exterior ad totam interiorem, quæ in puncto ultra f epicyclum secat, $\overline{b f}$ ad fe: maiorem igitur rationem habebit $\overline{k f}$ ad fe, $\overline{b f}$ ad fg. Habeat autem $\overline{b f}$ ad fo minorem ipsa fg, eam rationem quam seruat $\overline{k f}$ ad fe, & connectatur eo: duo idcirco



triangula $\overline{b f k}$ & $\overline{e o f}$, ostēdemus (ut antea) equiāgula esse per 6. sexti, angulos quæ coalternos $\overline{b k f}$ & $\overline{f e o}$, æquales esse concludemus: & propterea duas rectas $\overline{b k}$ & $\overline{e o}$ parallelas esse, quod est impossibile. Et quia planeta retrogradus est in d, maiore existente motuum proportione, quam $\overline{b d}$ ad $\overline{d a}$: stationarius autem esse non potest in f, neque in aliquo alio puncto inter f, & illud punctum in quo recta linea à puncto b, ducta epicyclum tangit: stationarius igitur erit inter d & f, & proinde stationum puncta uiciniora erunt opposito augis ueræ in situ uiciniora, $\overline{q̄}$ in remotiore.

Ex quibus palam est, quòd maior uicinitas punctorum stationum non prouenit ex solo situ, aut propinquiore centro mundi, aut distantiore.

Sed neque maior quantitas epicycli causa est, ut stationum puncta uiciniora sint opposito augis ueræ, si cætera ponantur paria.

Intelligentur enim duo epicycli circa centrum a, & maioris diameter sit $\overline{b c}$, minoris uerò $\overline{d e}$: ipsi autem $\overline{b c}$, in unius atque eiusdem maximi circuli plano parallelus agatur $\overline{h k}$, minorē secans epicyclum in punctis f & g, & connectantur rectæ lineæ $\overline{e f}$ & $\overline{c k}$: quas quidem in rectum producemus, donec concurrant: sit $\overline{q̄}$ punctum, in quo concurrunt y: concurrere enim necesse est ad partes e & c.

Nam à punctis f & k, rectis lineis deductis $\overline{f l}$ & $\overline{k m}$, ad rectos angulos super $\overline{b c}$, maior erit $\overline{l e}$ in minori circulo, quam $\overline{m c}$ in maiori.

Quod enim fit ex $\overline{b m}$, in $\overline{m c}$, ei quod ex $\overline{k m}$, in se ipsam fit, æquum


In theor. Plan. Geor. Purbac. annot. 271

ad rectos angulos duæ rectæ lineæ ducantur $d e$ & $f g$. Sitq; $d e$, à cen-
tro ipso a distantior, sed $f g$ propinquior: quarum quidem cum mi-
nori circulo intersectiones sint $k h$ & $i l$. Æquidistantes igitur erunt ip-
sæ rectæ lineæ $d e$ & $f g$: connectantur autem $k i$ & $e g$, quæ necessa-
rio concurrent ad partes g & i , quemadmodum statim ostendemus.
Agatur enim inter centrum a & rectam $d e$, recta linea $m n$, ipsi $d e$ æ-
quidistans, sed quæ tanto interuallo distet ab ipso a, quanto distat $f g$,
interuallis nempe equalibus $a t$ & $a z$. Ea autem secet minorem circulo-
rum in p , inter k & i , maiorem uero in n , inter e & g , & connectantur $e n$ &
 $k p$. Rectæ igitur lineæ $p k$ & $e n$, concurrent ad partes p & n , uelut in præ-
cedenti figura demonstratum est. Et propterea maior ostendetur $e k$,
quam $n p$, per 4. propositionem 6. Euclidis: at uero ipsa $n p$, rectæ $g i$,
æqualis est: quod quidem per communem sententiam concludes. ex
æqualibus enim $t n$ & $g z$ relinquuntur, detractis $t p$ & $z i$ equalibus:
quapropter recta $e k$, maior erit ipsa $g i$. at æquidistantes sunt: concu-
rant igitur rectæ $k i$ & $e g$, ad partes g & i . Si enim parallelæ sunt: æqua-
les igitur erunt rectæ lineæ $e k$ & $g i$, per 34. propositionem primi libri,
at maior ostensa est $e k$, ipsa $g i$. Concurrere autem non possunt ad par-
tes k & e . nam si ad eas partes concurrerent, maior esset $g i$ ipsa $e k$, per
4. propositionem 6. at maior ostensa est, & propterea ad partes g & i ,
concurrunt ipsæ rectæ lineæ $k i$ & $e g$. Sit autem earum concursus in o-
puncto, à quo quidem ad centrum a, recta linea ducatur $o a$, proximas
epicyclorum circumferentias secans in r & s . Et ponemus ipsos epicy-
clos eisdem motibus moueri atq; eo pacto, ut motus centri epicycli eã
habeat rationem ad motum planetæ in epic. quam dimidium $k i$, ad re-
ctam $i o$, & propterea sicut dimidium $e g$ ad $g o$. Nam sicut $k i$ ad $i o$, ita
 $e g$ ad $g o$, per secundam propositionem 6. Euclidis. Quapropter
planeta minoris epicycli retrogradus erit in s perigæo, sed stationarius
us in i . At planeta maioris epicycli retrogradus erit in r , stationarius
uero in g . Et quoniam si à puncto a in punctum g , recta linea ducta fue-
rit $a g$, rectam $g z$, ante g , secare non poterit, ne accidat impossibile cõ-
tra ultimã comunem sententiã, duas rectas lineas superficiem non cõ-
cludere: circumferentia igitur si minor erit eã quæ in eodem circulo simi-
lis est circumferentiæ $g r$, & proinde in minori puncta stationum uici-
niora sunt perigæo, q̃ in maiori: quod quidem in præsentî figura de-
monstrandum suscepimus. Ex quib. concludes, qd maior quantitas e-
picycli causa non est (si cetera ponantur paria) maioris uicinitatis pun-
ctorum stationum, quod erat à nobis ostendendum.

Tarditas motus argumenti, idest, tardior motus planetæ in epicy-
clis causa est, ut puncta stationum magis inuicem appropinquent.

Esto em̃

Esto enim centrum epicycli a, centrum mundi b: motus uero planetæ in epicyclo ad motum centri epicycli maiorem habeat rationem, quã b d, ad d a. Sed sit sicut b c, ad dimidium c e: planeta igitur retrogradus erit in d, stationarius uero in c. Dico itaq; qd si motus ipsius planetæ in epicyclo tardior positus fuerit, sic tamen, quod maiorem adhuc rationem seruet ad motum centri eiusdem epicycli, quã b d ad a d, retrogradus etiam erit in d, sed stationis punctum erit inter c & d, atque eo modo propinquius fiet opposito augis ueræ eiusdem epicycli. Nam in ipso c puncto stationem facere non poterit: si enim faceret, recta b c, ad dimidium c e, maiorem haberet rationem, simul & minorem: quod est impossibile. Tardior enim motus planetæ in epicyclo ad eundem motum centri epicycli minorem habet rationem, quã uelocior: & proinde neque stationis punctum poterit esse f ultra c. Nam b f, ad dimidium interioris lineæ, quæ sit f g, maiorem habet rationem, quã b c ad dimidium c e: & idcirco tardior motus planetæ




in epicyclo ad eundem motum centri epicycli maiorem haberet rationem, quã uelotior: quod rursus est impossibile. Et propterea si argumenti motus ponatur tardior, stationis punctum erit ante c, uicinius nempe opposito augis ueræ epicycli. Idem etiã concludes, si seruato eodem motu planetæ in epicyclo, motum centri epicycli, aliquando uelotiores posueris quã antea. Nam utrouis modo proportio minuatur, dummodo maior relinquatur, quã ea quæ est rectæ b d, ad d a: planeta similiter retrogradus erit in d, & stationarius rursus ante c. Ex his igitur planè apparet Georgium Purbachium in theoremate causas minime assignare maioris uicinitatis punctorum stationum, sed ita intelligi debere. In Saturno, Ioue & Marte, atque in Venere, ipsarum stationum supputatione compertum est, quanto centrum epicycli opposito augis æquantis uicinius est, id est, quanto centrum epicycli uicinius est centro mundi, tãto earundem stationum puncta uiciniora esse opposito augis ueræ epicycli. Non quod in uniuersum maior uicinitas centri epicycli minus inuicem distare faciat stationum puncta. Ostensum enim à nobis est, ex maiori centri epic. à centro mundi uicinitate aliquando prouenire maiorem distantiam punctorum stationum, aliquando minorem, & aliquando

& aliquando parem. Cæterum in quouis trium planetarum superiorum & in Venere, ea magnitudine comparatus est epicycl: & orbis eum deferentis semidiameter ea etiam eccentricitas: atq; tanta est diminutio proportionis uelocitatis planetæ in epic. ad motum centri epicycli in sitibus propinquiorebus centro mundi: ut sicut centrum epicycli ipsi centro mundi appropinquat, sic puncta stationum uiciniora fiunt opposito augis ueræ epicycli. Atq; hæc ratio exacta est, & demonstrationibus comprobata ad situm augis æquantis, & mediæ longitudinis & oppositi augis. Ad alios autem situs facilioris supputationis gratia supponit Ptolemæus arcus stationum & remotiones à centro mundi proportionales esse, quem Purbach. sequi uidetur, cum inquit: quanto centrum epicycli, uicinius fuerit opposito augis æquantis, tanto stationum puncta uiciniora erunt opposito augis ueræ epicycli. Mercurium uerò excepisse constat: quoniam non quanto magis centrum epicycli opposito augis æquantis appropinquat, tanto minus distat à centro mundi, quem admodum superius ostensum est in ipsius Mercurij theorica. Præterea quia contrariam legem in eo habent stationum puncta. Quanto enim centrum epicycli Mercurij centro mundi uicinius est, tanto ea magis distant ab opposito augis ueræ epicycli. Nam ea magnitudine comparatus est huius planetæ epicyclus, & ea est eccentricitas, & eccentrici semidiameter ut ex maiori distantia centri epicycli, à centro mundi maior uicinitas punctorum stationum proueniat, quemadmodum supputationes demonstrant. Neque hoc mirum uideri debet: quum superius ostensum sit, ut aliquando maior uicinitas centri mundi maiorem remotio- nem punctorum stationum ab opposito augis ueræ epicycli efficere possit.

Aduersus illud assumptum Ptolemæi, quòd in tribus planetis superioribus & in Venere sicut centrum epicycli centro mundi magis appropinquat, sic stationum puncta minus distent ab opposito augis ueræ epicycli: & proinde differentias stationum & remotio- num à centro mundi proportionales esse, contendit Geber fieri posse ut in eisdem planetis ad inæquales à centro mundi remotiones æquales sint stationum arcus: & idcirco æquales habeantur distantie punctorum stationum ab opposito augis ueræ epicycli. Quem quidem Ioannes de Montere- gio sequitur hac uidelicet ratione ab ipso Gebro mutuata. Sit epicycli circulus a b g, cuius centrum sit d: mundi uerò centrum sit e. Sitq; collocatus in mediâ longitudine eccentrici, & ad eum situm stationis punctum sit g: rectæ uerò lineæ connectantur e d & e g, quæ quidem usque ad supremam epicycli circumferentiam in rectum producantur, e d ad a, augem ueram epicycli, & e g ad b, ipsi q; æ æquidistans agatur b z, quam secet recta h i,

Mm per



per punctum g transiens (qualitercunque ceciderit) in puncto l . Sic tamen ut sit dt maior, breuissima distantia centri epicycli, à centro mundi. Duo igitur triangula blg & egt , equiangula erunt: & idcirco sicut bg ad ge , sic gl ad gt .


Maior est autem gh quàm gl : maiorem igitur rationem habebit gh ad gt , quàm bg ad ge : & proinde dimidium ipsius gh ad gt , maiorem rationem habebit quàm dimidium bg ad ge . Intelligamus itaque eundem epicycl. recedere ab hoc situ longitudinis medię uersus oppositum augis eccentrici: motus igitur centri epicycli, uelocior erit in omni situ propinquiore opposito augis. Et idcirco uelocitas centri epicycli maiorem habebit rationem ad uelocitatem planetę in epicyclo in situ propinquiore, quàm in remotiore. Quando igitur centrum epicycli à centro mundi distiterit intervallo æquali rectę dt maiorem rationem habebit in eiusmodi situ, quicunque ille sit, uelocitas centri epicycli ad uelocitatem planetę in epicyclo, quàm quando erat in media longitudine deferentis. At uerò maiorem quoque rationem ostensum est habere dimidium hg ad gt , quàm dimidium bg ad ge : unà igitur augentur motuum & linearum pro-

portiones. Quamobrem possibile est, ut tantum addat proportio dimidij hg ad gt , super proportionem dimidij bg ad ge , quantum in distantiam dt , proportio uelocitatis centri epicycli, ad uelocitatem planetę in epicyclo addit super proportionem, quàm in distantia ed , uelocitas centri epicycli habet ad uelocitatem planetę in epicycl. Et proinde in distantia dt , sicut dimidiū rectę hg ad gt , sic erit uelocitas centri epicycli, ad uelocitatem planetę in epicycl. Tunc igitur stationis punctum erit ipsum g sicut antea, quando epicycl. erat in media longitudine deferentis. Supponitur autem in hac demonstratione non solum eg : sed etiam tg , in omni situ inter mediam longitudinem & oppositum augis deferentis in rectum productam superiori parti occurrere epicycl. aliter enim proportio dimidij hg ad gt maior non erit in situ propinquiore, quàm in remotiore: imò uerò minor.

Esto enim in subiecta figura circuli quadrans ab , & linea tg , in rectum producta occurrat circumferentię epicycli in h puncto ante b ,

& exa

& excitetur ex ipso h, puncto recta linea hi recte a e equidistans, cuius sectio cum e b, sit punctū o: erit igitur sicut o g ad g e, sic h g ad g t: propter æqualitatem angulorum & similitudinem triangulorum g o h & g e t:



quapropter b g ad g e, maiorem rationem habebit, quàm h g ad g t: & dimidium igitur b g, ad ipsam g e, maiorem quoque rationem habebit, quàm dimidium h g ad g t. Et idcirco in situ propinquiore non augebitur proportio dimidij interioris lineæ ad exteriorē: quin imò diminuetur. Idem ostēdes si utraq; e g & t g, circumferentiæ epicycli occurrat in inferiore quadrante. Et denique si t g, occurrat in superiori quadrante, quemadmodum in descripta figura sed e g, superiori ante i: similiter enim demonstrabitur maiorem rationem habere dimidium b g ad g e, quàm dimidium h g ad g t.


Sed etiam si concedamus quemadmodum assumunt puncta b & h, esse in medietate epicycli superiore: nondum tamen ostendunt illo syllogismo quòd possibile sit in ipsis planetis in situ propinquiore, & remotiore, stationem fieri in g. Quanquam enim dimidium rectæ h g ad g t, maiorem habeat rationem, quàm dimidium b g ad g e: & quanto epicyclus pro-

pinquior sit opposito augis eccentrici, tanto dimidium lineæ interioris ad exteriorem maiorem rationem habet. Præterea quanquam ratio motus cētri epicycli, ad motum planetæ in epicyclo semper augeatur: non probant tamen quòd in uno atque eodem situ epicycli tantum addere possit in his planetis motuum proportio, quātum linearum, nisi id possibile dicant, quod dubium est, atq; incertum. Et incerta nihilominus est ratio Ptolemæi quòd in tribus planetis superioribus, & in Venere, quanto epicyclus uicinior est centro mundi, tanto arcus stationum maiores sint. Purbach. tamen Ptolemæum sequutus est. Quapropter cum receptum iam sit in tribus planetis superioribus & Venere quāto epicyclus uicinior est centro mundi, tanto puncta stationum uiciniora esse perigeo epicycli, in Mercurio contrā, quanto epicyclus uicinior est centro mundi, tanto stationum puncta distantiora esse à perigeo epicycli. Pustat Erasmus Reinoldus huius diuersitatis causam esse, quòd in tribus planetis superioribus, & Venere, proportio quam semidiameter epicycli habet ad extrinsecam lineam, quæ inter ipsum epicycli, & centrum

Mm 2 mundi

mundi est, eam proportionem quam motus centri epicycli seruat ad uelocitatē planetæ in epicyclo, minus excedit in situ propinquiore, quam in remotiore: in Mercurio tamen contrarium accidere.

Nam in situ distantiore à terris proportio semidiameri epicycli, ad extrinsecam lineam inter ipsum epicyclum & centrum mundi, eam quam habet motus centri epicycli ad uelocitatem planetæ in epicycli minori differentia superat, quam quando idem epicycli est in situ propinquiore. Quanto enim (ait) maior fuerit ea proportio, quæ relinquitur de tracta proportione motuum à proportione linearum, tanto longius distare necesse est puncta stationum à perigeo epicycli: & quanto relicta proportio minor fuerit, tanto stationum puncta uiciniora erunt. Cæterum huiusmodi causam non rectè assignatam esse, in hunc modum ostendemus. Circulus $c g d$, circa centrum a descriptus, in quadrantes diuidatur duabus diametris $c e$ & $g d$, & in linea $g d$, in rectum producta duosumantur puncta, b propinquius centro, & k remotius, recta quoque connectatur linea $k e$, descripti circuli circumferentiam secans in f . Intelligamus igitur eundem circulum cuiusdam epicycli esse, cuius longissima



distentia à centro mundi sit $a k$: breuissima uerò æqualis supponatur rectæ $a b$. Proportionem porrò motus centri epicycli, ad motum planetæ in epicyclo æqualem ponemus ei quam seruat dimidium rectæ $e f$ ad rectam $f k$, eandem quoque in omni situ.

Quapropter cum epicyclus fuerit in auge eccentrici, stationis punctum erit f . At quando fuerit in opposito augis stationis punctum erit inter d & f : hoc enim superius à nobis ostensum fuit. Esto igitur h , stationis punctum in situ oppositi augis, recta quoque connectatur linea $b h$, quæ quidem in rectum producta circumferentiæ epicycli occurret in puncto i , quadrantis inferioris: neque enim punctum e , attingere potest, neque cadere inter ipsum e & g , ne dimidium interioris lineæ ad $h b$, maiorem habeat rationem quam dimidium $e f$ ad $f k$, quæ quidem est ratio motus centri epicycli, ad motum planetæ in epicyclo.

Igitur sicut se habet dimidium $e f$ ad $f k$, sic dimidium $i h$ ad $h b$: utraque

traque

traque enim est proportio motus centri epicycli ad motum planetæ in epicyclo. Ipsa uerò proportio minor est quàm quæ est $d a$ ad $d k$, & ad $d b$. Cæterùm maiorem proportionem habet ipsa $d a$ ad $d b$, minorem lineam, quàm ad $d k$ maiorem. Et propterea si proportio motus centri epicycli, ad motum planetæ in epicyclo, ex utraque proportionem $d a$ ad $d b$, & $d a$ ad $d k$, fuerit ablata: maior relinquetur proportio quando fuerit detracta ex ea quæ est $d a$ ad $d b$, quàm quando ex ea quæ est $d a$ ad $d k$. Sic igitur stationis punctum ad oppositum augis eccentrici distantius erit à puncto d quàm f : non igitur in h , quod quidem est impossibile.

Rursus si, quemadmodum in ipsis planetis superioribus, atque Venere fit, centrum epicycli aliquanto uelocius moueri in ipso opposito augis eccentrici posueris, quàm in auge, adhuc ostendemus, ubi maior relinquitur proportio, stationum puncta uiciniora esse perigeo epicycli. Intelligamus enim ab ipso b , puncto ad punctum r , inter d & h , rectam lineam uenire $b r$, quæ in rectum producta iterum epicyclum secet in puncto o inter e & i : sic tamen ut detracta proportione quam dimidium rectæ $o r$ habet ad $b r$, ex proportionem $d a$ ad $d b$, maior adhuc relinquitur proportio, quàm quæ relinquitur quando detrahitur proportio dimidij rectæ $h i$ ad $h b$, seu dimidij $f e$ ad $f k$, ex ea quæ est rectæ $d a$ ad $d k$. Tunc uerò ponemus centrum epicycli tanta moueri uelocitate in opposito augis eccentrici, ut motus ipsius eam seruet proportionem ad motum planetæ in epicyclo, quam dimidium $o r$ ad $r b$. Sic igitur stationis punctum erit r , quum in auge esset f . Propinquius itaque perigeo epicycli in opposito augis eccentrici, quàm in auge, etiam si celerius moueatur centrum epicycli in opposito augis, & maior relinquitur proportio in ipso opposito augis. Quanquam uerò nullius planetæ epicyclus talis existat, qualem finximus: nostra tamen ratio nihilominus euidentis est ad ostendendum minorem relinqui proportionem in opposito augis, quàm in auge, causam non esse iustam, ex qua proueniat maior appropinquatio punctorum stationum.

Quod autem sumpsimus, si à duabus inæqualibus rationibus æquales auferantur, maiorem relinqui à maiori quàm à minori, demonstrabitur hoc modo: habeat enim a ad b , maiorem rationem quàm c ad d , & ab ipsa ratione quæ est a ad b , auferatur ea ratio quam e habet ad f : sicut autem e ad f , sic se habeat g ad b , ipsa quoque ratio quæ est g ad h , ex ea auferatur quam c habet ad d . Dico, quòd maior relinquetur ratio ex ea quæ est a ad b , quàm ex ea quæ est c ad d . Sicut enim e ad f , siue g ad h , sic se habeat i ad b , & k ad d .

Ratio igitur a ad b ex ijs constabit, quæ a ad i , & i ad b . Similiter

Mm 3

ratio



ratio c ad d, ex ijs constabit quæ c ad k, & k ad d: hoc enim ostensum est ab Eutocio Ascalonita super 2. libro de Sphæra & cylindro Archi. & propterea si ratio i ad b, ex ea auferatur quæ est a ad b, relinquetur ea quæ est a ad i: & detracta similiter ratione k ad d, ex ea quæ c ad d, relinquetur ea quæ est c ad k. Cæterum maiorem rationem habebit a ad i, quam c ad k.

Nam quoniam a primum ad b secundum, maiorem rationem habet quam c tertium, ad d quartum per hypothèsim, b uerò secundum ad i quintum eandem rationem habet, & d quartum ad k sextum, per conuersam rationem: maiorem igitur rationem habebit a primum ad i quintum, quam c tertium ad k sextum. Quod quidem eadem arte demonstrari poterit, qua usus est Campanus ad ostendendum 31. quinti libri Euclidis: & proinde si à rationibus inæqualibus æquales auferantur rationes, maior relinquetur à maiori quam à minori, quod fuit à nobis assumptum.

Tardi dicuntur planetæ & minuti cursu &c.
Annotatio quarta.

PRioris partis exemplum Sol est, cum ab auge in longitudinem mediam mouetur. In eo enim loco medius motus uerum motum quam maximè superat. Sed ab ipsa media longitudine usque ad oppositum augis Sol dicetur uelox. Nam si ab auge ad longitudinem mediam linea ueri motus in aliquo tempore non moueretur tardius quam linea medijs motus: igitur uel uelocius, uel equali uelocitate moueretur. Quapropter in fine ipsius concepti temporis uel æquatio æqualis inuenta esset priori, quæ quidem inuenta fuerat in initio eiusdem temporis: aut ea minor, quorum utrumque est impossibile. Ostensum est enim in puncto longitudinis mediæ maximam haberi æquationem, & ab auge usque ad eum locum perpetuo crescere. Similiter ostendetur quòd à longitudine media usque ad oppositum augis linea ueri motus uelocius quam linea medijs motus moueatur. Atque ex hoc concludes quòd in motu uero Solis fit transitus à minori in maius, sed non per æquale: habes præterea quòd à longitudine media ad oppositum augis dicetur Sol uelox quidè cursu, sed diminutus numero. Et aduerte quòd quanquam res ita se habeat, nihilominus uera sunt quæ de motu Solis æquali & apparente superius annotauimus circa Theoricam Solis.

Triplex

Triplex est ratio, cur Luna post coniunctionem
quinque tardius, quinque citius appareat.

Annotatio quinta.

De prima causa.


Ponamus Solis & Lunæ coniunctionem in signis tardè descen-
dentibus factam fuisse, ipsamq; Lunam latitudine carere. Dico,
quòd citius apparebit Luna à Sole digressa, quàm si in signis ue-
lociter descendentes ipsa coniunctio accideret. Nam cum Sol occi-
dendo in horizonte fuerit, signa q; occupauerit rectè descendente, Lu-
na ipsa à Sole digressa supra horizontem relinquetur. Quapropter zodi-
aci arcus inter eam & Solem cum maiori æquinoctialis arcu descen-
det. Huic autem æquinoctialis arcui similis proportionalis uè est ar-
cus paralleli Lunæ, qui inter eam & horizontem intercipitur per 17. pro-
positionem 2. libri Theodosij, uel per ea quæ demonstrauimus super de-
cimaseptima 2. libri de Crepusculis: simul igitur descendet, & in eo-
dem tempore. Sed si coniunctio acciderit in signis obliquè descendentibus,
zodiaci arcus inter Solem & Lunam priori æqualis cum minori æ-
quinoctialis arcu, similiter & cum minori arcu paralleli loci Lunæ des-
cendet. Ex quibus concludes, quòd si in signis rectè descendentes cõ-
iunctio fiat, longius intra noctem Luna ipsa ad Occasum ueniet, q; si
facta fuerit in signis obliquè descendentes. Et quoniam astra quæ lon-
gius intra noctem ad Occasum ueniunt, melius uidentur: minus enim à
Solis splendore obtenebrantur: quæ autem post Solis occasum statim
descendunt minimè spectantur. Luna igitur citius uideri poterit si con-
iunctio facta fuerit in signis rectè descendentes: tardius uerò in ijs sig-
nis, quæ obliquum habet descensum.

Ita puto autorem concludere uelle Lunam à Sole digressam in clima-
tibus Borealibus citius apparere, si signa occupauerit quæ sunt à princi-
pio Capricorni usq; ad finem Geminorum.

At (quod sumit) arcus eclipticæ ipsius semicirculi ascendentes in cli-
matibus Borealibus rectè descendere certissimum ostendemus in hunc
modum. Esto enim abc , semicirculus eclipticæ descendens, a initium
Cancris, b Libræ, c Capricorni, æquinoctialis uerò db , & arcus fb ad
 b , punctum terminatus ascendat cum arcu gb , in horizonte obliquo k
 gi loci Borealis, in quo eleuatio æquinoctialis graduum sit 78. cum mi-
nut. 15. minor, id est in quo eleuatio poli graduum est 11. minut. 45. aut
maior. Dico, quòd gb , maior est ipso bf .

Nam

Nam quoniam tres anguli interiores sphaerici trianguli bfg , duobus rectis maiores sunt per 49. propositionem tertij libri Ioannis de Mon-



regio de triangulis:

idcirco supposito angulo fbg , maxi-

mè obliquitatis zo-

daci graduum 23.

m. fere 30. duo igitur anguli gfb & fgb , iunctim gra-

dibus 156. m. 30. maiores erunt: an-

gulus uerò fgb , graduum supponitur 78. m. 15. aut minor: reliquus igitur angulus gfb , maior erit quàm graduum 78. m. 15. Maiori autè angulo maius sub-

tenditur latus per septimam primi Menelai: maior igitur erit arcus bg , ipso bf : & proinde idem bf , arcus quadrantis ab ad b , punctum termi-

natus rectè ascendit, in omni horizonte obliquo Borealis loci, in quo eleuatio poli Borealis graduum est ii , cum m. 45. aut maior, dummodo

tanta non sit Borealis poli altitudo, ut propositus arcus bf , nec ortum nec occasum habeat in ipso horizonte: imo uerò semper appareat. O-

portet enim altitudinem Borealis poli supra horizontem complemen-

to declinationis puncti f minorem esse, ut idem f in eodem horizonte in una mundi reuolutione ortum habeat, atque occasum. Et quoniam in-

ter arcus quadrantis ab , qui proximior fuerit puncto a , siue continui sint ipsi arcus, siue non continui, cum maiori æquinoctialis arcu ascen-

dit, quàm qui ab eodem puncto remotior: quod quidem per 6. & 10. tertij libri Theodosij concludes. Omnis igitur arcus quadrantis ab , in pre-

dictis horizontibus Borealiu locorum rectè ascendit, id est cum ma-

iori æquinoctialis arcu. Atqui in duobus quadrantibus eclipticæ ab & bc , æquales arcus qui ad punctum b , Autumnalem sectionē terminantur, æquales habent arcus ascensionum in uno atque eodem horizonte,

per 14. tertij libri Theodosij.


Quapropter coadiuuante communi sententia, si ab æqualibus gq ua-

lia auferantur, statim concludes, quosuis arcus eclipticæ duorum qua-

dratum ab & bc , æquales æquali quæ interuallo distantes ab ipso b , puncto Autumnalis sectionis æquales inter se habere ascensiones. Et proinde omnis eclipticæ arcus in semicirculo descendente rectè ascendit id est cum maiori æquinoctialis arcu. At uerò in quo tempore oritur unus arcus semicirculi descendentis, in eodem oppositus occidit ascendentis se-

micirc-

micirculi: omnis igitur arcus semicirculi ascendens in climatibus Borealibus cum maiori æquinoctialis arcu descendit, quemadmodum autor supposuit, quod demonstrandum erat. Quod autem Capuanus antiquus expositor hunc textum de apparitione Lunę exponens ait: Pisces & Arietem maximas habere descensiones in sphaera obliqua, allucinatio est. Vtrum uerò omnis eclipticę arcus semicirculi descendens oblique occidat, id est, cum minori æquinoctialis arcu, deinceps examinabimus. Esto enim abc semicirculus, eclipticę ascendens db , æquinoctialis a initium Capricorni, b Arietis, c Cancri, & in obliquo horizonte kgi , loci cuiusvis Borealis ascendat arcus bf , quadrantis bc , cum arcu æquinoctialis bg . Dico quod bg , minor est



ipso bf . Nam quoniam angulus bg elevationis æquinoctialis est: acutus igitur erit, reliquus autem angulus bgf , obtusus.


Atqui duo latera bg & bf , trianguli fbg , uno semicirculo minora sunt: angulus igitur

bg , exterior ipsius trianguli fbg , interiore bf , maior erit: & idcirco ipse angulus bgf acutus erit, quapropter subtensum latus bg , latere bf , quod quidem obtuso angulo subtenditur bgf , minus erit. Et quoniam æquales arcus ad punctum b , terminati ipsorum quadrantum eclipticę ab & bc , cum æqualibus arcibus æquinoctialis ascendunt uelut antea demonstrauimus de his qui ad sectionem Autumnalem terminantur. Et in quo tempore arcus eclipticę semicirculi ascendens super horizontem ascendunt, in eodem oppositi arcus alterius semicirculi descendunt: omnes igitur arcus semicirculi eclipticę descendens, qui ad Autumnalem sectionem terminantur, oblique descendunt id est cum minoribus æquinoctialis circuli arcibus, quod erat in primis ostendendum. Sumpsimus porro duos arcus bg & bf , uno semicirculo minores esse, quod statim demonstrabimus. Nam quoniam angulus dgi , elevationis æquinoctialis acutus est: reliquus igitur angulus bgf , obtusus erit. Excitetur itaque ex g , puncto arcus circuli maximi gl , inter æquinoctialem & eclipticam, qui ad ipsum punctum g , rectos angulos efficiat cum æquinoctiali: quod quidem illico efficies si per idem g , & alterum æquinoctialis polum maximum circulum duxeris, secundum Theodosij præceptum in primo libro. Quoniam ita

Nn

que an

que angulus b , maximæ obliquitatis zodiaci acutus est: latus igitur l g , rectanguli trianguli b l g , minus erit quadrante. At latus b l rectum



subtendens angulū minus est quadrante: igitur & reliquum latus b g , rectum sustinēs angulum quadrante quoque minus erit. At uero ipse arcus b f , quadrante maior non est: igitur ipsa duo latera b f & b g , trianguli b f g , uno semicirculo minora sunt: quod quidem fuerat assumptum.

Sed esto c e , arcus Coluri inter c initium Cancrī & æquinoctialem: quadrans idcirco erit b e , propterea quod idem Colurus in eclipticā & æquinoctialem incidens, & à polis ipsorum ueniens rectos angulos efficit ad c & e . Veniat



igitur per f , eclipticę punctum arcus maximi circuli à polis æquinoctialis, qui ipsum æquinoctialem secet in l . In triangulo itaque rectangulo b l f , quoniam latus b l , minus est quadrante: angulus idcirco b

fl acutus erit. Rectus est autem angulus fl b : latus igitur b f , maiori angulo subtēsum ipso b l , maius erit. Quapropter arcus f c , qui relinquitur ex quadrante b c , arcu l e , qui relinquitur ex quadrante b e , minus erit. Esto autem arcus e y , ipsorum f c & l e differentia, & per ipsa c & y puncta arcus maximi circuli scribatur c y . Qui quidem obliquum horizontem referet in eo loco Boreali, in quo angulus eleuationis æquinoctialis acuto angulo c y e , equalis est. Punctum itaque eclipticę c , cum puncto æquinoctialis y , oriatur in eodem horizonte. Veniat autem punctum eclipticę f , ad eundem horizontem, quem in eo situ circulus referat f o , cum puncto æquinoctialis o . Arcus igitur eclipticę f c , cum arcu æquinoctialis o y ascendet. Atqui maior est o y ipso f c , nam l y æqualis est eidem f c : igitur o y , maior quam f c . & proinde rectę ascendit arcus f c , in ipso eodem horizonte, in quo eleuatio æquinoctialis angulo c y e equalis est. Esto autem a g , arcus equalis arcui f c , qui in ipso eodem

pfo eodem horizonte obliquo cum arcu æquinoctialis ascendat m n. Et quoniam ipsi fc & ag, æquales arcus æqualibus distant interval-
lis à puncto b, sectionis Vernæ, æquales idcirco habebunt ascensio-
nes o y & m n: quemadmodum superius demonstrauius de arcu-
bus semicirculi descendenti. Quare si fc posuerimus signum Gemin-
orum, erit ag Capricorni signum, rectæque ascendent in ipso hori-
zonte obliquo cy.

At uero in quo tempore signum Geminorum ascendit, in eodem
Sagittarius descendit: & in quo ascendit Capricornus, in eodem de-
scendit Cancer. Duo igitur signa Cancris & Sagittarij cum maioribus
arcubus descendunt in ipso eodem horizonte obliquo. Idem osten-
des de quouis alio arcu terminato ad initium Cancris aut Capricorni.
Et idem similiter ostendes de ijs omnibus, qui partes fuerint illorum
arcuum eclipticæ, qui quàm maximè à suis ascensionibus rectis supe-
rantur, etiam si ad initia Cancris, aut Capricorni minimè terminentur,
quemadmodum in libro de Ascensionibus signorum prolixius cons-
scripsimus. Signum itaque Geminorum in elevatione poli Borealis
graduum 12. cum arcu æquinoctialis ascendit graduum 31. m. fere 23. si-
gnum uero Libræ cum Gr. 30. m. 23. Sagittarius igitur descendet in eo-
dem horizonte cum Gr. 31. m. 23. Signum tamen Arietis cum Gr. 30.
m. 25. & ad latitudinē usque graduum 15. cum maiori æquinoctialis ar-
cu signum Geminorum ascendit, quam Libræ. & proinde rectius des-
cendat Sagittarius quam Arietis. Sed hæc latitudines minores sunt lati-
tudine mediæ primi climatis: sententia autem Autoris de locis Borea-
libus certissima est. Qui quoniam censet tardiores descensum cau-
sam esse citioris apparitionis: minimè igitur negare debet in locis ui-
cinis æquinoctiali circulo tardius apparere Lunam in Ariete, aut Pis-
cibus. q̄ in Cæcro, aut Sagittario: de qua quidem re infra disputabimus.


De secunda causa, Annotatio sexta.

LVna etiam citius apparebit post cōiunctionem (inquit autor)
si latitudinem habuerit Borealem: tardius enim descendet, tar-
dior autem descensus Luna post Solis occasum (iuxta Autoris
sententiam) causa est citioris apparitionis. Id autem certissi-
mum comperies in ijs Borealibus locis, quæ à tropico Cancris usque
ad circulum arcticum posita sunt. Nam in ijs quæ inter eundem tropi-
cum & circulum æquinoctialem sita sunt, contrarium accidere potest:
nempe ut Luna latitudinem Borealem habeat, & citius descendat: in-
terdum uero simul descendet cum gradu eclipticæ in quo existit, & in

terdum tardius. Prioris partis demonstratio hæc est. Esto $e b g$ ecliptica, & $e c h$ æquinoctialis, quorum sectio Verna sit e , sitq; $a b c d$, Occidentalis pars horizontis Borealis loci cuius latitudo maxima zodiaci obliquitate minor non sit: punctum uerò eclipticæ b , cum æquinoctialis puncto c simul descendat: Lunæ uerò locus sit b , uidelicet sine latitudine post ipsius cum Sole coniunctionem.

Igitur quoniam loci latitudinem posuimus maxima zodiaci obliquitate minorem non esse: complementum idcirco altitudinis poli complemento maximæ obliquitatis zodiaci maius non erit.

Angulus porro $e c b$, complementi altitudinis poli est in ipso eodem horizonte $a b c d$, & angulus $b e c$, maximam subtendit zodiaci obliquitatem: duo igitur anguli $b e c$ & $e c b$, uno recto angulo maiores non sunt, & quoniam tres interiores anguli spherici trianguli $e b c$, duobus rectis maiores sunt: angulus igitur $c b e$, recto angulo maior erit, atq; contrapositus $a b g$, cum sit ei æqualis angulo etiam recto maior erit. Veniat itaq; à polo eclipticæ Boreali ad b , quadrans maximi circuli qui sit $k b$: cadet igitur ipse $k b$, inter $a b$ & $b g$, propterea quod angulus $a b g$ obtusus ostensus est, & angulus $k b g$, rectus est per 19. primi Theodosij.



Luna igitur in b , descendit cum puncto c , sed si inter b & k posita fuerit, ut in f , latitudinis nempe Borealis, tardius ad horizonem Occidentalem ueniet, quàm b aut c : multò autem tardius quàm si Australem latitudinem haberet.

Id enim statim concludes, si quadrantem $b k$, ad zodiaci polum Australem prolongaueris, ipsamq; Lunam in puncto i collocaueris: tardius enim descendit b quàm ipsum i , quare & multò tardius f , quàm idem i .

At quoniam in descripta figura locum Lunæ posuimus b , extra eclipticæ & æquinoctialis sectiones, ponamus modò æquinoctialis $a b c$, & eclipticæ $d b e$, Autumnalem sectionem, id est, initiū Libræ esse b , horizontis uerò Occidentalis pars esto $f b g$, & multò facilius ostēdemus Lunam positam in b , sine latitudine citius descendere, tardius uerò, si in eodem gradu existeret cum Boreali latitudine.


Quoniam enim angulus $a b f$, complementi est altitudinis poli: acutus igitur erit, & idcirco reliquus $f b c$ obtusus. Quare obtusior adhuc erit

huic erit angulus $fb e$, qui ex concursu fit horizontis cum ecliptica.

Veniat itaque à polo zodiaci Boreali maximi circuli quadrans $k b$, qui rectos angulos efficiet cum ipsa ecliptica ad b .


Cadetque ipse quadrans $k b$, inter fb & $b e$.

Et propterea si Luna posita fuerit inter k & b , cum latitudine uide-



licet Boreali, tardius descendet quam in b , etiam si loci latitudo maxima zodiaci obliquitate minor sit, quemadmodum ex hac cōcluditur demōstratione. Angulus enim $ab f$, in omni obliquo hori-
zōte acutus existit, qui uerò ex duob. rectis res-
linquitur, obtusus est: & propterea angulus $fb e$, obtusior adhuc erit: et id-
circo quadrans bk , cadet inter fb & $b e$. Rursus ponamus $ab c$ æquino-

etialem, eclipticam uerò $l b i$, pūctum sectionis Vernæ b , partem Occi-
dentalem horizontis $r b z$. Sitq; poli altitudo maxima zodiaci obliqui-




tate maior, & erit idcirco angulus abr , minor angulo cōplementi maxime obliquitatis zodiaci. Quapropter duo anguli abr & $ab l$, iuncti uno angulo recto minores sunt. & propterea reliquus angulus $r b i$, obtusus erit. Ducto itaque quadrante bk ad ipsum

b , rectos angulos faciente cum $b i$: cadet igitur ipse quadrans inter br & $b i$, & idcirco si inter b & k Luna posita fuerit, tardius descendet q̄ b . Cæterum si loci latitudinem maxime Solis obliquitati æqualem posuerimus, angulum $l b r$, rectum esse consequens erit: et idcirco ipse circulus horizontis per polos eclipticæ transibit.

Quapropter si Lunam posueris in initio Arietis, siue latitudinem

Nn 3 habeat

habeat Borealem, siue Australem, unà descendet cum b. Cum Luna uero extiterit in signis Australibus, ea demonstrandi arte uti oportebit, qua in prima figura usi sumus, triangulum constituentes ad sectionem Autumnalem. Porro ut posteriorem assumpti partem demōstre-



mus, circulum maximum a b c d, horizontem intelligamus eorum locorū que sunt inter equinoctialem & circulum Cancrī polum mundi Borealem e circulo uero descriptus propter motum primæ spheræ ab eclipticæ Boreali polo sit d f b g, sintq̃ d & b, ipsius arctici circuli & horizontis interfectionum pūcta: Orientalis horizontis se-

micirculus sit a b c, Occidentalis uero a d c. Zodiaci autem polo in interfectione b constituto, ecliptica in Occidentali horizonte positionem habeat h i k, in d uero positionē l m n. at in f puncto sub horizonte, positionē o p q in g, deniq̃ puncto quis supra horizontē positionē habeat r s t. Dico quod Luna in i aut n, non citius aut tardius occidet, q̃ si latitudinem haberet, uel Australem, uel Borealē. Nam quoniam circulus horizontis à polo eclipticæ ueniens eclipticam secat in i & m: ipse igitur horizontis circulus, latitudinis circulus erit: & p̃pterea Luna ipsa in i aut m non citius aut tardius occidet, q̃ si latitudinem haberet aut Australem, aut Borealem. Sed ponamus Lunam in p. dico q̃d tardius occidet q̃ si latitudinem haberet Borealem, citius uero q̃ si latitudinem haberet Australem. Quoniam enim polo zodiaci Boreali in f constituto, circulus eclipticus positionem habet o p q. Veniat igitur ab ipso f, circulus maximus ad p, qui ad z, prolongetur uersus Australem zodiaci polū: ipse igitur circulus f p z, latitudinis circulus erit. Quando autem punctum p, occidentalem horizontem attingit, quod uis aliud punctum inter f & p, sub horizonte iam conditum est: quæ uero sunt inter p & z nondum occidunt. Luna igitur in p, constituta
tardius

tardius occidet, quàm si latitudinem haberet Borealem: citius uerò \overline{q} si latitudinem fortiretur Australem. Et ponamus deniq; Lunam in s. Dico, quòd citius occidet, quàm si latitudinem Borealem haberet, tardius quàm si latitudinem haberet Australem. Nam quoniam polo zodiaci Boreali in g constituto, circulus eclipticę positionem habet r s t: ueniat igitur ab ipso g, circulus maximus ad s, qui prolongetur ad y, uersus alterum zodiaci polum. Ipse igitur circulus g s y, latitudinis circulus erit. Quoniam autem punctum eclipticę s, horizontis semicirculum attingit Occidentalem, quòd uis aliud punctum quadrantis g s, adhuc supra horizontem relinquitur: quę uero sunt inter s & y, sub ipso horizonte iam condita sunt. Luna igitur in s constituta, citius occidit, quàm si latitudinem haberet Borealem, tardius uerò si latitudinem Australem fortiretur: quod quidem demonstrandum suscepimus. Itaque hæ duę causę propter quas Luna citius apparet post ipsius cum Sole coniunctionem, & tertia quoque de motu uelociori, in unam causam concurrunt, ea est tardius ad Occasum uenire.

Atque ad eum modum Arabes Lunę apparitionem definiunt, per tempora uidelicet gradus uic æquinoctialis, quę post Solis occasum sub horizonte descendunt: nobis tamen aliter uidetur.

Potius enim Solis occultationem sub horizonte causam esse putamus, propter quam Luna interdum citius, interdum tardius apparet post ipsius cum Sole coniunctionem, quàm maiorem aut minorem descensum arcus eclipticę inter ipsa luminaria.


Nam nisi tardior descensus maiorem postulauerit Solis occultationem, quamuis longius intra noctem terminetur: causa non erit, ut Luna citius appareat. Contingit autem æqualium arcuum eclipticę pares descensus inæquales postulare Solis occultationes. Contingit etiam interdum, equales zodiaci arcus inæquales habere descensus: cæterum maiori descensui minorem occultationem respondere.

Tardior porro descensus maius temporis spatium intra noctem fluxum esse indicat, sed maior Solis occultatio maiorem ostendit circa horizontem obscuritatem: ex qua quidem prouenit, ut astra quę circa horizontem sunt, melius à nobis uideantur.

Contingit autem (fateor) Lunam interdiu conspici: cæterum eo tempore distantior est à Sole, & plenior lumine.

Esto igitur a b c semicirculus eclipticę ascendens, d b e æquinoctialis, b sectio Verna, locus Solis f, locus uero Lunę b, post ipsorum coniunctionem, semicirculus Occidentalis obliqui cuiusuis horizontis in quo loci latitudo maior est maxima Solis declinatione esto h f k, æquinoctialem fecans in g, & eclipticam in f. Arcus itaq; æquinoctialis b g,

ctialis b g, descensus erit arcus eclipticę fb, q̄ depresso, ipse obliquus horizon positionem habeat lb m. Veniat autem à puncto n, horizon-
tis polo ad horizontem lb m, circuli maximi quadrans, qui usq̄ ad f,



descendat Solis lo-
cum sub horizon-
te, ipsumq̄ horizon-
tis circulum lb m,
secet in o: non em̄
secabit in b, nec in-
fra b, quia polus
horizonis supra c,
consistit. Erit itaq̄
arcus of, Solis oc-
cultatio sub hori-

zonte arcui f b respo-ndens, sub eodem horizonte depresso, rectosq̄
efficiet angulos cum ipso circulo lo m, ad punctum o, per 19. primi
Theodosij. Et intelligamus deinceps aliam Solis & Lunę coniunctio-
nem, in qua locus Solis sit b, Lunę uero p: sintq̄ duo arcus fb & bp,
æquales inuicem, & cum Luna ad Occasum peruenerit, ipse idem ob-
liquus horizon positionem habeat qpr, æquinoctialem secans in
s: arcus autem occultationis Solis in eodem temporis momento sit b
t, rectos efficiens angulos cum horizon- te ad punctum t, quippe quod
à polo ipsius horizonis ueniat. Duo igitur eclipticę arcus fb & bp,
æquales sunt, & arcus descensionum eorundem uidelicet bg & bs, æ-
quales sunt, per 14. tertij libri Theodosij. ceterum arcus occultationis
Solis fo & bt, inæquales ostendemus, nempe bt, minorem ipso fo.
Duo enim anguli bpt & bps, duobus rectis sunt æquales, tres uerò
anguli interiores trianguli bsp, duobus rectis maiores sunt: detracto
igitur communi angulo bps, minor relinquetur angulus bpt, duob.
angulis bps & psb, simul sumptis per communem sententiam.

Quorum unus uidelicet pbs, maxime obliquitatis zodiaci est: al-
ter uero qui est psb, complementi altitudinis poli in proposito obli-
quo horizonte. Atqui angulus fbo, duobus angulis æqualis est si-
mul sumptis, angulo nempe fbg, maxime obliquitatis zodiaci, & an-
gulo gbo, complementi altitudinis poli in eodem horizonte: angu-
lus igitur bpt angulo fbo, minor est. Duo autem triangula fob &
bpt, angulos ad t & o, puncta rectos habent: igitur sicut sinus totus
se habet ad sinum rectum anguli bpt: sic sinus lateris bp, ad sinum
lateris bt. Similiter sicut sinus totus ad sinum rectum anguli obf, sic
sinus lateris fb, ad sinum lateris fo. maiorem autem rationem habet si-


nus to,


nus totus ad sinum anguli $b p t$, quàm ad sinum anguli $f b o$, quia minor ostensus est angulus $b p t$ angulo $f b o$, utroque acuto existente: maiorem igitur rationem habebit sinus lateris $b p$, ad sinum lateris $b t$, quàm sinus lateris $f b$, ad sinum lateris $f o$. At equalia sunt per hypotheseim duo latera $f b$ & $b p$: & proinde eorum sinus æquales erunt: minor igitur erit sinus lateris $b t$, ut pote ad quem maior habetur ratio, ipso sinu lateris $f o$, ad quem minor. Atqui ipsa latera $b t$ & $f o$, minora sunt quadrantibus: igitur arcus $b t$, minor erit ipso $f o$. Sunt itaque arcus eclipticæ æquales, & ascensiones æquales habent. ceterum occultationes Solis inæquales sunt, quod demonstrandum suscepimus. Ipsa porrò latera $b t$ & $f o$, minora esse quadrantibus demonstrabis: quoniam angulus $f b o$, minor est recto, similiter & angulus $b p t$.

Præterea ponamus arcum zodiaci $p z$, æqualem rursus ipsi $f b$ aut $b p$, & intelligamus aliam Solis & Lunæ coniunctionem in qua quidem Solis locus sit p sub horizonte, & Lunam digressam esse à Sole arcu $p z$, ad occasumque venire cum puncto æquinoctialis y , in ipso eodem horizonte, qui positionem habeat $z y$: erit igitur $s y$, descensio arcus $p z$, maior quidem descensione arcus $f b$ aut $b p$: propterea quòd ipse arcus $p z$, à sectione Verna distantior est. Deducatur autem ex puncto p , arcus maximi circuli $p x$, rectos faciens angulos cum horizonte in puncto x . Et eadem demonstrandi arte, qua paulò antè usi sumus angulum $p z x$, ostendemus minorem esse angulo $f b o$: & proinde arcum occultationis Solis $p x$, minorem esse arcu occultationis $f o$. Sunt itaque $f b$ & $p z$, arcus zodiaci æquales, inæquales habentes descensus: quibus etiam respondent Solis occultationes inæquales, uidelicet ubi maior est descensus, ibi minor est Solis occultatio, quòd erat à nobis demonstrandum.

Certissimum autem putamus citius Lunam apparere post ipsius cum Sole coniunctionem, si ipsorum distantia semicirculi eclipticæ ascendentis fuerit: tardius uerò si semicirculi descendentis, quemadmodum auctor scripsit: non tamen propterea quòd maiores sint descensus in uno semicirculo quàm in altero ut ille asseruit, sed quia Sol descendendo occultior erit sub horizonte cum distantia ipsius à Luna semicirculi ascendentis fuerit: minus autem occultus si descendentis semicirculi. Et quoniam maior hæc aut minor Solis occultatio ex angulis provenit qui ex concursu fiunt eclipticæ & horizontis obliqui: ubi enim istiusmodi angulus minor fuerit, ibi Solis occultatio minor erit, quemadmodum ex his quæ superius demonstrauiimus, perspicuum est: operepretium igitur erit demonstrare quòd omnis angulus Occidentalis Borealisque qui ex concursu fit semicirculi eclipticæ ascendentis cum semicirculo Occidentali obliqui horizontis maior est omni angulo, qui ex concursu fit ipsius semis-

circuli horizontis cum semicirculo eclipticæ descendenti. Quod quia
 dem facile ostendemus, si demonstratum fuerit in primis, quòd anguli
 huiusmodi qui ad puncta eclipticæ fiunt, quæ paribus interuallis ab al
 terutra sectione Æquatoris distant, æquales sunt inter se. Esto enim a b
 c, semicirculus eclipticæ ascendens, d b e æquinoctialis, b sectio Verna,
 & sint f & g, duo ipsius semicirculi eclipticæ puncta, quæ paribus inter
 uallis distent ab ipsa sectione b, ueniatq; per f, obliquus horizon h f i k,
 qui ad ipsum f punctum angulum efficiat a f h, Occidentalem Borea
 lemq;: cū autem punctū g, ad Oc
 casum uenerit, i
 dē obliquus hor
 izō positionem
 habeat l m g n,
 angulum efficia
 ens a g l, Occi
 dentalem Borea
 lemq;. Dico, qd
 duo anguli a g l
 & a f h, æquales inuicē sunt. In sphaerico enim triangulo b f i, sicut se ha
 bet sinus rectus anguli b i f, cōplementi altitudinis poli ad sinum rectum
 anguli i b f, maximæ obliquitatis zodiaci, sic sinus rectus lateris b f, ad
 sinum rectum lateris f i. In triangulo rursus sphaerico b g m, sicut sinus
 rectus anguli b m g, ad sinum anguli g b m, sic sinus b g, ad sinum g m.
 Atqui duo anguli b i f & b m g, quorum unus est complementi altitudi
 nis poli: alter uerò altitudinis Æquatoris æquales sunt: igitur sicut sinus
 b i ad sinum f i, sic sinus b g ad sinum g m: & quoniam duo arcus b f &
 b g, æquales sunt per hypothesim: igitur sinus recti duorum arcuum f i
 & g m, æquales erunt per quintum librum Euclid. Et quoniam ipsi ar
 cus f i & g m, minores sunt quadrantibus: sunt enim latitudines occa
 sum punctorum f & g, partes uidelicet quadrantum horizontis, qui
 sunt inter meridiani sectiones & ipsa m atque i pūcta: duo idcirco arcus
 f i & g m, æquales inuicem erunt. Concurrant autem in puncto o Borea
 li ipsi duo horizontes qui pro uno atque eodem sumuntur. Nam nihil
 interest utrum horizonte immobili existente sphaera moueatur, an sphae
 ra quiescente horizontem mobilem feceris. Et quoniam duo anguli d
 m o & d i o, complementi altitudinis poli Borealis æquales sunt: duo igitur
 latera m o & i o, sphaerici trianguli m o i coniuncta uni semicirculo
 lo æqualia erunt: lateri autem m o arcum addemus g m, sed à latere i o, ar
 cum subtrahemus f i: & erunt rursus uni semicirculo æquales duo arcus
 g o &






go & fo : quapropter in sphaerico triangulo g o f angulus a go, angulo a f o, equalis erit, id est angulus a g l, angulo a f h aequalis. Poteris autem neglecta ratione sinuum (si libet) duos arcus f i & g m, equales inuicem ostendere. Duo enim arcus b i & b m, equales sunt per

14. tertij Theod. igitur f i & g m, aequales erunt per 4. primi Menelai.

Idem similiter demonstrabis, & eadem prorsus arte de angulis qui fiunt in semicirculo descendenti. De ijs uero qui fiunt ad initium Capricorni, & finem Geminorum, quoniam nullum trianguli latus hemicyclium esse potest: aliam igitur construemus demonstrationem ad hunc modum. Obliquus horizon esto a b c d, polus mundi Boreus, qui manifestus est, esto e, occultus uero f, semicirculus Occidentalis horizonis esto




b d c: reliquus autem sit Orientalis, & Occidentea Capricorni initio, habeat zodiacus positionem g a h, Occidente autem d Capricorni initio, habeat ipse zodiacus positionem k d i. Dico, quod exterior angulus b a g, Occidentalis Borealisque quia ad punctum a, efficitur angulo a d k qui ad d, & Occidentalis etiam est, atque Borealis equalis est. Scribatur enim per a & e, maximus circulus, item per f & d, & meridianus a g a b e c f. In duobus itaque sphaericis triangulis a b e & d c f, quoni-

am meridianus per polos horizonis uenit, angulos rectos efficiet e b a & f c d: duo autem latera b e & c f, equalia sunt. est enim b e, eleuatio poli manifesti, c f uero depressio occulti poli, duo propterea latera a e & f d equalia, complementa enim sunt maximarum zodiaci obliquitatum. Reliqua id

circo latera cum reliquis angulis inter se æqualia erunt, per ultimam propositionē tertij libri. Ioannis de Montereio: angulus igitur $b a e$, angulo $c d f$ æqualis est. Quod etiam ex proportione laterum & angulorum concludere poteris, in hunc modum. Nam quoniā duo latera $a e$ & $b e$, duobus $d f$ & $f c$, alterum alteri æqualia sunt, & sinus laterum & angulorum eandem seruant proportionem: igitur sicut sinus totus ad sinū anguli $b a e$, ita ipse sinus totus ad sinū anguli $c d f$: acuti porrò sunt ipsi anguli $b a e$ & $c d f$, quia latera opposita minora sunt quadrantibus: æquales igitur erunt iidem anguli. Recti sunt autem duo anguli $g a e$ & $f d i$, quoniam arcus $a e$ & $f d$, producti per polos eclipticæ ueniunt: detractis igitur æqualibus angulis $b a e$ & $c d f$, reliqui anguli $g a e$ & $f d i$, æquales inuicem erunt per communem sententiam. Atqui angulus $c d i$, contraposto $a d k$ æqualis est: duo igitur anguli $b a g$ & $a d k$, Occidentales Borealesq; qui ad ipsa initia Cancrī & Capricornī, fiunt, ex concursu eclipticæ & horizontis æquales sunt, quod demonstrandū relinquebat.

Nunc uerò facile erit demonstrare, quòd omnis angulus Occidentalis Borealisq;, qui ex concursu fit semicirculi eclipticæ ascendētis cum semicirculo Occidentali obliqui horizontis maior sit omni angulo Occidentali Borealiq;, qui ex concursu fit ipsius semicirculi horizontis cum semicirculo eclipticæ descendenti. Esto enim circulus $a b c d$ ecliptica, semicirculus ipsius Borealis $a b c$: Australis uerò $c d a$, æquinoctialis $l a e$, sitq; a initium Arietis, c Libræ, b Cancrī, d Capricornī. Semicirculus itaque ascendens erit $d a b$, descendens autem $b c d$. Dico, quòd omnis angulus Occidentalis, Borealisq;, qui ex concursu horizontis obliqui fit cum ipso circulo eclipticæ, ad puncta semicirculi ascendētis $d a b$, maior est omni angulo similiter Occidentali Borealiq;, qui fit ad puncta semicirculi descendētis



semicirculi descendētis $b c d$. Horizon enim obliquus $f g h$, in Occidentali parte angulum efficiat $f g a$, Occidentalem Borealemq; cum ecliptica ad punctum g , semicirculi ascendētis,

primi nempe quadrantis: in puncto autem k , secundi quadrantis angulum efficiat $f k g$, similiter Occidentalem Borealemq; positionem habens $f k i$: duo autem puncta h & i ea sint, in quibus ipse horizon æquinoctialem intersecat. In triangulo itaq; $f h i$: quoniam duo anguli $a h f$, exterior uidelicet, & $h i f$ interior æquales sunt, quippe quòd anguli sint complementi altitudinis poli in eodem horizonte: duo igitur latera $f h$

& f

& $f i$, coniuncta uni semicirculo equalia erunt. Et propterea duo latera $f g$ & $f k$, trianguli $f g k$, uno semicirculo minora erunt: ex quibus concludes quod exterior angulus $f g a$, interiore $f k g$, maior erit. Et hac arte demonstrabis quod huiusmodi anguli ab a in b , & à b in c , perpetuò decrecant, angulosq; primi quadrantis angulis secundi quadrantis maiores esse: à puncto autem c in d , & à d in a , in semicirculo nempe Australi huiusmodi angulos perpetuò crescere. Sumatur præterea in quadrante $c d$ punctum quoduis r . Dico, quod angulus qui fit ad g , punctum quoduis quadrantis $a b$, maior est eo qui fit ad r . Distent enim k & r , paribus interuallis à puncto c Libræ initio. Igitur duo anguli Occidentales Borealesq; ad ipsa puncta k & r , equalia erunt, per ea quæ superius demonstrauimus. At uerò angulus qui ad g , maior est eo qui ad k : maior est igitur angulus qui ad g , eo qui ad r : & proinde angulus qui fit ad punctum quoduis primi quadrantis angulo qui fit ad quoduis punctum semicirculi descendens maior erit. Et sumatur præterea punctum quoduis in quadrante $d a$, quod sit m . Dico, quod angulus qui fit ad ipsum m , maior est omni angulo qui fit in semicirculo descendenti. Distent enim m & g , paribus interuallis ab ipso a , puncto Arietis initio: quapropter anguli ad m & g , equalia erunt. Atqui maior est angulus qui ad g , omni angulo qui fit in semicirculo descendenti. Omnis itaq; angulus factus in semicirculo ascendenti Occidentalis Borealisq; maior erit omni angulo Occidentali Borealiq; semicirculi descendens. Et quoniam quæadmodum anguli ab a in c , per b perpetuò decrecant: ita ij qui sunt in punctis à c , in ipsum a per d , perpetuò crescunt. Angulus itaq; qui fit ad initium Arietis omnium maximus erit: qui uerò ad initium Libræ omnium minimus. Continet autem qui ad initium Arietis maximam zodiaci obliquitatē cum complemento altitudinis poli, sed qui ad initium Libræ is erit qui relinquit detracto angulo obliquitatis zodiaci ex angulo cōplementi altitudinis poli. Et propterea Luna initium Arietis occupante atq; in horizontis parte Occidentali constituta, maxima erit Solis occultatio sub ipso horizonte post coitum: minima uerò in initio Libræ. Et quia horizontis & eclipticæ inclinationes ex utraq; partes equalia inuicē sunt, quod illico patefiet, si in ipsis intersectionibus polos intellexeris maximi cuiusdam circuli per fines quadrantum uenientis: anguli igitur Occidentales atq; Orientales utriusq; semicirculi eclipticæ ascendens, atq; descendens, qui cum horizonte obliquo fiunt, ea lege commutabuntur, ut Orientales unius Occidentalibus alterius equalia sint. Orientalis itaq; angulus in initio Arietis minimus, sed in initio Libræ maximus. Et propterea Luna in initio Arietis existente, & in Orientali horizontis parte ante ipsius cum Sole coniunctionem, minima erit Solis sub horizonte

occultatio: maxima uerò in initio Libræ. Igitur sicut noua Luna post coitum uesperis post Solis occasum, ea in Arietis existēte citius apparet, ita senescens ante coitū manē ante ortum Solis ob eandem causam citius id est multo ante ipsum coitum occultabitur: in Libra uerò cōtrarium. Quod si aut citas aut tardas nouæ Lunæ apparitiones, ueterisq; occultationes, non ad Solis occultationes (ut nostra fert opinio) sed potius ad celeres aut segnes ascensus, atq; descensus arcuum eclipticæ inter ipsa luminaria referre uelis, quemadmodum Geor. Purbac. & Arabes: nouam igitur Lunam post coitum in Capricorno & Geminis quam citissimè apparere inquis, in Virgine uerò & Libra tardissimè: ueterem autē ante coitum in Piscibus & Ariete citissimè occultari, sed in Cancro & Sagittario tardissimè. Motus porro Lunæ uelocior sicut post coitum distantiam à Sole prolongat, efficitq; ut noua citius appareat, ita ante coitum distantiam contrahit: & uetus idcirco Luna tardius occultetur. Borealis etiam Lunæ latitudo causa est in his climatibus Borealibus, ut noua citius appareat, tardiusq; id est non multo ante coitum uetus atq; senescens occultetur. Concurrent igitur tres autoris causæ, ut in eodem die in quo Luna uetus est, noua uesperis uideatur. quod si duæ tantum, secundo die apparebit: si uerò una sola, tertio die non autem ut in uno atq; eodem die, in quo manē ante ortum Solis uetus Luna uidetur, uesperis noua appareat. Nam coniunctionem fieri in semicirculo eclipticæ ascendenti æquè causa est ut noua Luna citius appareat, ac uetus citius occultetur longioriq; tempore ante coitum lateat. At minimè occultari oporteret ueterem Lunam, ne dicam tardius, ut manē in eodem die ante coitum uideatur, uesperisq; post ipsum coitum noua appareat. Quod si autor putauit illud contingere posse, quemadmodum ipsius uerba enūciare uidentur, quodq; nonnulli se conspexisse affirmant: perperam tamen asseruit à tribus illis causis unà concurrentibus prouenire. Albategnius autem Astronomorum diligentissimus singulas causas enarrans citæ apparitionis Lunæ post coitum tres alias adiecit. Nam habendam esse rationem (inquit) diuersitatis aspectus ut arcus zodiaci cognoscatur, qui inter locum Lunæ uisum & Solem occidentem comprehenditur, & distantiam quoq; ipsius Lunæ à terra metiendam, item & ueram intercaepedinem inter Lunam & Solem. Cum enim Luna à Sole distat Grad. 180. plenitudinem sui luminis ostendit: & quoniam 12. in 15. faciūt 180. interuallo igitur ipsorum luminarium per 15. diuiso, luminis digiti ex partitione uenient, id est duodecimæ. Et denique concludit Lunam post coitum infra spacium unius diei naturalis uideri non posse: igitur multo minus concedet ueterem & nouam in uno artificiali die conspici.


De Diuersitate aspectus

Annotatio septima.

Centrum terræ sit a, Planetæ uisus in supero hemisphærio b, locus unde aspicitur in superficie terræ c. Igitur constituto triangulo a b c, ipsius planum extendatur usq; ad firmamentum, in quo punctum supra uerticem, terminus uidelicet lineæ a c, in rectum productæ

esto d, & horizontis linea in eodem plano sit recta e f. Producantur autem a b & c b, usque ad g & h, in firmamento: ipse igitur planeta uidebitur in g, sed eius uerus locus erit in h.

Apparens itaque distantia à ze-nith erit d g: uera porro d h: & idcirco diuersitas aspectus in circulo altitudinis erit arcus g h. Excitetur autem à puncto a, recta linea a k, usque ad firma-mentum, rectæ c g parallela: & quoniam recta a c, terræ semia-




tis est respectu a k: arcus igitur g k, insensibilis censebitur quantitatis in circulo d f e: & propterea arcus h k, æqualis existimabitur arcui g h, diuersitatis aspectus. At uerò angulus c b a, coalterno b a k, ipsum arcum h k, subtendenti æqualis est. Idem itaque angulus c b a, aspectus diuersi-tatem diffiniat in ipso d f e, altitudinis circulo, si in centro eiusdem circu-li constitutus fuerit. Maximus autem erit hic angulus diuersitatis aspe-ctus in horizonte, quantoq; ab eo distantior fuerit, tanto minor erit. Po-natur enim planeta in i, horizontis puncto, rectaq; connectatur linea a i, ueri loci. Dico, quòd angulus a i c, diuersitatis aspectus in horizonte angulo a b c, diuersitatis aspectus ipsius eiusdem in planete similiter ho-rizontem maior erit. Et ponatur rursus idem planeta in alio loco altio-re ut in l, rectaq; connectantur lineæ a l, c l: maior igitur erit angulus a b c, angulo a l c. Quæ quidem eadem prorsus arte demonstrabis, qua su-perius in Theorica Solis usi sumus, ad ostendendum diuersitatem æqua-lis motus & apparentis, id est mediæ & ueri motus, in puncto longitu-dinis mediæ maximam fieri: quanto autem Sol opposito augis uicinior fuerit, tanto minorem esse. Hæc enim facile concludes, si punctum a fin-

xeris


xeris centrum eccentrici Solis, c mundi centrum & lineam: idcirco c i mediæ longitudinis esse. At q̄ quantò astrum distantius fuerit à centro mundi, tanto minorẽ habeat aspectus diuersitatem, statim intelliges si à centro mundi a, rectam lineam duxeris ad punctum m, positum inter b & g. Et quoniam in triangulo a b m, exterior angulus c b a, interiore opposito q̄ a m b maior est: planeta igitur uisus in m, minorem habebit aspectus diuersitatem: & proinde maior erit diuersitas aspectus planetæ propinquioris quàm remotioris, quod erat ostendendum.

In nonagesimo gradu eclipticæ ab ascendente nulla fit diuersitas aspectus in longitudine, quia ipse nonagesimus gradus eclipticæ semper est in circulo per zenit & polos eclipticæ procedente. Esto enim horizontis circulus a b c, cuius polus e, segmentum eclipticæ similiter horizontem positum sit a d, & ueniat à polo zodiaci f, circulus maximus per e, eclipticam secans in g, & horizontem in h. Dico, quòd g est nonagesimus gradus ab ascendente. Nam quoniam horizontis & eclipticæ cir-



culi se inuicem per equalia secant per 15. propositionem primi libri Theod. semicirculos igitur a b d & a g d, per æqualia secabit ipse circulus f g h, per polos utriusq̄ ueniens per 12. propositionem secundi libri ipsius Theodosij: & propterea a g, quadrans erit: & proinde punctũ g, 90. grad. erit: ab ascendente, in q̄ quidẽ nulla diuersitas aspectus in longitudine continget: propterea quòd ipse idem circulus maximus f g h, sub quo astrum uidetur à polis eclipticæ uenit. Diuersitas tamen aspectus tunc habebitur in latitudine, q̄ quidẽ non alius arcus erit, quàm ille quem superius diuersitatem aspectus simpliciter dictam, siue in circulo altitudinis definiuimus.

Animaduertendum est præterea, tantam esse distantiam inter nonagesimum gradũ eclipticæ ab ascendente & meridianum, secundum diuisiones horizontis, quanta est amplitudo ortus ascendentis. Circulus enim a b f, sit meridianus, d e f semicirculus æquinoctialis, b e c, semicirculus horizontis, segmentum eclipticæ inter meridianũ & horizontẽ sit g k, punctũ a, sit polus horizontis, & circulus maximus a o r, per polos eclipticæ & horizontis ueniens eclipticam secet in o: horizontem uerò in r: igitur o k & k r, eclipticæ & horizontis segmenta quadrantes erunt per 15. primi Theodosij, & 12. secundi: & erit idcirco punctum o, nonagesimus gradus ab ascendente. Rursus quoniam meridianus a b f, per polos æquinoctialis & horizontis uenit: igitur d e & b e, æquinoctialis & horizontis segmenta quadrantes erunt, per easdem Theod. propositiones 15. uideli-



uidelicet primi, & 12. secundi. A duobus itaq; quadrantibus kr & be , communem auferemus arcum er , & equales relinquentur duo arcus ek & br . Est autem k amplitudo ortus ascendentis: br uero distantia inter nonagesimum gradum ab ascendente & meridianum, secundum diuisiones horizontis. Igitur tanta est distantia inter 90 . Gr. ab ascendente & meridianum per horizontem

quanta est amplitudo ortus ascendentis. Et idcirco cum amplitudini ortus ascendentis equalis reperta fuerit astri distantia a meridiano per horizontem, nulla erit ipsius astri in eo situ diuersitas aspectus in longitudine. Quod quidem Ioanes de Monteregio iuste admonuit in libro de Cometa, Problemate 5.

De Latitudine & declinatione.

Annotatio octaua.

Recentiores Astronomi uera loca siderum in concauo sphaerae non, aut primi mobilis assignant. Sideris autem declinationem arcum maximi circuli definiunt, per polos mundi siue equinoctialis ueniētis, inter uerum locum ipsius astri & equinoctiale. Astri enim cuius uis declinatione ex altitudine ipsius meridiana, & ex inuenta loci latitudine in quo obseruatio fit, nota efficiunt. Ceterum latitudo stellae arcus erit maximi circuli per polos eclipticae octauae sphaerae ueniētis, inter uerum locum eiusdem stellae & ipsam eclipticam octauae sphaerae. Nam quonia stellarum fixarum latitudines quas Hypparch. & Ptol. multis antea seculis obseruarunt, tametsi octauam ipsam sphaeram fateantur trepidationis motu agitari, inuariatas sumunt: ipsas igitur fixarum stellarum latitudines ad eclipticam octauae sphaerae referri necesse est, non ad eclipticam non, aut primi mobilis. Idem sentit Purbach. cum ait Solem latitudinem non habere. Et quia uerum locum obseruati sideris fixi in sphaerico triangulo inuestigant, cuius unum latus maximae Solis declinationi aequum est aliud uero complementum latitudinis est eiusdem astri, & tertium denique declinationis complementum, eum quidem angulum reddentes motum, qui ad polum zodiaci octauae sphaerae efficitur: palam igitur est inuentam ea arte distantiam ad punctum tropici aestiui in quo maxima Solis declinatio contingit, referendam esse, non ad initium Cancris primi mobilis: & proinde initium computationis motus stellarum fixarum a sectione Verna sumi, non ab initio Arietis primi mobilis. Et quoniam tam errantes quam inerrantes stellae unum atque idem prin-

Pp cipium

cipium in tabulis habere debent, à quo ipsarum motus computentur: sectio igitur Verna illud principium erit secundum recentiores Astronomos, mobile quidem atq; uagum: quod nos minimè probamus. De hoc plura scripsimus in libro superiori cap. 4. de Declinatione Solis.

Tres planetę superiores latitudinem aliam habent ex parte superficię planę epic. & reliqua.

Annotatio nona.

Quoniam centrum epic. in plano deferentis consistit: scribit aut Purbac. epic. superficiem à superficie deferentis quādoq; declinare: idcirco fortasse quispiā suspicabit, interdū ipsa epic. & deferentis plana se inuicē secare, alterumq; ab altero declinare: interdum uerò unā coniungi, cū re uera eadem epic. & deferentis plana semper se inuicem secant: nuncq; uerò coniūgantur. Et quia reliqua etiā huius motus accidentia nō satis ab ipso autore sunt expressa: hāc igit theoricā latitudinis ab epic. prouenientis lucidius enarrabimus, ad hūc uidelicet modum. Centro epic. in nodo capitis collocato, plana ipsius epic. superficies in plana eclipticę superficie consistet: tantum uerò diameter augis uerę in superficie deferentis erit, in communi nempe sectione plani eclipticę & plani deferentis. Deinde uerò epicyclo, à nodo soluente, diameter augis uerę declinare incipit à superficie deferentis: recedet enim aux uera uersus superficiem eclipticę: oppositum uerò augis in oppositam partem. Diameter etiam longitudinum mediarum quę axis huius motus existit, superficiem deferentis intersecabit, semiaxis enim Orientalis inter ipsas superficies eclipticę & deferentis relinquetur: semiaxis uerò Occidentalis extra utramq; superficiē, superficie tamen eclipticę equidistans erit. Ipsa igit epic. superficies ad deferentis superficiē inclinata erit, itemq; ad eclipticę superficiē in partē oppositi augis. Atq; ita centro epic. pcedente, aux uera & oppositū ipsius à superficie deferentis magis atq; magis recedent: axis tamen huius motus ad eandē perpetuò accedet, eclipticę nihilominus æquidistans, quousque centrum ipsius epic. ad punctū deferentis perueniat, quod maximè ab ecliptica declinat. Tunc em̄ diameter augis uerę à superficie deferentis quā maximè declinabit: diameter uerò longitudinū mediarū in ipsa superficie deferentis collocabit. Ab hoc loco in nodū caudę, diameter augis uerę ad superficiē deferentis ppetuò accedet: diameter aut longitudinū mediarū eandē rursus intersecabit. ceterū pmutatim. Nā Occidentalis ipsius semidiameter inter eclipticę & deferentis superficies relinquet, Orientalis uerò extra utramq; superficiē, ipsiq; eclipticę superficie (ut antea) equidistans erit. Centro itaq; epic. ad nodū caudę perueniente, ip-

sius

sius epic. superficies iterum collocabitur in superficie eclipticæ, & diameter augis ueræ in superficie deferentis. Moto autem per reliquum semicirculum Australem, oppositum augis ueræ à superficie deferentis ad Australem partem declinabit, & reliqua contingent accidentia, uelut antea. Et quoniam centro epic. in nodis existente ipsius superficies simul est cum superficie eclipticæ, sed extra ipsos nodos ad eam inclinata est, superficiem uerò deferentis semper intersecat: axis igitur super quo epic. moueatur in longitudinem, bis tantum in una centri epic. reuolutione axis eclipticæ æquidistans erit, uidelicet cum ipsum epic. centrum in nodis fuerit: axis autem eccentrici nunquam erit æquidistans.

Annotationo decima.

Quoniam centrum epic. in superficie deferentis existit, & ipsius epic. plana superficies deferentis superficiem semper intersecat: recta igitur linea ipsarum superficierum cõmunis sectio epic. diameter erit. Centro itaq; epic. extra nodos existente ea medietas superficie epic. quæ punctum augis continet, superior uidelicet inter duas superficies deferentis & eclipticæ comprehenditur: inferior uerò in qua oppositum augis extra utramq; superficiem relinquetur. Dum igitur planeta in inferiori medietate epic. uersatur, plus remouetur ab ecliptica, quàm deferens ab eadem. Quare non semper planeta inter deferentem & eclipticam reperietur, quemadmodum Gerardus Cremonensis putauit. Centro autem epic. in puncto deferentis maxime latitudinis existente, eiusmodi cõmunis sectio diameter erit longitudinũ mediarũ: in alijs uerò locis alia diameter erit. Et proinde medietas superficiei epic. uel superior quæ inter superficies deferentis & eclipticæ continet, uel inferior quæ extra utramq; relinquitur, non erit una atq; eadem in omni situ epicycli.

Octauæ spheræ triplex inest motus.


Annotationo prima.

DE motu octauæ spheræ secundum Alphonsum plura scripsimus in libro superiori capite de Declinatione Solis. Et quoniam illius theoricæ à Georgio Purbach. lucidissimè enarrata est pauca tantum in præsentis annotabimus.

Quòd ecliptica octauæ paruos circulos secet in alternas portiones æquales, facile ostēdes. Ipsi enim parui circuli æquales sunt per 33. propositionē 1. lib. Theod. sunt etiam æquidistantes per 2. secundi lib. & idcirco alternæ eorundem portiones æquales erunt per 22. ipsius secundi lib.

Porrò ut intelligas, quando æquatio motus acce. & re. motui non

addenda est, & quando detrahenda, alterū polū parui circuli ponemus a & ipsius parui circuli atq; alipticę nonę Occidentalē interfectionē b, Orientalē uerò c, & ueniat à puncto d, Boreali polo ipsius eclipticę nonę circulus maximus per a, paruū circulū secans in e & f: angulos igit̃ cum ea rectos efficiet, per 20. propositionē 1. lib. Theod. & p̃pterea paruus ipse circulus in quadrantes sectus erit b e, e c, c f, & f b. Veniāt etiā ab ipso polo d, per duo p̃ucta parui circuli g & h, quorū distantię ab e, æquales sint, maximi circuli, qui eundē circulū ipsum paruū ex altera parte intersecant in k & i: eclipticā uerò nonę in l & m. Ecliptica igit̃ nonę & circulus d g k, se inuicē ad rectos angulos secabunt per 19. propositionē 1. lib. Theod. transit igit̃ ecliptica nonę per polos circuli d g k, per 17. transit etiā per polos parui circuli: & idcirco arcum g c k, per æqualia diuidet in puncto e, & arcū g l k, per æqualia etiam in puncto l, per 12. secundi Theod. A quadrantibus igit̃ e c & c f, detractis æqualibus circūferentijs g c & c k, duo arcus e g & f k, æquales relinquent̃ per cōmunem sententiā. Eadē arte concludes duos arcus e h & f i, æquales esse: quā p̃pter quatuor arcus e g, f k, e h, & f i, æquales erunt inter se per cōmunem sententiā. Veniant aut̃ à puncto a ad g & h, maximorū circulorum arcus a g & a h: duorū igit̃ sphericoꝝ triangulorum o g d & a h d, duo anguli d a g & d a h, propter æqualitatem duorū arcuum g e & e h, æquales inuicē erunt: latus aut̃ a g lateri a h, æquū est, & latus a d, ambo bustriangulis cōmune: duo igitur anguli a d g & a d h, æquis lateribus contenti æquales inuicē erunt per 4. primi Menelaï. Et idcirco duo arcus eclipticę nonę a l & a m, eisdē subtēsi æquales inuicē erunt. Est aut̃ a l, æquatio motus acce. & re. quando caput octauę spherę est in g aut in k, & est a m, æquatio ipsius motus quādo ipsum caput est in h aut in i. Quādo igit̃ motus acce. & re. fuerit arcus e g aut e k, aut e i, aut e h, eadem habebitur in tabula æquatio. Additur autem ipsa æquatio motui nonę quando caput



est in k. quanquam in eo loco proprio motu regrediatur. Nam quando erat in c, addebat̃ totus arcus a c, in k: igit̃ regressionis arcus erit c l, q̃ detracto ex a c, relinquet̃ arcus a l, motui longitudinis adhuc addendus.

At propterea detrahitur ipsa æquatio, quando caput est in h, quāquam

in eo


terea maximus circulus $k o q$, ipsum eclipticę planũ secet super recta linea $p o$, paruũ aut circulũ super recta $k q$, quarũ rectarũ interfectio esto punctũ t . Et maximus deniq; circulus $m r n$, eclipticę planũ secet super recta linea $p r$, paruũ uerò circulũ super recta $m n$, quarũ rectarũ linearũ interfectio sit punctũ s . Et quoniam recta linea $p l$, cętrum sphaerę cũ cętro parui circuli cõnectit, perpendicularis igitur est super ipsius parui circuli plano per 7. ppositionẽ 1. lib. Theo. & ppterea rectilinearus angulus $p l c$, rectus erit per 2. definitiõem 11. lib. Eucl. Triangulũ itaque rectangulum intelligemus $p l t$, in plano eclipticę nonæ, cuius quidẽ latus $p t$, recto angulo subtẽsum latere $p l$, acutũ angulũ subtẽdẽte $p t l$, maius erit per 19. 1. Euc. reliquũ uero acutũ angulũ $l p t$, recta linea $p z$, per inæqualia secat. Nã si recta ipsa linea $p z$, angulũ $l p t$, in duos æquales angulos secat $l p z$ & $z p t$: igitur sicut est $p t$ ad $p l$, sic erit $t z$ ad $z l$, per 3. ppositionem 6. lib. Euc. Atqui maior ostẽsa est $p t$ ipsa $p l$: igitur & $t z$, maior erit q̃ $z l$, quod quidẽ est impossibile. Nã quia $t z$, à cętro distãtiõis est, minor erit q̃ $z l$: & proinde recta linea $p z$, angulũ $l p t$, per equalia minime secat, sed per inæqualia, maiorẽ erit angulus $l p z$, maius basis segmẽtum respiciẽs ipso $z p t$, minus segmẽtum respiciẽte. Si em̃ angulus $l p z$ angulo $z p t$, minor est: totũ igitur angulum $l p t$, in duos equalis angulos secabimus per 9. ppositionem 1. lib. Eu. recta q; idcirco linea ipsum angulum $l p t$, dispescẽs cadet inter z & t : et ppterea iterũ impossibile cõcludemus per eãdem 3. sexti, nẽpe partẽ segmẽti $t z$, multò maiorẽ esse ipso segmento $z l$: qd rursus est impossibile. Quamobrem recta linea $p z$ angulum $l p t$, per inæqualia secabit, maiorẽ erit $l p z$ q̃ $z p t$: & idcirco eclipticę arcus $a i$ arcu $i o$, maior erit per ultimam ppositionem 6. libri Euclidis. Similiter demonstrabitur, quoniam in triangulo $s p z$ angulus $p z s$ obtusus est, exterior nẽpe atq; oppositus recto angulo $p l z$: angulus uero $z s p$ acutus: maius idcirco esse latus $p s$ latere $p z$. Atqui recta linea $t s$, quoniam à centro distantior, minor est q̃ $z t$: recta igitur linea $p t$ angulum $z p s$, per inæqualia secabit, maiorẽ erit angulus $z p t$ angulo $t p s$.

Et propterea arcus $i o$, arcu $o r$ maior erit. Crescunt itaq; equationes motus acces. & reces. quadrantis $e c$, per inæqualia crementa: ipsarum enim æquationum differentia magis atque magis contrahuntur ab a in c , quod demonstrandum suscepimus.

Lemma.

Quod autem sumpsimus rectam lineam $l z$, maiorem esse recta $z t$, ipsamq; $z t$, maiorem recta $t s$, facile concludemus, hac uidelicet arte.

cet arte. Rectę lineę connectantur fg & hk, & quoniam duo arcus eg & fh, æquales ostensi sunt per 12. secundi Theodosij: angulus igitur efg coalterno fgh, æqualis erit per 27. propositionem 3. lib. Euclidis.



Et propterea rectę lineę ef & gh, parallelę erunt per 27. primi. Similiter demonstrabis duas rectas gh & kq parallelas. Et per ipsam deniq; 27. tertij libri concludes, duos angulos efg & ghk, inter se æquales esse. A punctis autę g & k, in rectas ef & gh, rectę lineę perpendicularares deducantur gx & ky, per 12. primi: duo igitur trięgula rectangula fgx & hky, equiangula erunt per 32. primi & cõmunem sententiam: & idcirco

latera habebunt proportionalia per 4. sexti, sicut fg ad hk, sic gx ad ky. Rectę autem lineę connectantur lg, lh, & lk: maior igitur erit angulus flg angulo hlk: & idcirco maior erit fg q̄ hk, per 24. propositionem primi: & p̄pterea maior erit recta gx q̄ ky. Atqui parallelę sunt rectę lz & gx, quoniam anguli ad l & x recti sunt. Similiter parallelę sunt ky & zt, quia anguli ad z & y recti quoq; sunt: in parallelogrammis igitur lg & zk, latus gx, lateri lz æquum est, p̄terea latera ky & zt, æqualia erunt per 34. primi. Maior porro ostensa est recta gx, quã ky. Et propterea maior erit lz, q̄ zt. & eadem arte concludes maiore esse zt q̄ ts, quod in demonstratione fuit assumptum.


Quemadmodum itaque capite Arietis octauę moto per quadrantem ec, æquationes crescunt minoribus perpetuò differentijs, ita per quadrantem cf, ipsę equationes decrescunt maioribus perpetuò differentijs. Quoniam uerò ipsum Arietis octauę caput per quadrantem mouetur fb, ita crescunt equationes, quemadmodum per ec & per be: rursus maioribus differentijs decrescunt, quemadmodum per cf. Motus itaque inerrantium siderum ex motu nonę & trepidatione octauę proueniens capite Arietis octauę moto à puncto b, usque ad e, uelox est augens uelocitatem.

Inde uero ad c, uelox est diminuens uelocitatem. Inde per quadrantem cf, tardus est, tarditatem augens usque ad punctũ h, quod à puncto f, distat Gr. 21. in ipso enim gradu 21. ante f, capite octauę existente, inerrantes stellę stationarię erunt.

Differentia eñ æquationum in ipso b, quemadmodum tabula per gradus extensa ostēdit, minuta continet 8. & se. 49. quantus est motus nonę in annis 20. At medius motus acce. & re. in ipsis annis 20. paulò maior est q̄ unius gradus. A gradu igitur 21. ante f, usq̄ ad 20. ante idē f, caput Arietis octauæ proprio motu regreditur, sed motu nonæ tantundem progreditur: & propterea inerrantes stellæ stationariæ uidebuntur in ipso tempore. Inde uero ad f retrogradę erunt, augentes regressiōem. Et ab f usq̄ ad gradum 20. post idem f, retrogradæ quoq̄ erunt, regressiōem diminuētes. A 20. in 21. rursus stationarię erunt. Inde uero usq̄ ad b, iam in consequentia mouebuntur: motus tamen earum tardus erit, diminuens tarditatem.

De Motu octauæ spheræ, secundum Thebith.
Annotatio secunda.

Circulus a b c, sit ecliptica fixa, b punctum caput Arietis ipsius, polus uidebit parui circuli d e f, in quo caput Arietis mobilis eclipticæ uersatur. Veniatq̄ per idem b, arcus maximi circuli e b f ad rectos angulos super ipsam eclipticam fixam a b c, paruum circulum secans in e & f. Sintq̄ a b & b c quadrantes, punctum a initium Capricorni, & c initium Cancri. Et erunt idcirco a & c, poli circuli e b f, per primum librum Theodosij. Veniat etiam per a & e maximus circulus a e, quem necesse est transire per punctum c, per 15. propositionem ipsius primi libri Theodosij. Igitur quoniam a & c,



poli sunt circuli e b f, duo segmenta a e & e c, quadrantes erunt, & anguli quos ipse circulus a e c, efficit cum e b f recti erunt: quapropter poli eiusdem circuli a e c, in circulo erunt e b f, per 17. Secat itaq̄ circulus ipse e b f, circulum a e c, trāsitq̄ per eius polos: secat etiam paruum circulum d e f, & transit per eius polos: & propterea ipsi duo circuli a e c & d e f, in

& def, in ipso eodem puncto esse contingent per quartam propositionem secundilibri Theodosij. Scribatur similiter per a & f, maximus circulus a f c, qui eundem circulum paruum tanget in ipso f. Circulus porro æquinoctialis circulum a e c, secet in g, Occidentali parte: circulum uerò a f c in h, Orientali parte, & paruum circulum in d & k. Et eclipticam mobilem ponemus a e c, dum caput Arietis ipsius est in puncto e, contactu Boreali: & quoniam a e & e c, quadrantes sunt: erit igitur initium Cancræ ipsius mobilis eclipticæ in c: Capricorni uerò in a. Idem continget, quando fuerit idem caput Arietis in Australi contactu f: & proinde capita Cæcri & Capricorni mobilia simul erunt cum capitibus fixorum.

Separat autem ecliptica mobilis ab æquinoctiali in situ a e c arcum b g, qui maxima est distantia mobilis sectionis à fixa sectione b, in situ uerò a f c, arcum b h. Æquales sunt autem ipsi arcus b g & b h. Quod quidem facile concludes in duobus triangulis rectangulis b f h & b e g. Contrapositi enim anguli f b h & e b g, æquales sunt, & duo latera b f & b e æqualia: igitur reliqui anguli, & reliqua latera æqualia inuicem erunt. Latus igitur b g lateri b h, æquum erit per primum librum Menelai, quod etiam per sinuum rectorum rationes concludere poteris. Acuti sunt enim anguli qui ad b: & quoniam latera b e & b f, minora sunt quadrantibus: anguli igitur b g e & b h f, acuti erunt. At uerò in triangulo b f h, sicut sinus totus ad sinum complementi arcus b f, sic sinus anguli f b h, ad sinum complementi anguli f h b. In triangulo similiter b e g, sicut sinus totus ad sinum complementi lateris b e, sic sinus anguli e b g, ad sinum complementi anguli b g e: æquales igitur concludes sinus rectos angulorum f h b & b g e.

Et quoniam sicut sinus totus ad sinum anguli f h b, sic sinus lateris b h, ad sinum lateris b f. Item sicut sinus totus ad sinum anguli b g e, sic sinus lateris b g, ad sinum lateris b e, æquales sunt autem sinus recti laterum b f & b e: æquales igitur erunt sinus laterum b h & b g, & quia totus arcus g h, uno semicirculo minor est: duo igitur arcus b g & b h, æquales inuicem erunt.

Continet autem uterque eorum gradus decem & 45. minuta: totus igitur g h, graduum erit 21. minut. 30. cui alter respondet æqualis in Orientali parte, ex alterno contactu circuli parui descripti circa caput Libræ eclipticæ fixæ: & propterea autor scribit cuiusque quantitatem esse circiter 21. Gr. & m. 30.

Veniat autem per b, circulus maximus ad rectos angulos super æquinoctialem, qui circulum paruum secet in i & k: erit igitur arcus d

i, quadrans ipsius parui circuli, capite uero Arietis mobilis eclipticæ in i posito, secet ipsa mobilis ecliptica æquinoctialem in l. Erit itaque arcus i l, maxima æquatio octauæ sphaeræ, maxima uero distantia capitis Arietis mobilis eclipticæ à sectione ipsius eclipticæ cum Aequatore, quam æqualem ponit arcui b g, graduum uidelicet 10. minut. 45. Inæquales enim sunt ipsi arcus b g & i l. ceterum æquales censentur, quia duo anguli e g b & i l b, maximarum declinationum mobilis eclipticæ ad situs e & i, insensibiliter differunt.

Duorum igitur rectorum triangulorum b e g & i b l, duo latera e b & i b, equalia sunt, & duo anguli g e b & l b i recti: duo uero anguli ad g & l, maximarum declinationum æquales supponuntur, propter insensibiliem eorum differentiam: idcirco latera b g & i l, rectorum angulos eorundem triangulorum subtendentia equalia erunt per primum librum Menelai.

Quod etiam per sinuum rectorum rationes ostendere poteris. In triangulo enim rectorum b e g, sicut sinus totus ad sinum anguli b g e, sic sinus lateris b g, ad sinum lateris b e. In triangulo præterea rectorum i b l, sicut sinus totus ad sinum anguli i l b, sic sinus lateris i l, ad sinum lateris b i: & quoniam duo anguli b g e & i l b, æquales supponuntur: igitur sicut sinus b g, ad sinum b e, sic erit sinus i l, ad sinum b i: & permutatim sicut sinus b g, ad sinum i l, sic sinus b e, ad sinum b i. Æquales sunt autem b e & b i: igitur sinus b g & i l, æquales erunt, & quia uterque ipsorum arcuum b g & i l, quadrante minor est: æquales igitur erunt, quod erat ostendendum.

Dum caput Arietis est in contactu e, maxima declinatio eclipticæ mobilis maior est maxima declinatione fixæ: duo enim arcus b c & e c, quadrantes ostensi sunt: arcus igitur g c, quadrante maior erit: & duo idcirco arcus b c & g c, coniuncti uno semicirculo maiores sunt: & propterea exterior angulus c b h, interiore atque opposito c g b, trianguli b g c, minor erit: ipse uero idem angulus c b h, maximæ declinationis est eclipticæ fixæ: angulus uero c g h, maximæ declinationis est eclipticæ mobilis dum caput Arietis est in contactu e. In situ igitur e, maior est maxima declinatio mobilis quam fixæ, quod erat ostendendum.

Sed ponatur caput Arietis mobilis in puncto d, sectionis Aequatoris & parui circuli. Dico, quod minor erit maxima declinatio mobilis quam fixæ. Secet enim ecliptica mobilis in eo situ eclipticam fixam in m: quadrans igitur erit arcus d m: & erit idcirco ipsum punctum m, maximè declinans, initium nempe Cancrî in ipso situ: arcus autem b m, minor est quadrante, pars uidelicet quadrantis b c: in triangulo igitur b m d quod

In theor. Planet. Geor. Purbach. annot. 307

¶ quoniam duo latera bm & dm , coniuncta uno semicirculo minora sunt, maior erit angulus exterior mbh , interiore opposito bdm : at uero ipse angulus mbh , maximæ declinationis eclipticæ fixæ est: angulus autem bdm , maximæ declinationis mobilis: in sectione igitur A quatoris & parui circuli existente capite Arietis mobilis, minor est maxima declinatio mobilis quam fixæ, quod erat ostendendum.

Annotationum in Theoricis Planetarum Georgij Purbachij, Finis.

B A S I L E Æ,
EX OFFICINA HENRICPETRINA,
ANNO M. D. LXVI, MENSE
SEPTEMBRI.

In theor. Planet. Geor. Purbach. Annot. 107

et quoniam quodlibet in & dicitur, conuenit in quibuslibet
sunt utique in angulis exterioribus in & dicitur, conuenit in quibuslibet
et quodlibet in & dicitur, conuenit in quibuslibet
sunt utique in angulis exterioribus in & dicitur, conuenit in quibuslibet
et quodlibet in & dicitur, conuenit in quibuslibet
sunt utique in angulis exterioribus in & dicitur, conuenit in quibuslibet


Annotatum in Theoricas Planetarum Geor.
per Purbachij, Paris.




ANNO 1545
L. P. R. I. N. A.

BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE S. FERNANDO









3215

NONIUS

OPERA

Observatorio de Marina
BIBLIOTECA

Núm. 245