

R (Ms.)
172

Sala Presentada 8 - 1




10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

ESTE ES VNTVN ALGRA^{DE},



I.
que lo están cha-
podando, y de las
chapodaduras se
aparta lo que
puede servir de
nuevas plantas:
hase de chapo-
dar Diciembre,
y Enero.



II.
Aqui se ponen
las que han de
ser nuevas plan-
tas al Sol, y al ai-
re, que se les qui-
ta la Tuna: esto
se hace por Di-
ciembre, y Ene-
ro.

III.

puestas, de las que se chapodaron, hanse de poner por Diciembre, y Enero, para que con la Primavera retóñescan.

ESTAS SON NVEVAS PLANTAS.



1851.01

III.

Aqui se pone la cochinilla en las nuevas plantas pasados seis meses, y mas que se plantaron. La semilla se pone por Marzo, y Abril á los arboles viejos, que á los nuevos es bien no poner-sela, hasta que tengan mas he-dad de seis me-ses, ó un año.



BIBLIOTECA PÚBLICA
TOLEDO

AQVI SECOGE SEMILLA.



V.

questà ya madura, y de sazon para Agosto, Septiembre, y Octubre, aunque todo el año hai cosecha, pero la principal es en estos meses.





VI.

Aqui se chapoda el tunal despues de haber dado ya el fructo, y cogidose de la cochinilla de la grana, y esto se hace por Diciembre, y Enero.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36






VII.

Aqui se cercan los Tuñales con Valladares de ramos, y cañas de maiz; esto se renueva cada año á las cosechas del maiz, por que hai año, q^e es por Noviembre, y Diciembre.



VIII.

Quando las plantas de los Tunales cargan mucho, suelen desgajar, y apartanlas por abajo con palos, y estacas por Maio, y Junio.





IX.


Aqui se le quita la tuna al tunal de la grana, porque la hoja quede con mas virtud para sustentar la cochinilla: esto se hace en todo tiempo sin dexar criar Tuna.



X.


Este es un Tunal al pie del qual hai arboles, rosas, coles del Piru, y otras yervas. Y plantas, conque se destruyen los tunales de la grana, los cuales no se han de consentir por ninguna manera.





XI.


Este es un Tunal
del qual ya se ha
cogido la grana y
quedan tan marchi-
to, y desustancia-
do, que queda
amarillo, y sin
virtud, hasta que
por Abril, y Maio
comienza a echar
renuevos.



XII.

Este es un Tunal,
que por descuido
del dueño, y no
limpiallo se cubri-
ó de yerva, zar-
zas, y otras cosas,
que se hizo silves-
tre, el qual ya no
es de ningun e-
fecto, y es mejor
derrivallo.







Gallina de la tierra



Gallina de Castilla.




Gorrión.



Nextequili.



Tenchicol



Nopalonquili.



Zacapochin.



Nopalaquequeyachin



Chichian.



Lagartija.



Ysquimilinqui.



Trottron.



Hahayote.





