

de Marina

TECA

77

de la Armada

TECA

77

Observatorio de San Fernando
BIBLIOTECA

Núm. del Invent.

Sección.....

Carpeta.....

Estante.....

Tomo.....

Observatorio de Marina
BIBLIOTECA

3177

Núm.....

BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE SAN FERNANDO



BIBLIOTECA
DEL
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS Y LINGÜÍSTICAS

BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE S. MARINO

D
D
21
M

1981
BIBLIOTECA
MUSEO
NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

IOANNIS
DELLA FAILLE
ANTVERPIENSIS

E SOCIETATE IESV

In Academia Matritensi Collegij Imperialis
Regij Matheseos Professoris

THEOREMATA
DE CENTRO GRAVITATIS
PARTIVM CIRCULI ET ELLIPSIS.



OBSERVATORIO DE MARINA
DE
SAN FERNANDO.

ANTVERPIÆ,
EX OFFICINA TYPOGRAPHICA
IOANNIS MEVRSI.

ANNO M. DC. XXXII.

BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

*Orlamano
uma de manu*

*Cuenta de
Suma de
ano 1638*

Handwritten scribble

IOANNIS

DELLA FALFA

ANTVERPIENSIS

E SOCIETATIS

In Academia Medica Collegij Imperialis
Legi Medice Professoris

THEOREMATA

DE CENTRO GRAVITANTIS

TARTINI ORCVII ET MIPSI



ANTVERPIE

EX OFFICINA TYPOGRAPHICA

IOANNIS MEYERS

ANNO MDCCLXXII

POTENTISSIMO
REGI CATHOLICO
PHILIPPO IV.
HISPANIARVM INDIARVMQ.

MONARCHÆ.

DE Circuli grauitate demonstra-
tiones REX MAXIME peruigi-
li studio elucubratas, ad subli-
me MAIESTATIS V. solium
debito cultu prostratus defero: qui orbem
circuis potestate, grauitate moderaris. Quid
enim Circulo similius potentiâ tuâ? quid
ponderi propius imperio tuo? Quod enim
in cælo orbitæ ambitúsque, in orbe diffu-
sum imperium Vestrum est, cuius, vt sic di-
cam, circulo maria terrásque ambis, com-
plecterísque tot regna populósque alio sub
sole calentes. Potentiam magnificentia
comitatur, nec aliter quàm sol diurno re-
gressu

* 2



gressu mundum illuminat, ita sparso per
vniuersum fulgore, Maiestas V. lustrat om-
nia fouétque. Nec aliter ipsa terræ moles
grauitate suâ, quàm pondere & constantiâ
regiminis tui quiescit, omni pedum impul-
su vacillatura, nisi vnum hoc momentum
pertinacius eam loco assereret suo. Rectè
igitur hoc inuentum tuis temporibus refer-
uatum, quibus felicissimè magnitudinem
tuam velut symbolum repræsentaret. Etsi
enim Circulum è centro suo æquilibrare
notissimum fuerit, quibus tamen ex punctis
eius æquilibrent partes hæctenus fuit igno-
ratum: & primus, ni fallor, in fragmenta dis-
sectum, ad seueram illam mechanicarum
speculationum trutinam expendi. Hieroni
Syracusarum Regi Archimedæa inuenta
accepta ferimus: cuius tam felicitis ingenij
exuuiæ, si non totæ periere, certè minore sui
parte vitarunt Libitinam. **TIBI REX MAXI-
ME** non inferiora debebunt posteri, fecisti
enim

enim vt multi per Te aggredi possent, quod sine Te vix audebant velle, testarique naturam non in vnius Archimedis ingenio effœtam esse. Quibus sub prima auspicia Academiæ tuæ, hoc mathematico conatu præire volui, non exemplum daturus reliquis, sed id festinando assecuturus, vt nondum melioribus præuentus, ante æstimari mea possint, quàm doctiorum superuentu obscurari.

* 3

LECTO-



LECTORI S.

E Centro grauitatis quadratam ab Archimede parabolam nosti Amice Lector, eamq; ad propria deinde Geometrarum principia reuocatam. Hæc mihi occasio fuit cogitandi de centro grauitatis partium circuli, & an non aliqua ad quadraturam eius hinc pateret via, primitus inquirendi; quæ quàm firmo cum hoc centro sociata sit nexu, hoc opusculum percurrenti tibi palam fiet. Præsertim quòd reciproca quædam sit sequela, & problematicè inuento grauitatis centro quadretur circuli Sector, adeoque totus; ac vicissim quadrato circulo, partium eius grauitatis centrum reperiatur. Nimum quantum cum figuræ huius in quadratum metamorphosi doctorum virorum ingenia vano conatu luctata sint, dum alij per ignoratam hætenus dimetientis cum perimetro proportionem, alij per curuas quasdam lineas, cuiusmodi sunt helices & quadratrices, alij denique per lunulas id sunt aggressi; nemo tamen, quod sciam, hanc institit viam, vt à circuli grauitate ad explicandam eius aream proficisceretur. Annis abhinc vndecim cùm primum in Dolana sequanorum Academia Mathematicas disciplinas professus sum, hæc à me Theoremata fuere excogitata, eaque tetigi verbo vno, sed demonstratione prætermissa, in iis quæ obiter de centro grauitatis auditores mei scripto exceperunt; Triennio post in Mechanicis Thesisibus, quas typis vulgavi, eorum mentionem feci, nec ad id tempus apud scriptorem aliquem vestigium huius speculationis deprehendi; ab Archimede sanè nihil tactum, nec ab iis qui commentaria in ipsum edidere. Fridericus Commandinus & Lucas Valerius in circulo & ellipsi centra grauitatis & figuræ in idem conue-

conuenire punctum ostenderunt, nempe quid sine vllō demonstrationis adminiculo facile quilibet admisset, hac tamen in parte non sine laude scrupulosæ Mathematicarum disciplinarum integritati obsecuti. Maioris tamen moliminis fuit centra portionum vtriusque figuræ inuestigare; quod inuentum vt à nouitate ac speculationis subtilitate commendari possit, ego tamen inuentionis modum impensius sum admiratus, qui longè alius est ab eo, quem primâ fronte demonstrationes ostendunt. De creueram aliquando discursus huius velut itinerarium scribere, vti pateret quâ viâ in hanc determinationem venissem, & opinione mea infinitis speculationibus aditum aperuisset, sed in iustum volumen excreuisset opus, multarum figurarum descriptione impeditum, quod quàm difficulter committi prælo potuisset, scio. Quî enim fieri aliter posset, vt (repudiatis tot futilibus libris qui magnitudinum dumtaxat dimensiones & instrumentorum vsus iam toties ad nauseam repetitos, obtrudunt) non fuisset inuentus aliquis, qui Apollonij Pergæi & Pappi Alexandrini opera, in doctorum virorum commodum iterato prælo subiecisset? Mathematica multi sciunt, Mathesim pauci. Aliud enim est nosse propositiones aliquot, & nonnullas ex iis obuias elicere, casu potius quàm certa aliqua discurrendi normâ, aliud scientiæ ipsius naturam ac indolem perspectam habere, in eius se adyta penetrare, & ab vniuersalibus instructum esse præceptis, quibus Theoremata ac Problemata innumera excogitandi, eademque demonstrandi facilitas comparetur. Vt enim Pictorum vulgus prototypon sæpè sæpius exprimendo, quemdam pingendi vsus, nullam verò pictoriæ artis, quam optica suggerit scientiam acquirit, ita multi lectis Euclidis & aliorum Geometra-

rum



rum libris, eorum imitatione fingere propositiones aliquas ac demonstrare solent, ipsam tamen secretissimam difficiliorum Theorematum ac problematum soluendi methodum prorsus ignorant. Antiqui sanè Analyticen subtiliter inuenerunt, de qua libro septimo disertissimè Pappus, cuius beneficio nonnulla illius artis, ad eamque spectantium librorum rudera ad nos peruenère, quæ iam viri doctissimi instauratum eunt; sed quæ in hanc rem à nobis sunt excogitata additaque suo tempore dabimus, pleraque tamen in subiecta materia, velut apertissima exercitationis arena expressa fuerant. Plurimum adhuc magnitudinum de quibus nemo hæctenus, centra gravitatis determinavi sensim edenda, quæ simul dare visum non fuit, tum vt explorarem, quis de his speculationibus doctorum virorum futurus sit sensus, tum quod antiquorum more librum vno subiecto constare debere existimem (quale sunt circulus & ellipsis eiusdem omnino essentia figuræ) nec quidquam adstruendum putem, quod velut adscititium ad fucum vel molem faciendam referri possit. Idcirco quantum nonnulli operæ ponunt vt scriptiones diducant, tantum mihi laborandum fuit, vt amplissimum argumentum in has angustias cogere. Quod si viris scripsissem doctis, arctius contraxissem, sed vel à leuiter geometriâ tinctis volui hæc percipi posse. Ideo sicut pleraque accuratè sunt demonstrata, ita nimios scrupulos, ne elementa viderer scribere negligendos duxi.

IOAN-

I O A N N I S
DELLA FAILLE
ANTVERPIENSIS

E SOCIETATE IESV

In Academia Matritensi Collegij Imperialis
Regij Matheseos Professoris

THEOREMATA
DE CENTRO GRAVITATIS
PARTIVM CIRCULI ET ELLIPSIS.

PROPOSITIO I. THEOREMA I.


*Dato quolibet Sectore circuli, unoq³ eius latere produ-
cto, possibile est à termino alterius lateris, lineam ducere
ad productum latus, vt illud, quod fiet triangulum recti-
lineum, Sectori sit æquale.*

SIT datus circuli Se-
ctor A B C.
Dico posse duci A D,
concurrentem cum
latere B C in D, vt triangulum
A B D æquale sit Sectori A B C.

Nam per ea quæ ab Archi-
mede demonstrata sunt, in li-
bro de lineis spiralibus, possi-
bile est arcui A C dare lineam
rectam æqualem; sit illa B E,
ducta perpendiculariter ad
A B, ducatur E F parallela B A, secans B C in D, ducaturque A D.

Cum trianguli A B D altitudo sit æqualis arcui Sectoris, & basis A B
æqualis semidiametro, erit triangulum æquale Sectori.

Igitur dato quolibet Sectore, &c. quod fuit demonstrandum.




A

PRO-



PROPOSITIO II. THEOREMA II.

Si à latere Sectoris circuli, triangulum Sectori æquale descriptum fuerit ut prius, alterum trianguli latus circa communem cum Sectore angulum, Sectoris latere maius erit; & tertium latus eius arcum secabit.



Sit triangulum $A D B$ Sectori $B A E C$ æquale.

Dico latus $B D$ maius esse latere $B A$.

Si enim latus $B D$ non sit maius, cadet punctum D vel in punctum C , vel infra C in G ; & utroque casu debet triangulum $A D B$, quod est pars Sectoris, toti Sectori esse æquale, quod fieri nequit, cadet ergo D ultra C .

Dico præterea lineam $A D$, secare arcum Sectoris in aliquo puncto E .

Ducatur enim $A F$ tangens circulum in A .

Cum totus Sector $B A E C$, cadat intra triangulum $A F B$, erit illud maius Sectore, ergo linea $A D$ quæ aufert triangulum Sectori æquale, cadet intra $A F$, sed etiam ultra $A C$ subtensam, ut iam ostensum est, ergo secabit arcum in aliquo puncto E .

Igitur si à latere sectoris circuli, &c. quod demonstrare oportuit.

PROPOSITIO III. THEOREMA III.

Si triangulum quodpiam fuerit æquale Sectori circuli, à basi trianguli tamquam semidiametro, descripto ut supra; linea è centro Sectoris educta, arcum & oppositum trianguli latus ita secabit, ut minor proportio sit partis lateris

teris basi vicinioris ad reliquam, quam partis arcus basi vicinioris, ad reliquam.

Sit triangulum ACB æquale Sectori BAD , & ex centro B quæcumque linea fecet arcum AD in E , & latus oppositum in F .

Dico minorem esse proportionem lineæ AF ad FC , quam arcus AE ad ED .


Cum linea AC fecet arcum AD in aliquo puncto, potest linea BF cadere in illud punctum, vel supra vel infra;

quomodocumque vero cadat triangulum AFB , inter lineam BF & basim positum, semper minus erit Sectori BAE , itidem inter basim & lineam BE constituto, quod primùm demonstro.

Cadat linea in punctum vbi AC arcum AD interfecat, manifestum est triangulum AFB , Sectori BAE inscriptum, Sectori minus esse; si cadat infra intersectionem, cum BE ante fecet lineam AC quam arcum, iterum constabit triangulum AFB , Sectori BAE minus esse. Si denique cadat supra intersectionem, cum Sector BED iam cadat intra triangulum BFC , erit minor triangulo BFC , sed totum triangulum ACB est æquale toti Sectori BAD , pars trianguli scilicet BFC est maior Sectori BED , ergo reliqua pars trianguli, scilicet AFB , minor erit reliquâ parte Sectoris BAE , atque ita semper triangulum AFB , minus est Sectori BAE .

Hoc posito minor erit proportio trianguli AFB ad Sectori BAE , quam trianguli BFC ad Sectori BED ; & permutando minor quoque proportio trianguli AFB ad triangulum BFC , quam Sectoris BAE ad Sectori BED ; sed vt sunt triangula, ita sunt lineæ AF , FC , & vt se habent Sectori, ita se habent arcus AE , ED , ergo etiam minor erit proportio lineæ AF ad FC , quam arcus AE ad arcum AD .


Ergo si triangulum quodpiam fuerit, &c. quod propositum fuit demonstrare.



a 2. huius.


DE CENTRO GRAVITATIS
PROPOSITIO IV. THEOREMA IV.

Si triangulum quodpiam ut supra, Sectori circuli æquale descriptum fuerit, & à trianguli vertice ducatur linea in basim productam, triangulum priori simile constituens; quæ è centro euocabitur linea, ita secabit iam ductam lineam, ut pars inter basim & lineam ductam, ad reliquam maiorem habeat proportionem, quam arcus basi & ductæ iam lineæ interiectus, ad reliquum.



It triangulū ABC æquale Sectori ACD , ducaturq; CE , ut triangulum ACB simile sit triangulo ECB , item aliqua ex centro linea BF , secans utcumq; EC in F , & arcū AD in G .
Dico maiorem esse proportionem EF ad FC , quam sit arcus AG ad GD .

Diuidat primò BF arcum AD bifariam in G , erit sicut BE ad BC , ita EF ad FC ; sed EB maior est BC , cum BC maior sit BA , & BA , BC , BE sint tres continuæ proportionales, ob similitudinem triangulorum, ergo EF maior est FC ; sed arcus AG æqualis est arcui GD , ergo maior proportio EF ad FC , quam arcus AG ad GD .



Secundò non diuidat BF bifariam arcum AD , sed sit verbi gratia AG arcus, minor arcui GD , & in GD sumatur arcus DI , æqualis arcui AG , ducaturque BI , quæ producta si opus fuerit secet AC in K ; secet quoque linea BF lineam CA in H .

Cum

Cum triangula BCA , BCE sint similia, & in iis similiter ductæ sint lineæ BF , BK ; erit sicut CK ad KA , ita EF ad FC ,^{a 3. huius.} sed minor est proportio AK ad KC , quam arcus AI ad ID , ergo conuertendo maior erit proportio CK ad KA , quam arcus DI ad arcum IA . Sed vt CK ad KA , ita EF ad FC vt iam ostendimus, ergo maior proportio EF ad FC , quam arcus DI ad IA , id est AG ad GD .

Idcirco si triangulum quodpiam vt supra, &c. quod fuit ostendendum.

PROPOSITIO V. THEOREMA V.

Si triangulum quodpiam vt supra, æquale Sectori circuli descriptum fuerit, & à trianguli vertice ducta linea in productam basim, triangulum priori simile constituens; si è centro euocetur linea aliqua, secans duas lineas angulo Sectoris oppositas, possibile est à vertice ducere lineam cadentem inter utramque, quæ ab illa quæ è centro educta est linea, secetur in eandem rationem, in quam Sectoris arcus diuiditur.


SECTORI BAD æquale sit triangulum ACB , ductaque CE , vt triangula ACB , ECB inter se sint similia, è centro vt-cumque ducatur BF , secans vtramque CA , CE in F & K .


Dico posse duci CG , inter CE & CA , secantem BF in H , vt sit sicut GH ad HC , ita arcus AI ad ID .

Sit enim CA secta in M , vt sicut arcus AI ad arcum ID , ita sit AM ad MC ; cum sit maior proportio arcus AI ad arcum ID , quam AK ,^{a 3. huius.} ad KC , cadet punctum M supra punctum K ; ducatur deinde FL parallela EB , erit AL ad LC , vt EF ad FC ; ergo cum maior sit proportio EF ad FC , quam arcus AI ad arcum ID , erit quoque maior pro-

A 3

por-






portio AL ad LC, quam arcus AI ad arcum ID, & consequenter quam lineæ AM ad MC, cadetq; punctum L supra punctum M. Ducatur MH parallela EB, secabit FK in aliquo puncto H, per quod si ex C ducatur CHG, erit GH ad HC, vt AM ad MC, id est vt

arcus AI ad arcum ID.

Igitur si triangulum quodpiam, &c. quod fuit demonstrandum.

PROPOSITIO VI. THEOREMA VI.

Sectori BAD vt supra equale sit triangulum ACB, & triangulum ECB simile triangulo ACB, ducta item utcumque BF, & CG secans BF in H, ita vt sicut angulus GBH ad angulum HBC, ita sit linea GH ad HC, si ducatur AH, erit triangulum AHB Sectori BAI equale.



ESt enim vt linea GH ad HC, ita triangulum GHB ad triangulum HCB; & componendo vt GC ad GH, ita triangulum GCB ad GHB; sed ita etiam se habet triangulum GCA ablatum à maiori GCB, ad triangulum GHA ablatum à minori GHB, ergo reliquum ACB ad AIB, vt totum ad totum, id est vt CG ad HG; & vt arcus

quum ACB ad AIB, vt totum ad totum, id est vt CG ad HG; & vt arcus

cus AI ad arcum ID , ita GH ad HC , ergo componendo ut arcus AD ad arcum AI , ita GC ad GH , ergo Sector ADB ad Sectorem AIB , (qui se habent ut arcus) ut GC ad GH , ergo & Sector BAD ad Sectorem BAI , ut triangulum ACB ad triangulum AIB ; ergo permutando ut Sector BAD ad triangulum ACB , ita Sector BAI ad triangulum AHB , sed Sector ADB est æqualis triangulo ACB , ergo Sector BAI æqualis est triangulo AHB .


Igitur Sectori BAD ut supra æquale sit, &c. quod ostendere propositum fuit.

PROPOSITIO VII. THEOREMA VII.

Iisdem positis quæ in præcedenti propositione; si fiat ut HB ad BC , ita BC ad BK , Dico BK minorem fore BE .

Cum enim ob similitudinem triangulorum ECB , ACB , sit ut AB ad BC , ita BC ad BE , rectangulum sub BA , BE , æquale erit quadrato BC ; similiter rectangulum sub BH , BK , æquale erit quadrato BC , ergo rectangulum sub BH , BK , rectangulo sub BA , BE æquale erit; ergo ut BA ad BH , ita erit BK ad BE ,^a sed AB est minor BH , ergo BK minor erit BE .


Ergo iisdem positis quæ in præcedenti propositione, &c. quod oportuit demonstrare.



PRO-

PROPOSITIO X. THEOREMA IX.

Si tres lineas ab uno puncto egredientes, & duos inæquales angulos comprehendentes, secuerit quarta quedam linea hoc pacto, ut partes quæ subtendunt angulos, eandem inter se proportionem habeant, quam anguli, media abscissarum erit minima, illa maior quæ minorem angulum claudit, maxima denique quæ cum media maiorem angulum comprehendit.



EX puncto A tres lineæ egrediantur, duos inæquales angulos comprehendentes, $DA B$ maiorem, $DA C$ minorem; illasq; secet linea CB hoc pacto, ut BD ad DC eandem habeat proportionem, quam angulus $DA B$, ad angulum $DA C$.

Dico primo DA medianam abscissarum, esse minorem CA , quæ cum illa angulum claudit.

Si enim DA non sit minor CA , erit æqualis vel maior; & primum ponatur esse æqualis.

Centro A intervallo AD , describatur arcus EDF , ducanturque DH , DG , perpendiculares ad AB , AC ; item BI , FL perpendiculares ad AC ; & cum angulus CDA fit acutus, utpote angulus ad basim trianguli isoscelis, non erit BD perpendicularis lineæ AD , ideoque dimittatur BK perpendicularis in AD productam, cadet enim extra BD , cum angulus BDK fit acutus, & ad verticem vni illorum, qui sunt ad basim isoscelis.

Cum ex hypothese AC , AD sint æquales, sintque bases triangulorum CBA , DBA , erunt illa triangula ut altitudines BI , BK ; sed triangula sunt etiam ut BC ad BD , ergo erit etiam BI ad BK , ut BC ad BD , sed

sed cum sit ut BD ad DC , ita angulus BAD ad angulum DAC , seu quod idem est arcus FD ad arcum DE , erit etiam componendo ut BC ad DB , ita arcus FDE ad arcum DF , & consequenter BI ad BK , ut arcus FDE ad arcum DF .

Iterum ut AB ad AF , ita BI ad FL , & ut BA ad AD , id est AF ita BK ad DH (sunt enim triangula ABK ADH similia) ergo ut BI ad FL , ita BK ad DH , ergo permutando ut BI ad BK , ita FL ad DH . sed BI est ad BK , ut arcus FDE ad arcum DF , ergo etiam FL ad DH , ut arcus FDE ad DF , quod est absurdum; non igitur sunt æquales AD , AC , ex quo hoc absurdum consequebatur.

Sit secundo CA minor quam AD , non poterit angulus CDA esse rectus, cum enim latus DA sit maius ex suppositione quam CA , erit angulus DCA , maior angulo CDA , non erit igitur rectus CDA ; demissa sit perpendiculans BK in AD , quomodo cumque cadat; cum triangulum CBA , habeat basim AC minorem AD basi trianguli DBA , minor erit proportio trianguli CBA ad triangulum DBA , quam altitudinis BI ad BK , (si enim trianguli CBA basis esset æqualis, triangulum esset maius, haberetque eandem proportionem ad triangulum DBA , quam altitudo ad altitudinem) ergo minor proportio BC ad BD , quam BI ad BK , cum BC sit ad BD , ut triangulum ad triangulum, & consequenter ut arcus FDE ad DF , qui sunt ut BC ad BD ; sed FL est ad DH , ut BI ad BK , ut ostendimus, ergo minor proportio arcus FDE , ad arcum DF , quam linea FL ad DH , quod est absurdum; non igitur minor est CA quam AD , ex quo id consequebatur.


Dico secundo AC esse minorem AB .

Si hoc negetur erit vel æqualis vel maior.

Ponatur primo AC æqualis esse AB . Cum in triangulis CDA , BDA , bases AC , AB sint æquales, erunt altitudines DG , DH , ut triangula; sed etiam DC , DB sunt ut triangula, & arcus DE , DF in eadem quoque

B 2

propor-




a Clavius
de sinibus
Propos. 10.
demonstrat
de arcibus
& eorum
chordis
quod hic
in dimidiis
arcibus
& eorum
chordis si-
mitur.

b Clavius
ibid.

proportione; erit igitur ut $D G$ ad $D H$, ita arcus $D E$ ad arcum $D F$; & permutando ut $D G$ ad arcum $D E$, ita $D H$ ad arcum $D F$,^b quod est ab-

surdum; non igitur æquales erunt $A B$ & $A C$. è quo hoc inferebatur.

Ponatur secundo $A B$ minor $A C$, erit minor proportio trianguli $A B D$ ad triangulū $A D C$, quàm altitudinis $D H$ ad altitudinem $D G$, ergo & minor proportio $B D$ ad $D C$, & consequenter arcus $F D$ ad arcum $D E$, quàm lineæ $D H$ ad $D G$, & permutando minor proportio $D F$ arcus ad lineam $D H$, quàm arcus $D E$ ad lineam $D G$, quod est absur-



dum; non igitur maior est $A B$ quàm $A C$. ex quo id sequebatur.

Ergo si tres lineas ab vno puncto, &c. quod fuit demonstrandum.

PROPOSITIO XI. PROBLEMA II.

Duabus lineis indefinitis angulum quemuis comprehendentibus, eoque per alteram indefinitam utcumque diuiso, ab assignato puncto in alterutra extremarum lineam ducere, terminatam ad alteram extremarum, qua à media ita diuidatur, ut pars inter punctum datum & mediam intercepta, ad reliquam, datam habeat proportionem.

DVæ lineæ $A B$, $A C$, quemuis angulum comprehendant, eumque diuidat utcumque $A D$. & sit in alterutra extremarum puta $A B$, datum punctum E , dataque proportio F ad G .

Propositum est ducere $E I$, ut $E H$ ad $H I$, datam habeat proportionem F ad G .


Diui-

Diuidatur $E A$ in K , vt
 $E K$ ad $K A$ sit vt F ad G ,
 ducaturque $K L$ paral-
 lela $A C$, quæ secet $A D$
 in aliquo puncto H , &
 per E & H ducatur linea
 $E H I$.

Dico $E H$ ad $H I$ esse,
 vt F ad G .

Cùm enim in trian-
 gulo $A E I$, linea $K H$ sit
 parallela $A I$, erit $E H$ ad
 $H I$, vt $E K$ ad $K A$, id est
 vt F ad G , sic enim diuifi-
 mus $E A$ in K .

Igitur duabus lineis
 indefinitis, &c. quod fuit
 faciendum.




PROPOSITIO XII. THEOREMA X.

*Iisdem positis quæ superiori problemate construximus,
 non poterit ab eodem puncto alia duci linea, quæ similiter
 diuidatur.*

SI enim alia duci possit
 sit illa $E N$, diuisa in M ,
 vt F ad G , erit etiam $E M$
 ad $M N$, vt $E K$ ad $K A$, er-
 go $K M$ erit parallela $A C$,
 sed & $K H$ est parallela
 $A C$, ergo $K H$, $K M$, sunt
 inter se parallelæ, quod
 est absurdum cùm con-
 ueniant in K ; ergo non
 erit diuisa $E N$ similiter vt
 $E I$, vnde id sequebatur.

Igitur iisdem positis
 quæ superiori proble-
 mate, &c. quod oportuit
 demonstrare.




B 3

PRO-

PROPOSITIO XIII. PROBLEMA III.

Duabus lineis indefinitis quemuis angulum comprehendentibus, & illo utcumque per aliam rectam diuiso, per punctum in linea diuidente assignatum, lineam ducere, utrimque ad extremas terminatam, ut pars definita ad reliquam, datam habeat proportionem.



Lineæ AB, AC, quemuis angulum comprehendant, quem diuidat utcumque AD, in qua assignatum sit punctum E.

Propositum est per E ducere lineam HI, ita ut EH ad HI datam habeat proportionem F ad G.

Ab E versus AB ducatur linea EK, parallela AC, & fiat ut G ad F ita AK ad KH, & ducatur per H & E linea IEH;

Dico EH esse ad EI, ut F ad G.

Cum enim in triangulo AIH, linea KE sit parallela AC, erit AK ad KI, ut EH ad EI, id est ut F ad G. sic enim fecimus AK ad KI.

Ergo duabus lineis indefinitis, &c. quod facere oportuit.

PROPOSITIO XIV. THEOREMA XI.


Iisdem positis qua in precedenti problemate construximus, non poterit per idem punctum alia duci linea, qua similiter positis partibus, similiter diuidatur.

Si enim alia duci possit, sit illa MN, per E transiens, & in E diuisa, ut EM sit ad EN, ut F ad G.

Cum

Cum in triangulo ANM, linea KE fit parallela AM, erit vt ME ad EN, ita AK ad KN; sed etiam ita est AK ad KI, quod fieri nequit, cum maior fit proportio AK ad KN, quam ad KI.

Ergo iisdem positis quæ in præcedenti, &c. quod fuit demonstrandum.




PROPOSITIO XV. THEOREMA XII.

Si quotcumque magnitudinum grauitatis centra in eadem recta linea posita fuerint, magnitudinis ex omnibus composita grauitatis centrum, erit in eadem linea recta.

Sint quotcumque magnitudines A, B, C, D, E, earumque cætra grauitatis per easdem litteras signata, in eadem linea rectè posita.

Dico commune grauitatis centrum in eadem recta reperiri.


Si enim fieri possit, sit extra lineam in F, & per primæ magnitudinis centrum A, & F ducatur AFG, erit in illa centrum grauitatis reliquarum magni-



a 8. primi Archimede de æquiponderantibus.

BIBLIOTEC
DEL
OBSERVATORIO DE S. MARINO

tudi-



b 8. primi
Archim.
de aequip.

c 1. postu-
latum Lu-
ca Valerij
de centro
gravit.


tudinum demptâ A, tamquam vnius, & reliquę partis, ultra punctum F in H. quod etiam erit extra lineam singularum centra continentem. Ducatur iterum per secundę magnitudinis centrum B, & punctum H, linea BHI; cum H fit centrum totius reliquę compositę ex B, C, D, E, & B centrum partis, berit in BI centrum reliquę compositę ex CDE, ultra punctum H in K.

atque ita semper progrediendo, donec ad vltimam peruentum fuerit, reperietur centrum vltimę magnitudinis E, in puncto aliquo O, extra lineam per singularum centra transeuntem, sed etiam E est centrum gravitatis vltimę magnitudinis, ergo duo habebit centra gravitatis, quod fieri nequit. Non erit itaque commune gravitatis centrum, extra lineam per omnium centra transeuntem, ex quo id impossibile sequitur.

Quapropter si quotcumque magnitudinum, &c. quod fuit ostendendum.

PROPOSITIO XVI. THEOREMA XIII.

Si quotcumque magnitudinum gravitatis centra in eadem recta linea posita fuerint, magnitudinis ex omnibus compositę gravitatis centrum, erit in eadem linea, intra centra extremarum magnitudinum.



Sint quotcumque magnitudines A, B, C, D, earumq; gravita-

uitatis centra, per easdem litteras signata, sint in eadē linea recta A B.

Dico centrum grauitatis commune, intra centra A D extremarum magnitudinum, in eadem linea recta reperiri.

Si enim non fit intra centra extremarum magnitudinum, cūm necessariò fit in linea A B, erit in illa producta; fit verò punctum E, nec refert versus quam partem.

Cūm centrum totius sit E, & vnius partis puta proximæ sit D, centrum reliquæ, id est magnitudinis compositæ ex C, B, A, a erit vltra B in F. Similiter sumpta magnitudine ex A, B, C, composita, cūm eius centrum sit F, extra centra extremarum A, C, constitutum, proximæ verò partis centrum sit C, b erit centrum reliquæ vltra F in aliquo puncto G, ac tandem reperietur centrum vltimæ magnitudinis in H, sed illius centrum erat A, ergo duo habebit centra grauitatis, c quod est absurdum: non erit itaque commune centrum totius compositæ magnitudinis, extra centra extremarum, ex quo id sequitur:

a 8. primi Archim. de aequip.

b 8. primi Archim. de aequip.

c i. postulatum Luca Valerij de centro grauit.

Ideo si quotcumque magnitudinum, &c. quod ostendere proposuimus.


PROPOSITIO XVII. THEOREMA XIV.

Si segmento circuli vel ellipsis inscripta fuerit figura quacumque rectilinea, reliquorum segmentorum, demptâ figura rectilinea, commune grauitatis centrum, erit intra segmentum propositum.

Segmento A C E inscripta sit quæcumque figura rectilinea A B C D E.

Dico commune grauitatis centrum, magnitudinis compositæ ex residuis segmentis A B, B C, C D, D E, esse intra segmentum A C E.

Centra grauitatis singulorum segmentorum residuorum, sint ex ordine puncta F, G, H, I, quæ singula erunt intra sua segmenta, a cūm sint figuræ habentes ambitum in easdem partes cauum. Si commune centrum sit extra segmentum A D E, vel in am-




a 9. petitiõ Archim. de aequipond.



bitu figuræ, fit quotcumque punctum K . & à puncto F centro primi segmenti residui, ducatur $F K L$. cum K sit centrum totius, & F centrum partis, ^b centrum reliquæ erit in $F L$, ultra K in aliquo puncto M , & consequenter extra segmentum $A C E$. Similiter cum commune centrum magnitudinis compositæ ex residuis $B C$, $C D$, $D E$, fit extra segmentum $A C E$ in M , ducta $G M N$, ex G centro partis, centrum reliquæ erit in $G N$, ultra M ; atque ita progrediendo reperiemus centrum ultimi segmenti residui $D E$ in Q , extra segmentum $A D E$, & consequenter extra ipsum segmentum $D E$, quod est absurdum; non erit ergo centrum magnitudinis compositæ extra segmentum, vel in ambitu unde id sequitur.


b 8. primi
Archim.
de aequi-
pond.



Igitur si segmento circuli vel ellipsis, &c. quod fuit demonstrandum.

PROPOSITIO XVIII. THEOREMA XV.

Si segmento circuli vel ellipsis figura evidenter inscribatur, eius gravitatis centrum erit in diametro segmenti.




Si segmento circuli vel ellipsis $A B C$, diameter $B D$, figura evidenter inscripta $A E F G B H I K C$.

Dico centrum gravitatis eius esse in linea $B D$.

Coniungantur anguli figuræ lineis $E K$, $F I$, $G H$.

Quoniam Trapezij $A E K C$ latera $A C$, $E K$, sunt parallela, bifariamque

riamque secantur in
 D & L, ^a centrum gra-
 uitatis ipsius est in LD,
 quæ est pars BD; ea-
 dem ratione cen-
 trum grauitatis Tra-
 pezij E F I K est in ML,
 id est BD, & Trapezij
 F G H I in NM id est
 BD, ad hæc quoque
 trianguli G B H cen-
 trum grauitatis est in
 BN, ^b ergo centrum
 grauitatis figuræ in-



atq. primi
 Archime-
 dis de equi-
 ponder.

bis. huius.

scriptæ, seu omnium partium simul sumptarum est in BD.
 Igitur si segmento circuli, &c. quod fuit probandum.


PROPOSITIO XIX. THEOREMA XVI.

Cuiuscumque segmenti circuli vel ellipsis grauitatis centrum est in diametro segmenti.

PRimò segmentum circuli vel ellipsis sit ABC, semicirculo vel semi-
 ellipsi non maius, diameter eius BD.

Dico centrum grauitatis ipsius esse in BD.


Si enim non sit, esto punctum E & per ipsum ducatur EF, lineæ BD
 parallela, & inscribatur segmento triangulum ABC, eandem basim
 & altitudinem habens cum se-
 gmento, & quam proportio-
 nem habet CF ad DF, hanc ha-
 beat triangulum ABC ad spa-
 tium K; inscribatur euidenter
 segmento figura rectilinea, ita
 vt quæ residua erunt segmenta
 simul sumpta, minora sint spa-
 tio K; figuræ inscriptæ grauita-
 tis centrum est in BD, sit igitur



H, & iungatur HE, & producat, & ducatur CL æquidistans ipsi BD,
 constat autem quod maiorem habeat proportionem figura segmen-
 to



to inscripta ad ea quæ reliqua sunt segmenta, quàm $A B C$ triangulum ad spatium K , quod eam habet quam $C F$ ad $D F$, figura igitur inscripta ad portiones relictas maiorem habet proportionem, quàm $C F$ ad $F D$, hoc est $E L$ ad $E H$. habeat itaque $M E$ ad $E H$ eam proportionem quam rectilinea figura ad portiones, quoniam igitur E est centrum totius segmenti, figuræ verò inscriptæ centrum H ,^a constat




a 8. primi
Archim.
de æqui-
ponder.

b 17. huius.

quod magnitudinis compositæ ex residuis segmentis centrum grauitatis sit in parte $H B$ producta, quæ eam ad $H E$ proportionem habeat, quam figura inscripta ad residua segmenta, quæ sit $E M$, erit igitur M centrum grauitatis magnitudinis compositæ ex residuis segmentis, extra segmentum, b quod fieri nequit, non est igitur centrum grauitatis segmenti circuli aut ellipsis, semicirculo aut semiellipsi non maioris, extra lineam $B D$ ex quo id sequitur.

Sit secundò segmentum circuli vel ellipsis $A B C$, semicirculo vel semiellipsi maius, compleatur figura & diameter producatur in F , ducatur etiam per centrum figuræ E linea $G H$, parallela $C A$ basi segmenti, totius figuræ $G F H$ centrum grauitatis erit in $E F$ per ea quæ iam diximus, sed & partis $C F A$, erit in $D F$,^c ergo & residui $G C A H$ erit in $E D$, cum $D F$ $E D$ sint partes eiusdem lineæ $E F$; iterum centrum figuræ $G B H$ est in $B E$ per iam dicta & centrum figuræ $G C A H$, est in $E D$,




c 8. primi
Archim.
de æqui-
ponder.

sed

sed BE ED componunt eandem rectam, ^d ergo centrum totius segmenti CBA erit in BD .

Igitur cuiuscumque segmenti circuli vel ellipsis, &c. quod fuit demonstrandum.



dis. huius.

PROPOSITIO XX. THEOREMA XVII.




Cuiuscumque Sectoris circuli gravitatis centrum, est in linea qua illum ex centro bifariam secat.

Sit primò Sector circuli ABC semicirculo minor, eumque linea BD ex centro B bifariam secet.

Dico centrū gravitatis ipsius esse in BD .

Cum enim linea BD angulum Sectoris bifariam secet, lineam quoque AC & arcum ADC bifariam secabit; itaque cum AD bifariam secet basim trianguli BAC , ^a erit in ea centrum gravitatis trianguli, item cum bifariam secet arcum segmenti ADC , eiusque basim AC , ^b erit in ea centrū gravitatis segmenti, ^c ergo in BD centrum gravitatis ex utraque magnitudine compositi id est Sectoris, quod quoque intra Sectorem cadet.

Sit secundò semicirculus vel semicirculo maior $ABCD$, eumque linea BD ex centro bifariam secet, in duos Sectores $ABDE$, $CBDF$, erunt illi necessario semicirculo minores, diuidantur illi iterum bifariam per semidiametros BE , BF , centra gravitatis eorum erunt in illis semidiametris vt diximus, sintque G & H , propter æqualita-



a 13. primi Archim. de equip.

b 19. huius c 15. huius.

C 3

BIBLIOTECA DEL tem


INSTITUTO DE J. VILLANOV

tem & similitudinem Sectorum, erunt $B G$, $B H$ æquales, & $G H$ bifariam diuidetur à $B D$ in I , & ob Sectorum æqualitatem, centrum commune seu totius Sectoris erit I , & consequenter in $B D$, Sectorem bifariam secante.

Ergo cuiuscumque Sectoris circuli, &c. quod fuit ostendendum.

PROPOSITIO XXI. THEOREMA XVIII.

Si segmento circuli vel ellipsis figura euidenter inscribatur, magnitudinis ex residuis segmentis compositæ gravitatis centrum, erit in segmenti diametro.




Si segmentum circuli vel ellipsis $A B C$, figura euidenter inscripta $A E B F C$, diameter segmenti $B D$.

Dico centrum gravitatis magnitudinis compositæ ex residuis segmentis $A E$, $E B$, $B F$, $F C$ esse in linea $B D$.

^a Cùm enim in $B D$ sit centrum gravitatis totius segmenti, ^b item & figuræ euidenter inscriptæ, ^c erit in illa centrum residui, id est magnitudinis ex reliquis segmentis compositæ.

Ideo si segmento circuli vel ellipsis, &c. quod oportuit demonstrare.



a19. huius.

b18. huius.

c 8. primi
Archim.
de aquip.

PROPOSITIO XXII. THEOREMA XIX.

Si Sectori circuli rectilinea figura fuerit euidenter inscripta, centrum gravitatis figuræ inscriptæ, erit in recta Sectorem bifariam secante.

Sector

Sector circuli sit $ABCD$, figura
evidenter inscripta $AEDFCB$,
linea Sectorē bipartito secans BD .

Dico centrum grauitatis figu-
ræ rectilineæ, quæ Sectori eui-
denter inscripta est, esse in linea
 BD .

^aCùm enim totius Sectoris gra-
uitatis centrum sit in linea BD ,
^bitem & partis illius, quæ ex resi-
duis segmentis componitur, ^cerit
& reliquæ partis, id est figuræ re-
ctilineæ, Sectori evidenter inscri-
ptæ grauitatis centrū in linea BD .


Quapropter si Sectori circuli, &c. quod fuit demonstrandum.

PROPOSITIO XXIII. PROBLEMA IV.

*Figuræ rectilineæ Sectori circuli evidenter inscripta, gra-
uitatis centrum inuenire.*

Sector circuli sit $ABCD$, &
figuræ rectilineæ illi eui-
denter inscriptæ grauitatis
centrum inueniendū esto.


Cùm hæc figura ex trian-
gulis isoscelibus compona-
tur, sumatur vnum extre-
morum triangulorum puta
 BFC , & Sector illi respon-
dens $BFGC$, diuidatur bifaria-
m à linea BG ; reliquum
Sectorum cum inscripto sibi
rectilineo bifariam secet
 BH , totum verò Sectorum
cum inscripto sibi rectilineo
bifariam diuidat BD . ^aTri-
anguli BFC repertum sit
grauitatis cētrum K , ^bè pun-
cto K ducatur KM , terminata
ad BH , quæ ita diuidatur à
 BD in L , vt reciprocè ML ad
 LK sit, vt triangulum BFC ad



a20. huius

b17. huius


c8. primi
Archim.
de aqip.



^a per 14.
primi Ar-
chim. de
aquipon-
derant.
^b per 11.
huius.

reliquam





c 8. primi
Archim.
de equi-
ponder.

d 12. huius

reliquam partem figurę eui-
denter inscriptę, proportio
autem facile ex numero tri-
angulorum colligetur.

Dico punctum L esse cen-
trum grauitatis figurę recti-
lineę, Sectori euidenter in-
scriptę.

Si enim non sit, esto quod-
uis aliud punctum N, in linea
BD, ducaturque KN O.

Cum K sit centrum vnus
partis, seu trianguli BFC,
centrum verò totius sit N,
& centrum reliquę partis erit
O, (est enim in linea KN pro-
ducta & in linea BH) erit igitur
ON ad NK, vt triangu-
lum BFC ad reliquam figurę
inscriptę partem, sed ita
quoque est ML ad LK, quod
tamen fieri nequit, vt nimi-

rum KM & KO in L & N similiter diuidantur, igitur punctum diuer-
sum à puncto L, non est centrum grauitatis figurę Sectori euidenter
inscriptę, ex quo absurdum hoc sequitur.

Ergo figurę rectilineę, &c. centrum grauitatis inuenimus quod fuit
faciendum.

PROPOSITIO XXIV. THEOREMA XX.

*Cuiuscumque Sectoris grauitatis centrum, minus distat
à circumferentia, quam trianguli à lateribus Sectoris &
subtensa arcus comprehensi.*

Sit circuli Sector ABCD, triangulum verò BAC.


Dico centrum grauitatis Sectoris cadere supra centrum graui-
tatis trianguli.

Sit enim E centrum grauitatis segmenti ADC, centrum verò graui-
tatis trianguli F, cadet E supra F versus circumferentiam, cum E sit in-
tra

a 9. petit.
Archim.
de equip.

tra segmentum, b F verò intra triangulum, at centrum grauitatis totius, id est Sectoris, c cadit intra centra grauitatis partium, sitque punctum G , constat punctum G cadere vltra punctum F , & vicinius esse arcui $A D C$.

Igitur cuiuscumque Sectoris grauitatis centrum, &c. quod fuit ostendendum.




b14. primi
Archim.
de equi-
ponder.
c16. huius.

PROPOSITIO XXV. THEOREMA XXI.

Si datum fuerit centrum grauitatis Sectoris circuli, qui deinde in duos Sectores utcumque diuisus fuerit, & ipsi quoque Sectores per lineas è centro ductas iterum bifariam diuidantur; si ducatur linea per centrum grauitatis totius Sectoris, vtrunque terminata ad eas lineas, qua alios Sectores bifariam secant, hac lege, vt diuisa ad centrum grauitatis totius Sectoris, pars ad partem reciprocam habeat proportionem Sectoris ad Sectorem, extrema linea puncta erunt centra grauitatis partium.

Datus circuli Sector sit $A B C D$, diuisus à linea $B D$, in duos Sectores $A B D G$, $D B C F$, quos etiam bifariam secent lineæ $B G$, $B F$; in linea verò $B E$, totum Sectorem bifecante sit H , centrum grauitatis totius Sectoris, & per H ducta sit linea $I H K$, vtrunque terminata in I & K , hac lege, vt sit reciprocè quemadmodum angulus $G B E$, ad $E B F$, ita $I H$ ad $H K$.


Dico puncta I & K esse cen-



D

tra





a 8. primi
Archim.
de equip.
c. 20. hu-
ius.


b 14. huius

tra grauitatis suorum Sectorum.
Si enim non sint, alterutrius Sectoris centrum erit diuersum ab illis punctis; sit ergo Sectoris $ABDG$ centrum grauitatis L , & per puncta LH , id est centrum vnus partis & totius, ducatur linea, quæ occurrat BF in M , (occurreret autem alioquin Sector DBC nullum haberet grauitatis centrum, a cum debeat esse in illarum B linearum concursu) erit M centrum grauitatis reliqui, ac proinde erit reciprocè vt Sector $ABDG$ ad Sectorem DBC , ita MH ad HL ; sed vt Sectors ita etiam se habent ipsorum anguli DBA, DBC , eorumque dimidij DBG, DBE , & vt angulus DBG ad DBE , ita IH ad IK , ergo etiam MH ad HL , vt IH ad IK ,^b quod ostendimus fieri non posse; non igitur aliud punctum fuit centrum grauitatis alterutrius Sectoris, ex quo absurdum sequitur.

Quamobrem si datum fuerit, &c. quod demonstrare volumus.

PROPOSITIO XXVI. THEOREMA XXII.

Si Sectori circuli figura rectilinea euidenter fuerit inscripta, centrum grauitatis ipsius cadet infra centrum grauitatis Sectoris.



SIt Sector circuli $ABCD$, illique euidenter inscripta sit figura $AEDFCB$.

Dico centrum grauitatis figuræ inscriptæ, cadere infra centrum grauitatis Sectoris.

Si hoc non fiat, vel cum illo coincidat, vel cadet supra.

Ponatur primùm coincidere, & sit G centrum gra-

uitatis tum Sectoris tum figuræ inscriptæ, sumatur vnum triangulorum extremorum FBC , eiusque angulus ad centrum bifariam secetur à BI ,

à BI ,

à $B I$, reliqua etiam figuræ pars, dempto triangulo $F B C$, bisecetur à linea $B K$, & a per G ducatur $L M$, terminata ad lineas $B I$ $B K$, quæ diuidatur ad G , vt recprocè sit $L G$ ad $G M$, vt Sector $B C I F$ ad Sectorem $B A K F$, erit etiam vt patet $L G$ ad $G M$, vt triangulum $B F C$, ad reliquam partem figuræ euidenter inscriptæ, & etiam vt angulus $K B D$ ad $D B I$, vt sæpius iam ostensum est. ^{a 13. huius.} Eruntque puncta L, M , centra grauitatis Sectorum $A B F K$, $B C I F$, eodemque discursu quo id supra de Sectoribus ostendimus, etiam demonstrabitur L esse centrum figuræ euidenter inscriptæ Sectori $B A K F$, & M esse centrum grauitatis trianguli $B F C$, igitur idem punctum M est centrum grauitatis trianguli $B F C$, & Sectoris $B C I F$, ^{b 25. huius} quod est absurdum; non igitur punctum G est centrum Sectoris & figuræ euidenter inscriptæ vnde hoc sequitur. ^{c 24. huius}

Cadat secundo centrum grauitatis figuræ inscriptæ in H , supra G centrum Sectoris, & per H ducatur $N O$, parallela $L M$, erit $N H$ ad $H O$, vt $L G$ ad $G M$, id est recprocè vt triangulum $B F C$ ad reliquum figuræ inscriptæ dempto triangulo, cum igitur H sit centrum grauitatis totius figuræ inscriptæ, constat N & O esse centra partiũ, igitur O est centrum grauitatis trianguli $B F C$, caditque supra M centrum grauitatis Sectoris $B C I F$, ^{d 24. huius} quod fieri nequit, ergo centrũ grauitatis figuræ inscriptæ, non cadit supra G centrum Sectoris, ex quo absurdum illud consequitur.

Ideo cum centrum grauitatis figuræ inscriptæ, non coincidat cum centro grauitatis Sectoris, nec cadat supra, necesse erit cadere infra.

Ergo si Sectori circuli, &c. quod fuit demonstrandum.


PROPOSITIO XXVII. THEOREMA XXIII.


Possibile est Sectori circuli figuram euidenter inscribere, vt centrum grauitatis figuræ inscriptæ, minus distet à centro grauitatis Sectoris, quolibet intervallo dato.

Si Sector $A B C D$, centrum grauitatis eius E , intervallo datum $E F$, infra F ; cadit enim centrum figuræ inscriptæ infra centrum Sectoris.

Dico Sectori inscribi posse euidenter figuram rectilineam, cuius centrum grauitatis minus distet ab E , quam punctum F .

Sumatur aliquod spatium G , ad quod Sector maiorem habeat proportionem quam





DF ad EF, & Sectori figura euidenter inscribatur, donec spatium ex residuis segmentis demptâ inscriptâ figurâ compositum, sit minus spatium G, constat verò id fieri posse.

Dico centrum grauitatis illius figuræ euidenter inscriptæ, cadere supra punctum F.

Si non cadat supra F, vel cadet in ipsum F, vel infra.

Ponamus primùm coincidere cum F; cùm E sit

centrum totius, & F partis seu figuræ inscriptæ, erit centrum reliquæ partis id est magnitudinis ex residuis segmentis compositæ in FE, producta versus E, in eoque puncto puta H, vt FE ad EH sit, vt residuum ex segmentis ad inscriptam figuram; quare etiam erit componendo vt HF ad FE, ita totus Sector ad residuum ex segmentis; cùm verò illud residuum sit minus spatium G, erit maior proportio Sectoris ad residuum, quam Sectoris ad spatium G, ideoque maior proportio HF ad FE, quæ est vt Sector ad residuum, quam DF ad FE, quæ est vt Sector ad spatium G. maior ergo erit HF quàm DF, ergo H centrum grauitatis segmentorum residuorum, cadit extra arcum, & consequenter extra segmentum ADC, ^a quod fieri nequit; ergo centrum grauitatis inscriptæ figuræ non coincidit cum F, ex quo absurdum sequitur.

a17. huius

Cadat secundò centrum grauitatis infra F in I. Cùm E sit centrum grauitatis totius id est Sectoris, & I centrum grauitatis figuræ inscriptæ, centrum reliqui sit H; vt prius, erit maior proportio Sectoris ad residuum ex segmentis compositum, quam DF ad DE, ergo quoque diuidendo maior proportio figuræ inscriptæ, id est Sectoris demptis residuis segmentis, ad residua segmenta, quàm DE ad EF, multoque maior quàm DE ad EI; sed vt inscripta figura ad residua segmenta, ita HE ad EI, ergo maior proportio HE ad EI, quàm DE ad EI, ergo HE maior quàm DE, ergo H cadit extra Sectorem, centrum nimirum grauitatis residuorum segmentorum, ergo extra segmentum ADC, ^b quod fieri nequit; ergo nec inscriptæ figuræ centrum grauitatis cadit infra F, ex quo id impossibile sequitur.

b17. huius

c20. huius

Cùm ergo inscriptæ figuræ centrum, ^c quod necessariò cadit infra E Sectoris centrum, nec coincidat cum F, nec cadat infra F, cadet intra spatium

spatium FE , eritque vicinius centro Sectoris, quam sit datum spatium FE .


Itaque possibile est Sectori circuli, &c. quod oportuit demonstrare.

PROPOSITIO XXVIII. THEOREMA XXIV.

Omnis figura rectilinea, Sectori evidenter inscripta gravitatis centrum, minus abest à centro circuli, duabus tertiis semidiametri partibus.

Si circuli Sector $ABCD$, figura rectilinea evidenter inscripta $AEDFCB$.

Dico centrum gravitatis figuræ inscriptæ, minus abesse à centro B , duabus tertiis semidiametri BD .



Sumatur enim triangulum BFC , & ex centro gravitatis ipsius G , inveniatur centrum gravitatis totius figuræ evidenter inscriptæ, quod sit H , & consequenter reliquæ partis dempto triangulo centrum erit I ; lineâ BCK bisecante angulum trianguli BFC , & lineâ BHD , bisecante angulum totius figuræ inscriptæ, lineâ denique BI , bisecante reliquam figuræ partem, dempto triangulo BFC . erit itaque I ad HG , ut triangulum BFC ad reliquam figuræ inscriptæ partem, & consequenter ut angulus FBC ad angulum FBA , & iterum ut eorum dimidij, id est FBK ad $FB L$, quibus cum sint æquales LBD , DBK , constat verò angulum LBD esse minorem angulo DBK (nisi figura inscripta duobus tantum constet triangulis de quo statim) ^a ergo BH minor erit BI , & BI ^{a 10. huius} minor BG , multo ergo minor erit BH quàm BG , sed BG minor est duabus tertiis semidiametri partibus, cum sit subsesquialtera BM , quæ semidiametro minor est, ergo & BH minor erit duabus tertiis semidiametri, quæ est intervallum seu distantia H , centri gravitatis figuræ inscriptæ à centro B .

Si verò figura inscripta duobus tantum constet triangulis, cum illa sint æqualia, erunt etiam BG , BI æquales, & angulus IBH æqualis HBC , & BH perpendicularis ad IG , ideoque minor BG , quæ minor est duabus tertiis semidiametri partibus, ergo & ipsa BH .

Quare omnis figuræ rectilineæ, &c. quod fuit ostendendum.


D 3

PRO-



PROPOSITIO XXIX. THEOREMA XXV.

Nullius Sectoris circuli gravitatis centrum, abest à centro circuli, intervallo quod excedat duas tertias semidiametri.



a 27. huius

b 28. huius

SIt Sector circuli $A B C D$.
Dico centrum gravitatis ipsius, non abesse à centro B , intervallo quod superet duas tertias semidiametri $B D$.

Si enim fieri possit, sint $B F$ duæ tertix semidiametri, & E centrum gravitatis Sectoris, a possibile est Sectori figuram rectilineam euidenter inscribere, cuius centrum gravitatis minus distet à centro gravitatis Sectoris, dato intervallo $F E$, & consequenter magis absit à centro B , intervallo $B F$, id est duabus tertis semidiametri partibus, quod fieri nequit; ergo nec cen-

trum Sectoris potest à centro circuli abesse maiori intervallo, quam duarum tertiarum semidiametri, ex quo impossibile illud sequitur.

Igitur nullius Sectoris circuli, & c. quod fuit demonstrandum.

PROPOSITIO XXX. THEOREMA XXVI.

Omnis Sectoris circuli gravitatis centrum, minus distat à centro sui circuli, duabus tertis semidiametri partibus.

SIt Sector circuli $A B C D$.


Dico centrum gravitatis ipsius minus abesse à centro circuli B , duabus tertis semidiametri $B D$.

Si enim non absit minus, cum magis etiam abesse non possit, poterit abesse duabus tertis semidiametri partibus. Sit igitur E , & $B E$ duæ tertix semidiametri; a cum $B D$ Sectorem bifariam fecet, ducantur etiam $B F$ $B G$, quæ æquales partes bipartitò diuidant, ducaturque $H I$

m 0. huius

per

per E, perpendicularis ad BD, quæ lineis BF, BG occurrat in I & H, erunt H & I centra grauitatis partium, b nulla enim alia linea per E, bifariam diuidetur in E, terminata ad BF, BG; c cum centra grauitatis partium ob earum æqualitatem debeant esse in linea per E bifariam secta, ergo H erit centrum grauitatis partis seu sectoris ABD, sed BH maior est BE, quæ est duarum tertiarum semidiametri, ergo centrum grauitatis Sectoris ABD, abest amplius duabus semidiametri partibus, d quod fieri non potest; impossibile igitur erit centrum grauitatis totius, abesse duabus tertiis semidiametri partibus, ex quo consequitur.



b14. huius

c20. huius
e 25. huius.

d29. huius

Ergo omnis Sectoris grauitatis centrū, &c. quod fuit ostendendum.


PROPOSITIO XXXI. PROBLEMA V.

A dato quolibet circulo auferre Sectorem, cuius centrum grauitatis magis distet à centro circuli, quolibet interuallo dato, quod minus sit duabus tertiis semidiametri partibus.

Datus fit circulus ABC, cuius centum B, & data linea E, minor duabus tertiis partibus semidiametri.


Propositum sit auferre Sectorem, cuius centrum grauitatis magis distet à centro circuli B, dato interuallo E.

Cum E sit minor subfesquialtera semidiametri dati circuli, à ducta qualibet semidiametro BD, auferatur BF sesquialtera lineæ E, erit enim BF minor BD, per F ducatur GH, perpendicularis BD, se-



cans





a 9. petitiō
Archim.
de equip.
b16. huius.

cans circulum in G & H , ducanturque BG , BH .

Dico $GBHD$ esse Sectorem qui postulatur.

Sumatur in linea BD , quæ Sectorem bifariam diuidet vt constat, linea BI æqualis E , erit I centrum grauitatis trianguli BGH , cùm BI sint duæ tertiæ BF , sumatur quoque punctum K esse centrum grauitatis segmenti GDH , a quod erit intra DF , cùm I & K sint centra partium,^b centrum totius erit intra IK , puta punctum L , quod magis distat à

puncto B , interuallo BI , id est lineæ E .

Igitur à dato circulo, &c. quod fuit faciendum.

PROPOSITIO XXXII. THEOREMA XXVII.

Si quolibet Sectore circuli bifariam secto, à latere eius velut basi descriptum fuerit triangulum, dimidio Sectori æquale, communem cum Sectore eum habens angulum, qui ad centrum circuli est, deinde à vertice trianguli ad basim producta linea quæ simile priori triangulum constituat, centroq; Sectoris alius describatur Sector, eiusdem anguli cum dato Sectore, cuius latus sit sesquialterum eius lineæ, quæ inter centrum circuli & concursum lineæ à vertice ductæ ad productam basim, interiicitur; trianguli vertex erit centrum grauitatis Sectoris postremo descripti.

SEctor circuli sit $BADC$, bifariam sectus à linea BD , descriptumque triangulum AEB , æquale dimidio dicti Sectoris ADB , & sit vt AB ad BE , ita BE ad BF , ducaturque EF ; seu ducatur EF , vt triangulum BEF , sit simile triangulo BEA ; sumatur deinde BG sesquialtera BF , & centro B interuallo BG , describatur Sector $BGIH$.

Dico


Dico punctum E esse centrum grauitatis Sectoris $BHKI$.

Si enim non fit; cum fit in linea BK , cadet supra vel infra punctum E .

Cadat Primum supra E in K , & fiat vt BK ad BI , ita BE ad BL , & centro B interuallo BL describatur Sector BLM ,^a erit E centrum grauitatis Sectoris BLM , cum Sectors BLM & $BGIH$ sint figuræ similes, & puncta E & K in vtroque similiter ponantur, sitq; punctum K , ex hypothefi centrum grauitatis Sectoris $BGIH$.

^a 7. petie.
Archim.
primi de
aquipond.

Diuidatur BL in N , vt BL fit sesquialtera BN , & iuxta ea quæ Propositione nona ostensa sunt, ducta sit BO , vt deinde ducta EB , diuidatur ad BO in Q hac ratione, vt fit PQ ad QE , vt angulus PBQ ad angulum QBE , & duabus lineis QB, BE , sumptâ tertiâ proportionali BR , excedat linea



BF lineam BR minori interuallo, quam FN , quo BF superat BN , & consequenter fit maior quàm BN , sumatur quoque angulus LBS duplus anguli LBO , & angulus TBV æqualis angulo LBO , & per puncta R & E ducatur linea quæ occurrat BV in X .

Cum lineæ QB, BE, BR sint tres continuæ proportionales ex constructione, erunt triangula BER, BEO similia, & anguli BER, BEO æquales, ergo etiam anguli deinceps, id est BEX, BOP æquales erunt, ergo & triangula BEX, BPO similia erunt, cum præter angulos BEX, BPO etiam angulos EBX, QBP æquales habeant, quare in triangulis BOP, BEX erit sicut PQ ad QB , ita EX ad EB , similiter etiam in triangulis BQE, BRE , erit sicut BQ ad QE , ita BE ad ER , sed PQ est ad QE vt angulus BPO ad QBE , id est angulus LBO ad OBT , ergo etiam XE erit ad ER , vt angulus LBO ad angulum OBT , ergo etiam vt angulus LBS , qui est duplus anguli LBO , ad angulum SBM , qui est duplus anguli OBT , ergo erit XE ad ER reciprocè, vt Sector LBS ad Sectorem SBM , quia Sectors habent eandem proportionem quam anguli; cum verò E sit centrum grauitatis totius Sectoris BLM , & BO bifariam secet Sectorem LBS , & BN Sectorem SBM , partes totius Sectoris, & linea RX per E ducta, & vtriusque terminata ad BO, BN diuidatur ad punctum E , in recipro-

E

cam



OBT , & angulus TBV ad angulum TBO , vt iam ostendimus.

Fiat deinde vt BR ad BE , ita BE ad BQ ; ducatur EQ , & producatuſque in P , ducatur item AQ ; ſimilia erunt triangula REB , EQB , & anguli REB , EQB æquales, ergo & in triangulis BEX , BQP anguli BEX , BQP qui prioribus ſunt deinceps, æquales erunt, ergo & triangula BEX , BQP ſimilia vt ante ostendimus, eritque vt EX ad EB , ita PQ ad QB , & vt EB ad ER , ita QB ad QE , ergo ex æqualitate vt EX ad ER , ita PQ ad QE ; ſed EX ad ER , vt angulus ABQ ad QBE , hoc eſt vt angulus LBO ad angulum OBT , ergo triangulum AQB æquale Sectori BAY , ergo BQ maior BA ; ſed EB eſt media proportionalis inter BQ , BR ; item inter BA , BF , ergo reſtangulum ſub BF , BA , æquale eſt reſtangulo ſub BR , BQ , ergo erit vt BF ad BR , ita BQ ad BA , ſed BE eſt minor BF ex conſtructione, ergo erit BQ minor BA , ergo BQ ſimul erit maior & minor BA , quod fieri nequit; non cadet igitur centrum grauitatis Sectoris $BGIH$ infra E , ex quo abſurdum conſequitur; ſed oſtenſum eſt etiam non cadere ſupra E , ergo erit ipſum punctum E , centrum grauitatis Sectoris $BGIH$.

Igitur ſi quolibet Sectori circuli, &c. quod fuit demonſtrandum.


PROPOSITIO XXXIII. THEOREMA XXVIII.

Si quolibet Sectori circuli à centro bifariam diuiſo, ducta fuerit perpendicularis in lineam biſecantem, à puncto lateris quod duabus tertiis partibus ſemidiametri abſit à centro circuli, & fiat vt dimidius Sectoris arcus ad ſemidiametrum, ita perpendicularis ducta ad quartam quamdam lineam, è centro circuli in linea biſecante ſumendam, eius terminus eſt centrum grauitatis Sectoris propoſiti.

Si datus Sector ABC , ſectus bifariam à ſemidiametro DB , & latere AB diuiſo in E , vt AB ſit ſeſquialtera BE , ducta ſit EF perpendicularis lineæ DB , & ponatur eſſe vt arcus DA ad ſemidiametrum AB , ita EF ad BC .

Dico punctum G eſſe centrum grauitatis Sectoris propoſiti.


Fiat enim vt BE ad BC , ita EG ad BK , ducanturque GE GK ; item centro B , interuallo BG ,



Dico E esse centrum grauitatis Sectoris propositi.

Diuidatur enim AB in F, vt sit AB sesquialtera FB, & ducatur FH parallela AC.

Cum BF sit subsesquialtera BA, & sit vt BF ad BA, ita FH ad AC, erit quoque FH duarum tertiarum AC, quare erit vt arcus ADC ad FH, ita AB ad BE, & vt DA dimidium arcus ADC, ad FG dimidiam FH, ita AB ad BE, ergo conuertendo vt arcus AD ad rectam AB, ita FG perpendicularis lineæ BD, ad lineam BE; cum igitur AB sit sesquialtera FB, per præcedentem^a constabit E esse centrum grauitatis Sectoris propositi.



233. huius.


Igitur dato quolibet Sectore circuli, &c. quod fuit ostendendum.

PROPOSITIO XXXV. THEOREMA XXX.

Si datum fuerit quodlibet segmentum circuli semicirculo minus, ductisque semidiametris quæ segmenti arcui insunt; inuentis deinde centrīs grauitatis Sectoris, & trianguli à Sectoris lateribus & segmenti subtensa comprehensi, si linea utraque connectens centra grauitatis inuenta, versus centrum Sectoris producta ita augeatur, vt augmentum ad compositam ex augmento & inuenta iam linea, quæ centra connectit, eam habeat proportionem, quam perpendicularis ab extremo arcus Sectoris ducta in Sectoris latus, ad segmenti arcum, erit illius augmenti extremum, centrum grauitatis dati segmenti circuli.



Sit ADC segmentum semicirculo minus, ductisque ad centrum circuli cuius est segmentum lineis AB , CB , item positis, F quidem centro grauitatis Sectoris $ABCD$, at puncto E centro grauitatis trianguli ABC , per quæ ducta linea EF ita producta sit in G , vt quemadmodum



a 8. primi
Archim.
de aequi-
ponder.

CH perpendicularans in AB , ad arcum ADC , ita sit GF ad totam GE .

Dico punctum G , esse centrum grauitatis segmenti ADC .

a Cùm enim linea EF ducatur per centrum totius, id est Sectoris; & vnius partis, id est trianguli; erit in illa versus F producta centrum reliquæ partis, id est segmenti ADC ; in eoque puncto puta G , vt linea EF ad FG , habeat reci-

procam proportionem partium; sed illam habet EF ad FG ; nam vt est perpendicularans CH ad arcum ADC , ita est triangulum ABC ad Sectorem $ABCD$; (Sector enim æqualis est triangulo sub basi æquali AB , & altitudine quæ æqualis sit arcui ADC) ergo triangulum & Sector sunt in proportione GE ad GF , & diuidendo vt triangulum ABC ad segmentum ADC , ita FG recrocè ad FE . b Cùm itaque F sit centrum grauitatis totius, centrum verò partis, id est trianguli sit E , erit G centrum grauitatis reliqui, id est segmenti ADC .

b 8. primi
Archim.
de aequip.

Ergo si datum fuerit quodlibet, &c. quod fuit ostendendum.

PROPOSITIO XXXVI. THEOREMA XXXI.

Si datus fuerit semicirculus, aut circuli portio semicirculo maior, parte circumferentia & duabus semidiametris comprehensa, & sicut dimidius arcus, ad duas tertias partes sua subtensa, ita perpendicularis è centro circuli in dictam subtensam, ad quartam quampiam lineam, sumendam à centro, in linea totam portionem è centro bisecante, in eius termino erit centrum grauitatis semicirculi, aut portionis propositæ.

Sit



Si datus semicirculus, aut portio maior ut eam iam descripsimus ADC , quam bipartito secet BD , ductaque AD , subtensa dimidij arcus AED , in eamque perpendicularis BF ; si ponatur esse ut arcus AED , ad duas tertias partes suæ subtensæ AD , ita BF ad BG .

Dico punctum G esse centrum gravitatis semicirculi, aut portionis propositæ.

Producatur BF in E , quæ bisecabit Sectorẽ $ABDE$, similiter reliquum Sectoris dimidium, scilicet BDK bifariam secet BK , ducatur EK , & per punctum G ducatur HI , parallela EK , occurrens lineis BE , BK , in H & I .

Cum BD totam portionem bifariam secet, & lineæ BE , BK reliquas partes, erit arcus EDK dimidio arcui portionis æqualis, & EK æqualis AD , & consequenter linea BL æqualis BF ; ergo ut BF ad BG , ita BL ad BG , id est ut arcus AED , ad duas tertias subtensæ AD ; at in triangulo BEK , linea FI est basi parallela, ergo latera in eandem proportionem diuidit, scilicet in proportionem lineæ BL ad LG ; erunt igitur EB ad BH , & BK ad BI , sicut arcus singulorum Sectorum, ad duas tertias suæ subtensæ, ^a ergo puncta H & I centra gravitatis Sectorum ^{a 34. huius} $ABDE$, $CBDK$, ^b ergo centrum totius in HI , sed etiam est in BD , ergo ^{b 20. huius} in G .

Igitur si datus fuerit semicirculus, &c. quod demonstrare oportuit.



PROPO-



PROPOSITIO XXXVII. THEOREMA XXXII.


Si datum fuerit segmentum quoddam semicirculo maius, ductisque à basis extremis duabus ad centrum lineis, factisque cum base trianguli, & reliqua portionis gravitatis centra fuerint data; producto uno trianguli latere, & in illud demissa perpendiculari, ex opposito basis extremo, si linea centra gravitatis trianguli, & reliqua portionis connectens, ita diuisa fuerit, ut quam proportionem habet segmenti arcus, ad perpendicularem iam ductam, eam habeant partes lineæ, hac lege, ut maior pars centro gravitatis trianguli adiaceat; hoc diuisionis punctum, erit centrum gravitatis segmenti propositi.

SIt ADC segmentum semicirculo maius, ductisque AB, CB semidiametris, trianguli ABC gravitatis centrum sit E, reliqui verò Sectoris gravitatis centrum sit punctum F, producaturs AB in G, ductaque ad

eam perpendiculari CH, ponatur linea EF dicta gravitatis centra coniungens, ita diuisa in I, ut quam proportionem habet arcus segmenti ad perpendicularem CH, eam habeat EI ad IF.

Dico punctum I, esse centrum gravitatis dicti segmenti.

^a Necessè enim est, ut centrum gravitatis segmenti propositi, sit in FE connectente centra partium, ^b in eoque puncto, quod lineam diuidit



a 16. huius

b 6. & 7.
primi Archimedis
de æquiponder.

reciprocè in rationem partium; at triangulum ad residuam portionem illam habet proportionem, quam CH ad arcum segmenti, (illa enim portio æqualis est triangulo rectangulo, sub semidiametro & altitudine quæ sit dicto arcui æqualis) in eandemque posuimus reciprocè diuisam lineam FE, ergo I erit centrum gravitatis segmenti propositi.

Itaque si fuerit datum quoddam segmentum, &c. quod fuit demonstrandum.

PROPO-


PROPOSITIO XXXVIII. THEOREMA XXXIII.

Si segmento circuli vel ellipsis, figura rectilinea euidenter inscripta fuerit, segmentorum reliquorum demptâ figurâ inscriptâ, commune grauitatis centrum, minus aberit à segmenti vertice, dimidio lineæ, qua à vertice ad mediam basim ducitur.

Segmento ABC , euidenter inscripta sit figura $ADEFBGHC$.


Dico magnitudinis ex reliquis segmentis, demptâ figurâ inscriptâ compositæ, grauitatis centrum, (quod est in diametro BK) minus abesse à vertice B , dimidio lineæ BK .

Ducantur AB, CB , segmento que AEB euidenter inscripta erit figura $ADEFB$, & segmento CHB figura $CIHGB$, quare ductis EL, HM diametris, ^b erunt centra grauitatum magnitudinû compositarû ex segmentis residuis, demptis figuris $ADEFB, CIHGB$, in lineis EL, HM .



b 21. huius

nis compositæ ex segmentis portionis AEB , & sumatur O centrum grauitatis, magnitudinis compositæ ex segmentis portionis BHC , ductaque NO , ^c cum centrum grauitatis ex omnibus compositæ sit in NO , & ^d sit præterea in BK , erit



c 21. huius.

in P , quæ communis vtriusque lineæ intersectio est; ducatur deinde LM , cadet illa infra NO , & cum lineas AB, BC secet bifariam in L & M , lineam quoque BK bipartitò secabit in Q , quapropter cum P cadat supra Q , punctum P , centrum grauitatis

F

uitatis

uitatis magnitudinis ex omnibus segmentis compositæ, aberit à vertice B , interuallo BP , quod minus est BQ , dimidio lineæ BK .

Igitur si segmento circuli vel ellipsis, &c. quod fuit demonstrandū.

PROPOSITIO XXXIX. THEOREMA XXXIV.

Cuiuslibet segmenti circuli vel ellipsis gravitatis centrum, plus distat à segmenti vertice, dimidio diametri segmenti.



Si ABC segmentum circuli vel ellipsis, & linea BE segmenti diameter.

Dico centrum gravitatis segmenti, ^a quod est in diametro BE , plus dimidio BE , abesse à vertice B .


Si enim id verum non sit, vel aberit dimidio lineæ BE , vel interuallo quod dimidio minus sit, à segmenti vertice.

Primò ponatur abesse dimidio BE , sitque punctum D ; ducatur per D linea FG , parallela AC , occurrens vtriusque arcui segmenti in F & G , & per puncta FEG , describatur segmentum circuli vel ellipsis, æquale & simile segmento FBG , totumque cadet intra figuram $AEGC$, quæ omnia ex geometria evidentiæ sunt. ^b Segmenti quoque FEG centrum gravitatis erit in DE , & sit H , centrum item gravitatis segmenti FBG sit I , ^c erunt DH & DI æquales, ^d ideoque magnitudinis compositæ ex segmentis FBG , FEG , commune gravitatis centrum erit D , ob æqualitatem & similitudinem segmentorum, & ex D æquiponderabunt;


a19. huius.



b19. huius



c2. postu-
latum Lu-
ca Valerij.
d1. petitio
Archim.
de aequip.



bunt; additâ igitur magnitudine, quæ cum segmento $FE G$, componit figuram $AFC G$,^e inclinabit pondus ad partes segmenti $FE G$, tota enim composita magnitudo $AFC G$, ponderat ad partes segmenti $FE G$; nam cum totius segmenti ABC , centrum grauitatis sit in BE , item & ablatae partis $EB G$ sit in eadem linea, etiam reliquæ figuræ $AFC G$, erit in eadem linea, sed etiam est intra ipsammet figuram $AEG C$, ergo erit intra lineam DE , ideoque tam segmentum $FE G$, quam hoc quod additum est simul sumpta, ponderant ex DE , cum igitur inclinetur pondus, non erit D centrum grauitatis segmenti ABC .

e 2. petitio Archim. de æquipond.
f 8. primi Archimede de æquiponder.
g 9. petitio æquipond. Archim.

Ponatur secundo centrum D , abesse minori interuallo, quam sit dimidium BE , & sumatur DK æqualis DB , & per $F K G$ describatur segmentum circuli vel ellipsis vt supra, quod amplius cadet intra figuram $AFC G$, & institutâ vt prius argumētatione, idem absurdum consequetur.

Idcirco cum centrum grauitatis segmenti ABC , nec dimidio lineæ BE , nec interuallo dimidio minori abesse possit, cadet vltra dimidium lineæ BE , seu diametri segmenti, initio sumpto à vertice.

Quare cuiuslibet segmenti, &c. quod ostendere oportuit.

PROPOSITIO XL. THEOREMA XXXV.

Centrum grauitatis figuræ, segmento circuli vel ellipsis euidenter inscriptæ, non potest idem esse, cum centro grauitatis ipsius segmenti.


Sit ABC segmentum circuli vel ellipsis, & figura $ADBE C$, illi euidenter inscripta.

Dico vtriusque idem esse non posse grauitatis centrum.

Si enim fieri possit, a cum sit in diametro BF , sit punctum G .

Cum G sit centrum totius, id est segmenti; & partis, id est figuræ A euidenter inscriptæ, b erit etiam centrum grauitatis reliqui, id est magnitudinis ex residuis segmentis compositæ. ergo $B G$ erit c minor dimidio BF , & simul d maior, quod fieri nequit; ergo nec hoc vnde sequitur, scilicet idem esse segmenti, & figuræ euidenter inscriptæ grauitatis centrum.

Ergo centrum grauitatis figuræ, &c. quod fuit demonstrandum.



a 18. & 19. huius.

b 1 8. primi Solidorum Luca Valerij.

c 33. huius

d 39. huius

F 2

PRO-

PROPOSITIO XLI. THEOREMA XXXVI.


Si segmento circuli vel ellipsis, figura rectilinea fuerit euidenter inscripta, totius segmenti grauitatis centrum, erit vertici segmenti propinquius, quàm centrum figurae inscriptae.

Sit ABC segmentum circuli vel ellipsis, & ADBEC figura rectilinea, segmento euidenter inscripta.

Dico centrum grauitatis segmenti, minus distare à vertice, quàm centrum grauitatis figurae euidenter inscriptae.

a 18. & 19.
huius.


b 40. huius



c 8. primi
Archim.
de equip.

d 38. huius

e 39. huius



^a Cùm vtriusque magnitudinis centrum grauitatis sit in BF, segmenti diametro, nec idem possit esse vtriusque centrum; sit G centrum segmenti, H verò centrum magnitudinis, compositae ex residuis segmenti, demptâ figurâ inscriptâ. Cùm G sit centrum totius, & H centrum partis, necesse est centrum reliquae partis cadere ad alteram partem G, id est in aliquod punctum I, ^d & cùm H sit vicinius vertici quàm G, ^e debebit I esse remotius à vertice quàm G.

Itaque si segmento circuli vel ellipsis, &c. quod oportuit demonstrare.

PRO-

PROPOSITIO XLII. THEOREMA XXXVII.

Dato segmento circuli vel ellipsis, potest figura rectilinea evidenter inscribi, ut linea qua inter centrum gravitatis segmenti & centrum inscriptæ figuræ interiicitur, sit quacumque lineâ rectâ datâ minor.

Segmentum circuli vel ellipsis sit ABC , centrum gravitatis eius E , intervallum datum EF , ita ut F sit infra, ^a cum centrum gravitatis figuræ cadat infra centrum segmenti.

Sumatur aliquod spatium G , ad quod segmentum maiorem habeat proportionem, quam BF ad EF , & segmento figura evidenter inscribatur, donec spatium ex residuis segmentis, dempta inscripta figura compositum, sit minus spatium G , constat verò id fieri posse.

Dico centrum gravitatis illius figuræ inscriptæ, cadere supra F .



Si non cadat supra F , vel cadet in ipsum F , vel infra.

Ponamus primò coincidere cum F ; cum E sit centrum totius segmenti, & F partis, seu figuræ evidenter inscriptæ, ^b erit centrum reliquæ

partis, id est magnitudinis ex residuis segmentis compositæ, in FE , producta versus E , in eoque puncto puta H , ut FE , ad EH sit, ut residuum ex segmentis, ad inscriptam figuram; quare etiam componendo erit ut HF ad FE , ita totum segmentum, ad residuum ex segmentis; cum verò illud residuum iuxta constructionem sit minus spatium G , erit maior proportio segmenti ad residuum, quam segmenti ad spatium G , ideoque maior proportio HF ad FE , quæ est ut segmentum ad residuum, quam BF ad FE ; ergo H centrum gravitatis spatiorum residuorum, cadit extra segmentum ABC , ^c quod fieri nequit. igitur centrum gravitatis inscriptæ non coincidit cum F , ex quo absurdum consequitur.

F 3


Cadat




b 8. primi
Archim.
de aquip.

c 17. huius

Cadat secundo centrum grauitatis infra F in I; cum E sit centrum grauitatis totius, id est segmenti; & I centrum grauitatis figuræ inscri-



d 17. huius



ptæ, centrum reliqui, id est magnitudinis ex residuis segmentis compositæ sit H; vt prius erit maior proportio segmenti ad residuum, quàm BF ad BE, ergo quoque diuidendo, maior erit proportio figuræ inscriptæ ad residua segmenta, quàm BE ad EF, multo que maior quàm BE ad EI, sed vt inscripta figura ad residua segmenta, ita HE ad EI, ergo maior proportio HE ad EI, quàm BE ad EI, ergo HE maior BE, ergo H cadit extra segmentum, centrum nimirum grauitatis residuorum segmentorum, d quod fieri nequit; ergo nec inscriptæ figuræ centrum grauitatis cadit infra F, ex quo id impossibile sequitur.

Cum ergo inscriptæ figuræ centrum grauitatis, quod necessario cadit infra E centrum segmenti, non coincidat cum F, nec cadat infra F, cadet intra spatium FE, eritque propinquius centro segmenti, quàm sit datum spatium FE.


Quare possibile est dato segmento, &c. quod fuit demonstrandum.

PROPOSITIO XLIII. THEOREMA XXXVIII.

Si dentur duo segmenta, vnum ellipsis alterum circuli, & quam proportionem habet segmentum ellipsis ad totam ellipsim, eandem habeat segmentum circuli ad totum circulum; & in vtroque rectilineæ figuræ euidenter describantur, quarum latera sint multitudine equalia, figurarum centra grauitatis, similiter secabunt segmentorum diametros.


Sit

Sit ABC segmentum ellipsis, DEF segmentum circuli, & sit segmentum ellipsis ad totam ellipsim ABCG, vt segmentum circuli ad totum circulum DEFH, & segmento quidem ellipsis, figura APNLBMOQE euidenter inscripta sit, segmento verò circuli, figura DXTRESVXF.





Dico centra grauitatis vtriusque figuræ inscriptæ, similiter secare diametros segmentorum BI, EK.

Iungantur LM, NO, PQ, in ellipsi; & RS, TV, XY in circulo.



Iam suppono ex Conicis, ductas lines inter se parallelas esse, & ad diametros bifariam diuidi; & parallelas in segmento ellipsis, cum respondentibus comparatas, inter se eandem habere proportionem, quam illæ quæ in segmento circuli respondent illis, quæ in ellipsi inter se comparatæ sunt; denique ipsas segmentorum diametros, ad totas suarum figurarum diametros, eandem habere proportionem, eò quòd segmentorum area, ad totas suarum figurarum areas, eandem proportionem habeant. Hæc enim omnia ex Conicis demonstrationibus, apud geometras nota sunt, & ea hîc demonstrare ab instituto alienum foret.

His suppositis propositum demonstrabo. a Trapeziorum APQC, a 15. primi Archim. de æquipond. DXFY centra grauitatis, erunt in I beta, K, epsilon, rectis lineis similiter posita, cum eandem habeant proportionem AC, PQ, quam DF, XY. Similiter



liter etiam trapeziorum PNOQ, XTVY centra grauitatis, similiter diuident lineas $\beta\alpha$, $\epsilon\delta$; denique & in trapeziis reliquis, centra grauitatis similiter diuident suas lineas, eadem de causa; sunt autem & triangulorum LBM, RES centra grauitatis, in lineis BZ, EY similiter posita; habent autem eandem proportionem trapezia & triangula, vt sibi respondent in segmentis propositis circuli & ellipsis, quare si duorum primorum trapeziorum in segmento ellipsis, commune centrum grauitatis inuentum fuerit; itidem duorum trapeziorum primorum in segmento circuli, lineæ $\alpha\iota$ in ellipsi & $\delta\kappa$ in circulo similiter diuidentur, atque ita progressionem facta ad reliqua, totius figuræ rectilineæ, in segmento ellipsis ABC inscriptæ, centrum grauitatis similiter diuidet diametrum BI, sicut figuræ in segmento circuli inscriptæ grauitatis centrum, diuidet lineam EK.

Igitur si dentur duo segmenta, &c. quod fuit demonstrandum.

PROPO-

PROPOSITIO XLIV. THEOREMA XXXIX.


Si duo segmenta data fuerint, unum ellipsis alterum circuli, & quam proportionem habet segmentum ellipsis ad totam ellipsim, eandem habeat segmentum circuli ad totum circulum; centra gravitatis in eandem proportionem diident earum diametros.

Sint duo segmenta ABC , DEF , qualia propositio postulat, eorum diametri BG , EH , centra gravitatis I & K .


Dico eandem esse proportionem BI ad IG , quæ est EK ad EH .

Si enim non sit eadem proportio, erit maior vel minor.

Sit primò maior proportio BI ad IG , quàm EK ad EH , & diuidatur EH in proportionem BI ad BG , in aliquo puncto L , cadet illud necessariò infra punctum K .^a Inscríbatur segmento circuli DEF , euidenter figura rectilinea, cuius centrum gravitatis N , minus absit à puncto K , interuallo KL , & sicut diuisa est EH in N , ita diuidatur BG in aliquo puncto O , cadet punctum O supra punctum I , nam maior est proportio EN ad NH , quàm EL ad LH , id est BI ad IG ; deinde inscribatur segmento ellipsis ABC euidenter figura rectilinea totidem laterum, eius centrum gravitatis erit O ,^b cadetque supra centrum gravitatis segmenti,^c quod fieri nequit; unde nec maior erit proportio BI ad IG ,^c quàm EK ad EH , unde id sequitur.



a 42. huius




b 43. huius

G


Sit



d42. huius



c43. huius



Sit secundo minor proportio BI ad IG , quam EK ad KH , & diuidatur EH in proportionem BI ad BG , in aliquo puncto L , cadet illud necessario supra punctum K , & tum diuidatur BG in O , vt sit BO ad OG , sicut EK ad KH , cadet O necessario infra I . ^dinscribatur segmento ABC euidenter figura rectilinea, cuius centrum grauitatis P , minus absit a puncto I , interuallo OI , & sicut diuisa est BG in P , ita diuidatur EH in R , cadet R supra K ; nam minor est proportio BP ad PG , quam BO ad OG , id est EK ad KH , deinde inscribatur segmento circuli DE ^e HE , euidenter figura rectilinea totidem laterum, eius centrum grauitatis erit R , ^e cadetque supra centrum grauitatis segmenti, quod fieri nequit; vnde nec minor erit proportio BI ad IG , quam EK ad KH , vnde id sequebatur.

Idcirco cum proportio BI ad IG , nec maior nec minor sit proportione EK ad EH , erit eadem.

Ideo si duo segmenta data fuerint, &c. quod ostendere oportuit.

PROPO.



PROPOSITIO XLV. THEOREMA XL.

Si fuerint duo Sēctores, vnus ellipticus alter circularis, dimidiis suis figuris minores, æquales, vel maiores; & quam proportionem habet vnus Sēctor ad suam figuram, eandem habeat alter Sēctor ad suam, centrum grauitatis ipsorum, in eandem rationem diuidet semidiametros illas, quæ Sēctores bifariam secant.

Sint primò Sēctores semiel-
lipfi aut semicirculo mino-
res $ABCK$, $EFGI$, eosque bifa-
riam secent semidiametri KB ,
 IF .

Dico semidiametros illas, à
centris grauitatis diuidi in
eandem rationem.

Ducantur AC , EG ; quòd AC
 EG secent similiter semidia-
metros in R & S , & segmenta
 ABC , EFG singula ad reliqua
triangula, & totas figuras,
eandem habeant proportio-
nem, ex Conicis demonstra-
tionibus notum est. ponantur
 N & P esse centra grauitatis se-
gmentorum; puncta verò O &
 Q esse centra grauitatis trian-
gulorum (^a erunt autem N & P
in semidiametris KB , IF , bases
& segmenta bisecantibus, ^b &
 O & Q in iisdem semidiamete-
tris, quæ bases triangulorum
 AKC , EIG bifariam diuidunt)
^c erit BN ad NR , vt FP ad PS .
ditem KO ad OR , vt IQ ad QS ,
& cum N , O , sint centra par-
tium Sēctoris elliptici, P & Q
verò centra partium Sēctoris
circularis, totorum Sēctorum






a19. huius.

b 13. primi
Archim.
de aquip.c 44. huius
d corollar.
14. primi
Archim.
de aquip.

G 2

centra

e 6. & 7.
primi a-
quiponder.
Archim.



fex iam
dictis.

g 1. petitio
aquipond.
Archim.

centra erunt in NO , PQ , & consequenter in semidiametris Sectors bifariam secantibus; sint L & M , erunt reciproce OL ad LN , & QM ad MP , sicut segmenta ad triangula, quæ cum utrobique in eadem sint proportione, erit OL ad LN , ut QM ad MP . ideoque manifestum est puncta N, Q, L, O , ita diuidere semidiametrum BK , ut puncta P, S, M, Q , diuidunt semidiametrum FI , & consequenter puncta L & M , quæ sunt centra grauitatis Sctorum, semidiametros in eandem ratione secare.

Sint secundo ambo mediæ parti suarum figurarum æquales aut maiores, $ABCK$ ellipticus, $EFGI$ circularis, eosque bifariam secent semidiametri BK, FI , factosque Sctores, in ellipsi quidem $ALBK, CMBK$, in circulo verò $ENFI, GOFI$, bifariam secent semidiametri KL, KM, IN, IO , inuentaque sint centra dictorum Sctorum, in quas toti Sctores propositi diuisi sunt, (quos medietate figurarum suarum minores esse necesse erit) sintque centra grauitatis, in ellipsi quidem P, Q , in circulo verò R, S . (erunt enim in illis semidiametris ut iam ostendimus) ducanturque LM, PQ, NO, RS , quæ secent BK quidem in X & T , at FI in Y, V .

Lineas LM, NO bifariam diuidi à semidiametris BK, FI , ex conicis patet; sed cum toti Sctores ad suas figuras eandem habeant proportionem, etiam ipsorum dimidij ad suas figuras eandem habebunt proportionem, ideoque inuenta grauitatis centra $A, Q; R, S$. diuident omnes illas semidiametros in eandem proportionem, & PQ erit parallela LM , & RS parallela NO , & tam PQ quam RS , ad semidiametros BK, FI bifariam diuidentur, cum LM, NO ipsis parallelæ, bipartitò secantur. S erit quoque in ellipsi, ob

COROLLARIA.

I.

INuentâ circuli quadraturâ, dabitur centrum gravitatis cuiuslibet Sectoris, minoris & maioris semicirculo, ipsius semicirculi, & segmentorum semicirculo maiorum & minorum, si quidem proportio arcus ipsorum, ad totam peripheriam sit cognita; & hæc de ellipticis figuris, qua illis respondent, etiam intelligantur.

II.

Dato cuiuslibet istarum partium gravitatis centro, ipsius etiam quadratura erit obuia; dabuntur enim tres lineæ rectæ, quibus sumpta quarta proportionalis, sit arcui toti, aut dimidio figura propositæ æqualis. quâ detectâ à nobis connexionem, inter quadraturam circuli & centra gravitatis partium eius, simul novam aperuimus viam quadrandi circulum; si nimirum centra gravitatis partium, independentem à quadratura querantur.

III.

Lunularum quarumvis, à quibuslibet duabus circumferentiæ portionibus comprehensarum; similiter spatiorum inter duas lineas parallelas, vel non parallelas interceptorum; Arbelorum quoque & scalprorum, seu securicularum, & quarumvis figurarum, vel ex arcibus circuli, vel arcibus & rectis lineis compositarum, dabuntur centra gravitatis; quæ omnes subtensis rectis lineis sub arcibus, in segmenta circulorum, & rectilineas figuras resolventur. Et hæc in ellipsi quoque locum habent.

IV.

Sed & ad corporum quorundam, quae nos haecenus latuere, grauitatis centra reperienda, hac licebit transferre. Dabuntur enim centra grauitatis partium cylindrorum, dictis iam figuris velut basibus insistentium, bases oppositas parallelas habentium. Similiter & partium conorum per verticem Sectorum, talibus basibus siue circularibus siue ellipticis insistentium. Dabitur enim axis grauitatis, in cylindris quidem per centra grauitatis oppositarum basium parallelarum, in conis vero ductus ad centrum grauitatis basis per verticem, in cuius medietate centrum grauitatis partium cylindricarum, in quarta vero parte quae basi adiacet, partium conicarum reperietur; iuxta ea quae Fridericus Commandinus, & Lucas Valerius de centrīs grauitatis solidorum tradidēre.

R.P.PRO-



R. P. PROVINCIALIS Societatis IESV
in Prouincia Toletana Facultas.

MICHAEL PACHECVS Societatis IESV, in Prouincia Toletana Præpositus Prouincialis, potestate ad id mihi facta à Reuerendo admodum Patre nostro MUTIO VITELLESCHO, Præposito Generali, facultatem facio, vt liber inscriptus: IOANNIS DELLA FAILLE ANTVERPIENSIS, E SOCIETATE IESV, IN ACADEMIA MATRITENSI COLLEGII IMPERIALIS, REGII MATHESIOS PROFESSORIS, THEOREMATA DE CENTRO GRAVITATIS PARTIVM CIRCULI ET ELLIPSIS, eiusdem Societatis grauium doctorumque hominum iudicio approbatus, typis mandetur. In quorum fidem has litteras manu nostra subscriptas, & sigillo nostro munitas dedimus. Matriti, in nostro Imperiali Collegio x. Kal. Decembr. ∞ IOC XXXI.

MICHAEL PACHECO.

GVILIELMVS DE VVAEL Societatis IESV
per Flandro-Belgium Præpositus Prouincialis
IOANNI MEVRSIO Typographo Sal!

CVm P. Ioannes della Faille Societatis nostræ Sacerdos librum composuerit de centro grauitatis partium circuli & ellipsis, examinatum & auctoritate R. di ad. um P. N. Mutij Vitelleschi Præpositi Generalis Societatis IESV approbatum, ego pro auctoritate à Ser. mis Principibus nostris nobis concessa, potestatem Tibi facio dictum librum imprimendi & liberè diuendendi. In quorum fidem has manu mea signaui, & officij mei sigillo muniui Liræ 4. Aprilis 1632.

GUILIELMVS DE WAEL.

SVMMA PRIVILEGII.

PHILIPPVS Dei gratia, Hispaniarum, Indiarum, &c. Rex Catholicus, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, &c. Serenissimus Belgarum Princeps, diplomate suo sanxit, ne quis Librum, cui titulus est, THEOREMATA DE CENTRO GRAVITATIS PARTIVM CIRCULI ET ELLIPSIS, Auctore P. IOANNE DELLA FAILLE, citra IOANNIS MEVRSI voluntatem, vlllo modo imprimat, aut alibi terrarum impressum, in Inferioris Germaniae ditiones importet, venalemve habeat. Qui fecus faxit, confiscatione Librorum, & alia graui poena mulctabitur, vti latius patet in Litteris datis Bruxellæ, 24. Apr. 1632.

Signat.

I. COOLS.

BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE S. VICENTE

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint purple stamp or text, possibly a library or archival mark.

BIBLIOTECA
DEL
CONSERVATORIO DE

BIBLIOTECA
DEL
CONSERVATORIO DE P. N. N.

BIBLIOTECA
DEL
MUSEO DE S. CARLOS

Observatori
BIBLI
Núm. 3

Real Observatori
BIBLI
03

784

CENTRO
GRAVI-
TATIS

Observatorio de Mina

BIBLIOTECA

Núm.

317

Real Observatorio de Armada
BIBLIOTECA

03177