

27

154

...per hunc...
...per hunc...
...per hunc...

R. 13

6/33

27

134

cds
C. 2

111

111

BWA 27

no - 134

R. 13

6733

18918293



IOAN.

BVTEONIS DE QVADRATVRA

circuli Libri duo, vbi multorum
quadraturæ confutantur, & ab
omnium impugnatione
defenditur Archi-
medes.

EIVSDEM,

*Annotationum opuscula in errores Campani,
Zamberti, Orontij, Peletarij, Io. Pena
interpretum Euclidis,*



I
N
V
I
R
T
V
T
E,



F
O
R
T
V
N
A.

LUGDVNI,

APVD GVLIELMVM ROVILLIVM,

SVB SCVTO VENETO.

M. D. LIX.

Cum privilegio Regis.



*Liber primus de Quadratura circuli
hoc ordine procedit.*

Post proœmium quid sit tetrago-
nismus ostenditur. Referuntur deinde,
atque confutatur tetragonismi Græ-
corum Antiphontis, Brysonis, Hippo-
cratis. Sequitur post hæc Archimedis
dimensio circuli cum Eutocii Asca-
lonitæ cōmentario, ex interpretatio-
ne, Buteonis. Et alter etiam ipsius Bu-
teonis cōmentarius in dimensionem
Archimedis. In quo docetur potissi-
mum quomodo & aliæ circuli di-
mensiones verò propius per numeros
& lineas, ac etiam organicas inueniri
possint. Subsequitur ad finem dimen-
sio circuli ex Ptolomæo.


Libro secundo continentur.

Orontii in dimensionem Archi-
medis deprauationes prima, & secun-

da. Tetragonismi deinde confutan-
tur hoc ordine, Arabum vnus, Cam-
pani vnus, Cufani quinque, Alberti
vnus, Fortii vnus, Bouilli duo, Oron-
tii duo, quorum posterior depraua-
tionem ipsius tertiam in dimensio-
nem Archimedis ostendit. Ad po-
stremum in tetragonismos Orontii
posteriores numero plus quàm cen-
tum confutatio datur in omnes
primùm generaliter, de-
inde & particula-
tim in aliquos.




5



I O. B V T E O N I S
D E Q V A D R A T V R A
circuli Liber primus.

P R O O E M I V M.

 *NTER* multa quæ princeps ille
Geómetra artis ingeniique bonis
suspiciendus Archimedes doctri-
næ suæ monimenta reliquit ad po-
steros, locum præcipuum faciliè te-
net circuli dimensio, cuius utilitas in usus varios
latissimè patet. Opus arduum sanè, ipsaque diffi-
cultate famosum, multis quoque seculis inexplora-
tum antea, vel deploratum potius, quãvis ex Græ-
cis non pauci disciplinarum sectatores primarij ad
id sese frustra defatigassent. Is etenim periphe-
riæ circuli cum diametro mensuram, quod est rei
fundamentum, intra duos limites, maius scilicet
atque minus, tantillo discrimine conclusit, ut ra-
tiocinatione magis colligi, quàm vlllo sensu, vel or-
gano discerni possit. Et quod est mirabile prorsus,
viam inde præmòstravit, qua magis semper, atque
magis vero propius accedas. Vnde syderalis scien-
tiæ periti postea non dubitarunt secundùm hanc

ipsius theoriam defectus luminarium supputare,
 paucis quibusdam in suum usum, calculi necessi-
 tate mutatis. In hoc igitur, sicut in alijs multis, quæ
 miranda, gratâque fuere Mathematicis sagacissi-
 mus Archimedes inuenti palmam ab omni poste-
 ritate reportauit. Quanquam non desunt, ad æta-
 tem vsque nostram, (quod equidem mirari soleo)
 qui gloriam hanc illi propriam delibare conantes,
 audeant profiteri quæstionem huiusmodi ad exa-
 ctum, perfectumque modum terminasse, quod uti-
 nam præstitissent. Siquidem fœlicitati temporum
 gratularer, quibus sese proferrent ingenia, quæ
 Græcis antiquis opponi, vel præponi iure possent.
 Verum enimvero cum in istorum scripta, verita-
 tis cognoscendæ studio, diligenter inquirerem, in-
 credibile est, quàm inanes, ne dicam temerarios, o-
 mnium conatus inuenerim, remque totam sic ab
 ipsa promissorum ostentatione diuersam, vt me
 vanitatis talium pudeat, pigeretque bonas horas in
 ea disquisitione collocasse, ni laborem nostrum pu-
 blicando studiosis vtilem fore putarem, ne falsa
 recipiendo pro veris, alienos sequantur errores, qui
 prout sophisticis argumentis adumbrantur, ita &
 doctis etiam, non acriter atque solerter intenden-
 tibus imponunt. Ex quibus multos satis possem, si
 res exigeret, proferre. Id autem cum ab omni disci-
 plina sit alienum, tum a Geometricis quàm maxi-
 me

mè, ubi certis elementis omnia constant. In his igitur, sicut & aliàs ubique, mala cognoscere, falsaque refelli, permagni semper interest, & ab authoribus magnis vsurpatum. Nam & medici tractant venena, ut vim letalem intelligentes, ea vitemus. Sic Aristoteles omnium ferè qui ante se fuerunt opiniones, in Philosophia, et in his plerumque præceptoris sui Platonis refutavit. Sic Galenus Tessalum medicine corruptorem insectatur. Sic Ptolomæus Marini tabulas emendavit. Sic Archimedes theoremata quædam Cononis, & aliorum falsitatis arguit. Id denique multi facientes, de posteris bene merendo, puriores nobis disciplinas reliquerunt. Nouissimè Regiomontanus in tetragonismis Cusani mendacium inuenit. Doctorum itaque ad veri subsidium exempla sequutus, quicquid de circuli quadratura ante tempus Archimedis sparsim, & intercisè apud referentes inueni, deinde & apud posteriores ex suis ipsorum scriptis, unà cum dimensionis opere, & Eutocij commentario, nostrum insuper adiungens, seruata temporum ratione digessi. Examinatione sedula singulorum sententias discutiens. Sic enim depulsis errorum nebulis, veluti defecata veritas purior atque syncerior elucebit, quam & limitibus alijs, quot libuerit, intra datos ab Archimede, numeris atque figuris concludere monstrauimus.

Quid sit tetragonismus.

Géometres ubi de triangulis & parallelogrammis, potentiâque lineæ rectæ, quæ sunt necessaria proponendo demonstravit, volumen secundum elementorum conclusit problemate tali. Dato rectilineo æquale quadratum constituere. Et hoc est quod dicitur tetragonismus, in omni specie planorum quæ terminos suos habent undique lineas rectas, per quem intelligitur quot cubitorum, pedum, digitorum, aliorumque nominum mensuras quadratas tales figuræ contineant. Id vno verbo Græci dicunt ἐμβαδόν. Nec aliâs plenè superficierum mensuram intelligentia capit. Subsequentium autem totidem voluminum Theoria, & si tota versetur in circulis, aliâque & in sexio posterioribusque solidorum libris thoremata super his habeantur, nusquam tamen constat proprius modus ex elementis, quemadmodum circulo dato quadratum æquale constituas. Et hoc est problema, quem tetragonismum circuli vocant. Id autem cum sit necessarium prorsus in arte, & prætermissum ab Euclide, διὰ τὸ οὐκ εὐμεθόδου εἶναι καὶ δὲ συεογίδου. Constat enim fieri posse magis quidem re ipsa, sicut in sequentibus ostendam, quàm Aristotelis aliorumque sapientum testimonio frequenti. Quid putamus igitur, quàm acri contentione Geométra-


rum

rum olim, tunc cùm vigeabant animis acutius, sit in ea vestigatione laboratum, ne vel hac sola difficultate vincerentur, & inuentionis tam reconditæ palmam reportarent. Præterea sic est ingenium artis vt rerum obscuritate gaudeat. Credibile est itaque longè plures quadratū æquale circulo quæsisse, quàm quorum nomina leguntur. Nullius enim antiquorum, præterquàm Archimedis, extant scripta quæstionis huius, sed tantum sententiæ paucorum recitantur obiter apud authores. Quas ego plenius quàm inuenerim, quò magis intelligantur, seruata rei substantia, scriptis meis interseram. Nam ad ea quæ tractat Archimedes super dimensione circuli, non parū utilis erit ista cognitio.

Tetragonismus Antiphontis.

In primis itaque tetragonismum disquiramus, quem tradit Antiphon, ita proponens. Si intra datum circulum describatur quadratum isoscelis trigona à quatuor circuli segmentis toties auferri possunt, vt fiat tandem rectilineum æquale circulo dato. Sed in hoc (inquiūt) fallitur Antiphon: quoniam impossibile est magnitudinem ita secari, vt non sit aliquid residui. Omnis enim magnitudo secatur ad infinitum. Sic igitur refellunt, & verissimè quidem. Itaque propter hanc sectionum infinitatem, nunquam verum attinget problema, quan-

uis prope semper magis atque magis accedere possit. Quod ut fiat evidentius, constructionem dictorum, demonstrationemque disponam. Est o datus circulus in quo centrum A , et intra circulum describatur quadratum $BCDF$. Et ipsa peripheria BF , bipartiatur equaliter in signo G , & connectantur GB , & GF . Erit igitur BGF trigonum isosceles, duo enim ipsius latera BG & GF peripherijs subtenduntur equalibus. Dispositis hoc modo trigonis isoscelibus in reliquis segmentis descriptum erit intra circulum octagonon isopleuron. Bipartiatur equaliter peripheria BG in puncto H , connexisque HB & HG , bipartitisque ad hunc modum reliquis septem peripherijs, connexisque bipartitionum signis cum angulis octagoni, descriptum erit intra circulum sedecagonum isopleuron maius quidem octagono, sed minus circulo. Rursus bipartitis peripherijs BH & HG , reliquisque quatuordecim, connexisque per bipartitionum signa lineis cum angulis sedecagoni, descriptum erit intra circulum isopleuron polygonum duorum & triginta laterum, quod quidem minus erit circulo. Et sic semper descriptis ad hunc modum isoscelibus trigonis, fient intra circulum polygona excedentia sese semper ordinatim laterum multitudine dupla. Nec ex huiusmodi polygonis ullum unquam tanta laterum multitudine dari poterit



terit, quin semper sit minus circulo intra quem describitur, cum sit pars ipsius circuli. Si igitur intra datum circulum describatur quadratum isosceles trigona à quatuor circuli segmentis toties auferri non possunt, ut fiat tandem rectilineum æquale circulo dato. Quod oportuit demonstrasse. Ex his itaque patet Antiphontis problema falsum esse, utile tamen ad hoc, ut vero proximum assequamur. Sed magis erit istud expeditum Archimedis ratiocinio facere, sicut infra videbitur.

Ceterum Orontius ætate nostra Mathematicæ sapientiæ professor insignis in vrbe regia, & scri-
pto

ptorum multitudine clarus, ipse, inquam, Orontius de hoc problemate loquitur inscienter, in opere suo de quadratura circuli, quam ego postea confutabo. Antiphon (inquit Orontius) putabat per isosce- lia triangula super quadrati circulo inscripti late- ribus, dein, exagoni, postea sedecagoni, & sic con- sequenter descripta aream demum consequi posse circularem, ex qua prodiret quadratum ipsi circu- lo æquale. In paucis his verbis non semel erravit O- rontius. Primum in eo quòd exagoni mentionem fa- cit, iam enim demonstravi descriptis quatuor iso- scelibus trigonis ex quadrato primum fieri octa- gonum, secundo sedecagonum, & alia deinde po- lygona semper ordinatim exedentia sese laterum multitudime dupla. Quare, vt hìc sit locus vllus exagono prorsus est impossibile. Mirum igitur quo- modo tam intempestiuè exagoni meminert in hoc loco. Deinde quod dicitur: *Aream demum conse- qui posse circularem.* Impropriè, ne dicam absur- dè, posuit *aream circularem*, pro *rectilineo* quod sit æquale circulo. est enim *area circularis* peri- phrasis circuli, hoc est *circulus ipse*, sicut *area qua- drata trigona*, vel *pentagona*, nihil aliud esse po- test, quàm *quadratum trigonum*, vel *pentagonum*. Et hæc de tragonismo secundum Antiphontem di- cta sint.


Tetragonifinus Brysonis

Memoratur & Bryson quæstionem hanc
 sic terminasse. Circulus est æqualis quadra-
 to inter duo quadrata medio, quorum alterum cir-
 ca ipsum circulum, alterum verò intra describitur.
 Ad propositum autem demonstrandum (vt dicunt,
 & verè quidem) argumentatione legitima non est
 vsus, sed sophistica, quæ quò melius intelligatur cõ-
 structionem ita dispono. Estò circulus cuius dia-
 metros BC , & describantur duo quadrata, alterũ
 quidem circa circulum, sit q; C , alterum intra, quod
 sit D . Et diametri pars. DC bipartiatur æqualiter
 in signo G , ad quod statuatur quadratum quod sit
 circa diametron aliorum quadratorum. Dicit ita-
 que Bryson, quòd circulus BC æqualis est quadra-
 to G . Quoniam (inquit) circulus BC , & etiã qua-
 dratum G sunt maiora quadrato D , quod est ipso-
 rum pars. Et eadem circulus BC , & quadratum
 G , minora sunt quadrato C , cuius sunt partes. Cir-
 culus igitur BC , est æqualis quadrato G . Quæ
 enim eisdem sunt maiora, & minora equalia
 sunt (vt volebat) inter se. Hoc autem (vt dicunt)
 nequaquam verum est. Si quidem octo & nouem
 minora sunt quàm decem, & eadẽ maiora quàm
 septem, neque tamen propter hoc octo & nouem
 inter se sunt equalia. Ad hæc ego dico, quanuis sit
 ista

ista demonstratio falsa, fieri tamen posse ut ve-
 rum sit quadamtenus propositum, aliter intelli-
 gendo quadratum medium, quàm quomodo nunc
 in figuratione posui, scilicet, ut quadratum G sit
 inter duo quadrata D & C medium vtcunque,
 quod sic ostendo. Quoniam enim circulus & qua-
 dratum sunt in eadē specie magnitudinis, quæ pla-
 na dicitur, nullus puto negauerit aliquod esse na-
 tura quadratum æquale circulo dato BC. Et si
 nondum sit proditum quoniam id modo verè dari
 possit. Ipsum igitur tale quadratum, in proposito
 nostro, cum non possit esse minus quadrato D, nec
 maius quadrato C, necesse est ut locum habeat ali-
 quem in medio quadratorum D & C. Et sic qua-
 dratum aliquod inter D & C quadrata medium,
 erit æquale circulo BC. Quod erat demonstnan-
 dum. Sed talis inter maius & minus terminatio,
 sicut aliquatenus est vera, ita semper incerta.
 Quod est alienum prorsus ab arte, nisi quemadmo-
 dum fecit Archimedes, tam propinquus inter se li-
 mitibus constet, ut non sit cuiuslibet à veri proxi-
 mo discernere verum. Quod autem quadratum G
 non sit æquale circulo BC, sic ostendo. Quoniam
 enim latus quadrati C æquale est diametro qua-
 drati D, ipsum quadratum C duplum est quadrati
 D. Itaque si quadratum C ponatur esse 32, qua-
 dratum D erit 16, quare & excessus quadrati C
in

in quadratum D erit etiam 16. Quadrilaterum igitur inter parallelos C & D, utpote quarta pars talis excessus, erit 4. Et quoniam linea DG equalis est lineæ GC, & latus quadrati C maius est latere quadrati D, quadrilaterum inter parallelos G & C plus est, quam dimidium totius quadrilateri inter parallelos D & C. Reliquum igitur quadrilaterum inter G & D minus est quam 2. Totus igitur excessus quadrati G in quadratum D minus est quam 8, quare & quadratum G minus est quam 25. Constat autem ex demonstratis ab Archimede in dimensione circuli, quod circulus ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habet maiorem quam 223 ad 284, quare & multò magis maiorem, quam 25 ad 32. Quoniam igitur quadratum C ponitur esse 32, circulus BC plus erit quam 25, ostensum est autem quadratum G minus esse quam 25. Non est igitur quadratum G æquale circulo BC. Quod erat demonstrandum. Si verò disponatur quadratum aliud quod sit mediū proportionale inter quadrata D & C, demonstrabitur etiam, quòd tale quadratum non erit æquale circulo BC. Ponamus itaque quadratū G esse medium proportionale inter ipsa quadrata D & C. Et quoniam quadratum C positum fuit esse 32, et quadratum D est 16, quadratum igitur G minus est quam 23, ostensum est autem quod circulus

*BC plus est quàm 25. Quadratum igitur G me-
dium proportionale inter quadrata D et C non est
equale circulo BC. Quod oportuit demonstrasse.
Ex his itaque patet tetragonismon Brysonis fal-
sum esse. Et quadratum medium, saluo sensu pro-
positi, nullo modo certo constitutoque melius intel-
ligi posse, quàm quo disponitur à nobis in constru-
ctione figuræ.*




Tetragonismus Hippocratis.


Nunc autem ad Hippocratis Chij conuerta-
mur inuentum, per quod & si tetragonismi
quæsi

quæsi negotium nequaquam possit absolui, est ta-
 men, ob subtilitatem eximiam, tale ut docto cuiq;
 sit admirandum, quòdque non nisi ab homine natu-
 ra, & arte solertissimo proficisci vnquam potuit.
 Fiet autem ex ipsius Hippocratis mente descri-
 ptio, simul & demonstratio talis. Estò datus cir-
 culus. $BACG$, cui æquale quadratum sit opus
 describere. Constituatur ex circuli diametro BC
 quadratum $BCDF$, & excitetur in ipso diame-
 tros BGD . Et centro quidem G , spatio verò GB
 describatur circulus $BECDF$, & connectantur
 puncta GC . Et quoniam in orthogonio trigono
 BCD , latus BD subtenditur angulo recto, quod
 igitur ex ipso BD quadratum æquale est his quæ
 ex duobus lateribus BC & CD fiunt quadratis.
 Duplum est igitur id quod ex DB quadratū eius,
 quod ex CB quadrati. Quare & circulus $BEC-$
 DF duplum est circuli $BACG$. Sunt enim inui-
 cem circuli, sicut quæ ab ipsorum dimetientibus
 quadrata. Et semicirculus igitur $BECDF$ duplum
 est semicirculi BAC . Quare sector $BECG$, cum
 sit sui semicirculi dimidium, æqualis est semicir-
 culo BAC . Sublato igitur communi segmento
 BEC , erit meniscos $BACE$ (dicta vulgò lunu-
 la) æqualis trigono BGC , cui quidem trigono si
 describatur æquale quadratum, quod sit K , erit
 quadratum K æquale menisco $BACE$. Ex hac

itaque prima descriptionis parte manifestum est id quod testatur Aristoteles frequenter, circuli tetragonis non esse quidem $\epsilon\pi\iota\sigma\tau\eta\tau\omicron\upsilon$, quãvis ipsius nondum sciẽtia cõstet. Esse enim aliquod natura quadratũ æquale circulo dato, iã antea docui. Et quod nũc ostẽditur ab Hippocrate de menisco, quæ pars est circuli, nihil idem prohibet de circulo toto sciri posse, et hoc etiã nõ inuestigata quãtitate peripheriæ circuli. Et plus aliquantò dubitationis inferret inuentio quadraturæ menisci nõ cognita, quàm circuli. Reliquam partem prosequemur hoc modo. Posita linea LM , quæ sit duplum ipsius BC , describatur super ipsa semicirculus $LNOPM$, intra quem describatur exagoni æquilateri dimidium $LQSM$, & super exagoni lateribus describantur tres semicirculi LHQ , QRS , SXM . Et quoniam diametros LM duplum est uniuscuiusque diametrorum LQ , QS , SM , semicirculus LOM æqualis est quatuor semicirculis LHQ , QRS , SXM , BAC . Sublatis igitur tribus segmentis cõmunibus LNQ , QOS , SPM , quod relinquitur exagoni dimidiũ $LQSM$ æquale est tribus meniscis $LNQM$, $QRSO$, $SXMP$, & semicirculo BAC . Itaque si ab ipso trapezio $LQSM$ auferatur rectilineum, quod sit æquale tribus meniscis (id enim quomodo fiat in prima descriptionis parte demonstratum est)





est) residuum trapez ij erit equale semicirculo
 BAC. Cuius quidem residui duplo, si quadra-
 b 2



tum æquale describatur, ipsum erit æquale circulo dato $BACG$. Hic demonstrandi modus
 quan

quamvis subtiliter per Geometrica principia, artificiosèque procedat, est tamen in eo vitium illud, quod ab Aristotele dicitur $\Psi\epsilon\upsilon\delta\omicron\gamma\rho\alpha\phi\eta\mu\alpha\ \omega\pi\epsilon\rho\beta\ \delta\ \alpha\lambda\eta\theta\epsilon\varsigma$. Quoniam id quod demonstratur ad descriptionem rectilinei, quod sit æquale menisco, singulare est in eo menisco, cuius semicirculi diametros est quadrati latus intra circulum descripti, nec verum habere potest in eo, cuius semicirculi diametros est latus exagoni intra circulum descripti, idque propter meniscorum inæqualitatē. Quæ quidem statim apparebit applicatione facta menisci BAC super menisco QRS , deficit enim alter ab altero in menisco BEC . Sed iam quò sit evidentior effectus tetragonismi ipsum $\Psi\epsilon\upsilon\delta\omicron\gamma\rho\alpha\phi\eta\mu\alpha$ ex authoris præscripto disponam. Describatur ipsi rectilineo $LQSM$ æquale rectangulum $CDFH$, cui ad lineam CD applicetur rectangulum CI , quod sit æquale triplo quadrati K , hoc est tribus meniscis. Cum sit itaque rectangulum CH æquale tribus meniscis, et semicirculo BAC , sublato rectangulo CI , residuum FI æquale est semicirculo BAC . Quare si fiat quadratum æquale duplo rectanguli FI quale est TR , erit secundum Hippocratem quadratum TR , æquale circulo $BACG$. Quod quidem procul à vero est. Applicato enim circulo $BACG$, ad quadratum TR falsitas sese prodit apertè. Quam Hippocratè

non latuisse puto. Quomodo enim tam acutus in-
uentor rei finem manifestum non vidisset? Sed



prop

propter excellentiam inuenti paralogismus placuit authori. Cui ad propositi scopum id solum deest, quòd non in omni menisco, sed in singulari tantum demonstratio procedit. Apud Proclum libro secundo commentariorum in Elementa, Oinopides Chius menisci tetragonis non inuenisse memoratur. Quisquis autem fuerit author, proles est (vt cum Nasone dicam) non inficianda parenti. Istæ sunt de quadratura circuli traditiones veterum, quas cunque reperi, ante tempus Archimedis. Cuius super hac re sententiam multi postea, alius aliter ab alio dum student recitare, ne non aliquid sui, ad opinionem ingenij, viderentur afferre, satis in eo malè multa commutando deprauarunt, prout in sequentibus ostendam. Sed cum Archimedis sensum exprimere nemo possit Archimede melius ipso, celebratissimum illud opus ipsius, inscriptum Circuli dimensio, hinc inserendum putavi, vnà cum Eutocij Ascalonitæ commentario. Quod si verè, prout res exigit, & cum fide præstare voluero, nequaquam erit illa versio sequenda, quæ sine nomine circunfertur authoris. Quisquis enim fuit interpretes ille, Græca quidem vix mediocriter, Geometrica verò nec leuiter quidem calluit. Vnde & hinc, & aliàs in Archimede toto, multa nimis perperam & ineptè transtulit, addendo etiam, ac minuendo temerè non pauca, vt non minus in eo fi-

dem, quàm intelligentiam requiras. Quæ cum ita sint interpretationem aliam iam hinc exordiar.



Archimedis dimensio circuli Io. Buteone interprete.

I.

OMnis circulus æqualis est trigono orthogonio, cuius quæ quidem ex centro linea æqualis est vni eorum laterum quæ circa rectum angulum, perimetros autem basi.

Habeat $ABGD$ circulus quæadmodum supponitur. Dico quòd æqualis est trigono E . Si enim fieri possit, esto maior circulus, & inscribatur quadratum AG , & ipse peripheriæ bipartiantur æqualiter, & sint segmenta iam minora excessu, quo circulus excedit trigonum. Igitur rectilineum adhuc maius est trigono. Sumatur centrum N & cathetos NX . Est igitur ipsa NX minor latere trigoni E . Est autem & ipsa rectilinei perimetros reliquo latere minor. Quandoquidem & ipsa etiã circuli perimetros. Est igitur rectilineum minus trigono. Quod est absurdum. Sit autem circulus si fieri possit, minor trigono E , et circumscribatur quadratum, & ipse peripheriæ bipartiantur æqualiter. Et excitentur contingentes per signa. Rectus igitur

igitur est angulus qui sub OAR . Quare OR ipsa
 RM maior est. Etenim RM ipsi RA æqualis est.
 Et ipsum igitur ROP trigonum ip-
 sius $MRAPZ$ figuræ maius est,
 quàm dimidium. Relinquantur ipsi
 PZA similia segmēta minora ex-
 cessu quo trigonum E excedit ipsum
 $ABGD$ circulum. Est igitur cir-
 cumscriptum rectilineū adhuc ipso
 trigono E minus. Quod est absur-
 dum. Est enim maius quoniam ipsa
 NA æqualis est catheto trigoni,
 perimetros autem maior est basi tri-
 goni. Aequalis igitur est circulus
 ipsi trigono E .




b 5

11.

Circulus ad id
quod ex dime-
tente quadratum ra-
tionem habet, quàm
vndecim ad quatuor-
decim.

Esto circulus \odot
diametros BA , \odot
circumscribatur qua-
dratum $GDFI$. Et
ipsius GD dupla sit
 DE , sit autem EZ
ipsius GD pars septi-
ma. Quoniam igitur
ipsum AGE ad
 AGD rationem ha-
bet, quàm 21 ad 7. Et
 AGD ad ipsum
 AEZ rationem ha-
bet, quàm septem ad
vnum, ipsum AGZ
ad AGD se habet
sicut 22 ad 7. Sed
ipsius AGD qua-
druplū est ipsum qua-
dra



dratum GI , trigonum autem AGZ ipsi BA circulo æquale est. Quandoquidem ipsa AG cathetos æqualis est lineæ quæ ex centro, basis autem ad ipsam diametron esse tripla, & adhuc excedere propinquissimè septima parte demonstrabitur. Circulus igitur ad ipsum quadratum GI rationem habet, quam undecim ad quatuordecim.


III.

OMnis circuli perimetros triplum est diametri, et adhuc excedit, minori quidem quàm septima parte diametri, maiori autem, quàm decem septuagesimis primis.

Estō circulus & diametros AG , & centrū E , & GLZ linea contingens circulum, & qui sub ZEG angulus tertia pars recti. Ipsa igitur EZ ad ZG rationem habet, quam 306 ad 153. Ipsa autem EG ad GZ rationem habet, quam 265 ad 153. Itaque bipartiatur æqualiter qui sub ZEG angulus, ducta linea HE . Est igitur sicut ZE ad EG , ita ZH ad HG . Et permutatim, & componendo sicut utraque simul ZE & EG ad ZG , ita EG ad GH . Quare ipsa GE ad GH maiorem rationem habet, quàm 571 ad 153. Ipsa igitur EH ad HG potentia maiorem rationem habet, quàm 349281 ad 23409, longitudine autem quàm 591 ad 153. Rursus bipartiatur æqualiter

ter

ter angulus qui sub $H E G$, ducta $E Q$. Per eadem igitur ipsa $E G$ ad $G Q$, maiorem rationem habet, quam $1162 \frac{1}{8}$ ad 153 . Ipsa igitur $Q E$ ad $Q G$ maiorem rationem habet, quam $1172 \frac{1}{8}$ ad 153 . Rursus bipartiatur equaliter angulus qui sub $Q E G$, ducta $E C$. Ipsa igitur $E G$ ad $G C$ maiorem rationem habet, quam $2334 \frac{1}{4}$ ad 153 . Ipsa $E C$ igitur ad $G C$ maiorem rationem habet, quam $2339 \frac{1}{4}$ ad 153 . Rursus bipartiatur equaliter angulus qui sub $C E G$, ducta $E L$. Ipsa igitur $E G$ ad $L G$ maiorem rationem habet, quam $4673 \frac{1}{2}$ ad 153 . Quoniam igitur qui sub $Z E G$ angulus, cum sit tertia pars recti, quater bipartitus est, is qui sub $L E G$ recti pars est quadragesima octava. Ponatur itaque angulo qui ad E equalis qui sub $G E M$. Ipse igitur angulus qui sub $L E M$ recti pars est vicesima quarta. Quare $\&$ ipsa linea recta $L M$ est latus descripti circa circulum polygoni laterum 96 . Quoniam igitur ipsa $E G$ ad $G L$ demonstrata est rationem habere maiorem, quam $4673 \frac{1}{2}$ ad 153 . Sed ipsius quidem $E G$ dupla est $A G$, ipsiusque $L G$ dupla est $L M$. Et ipsa igitur $A G$, ad polygoni 96 laterum perimetron maiorem rationem habet, quam $4673 \frac{1}{2}$ ad 14688 . Et est tripla, $\&$ excedit in $667 \frac{1}{2}$ que quidem minora sunt, quam pars septima ipsorum $4673 \frac{1}{2}$. Itaque polygonon quod circa circulum




lum circumscribitur ipsius diametri triplum est, et
 ,culo minus quam septima parte maius. Ipsa igi-
 tur

tur circuli perimetros multò magis minus est,
quàm tripla & septima parte maior.

IIII.

Esto circulus & diametros AG , & qui
sub BAG angulus tertia pars recti. Ipsa
igitur BA ad BG rationem habet minorè, quàm
 1351 ad 780 . Ipsa autem AG ad GB , quàm
 1560 ad 780 . Bipartiatur equaliter angulus
qui sub BAG , ducta AH . Quoniam igitur
equalis est qui sub BAH angulus ei qui sub
 HGB , sed etiam ei qui sub HAG . Igitur qui
sub HGB ei qui sub HAG est equalis, &
communis qui sub AHG rectus. Et tertius igitur
angulus qui sub HZG equalis erit tertio qui sub
 AGH , equiangulum est igitur AHG trigo-
num ipsi GHZ trigono. Est igitur sicut AH ad
 HG , ita GH ad HZ , & AG ad GZ . Sed
sicut AG ad GZ , sic utraque GAB ad BG .
Et sicut igitur utraque BAG ad BG , ita ipsa
 AH ad HG . Propter hoc igitur ipsa AH ad
 HG rationem habet minorem, quàm 2911 ad
 780 . Ipsa autem AG ad GH minorem, quàm
 $3013 \frac{3}{4}$ ad 780 . Bipartiatur equaliter angu-
lus qui sub GHA , ducta TA . Ipsa TA igi-
tur, per eadem, ad TG rationem habet minorem,
quàm $5924 \frac{3}{4}$ ad 780 , hoc est, quàm 1823 ad
240.

240. Vtraque enim vtriusque est $\frac{4}{13}$. Itaque ipsa AG ad GT rationem habet minorem, quam 1838 $\frac{2}{11}$ ad 240. Bipartiatur adhuc qui sub TAG angulus, ducta KA: Et ipsa KA igitur ad KG rationem habet minorem, quam 1007 ad 66. Vtraque enim vtriusque est undecimarum $\frac{1}{40}$. Itaque ipsa AG ad GK rationem habet minorem, quam 1009 $\frac{1}{6}$ ad 66. Bipartiatur adhuc qui sub KAG angulus, ducta LA. Ipsa igitur LA ad LG rationem habet minorem, quam 2016 $\frac{1}{6}$ ad 66, ipsa autem AG ad GL minorem, quam 2017 $\frac{1}{4}$ ad 66. Conuersim igitur perimetros polygoni ad diametron rationem habet maiorem, quam 6336 ad 2017 $\frac{1}{4}$, quæ quidem ipsorum 2017 $\frac{1}{4}$ maiora sunt, quam triplum & decem septuagesime primæ. Et perimetros igitur 96 laterum polygoni intra circulum descripti triplum est diametri, & maior quam $\frac{10}{71}$. Quare circulus multò magis triplum est & maior quam $\frac{10}{71}$. Ipsa



igitur circuli perimetro triplum est diametri, & minor quidem, quàm septima parte, maior autem, quàm decem septuagesimis primis.

EUTOCCII ASCALONITAE COMMENTA-

rius in Archimedis dimensionem circuli, Io. Buteone interprete.



Onsequens sanè fuerit mihi meum adimplenti propositum, cùm inciderim in ea quæ sunt ab Archimede tradita clarius, & quibus præceptione opus est breui, & in ipsis quæcunque postulant explanari ea, pro facultatis nostræ modulo, his coaptare, quæ sunt in librum de Sphæra & Cylindro à nobis antea conscripta. Erit itaque nobis tanquam propositus ad inspiciendum deinceps libellus Archimedis, inscriptus Circuli dimensio, in quo viri propositum ex ipso titulo perspicimus. Vult enim demonstrare, cui nam plano rectilineo esse possit circulus æqualis. Res iam olim à claris ante ipsum philosophis perquisita. Constat enim hoc genus id esse quæstionis, quàm cùm Hippocrates Chius, & Antiphon peruestigassent,

accu


accuratos nobis illos paralogismos inuenerunt, quos his optimè notos existimo, qui & Geometricam Eudemi historiam diligenter, & Aristotelica Cæria perspexerunt. Cæterum est quidem libellus hic (vt ait Herclides in Archimedis vita) ad vsus vitæ necessarius, ostendit enim quòd peripheria circuli triplum est diametri, & adhuc excedit minus quidem, quàm septima parte, plus autè, quàm decem septuagesimis primis. Hoc etenim (inquit) propinquè demonstratur, inuenta est si quidem ab ipso per quasdam Helices, linea recta quæ sit æqualis datæ circuli peripheriæ.

Ad primum theorema.

Primum theorema vestigationem nullam habens, leuiter etiam vsu Mathematicum exercitatis, perspicuum est, ipsius verbis Archimedis palam expositis, & conclusionem propositioni integrè reponentibus. Videtur autem ad demonstrationem abuti re quadam nondum demonstrata. Exposito siquidem orthogonio trigono. Habeat (inquit) vnum eorum quæ circa rectum angulum latus æquale ei quæ ex centro, reliquum autem peripheriæ. Sed ipsi peripheriæ circuli æqualem lineam rectam sumere, nec ab ipso demonstratū, nec ab alio quoquam traditum. Animaduertere tamè oportet, quàm nihil, præter id quod deceat, ab Ar

chimedede dicatur. Esse enim magnitudinem circuli peripheriam omnino manifestum est, et hanc quidem cuius dimensio constet in vno. Est autem & in eadem specie linea recta. Et si nondum igitur manifestum sit, peripherie circuli equalem lineam rectam posse præstari, attamen aliquam esse naturam lineam rectam equalem ipsi, dubitatur à nullo. Ipsum igitur ab Archimede propositum tale est, quòd triangulum orthogonium sua, sicut prædictum est, habens latera æquale est circulo. Itaque propositum exponendo rem nullam abutitur. Quin potius hoc nomine venit admirandus, quòd ita questiones magnas perspicuo, facilique concludat inuento. Sicut autem dictum est vestigationem nullam habet primum theorema. Nam de triangulo POR quod maius sit, quàm dimidium figuræ $MRAPZ$. Et quòd omnino circa datum circulum describi possit rectilineum, ita vt segmen-

ta conclusa inter circuli peripherias, & latera circumscripti rectilinei minora sint area data, aperte dictum est in his que in primum librorum de Sphæra & Cylindro



dro scripta sunt à nobis.


Buteo. Hoc autem ad theorema decimum inuenies.

Ad tertium theorema.

In hoc theoremate cogimur frequenter dati numeri tetragonici latus inuenire. Hoc autem ad verum inuenire, in eo qui non est quadratus numero, impossibile. Etenim numerus in seipsum multiplicatus facit quendam quadratum numerum. Qui autem $\&$ particulam ad ipsa producta, non iam numerum facit plenum, sed etiam particulam. Quomodo autem oporteat latus propinquè potens datum numerum inuenire, ab Hierone dictum est in metricis, dictum etiam à Pappo, $\&$ Theone, aliisque pluribus, qui magnam Claudij Ptolomei syntaxim exposuerunt. Quare nihil necesse est à nobis ista perquiri, cum disciplinarum studiosis liceat ab illis sumere. Et qui sub $Z E G$ angulus tertia pars recti. Si enim exagoni peripheria bipartita, $\&$ dimidio ipsius ad trientem derelicto, connexuerimus ipsam $E Z$, erit qui sub $G E Z$ angulus tertia pars recti, ipsa enim ad G peripheria, cum sit dimidium eius quæ est exagoni, duodecima est circuli. Quare $\&$ qui sub $G E Z$ ad centrum angulus duodecima pars est quatuor rectorum, tertia igitur recti. Ipsa ergo $E Z$ ad $Z G$ ra-

tionem habet, quàm 306 ad 153. Quòd dupla sit EZ ipsius ZG, hinc manifestum est, Si enim producentes ipsam ZG ad M, & equalẽ ipsi abscindentes, connexuerimus ab ipso E, constituetur qui versus M angulus duæ tertiæ recti. Est autem & qui ad E angulus duæ tertiæ recti, & etiam qui ad Z duæ tertiæ recti. Quare trigoni æquilateri dimidium est ipsum GEZ. Et propterea quod æquilateri basis, æqualis ipsi EZ, bipartitur æqualiter in signo G, dupla est EZ ipsius GZ. Ipsa autem EG ad GZ rationem habet, quàm 263 ad 153. Quoniam enim ipsa EZ supponitur 306, si in se multiplicetur, fient 93636. Ipsa autem GZ est 153. Itaq; quod ab ipsa quadratũ erit 23409. Quoniam igitur quod ex EZ æquale est his quæ ex ipsis EG & GZ, si ab eo quod ex EZ, quod quidem est 93636 abstulerimus id quod ex GZ, quod est 23409, relinquetur id quod ex EG, scilicet 70227, quorum latus tetragoniciũ est 265, & item particula minima, & insensibilis. Deficit enim ipsorum 265 potentia à iusto monadibus 2. Ipsæ autem multiplicationes subiiciuntur.

EZ 306	ZG, 153
in, 306	in, 153
Fit, 93636	Fit, 23409
Reliquum id quod ex EG 70227	
Ipsa autem 265 in se	70225
	Desunt igitur, 2



ITaque bipartiatur æqualiter qui sub ZEG an-
 gulus, ducta linea EH . Est igitur ZE ad EG
 sicut ZH ad HG , per tertium theorema sexti li-
 bri elementorum Euclidis. Et componendo, sicut
 utraque ZE & EG ad EG , ita ZG ad GH .
 et vicissim sicut utraq; ZE & EG ad ZG , ita
 EG ad GH . Utraq; autem EZ & EG maior est,
 quàm 571 , ipsa enim ZE supponitur 306 , ipsa au-
 tem EG 265 , cum aliqua particula. Quare plus
 sunt, quàm 571 . Ipsa autem ZG est 153 . Utraq; igitur
 ZE & EG ad ZG rationem habet maiorem,
 quàm 571 ad 153 . Quare & ipsa EG ad HG
 rationem habet maiorem, quàm 571 ad 153 . Ipsa
 igitur HE ad HG potentia rationem habet, quàm
 349450 ad 23409 . Colligetur autem hoc in hunc
 modum. Quoniam enim data est ipsa EG ad GH

rationem habens maiorem, quam 571 ad 153, si quis supposuerit ipsam quidem EG 571, ipsam autem GH 153. Erit quidem quod ex EG 236041, quod autem ex GH 23409. Vtraque autem cum sint equalia ei quod ex EH, erunt 349450. Horum latus tetragonum est 591 $\frac{1}{8}$ proximè. Deficit enim à iusto in 21 $\frac{6}{5}$ proximè. Ipsa igitur EH ad HG potentia quidem rationem habet, quam 349450 ad 23409, longitudine autem, quam 591 $\frac{1}{8}$ proximè ad 153. Multiplicationes autem subiiciuntur.

EG 571

HG 153

EH 591 $\frac{1}{8}$ In, 571In, 153In, 591 $\frac{1}{8}$

326041

23409

349428 $\frac{49}{64}$

Ex istis colligitur id quod
ex EH esse 349450

Deficit à iusto in
21 $\frac{6}{5}$ proximè.

But. Deficit in 21 $\frac{15}{64}$

Rursus bipartiatum equaliter angulus qui sub HEG, ducta EB. Propter eadem igitur ipsa EG ad GB rationem habet maiorem, quam 1162 $\frac{1}{8}$ ad 153. Fit enim per bipartitionem anguli sicut HE ad EG, ita HB ad BG. Et componendo sicut utraque HE & EG ad EG, ita HG ad GB. Et vicissim sicut utraque HE & EG ad HG, ita EG ad GB. Et est ipsa quidem

EG

EG 571 cum particula quadam. Ipsa autem EH
 591 cum particula. Maiores sunt igitur, quàm
 1162 $\frac{1}{8}$. Et est ipsa HG 153. Vtraque igitur
 HE \curvearrowright EG ad HG rationem habet maiorem,
 quàm 1162 $\frac{1}{8}$ ad 153. Ipsa igitur BE ad BG
 rationem habet maiorem, quàm 1172 $\frac{1}{8}$ ad 153.
 Quoniam enim demonstrata est ipsa EG ad BG
 rationem habere maiorē, quàm 1162 $\frac{1}{8}$ ad 153.
 Si quis supposuerit ipsas sic habere, erit quidem id
 quod ex EG 1350534 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{64}$. Quod autem ex
 BG 23409. Quare id quod ex EB, cum sit equa
 le his quæ ex EG et GB, erit 1373943 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{64}$.
 Quorum latus tetragonum est 1172 $\frac{1}{8}$ proxi
 mē. Deficit enim à iustā potentia id quod ex ipso,
 in 66 $\frac{1}{2}$. Multiplicationes autem subiiciuntur.

EG 1162 $\frac{1}{8}$	BG 153
In, 1162 $\frac{1}{8}$	In, 153
Facit 1350534 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{64}$	Facit 23409

1172 $\frac{1}{8}$
In, 1172 $\frac{1}{8}$
Facit 1373877 $\frac{1}{64}$
Deficit à iusto in 66 $\frac{1}{2}$

Quod ex EB, equale his quæ ex EG
 \curvearrowright GB, est 1373943 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{64}$

Rursum bipartiat^r equaliter qui sub BEG angulus, ducta EK . Ipsa igitur EG ad GK rationem habet maiorem, quam $2334 \frac{1}{4}$ ad 153 . Iterum enim propter bipartitionem eius qui sub BEG anguli, est sicut BE ad EG , ita BK ad KG . Et componendo sicut utraque BE & EG ad EG , ita BG ad GK . Et vicissim sicut utraque BE et EG ad BG ita EG ad GK . Et quoniam demonstrata est ipsa BE $1172 \frac{1}{2}$ cum aliqua etiam particula. Utraque igitur BE & EG maior est, quam $2334 \frac{1}{4}$. Et supponitur ipsa BG 153 . Utraque igitur BE & EG ad BG rationem habet maiorem, quam $2334 \frac{1}{4}$ ad 153 . Ipsa igitur EK ad KG rationem habet maiorem, quam $2339 \frac{1}{4}$ ad 153 . Rursus enim quoniam supponitur ipsa quidem EG $2334 \frac{1}{4}$, Ipsa autem GK 153 erit quidem quod ex EG $5448723 \frac{1}{16}$. Id autem quod ex KG 23409 , his autem equale est quod ex KE , ipsum erit igitur $5472132 \frac{1}{16}$. Quorum latus tetragonum proximè est $2339 \frac{1}{4}$. Deficit enim à iusto in $41 \frac{1}{2}$.

$EG \ 2334 \frac{1}{4}$	$KG \ 135$
$In \ 2334 \frac{1}{4}$	$In \ 153$
$Facit \ 5448723 \frac{1}{16}$	$Facit \ 23409$

$$2339 \frac{1}{4}$$

$$\text{In } 2339 \frac{1}{4}$$


$$\text{Facit } 5472090 \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{16}$$

Ex his colligitur id quod ex $E K$ esse
 $5472132 \frac{1}{16}$. Deficit igitur à iu-
 sto in $41 \frac{1}{2}$.

Rursum bipartiatur equaliter qui sub, $K E$ -
 G angulus, ducta $E L$. Ipsa igitur $E G$ ad
 $G L$ rationem habet maiorem, quàm $4673 \frac{1}{2}$
 ad 153 . Rursus enim propter bipartitionem angu-
 li, est sicut $K E$ ad $E G$, ita $K L$ ad $L G$. Et com-
 ponendo, sicut utraque $K E \& E G$ ad $E G$, ita
 $K G$ ad $G L$. Et vicissim, sicut utraque $K E \&$
 $E G$ ad $K G$, ita $E G$ ad $G L$. Et est ipsa quidem
 $K E 2339 \frac{1}{4}$, cum aliqua etiam particula, ipsa
 autem $E G 2334 \frac{1}{4}$ cum particula. Utraque igi-
 tur $K E \& E G$ maior est, quàm $4673 \frac{1}{2}$, &
 est ipsa $K G 153$. Utraque igitur $E K \& E G$ ad
 $K G$ rationem habet maiorem, quàm $4673 \frac{1}{2}$
 ad 153 . Sicut autem utraque $K E \& E G$ ad $K G$,
 sic $E G$ ad $G L$. Et ipsa igitur $E G$ ad $G L$ ra-
 tionem habet maiorem, quàm $4673 \frac{1}{2}$ ad 153 .
 Cum sit itaq; qui sub $Z E G$ angulus tertia recti,
 duodecima pars est quatuor rectorum, huius autem
 dimidium, qui sub $H E G$ angulus, erit vicesima

quarta, huius autem dimidium, qui sub BEG ,
 pars quadragesima octava, huius autem dimidium,
 qui sub KEG , nonagesima sexta, cuius dimidium,
 qui sub LEG , centesima nonagesima secunda.
 Adiaceat igitur (inquit) equalis ipsi, qui sub
 GEM angulus, & producat ZG ad M . Cum
 igitur angulus qui sub LEM duplum sit eius qui
 sub LEG , pars est nonagesima sexta quatuor re-
 ctorum. Quare & ipsa LM est latus circa cir-
 culum descripti polygoni habentis latera 96. Quo-
 niam igitur ipsa E ad GL ostensa est rationem ha-
 bere maiorem, quam $4673\frac{1}{2}$ ad 153, est autem
 ipsius quidem EG dupla AG , ipsius autem LG ,
 ipsa LM . Et ipsa igitur AG ad LM rationem
 habet maiorem, quam $4573\frac{1}{2}$ ad 153. Econ-
 trario igitur ipsa LM ad AG rationem habet
 minorem, quam 153 ad $4673\frac{1}{2}$. Et quoniam
 ipsa LM est latus polygoni habentis latera 96,
 ipsa polygoni perimetros est 14688. Etenim ipsius
 96 in 153 multiplicatio huc facit numerum. Ipsa igi-
 tur polygoni perimetros ad AG diametrum rationem
 habet minorem, quam 14688 ad $4673\frac{1}{2}$. Ipsa
 ergo polygoni perimetros diametri circuli tripla
 est, & adhuc excedit in $667\frac{1}{2}$. Hic autem
 excessus minor est septima diametri, monadis v-
 nius septima parte. Nam septuplicia ipsorum $667\frac{1}{2}$,
 que quidem sunt $4672\frac{1}{2}$, minora sunt diame-
 tro

tro, monade vna. Quoniam igitur polygonon mi-
nus est, quàm triplum, & adhuc excedens septi-



ma. Ipsa autem perimetros circuli minor est polygono, multò magis igitur circuli peripheria tripla est diametri, & adhuc excedit minus, quàm septima parte.

Ad quartum theorema.

Post hæc autem construens partem theorematis reliquam dicit. Estò Circulus circa diametron AG , & tertia pars recti qui sub BAG angulus. Hoc autem erit, si ad signum G , lateri exagoni æqualem adaptantes GB , cõnexuerimus BA . Angulus enim ad exagoni peripheriam progrediens, in centro quidem duarum est tertiarum recti, in peripheria verò vnius tertiæ recti. Quoniam igitur rectus est qui sub GBA , recti verò triens qui sub BAG , duarum igitur recti tertiarum est qui sub AGB . Si igitur extra producentes ipsam GB versus B , et ipsi æqualem adaptantes connexuerimus ex puncto A , æquilaterum erit triangulum. Et quoniam BA cathetos basim bipartitur, dupla est AG ipsius GB . Itaq; si rursus sumpserimus ipsam AG esse 1560, erit ipsa GB 780. Et id quidem quod ex AG 2433600. Quod verò ex GB 608400. Et si abstulerimus id quod ex GB ab eo quod ex AG residuum erit, id quod ex BA 1825200. Quorum latus tetragonicum est 1351 proximè, superfluit

fuit enim monade. Propterea dicit minorem rationem habet B A ad B G, quam 1351 ad 780. Multiplicationes autem subiiciuntur.

AG 1560

GB 780

In 1560

In 780

Facit 2433600

Facit 608400


Si abstulerimus quod ex
GB ab eo quod ex AG,
relinquetur 1825200

1351

In 1351

Facit 1825201

Excedit iustum
monade.



B Ipartiatu equaliter qui sub B A G angulus, ducta A Z H. Quoniam igitur equalis est qui sub B A H angulus ei qui sub H G B, ad eandem enim peripheriam progrediuntur, sed & ei qui sub H A G. Igitur qui sub H G B ei qui sub H A G est equalis, & communis qui sub A H G

AHG rectus. Et reliquus igitur qui sub HZG
 reliquo qui sub AGH est equalis. Aequiangulum igitur est ipsum AHG trigonum ipsi GHZ
 trigono. Est igitur sicut AH ad HG , ita GH
 ad HZ , & AG ad GZ . Aequiangulorum
 enim trigonorum proportionalia sunt latera, &
 homologa quæ subtenduntur angulis equalibus,
 Sed sicut AG ad GZ , sic utraque GAB ad
 GB , & ipsa AH ad HG . Quoniam enim qui
 sub BAG angulus bipartitur per lineam AZ ,
 est sicut BA ad AG , ita BZ ad ZG . Et com-
 ponendo, sicut utraque BA & AG ad AG ,
 sic BG ad GZ . Et vicissim, sicut utraque BA
 & AG ad BG , ita AG ad GZ . Et est ipsa
 quidem BA minor quam 1351, ipsa autem AG
 1560, ipsa autem BG 780. Utraque igitur AB
 & BG ad BG rationem habet minorem, quam
 2911 ad 780, & AG igitur ad GZ rationem
 habet minorem, quam 2911 ad 780. Sicut autem
 AG ad GZ , ita AH ad HG . Et ipsa igitur
 AH ad HG rationem habet minorem, quam
 2911 ad 780. Propter hoc igitur, est quidem id
 quod ex AH 8463921, id autem quod ex HG
 608400, & est ipsis equale quod ex AG . Et
 ipsum igitur erit 9082321. Quorum latus tetra-
 gonium est $3013\frac{3}{4}$ proximè. Excedit enim ab
 ipsa iusta potentia in $368\frac{1}{16}$. Propter hoc igitur
 dicit

dicit, quòd ipsa AG ad GH rationem habet minorem, quàm $3013 \frac{3}{4}$ ad 780 . Multiplicationes autem subiiciuntur.

$$\begin{array}{r} AH \ 2911 \\ \text{In } 2911 \\ \hline \text{Facit } 8473921 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} HG \ 780 \\ \text{In } 680 \\ \hline \text{Facit } 608400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Quæ ex ipsis } AH \ \& \\ HG \ 9082321 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3013 \ \frac{3}{4} \\ \text{In } 3013 \ \frac{3}{4} \\ \hline \text{Facit } 9082689 \ \frac{1}{16} \end{array}$$

Excedit iustum

$$\text{in } 361 \ \frac{1}{16}$$

B Ipartiatuŕ equaliter qui sub G AH angulus, ducta AQ . Itaque propter bipartitionem anguli, unà cum similitudine trigonorum, & analogia laterum, & componendo & vicissim est sicut utraque HA et AG ad HG , ita AQ ad QG . Et ponebatur ipsa quidem AH minor, quàm 2911 , ipsa autè AG minor, quàm $3013 \frac{3}{4}$, utraque igitur HA & AG minor est, quàm $5924 \frac{3}{4}$, ipsa autem HG 780 . Utraque igitur HA & AG ad HG rationem habet minorem, quàm $5924 \frac{3}{4}$ ad 780 . Quare ipsa AQ ad QG rationem habet minorem, quàm $5924 \frac{3}{4}$ ad 780 . Quare ipsa AQ ad QG

rat

rationem habet, quam $455 \frac{3}{4}$ ad 60. Vtraque enim utriusque est pars $\frac{1}{13}$, & harum quadruplicia. Ipsa igitur AQ ad QG rationem habet minorem, quam 1823 ad 240. Propter hoc enim dicit, quod utraque utriusque est $\frac{4}{13}$. Et quoniam ipsa AQ est 1823. Igitur quod ex ipsa est 3323329. Est autem QG 240, & quod ex ipsa 57600, et est his quæ ex AQ et QG æquale id quod ex AG ipsū igitur erit 3380929. Quorum latus tetragonum est $1838 \frac{2}{11}$, quod enim ex ipso excedit iustum in 321 propè. Itaque ipsa AG ad QG rationem habet minorē, quam $1838 \frac{2}{11}$ ad 240. Multiplicationes autem subiunguntur.

AQ 1823	QG 240
In, 1823	In, 240
Facit <u>3323329</u>	Facit <u>57600</u>
His æquale quod ex	$1838 \frac{2}{11}$
AG 3380929	$1838 \frac{2}{11}$
	<u>Facit $3381252 \frac{37}{341}$</u>
	Excedit iustū in 321 propè
	Buteo excedit in $323 \frac{37}{111}$

B Ipartiatu adhuc æqualiter qui sub QAG angulus, ducta linea KA . Rursus itaque propt

propter bipartitionem anguli, & similitudinem
 trigonorum, analogiamque laterum, & compo-
 nendo, & vicissim est sicut vtraq; QA et AG
 ad QG , ita AK ad KG . Sed vtraque QA &
 AG minor est, quam $3661 \frac{2}{11}$. Quandoquidē
 ipsa QA ponitur 1823. Ipsa autē AG 1838 $\frac{2}{11}$.
 Est autem & QG 240. Vtraque igitur QA et
 AG ad QG rationem habet minorem, quam
 $3661 \frac{2}{11}$ ad 240. Quare et ipsa AK ad KG
 rationē habet minorē, quam $3661 \frac{2}{11}$ ad 240.
 Et quoniam ipsarum $3661 \frac{2}{11}$ undecimarum $\frac{1}{40}$
 est 1007, ipsorum autem 240 etiam $\frac{1}{40}$ est 66.
 Ipsa igitur AK ad KG rationem habet minorē,
 quam 1007 ad 66. Et id quidem quod ex AK
 est 1014049, quod autem ex KG 4356. Qui-
 bus cum sit æquale id quod ex AG 1018405,
 quorum latus tetragonum est $1009 \frac{1}{6}$ proxi-
 mē. Excedit enim iustū in $12 \frac{13}{36}$. Ipsa igitur AG
 ad GK rationem habet minorē, quam $1009 \frac{1}{6}$
 ad 66. Multiplicationes autem subiiciuntur.

$$AK \ 1007$$

$$\text{In } 1007$$

$$\text{Facit } 1014049$$

$$KG \ 66$$

$$\text{In } 66$$

$$\text{Facit } 4356$$

His æquale est quod ex

$$AG \ 1018405$$

d

$$1009 \frac{1}{6}$$

$$\text{In } 1009 \frac{1}{6}$$

$$\text{Facit } 1018417 \frac{13}{36}$$

$$\text{Excedit iustum in } 12 \frac{13}{36}$$

Bipartiatu adhuc equaliter qui sub KAG angulus, ducta AL . Per eadem iam est sicut utraque KA & AG ad KG , ita AL ad LG . Et est ipsa quidem à K minor, quàm 1007 ipsa autem AG minor, quàm $1009 \frac{1}{6}$, ipsa autem KG 66 . Utraque igitur KA & AG ad KG rationem habet minorem, quàm $2016 \frac{1}{6}$ ad 66 . Et ipsa igitur AL ad LG rationem habet minorem, quàm $2016 \frac{1}{6}$ ad 66 . Et quoniam ipsa AL ponitur $2016 \frac{1}{6}$, & quod ex ipsa est $4064928 \frac{1}{36}$, ipsa autem LG 66 , & quod ex ipsa 4356 . Aequale autem ipsis est id quod ex AG , ipsum erit igitur $4069284 \frac{1}{36}$. Huius tetragonum latus est $2017 \frac{1}{4}$ proximè. Excedit enim iustum in $13 \frac{77}{144}$. Quare ipsa AG ad GL rationem habet minorem, quàm $2017 \frac{1}{4}$ ad 66 . Multiplicationes sequuntur.

$$AL \quad 2016 \frac{1}{6}$$

$$LG \quad 66$$

$$\text{In } 2016 \frac{1}{6}$$

$$\text{In } 66$$

$$\text{Facit } 4064928 \frac{1}{36} \quad \text{Facit } 4356$$

His aequale quod ex AG

$$\text{est } 4069284 \frac{1}{36}$$


$$2017 \frac{1}{4}$$

$$\text{In } 2017 \frac{1}{4}$$

$$\text{Facit } 4069297 \frac{9}{16}$$

$$\text{Excedit iustum in } 13 \frac{77}{144}$$

Quoniam igitur ipsa AG ad GL ratio-
nem habet minorem, quam $2017 \frac{1}{4}$ ad
66. Igitur e contrario ipsa LG ad AG rationem
habet maiorem, quam 66 ad $2017 \frac{1}{4}$. Et quo-
niam ipsa GB peripheria pars est sexta circuli,
ipsa igitur HG pars est duodecima, & ipsa TG
vigesima quarta, ipsa autem KG quadragesima
octava, & ipsa LG nonagesima sexta. Itaque
 LG linea recta est latus polygoni habentis latera
96, & est ipsa LG 66. Ipsa igitur polygoni peri-
metros ad circuli diametron rationem habet maio-
rem, quam 6336 ad $2017 \frac{1}{4}$. Hæc autem late-
ra sunt triplicia, & adhuc excedunt in $284 \frac{1}{4}$,
quæ quidem partes sunt maiores decem septuage-



simis primis, quarum una est $28 \frac{117}{284}$ & huius decuplum $284 \frac{17}{142}$. Multo magis igitur circuli peripheria maior est, quam tripla super decupartiens septuagesimas primas. Sicut igitur requirebat locus, numeros ab ipso positos mediocriter explanavi.

Sciendum est autem, quod Apollonius Pergæus Sin Ocytoboo, hoc idem demonstravit, per alios numeros magis prope verum adducens. Hoc autem exquisitius esse videtur, sed est inutile prorsus ad Archimedis scopum. Iam enim diximus illius esse scopum in hoc libro, ut id quod propinquum est inueniret, ad usus in vita necessarios. Quare neque convenienter Porus Nicæus Archimedem in hoc carpere censendus erit, ut qui non inuenerit exactè, quænam linea recta sit æqualis peripheriæ circuli. Propter quod asserit ipse in Kyrijs, dicens præceptorem suum Philonem Gadareum negocium perduxisse ad numeros exactiores his qui dicti sunt ab Archimede, de $\frac{1}{7}$ dico, et $\frac{10}{71}$. Omnes autem vno sese tenore demonstrant ipsius scopum ignorasse. Usi sunt autem myriadum multiplicationibus, & diuisione, quas quidem non est expeditum intelligentia consequi eum qui non sit institutus in Magni calculis. Si quis tamen omnino velit ad id quod minus distat à vero reducere, exemplum dictorum in Mathematica syntaxi Claudij

Ptolomæi sequutus hoc per partes & minuta, & per rectas in circulo lineas faciat oportet. Et istud ego quidē præstitissem, nisi (quod iam sæpe dixi) viderem per ea quæ sunt hic tradita fieri non posse, vt inueniatur exactè æqualis peripheriæ circuli linea recta. Si quis tamen ad id quod prope verum accedit minimùmque differens animum attendat, sufficiunt omnino quæ dicta sunt hic ab Archimede.

Eutocij Ascalonitæ commentarius in Circuli dimensionem Archimedis, æditione prælecta Isidoro Milesio Mechanico præceptori nostro, finitur.

I O. B V T E O N I S
I N D I M E N S I O N E M
Archimedis commentarius incipit.



Vanquam in dimensionem Archimedis multa scienter, & ingeniosè sit commentatus Eutocius, nonnulla tamen adhuc vtiliter ad hanc intelligentiam discutienda putavi.

Omnes enim video, post Archimedem & Ptolemaeum in hac quaestione versatos, erroris causam habere potissimum, quod disputationis huius sensum plenè non capiāt. In primis itaq; disquirēda videtur ipsa tituli ratio. Cùm enim Aristoteles, & alij de hoc problemate loquētes, tetragonismon circuli semper appellent, quam dicunt vulgò quadraturam, mirum videri possit, cur id pertractās Archimedes μετρησιμ, hoc est, dimensionem, potius quàm tetragonismon inscribat, sicut & aliàs in tetragonismo parabolæ facit. Cuiuslibet enim figuræ tetragonismus hoc habet in sensu propriè, ut tali figuræ quadratum æquale, exacta ratione, describas. Ad hæc puto dici posse breviter, quod cùm videret id abs se tantum præstari, quod est vero proximum, & satis ad usum rei, inuentum suum dimensionis nomine communi, quàm artis voce tetragonismon dicere maluit. Solent enim mensores, & Astrologi nonnūquam ad expeditiorem calculum, minutissima quædam negligere, nec propositum suum propterea minus assequuntur. Ad quorum exemplum sese componens Archimedes, id primùm operis sui fronte testatur: nec abutendum titulo putavit. Quod tam erat ab antiquis alienum, quàm recentioribus vsurpatum, qui suas in circulum, non dimensiones quidem, sed demeritas verius, quadraturæ vocabulo venditare glorio

riosum sibi putant.

Ad theorema I.

In hoc opere, sicut aliàs semper more suo, breuitatem sectatur Archimedes, & expedita, succinctaque methodo procedit. Ita tamen, vt nullam Theorematum partem necessariam relinquat. Multa autem quæ sibi lector intelligens, et industrius suppeditare valeat, consultò prætermittit. Et sunt partes incolumes quidè, magis quàm plenæ. Quare non oportet eum qui sit in Geometricis exercitatus leuiter, et adhuc tyro, in Archimedis sese scripta conijcere, ad quæ nunquam penetrabit, sed extra positus exhorrebit confertam angustijs rerum caliginem. Sicut statim experietur in proposito, quisquis non exactè percalleat secundam propositionem secundi solidorum. Vbi per eadem principia quibus hîc, & argumentis similibus demonstratur, quòd circuli inuicem se habent, sicut quæ ex ipsorum diametris quadrata. Et ibi plenè sunt omnia quibus hîc compèdium suppleatur. Aduertere tamen oportet, quàm mirabili re conditæque subtilitate $\epsilon\kappa\tau\epsilon\sigma\iota\upsilon$ trigoni, quam expositionem dicimus prætermittens, hypothesim potius esse velit. Habeat inquit $A B G D$ circulus quemadmodum supponitur. Quod ita supplendum: habeat circulus eam quæ ex centro lineam æqualem catheto tri-

goni, perimetron autem basi. Sic enim in propositione ponitur. Propterea non dixit esto, quod verbum expositioni proprium est, sed ἐχέτω, id est, habeat, quod hypothese magis conuenit. Cur autem expositionem refugiat, ratio est, quoniam legitime fieri non potuit, propterea quod nescimus perimetro circuli æqualem dare lineam rectam, unde fiat basis trigono. Quauis enim Archimedes ipse in Helicis, propositione decima octaua, duabusque sequentibus demonstrauerit, quænam linea recta sit æqualis peripheriæ circuli, non tamen tradidit, nec alius quisquã, quomodo talis linea dari possit. Trigonum igitur argutissime supponit, cuius expositio citra quendam abusum fieri non potest, nec cum exceptione quidem solita cum dicitur εἰ δὲ υἕταιρον, hoc est, si fieri possit. Nam fieri potest in trigono basis huiusmodi. Esse enim aliquã lineam rectam æqualem peripheriæ circuli nemo negauerit, etiam si non fuisset ab Archimede probatum, sicut antea dixi. Fit autem hypothesis legitime, etiam de re non cognita. Ex his itaque constat, quàm scienter, & ex arte expositio trigoni supprimatur in hoc loco. Quare mirari satis non possum, quid in mentem uenerit Eutocio quædam hinc non uera referre, ut abusum postea defendat in Archimede, quem ita fingit dicere. Exposito siquidem orthogonio trigono, habeat (inquit) unum eorum

rum quæ circa rectum angulum latus æquale ei quæ ex centro, reliquum autem peripheriæ. Sed istud nunquam dixit Archimedes, imo (sicut iam probavi) subtiliter, & artificiosè reticuit. Euto- cius igitur artem compendij non aduertens, in hac causa calumniatorem simul agit, & patronum. Post hæc autem cum dicitur, inscripti rectilinei perimetron esse maiorem circuli perimetro. Quã- vis propemodum sit hoc ex seipso manifestum, de- monstratur tamen in principijs de Sphæra & Cy- lindro. Ex hoc theoremate patet, ad circuli tetra- gonismũ nihil aliud desyderari, quàm lineam re- ctam æqualem circuli perimetro. Et hoc sanè est paradoxon quiddam in arte, id scilicet posse de- monstrari, quod dari non possit. Sed dicas fortasse, ad quid nobis æqualitatis ista cognitio? circuli vi- delicet cum trigono tali, cuius basim præstare non possis. Ex hoc respondeo, demonstrationis gradum ad sequentia fieri, quibus hic instituta dimensio perficitur. Iam enim documentum habet geodætes aream circuli ex multiplicatione lineæ quæ ex centro, hoc est semidiametri, in semissem perimetri constare, & nihil aliud quàm peripheriæ quanti- tatem perquirendum. Quam secundùm propinqui- tatem sequentia monstrant.


Ad theorema 2.

d 5

Demonstrationem in hoc theoremate facit
 præcedens, unà cum propositione prima
 sexti Elementorum:

quæ est, quod triangulu
 la & parallelogram
 ma, quæ sub eadem
 sunt altitudine, inuicẽ
 sunt sicut & bases.

Quoniam enim basis
 GE basi GD ponitur
 dupla, & EF ipsius
 GD pars septima. Igi
 tur qualiũ est GD 7,
 talium erit GE 21,
 & GF 22. Quare
 trigonum AGE ad
 trigonum AGD ra
 tionem habet, quàm
 21 ad 7, & item
 AGF ad AGD
 rationẽ habet, quàm
 22 ad 7. Et per ean
 dem quadratum GI
 duplum est parallelo
 grãmi GB, quod qui
 dem GB, per 34 pri
 mi, duplum est trigo
 ni



ni AGD . Ipsum ergo quadratum GI quadruplum est trigoni AGD , cuius area, cum sit equalis quadrato, quod ex GA , ipsa est $12 \frac{1}{4}$, quare $\& GI$ est 49 , id scilicet quod ex dimetiente quadratum. Quandoquidem latus DG equale est diametro BA . Trigonum autem AGF , cum per 34 primi, sit dimidium parallelogrammi contenti sub duabus lineis AG & GF , ipsius area fit $38 \frac{1}{2}$. Supponentes igitur basim GF esse equallem perimetro circuli, erit ipse circulus, per theorema precedens, equalis trigono AGF . Circulus igitur ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habet, quam $38 \frac{1}{2}$ ad 49 . Hoc est in minimis numeris, quam 11 ad 14 . Data autem huiusmodi ratione dimensio circuli facile constat. Quae quam sit vero proxima nos docebit propositio sequens, cuius demonstrationis sunt duae partes.

Ad theorema 3.


EX demonstratis facile colligitur, non alium Archimedis fuisse scopum, quam quem iam statim ab ipsius operis titulo testari mihi velle visus est, scilicet ut dimensionem circuli quandam nobis traderet vero proximam, facilem & expeditam ad usum rei, ex qua sensibilis error non sequeretur. Nam in ratione peruestiganda diametri ad peripheriam, cum magis semper, atque magis

gis prope verum accedere posset, sicut paulò post
 re ipsa monstrabo, non solum id non fecit, sed etiã
 à vero regressus est aliquantulũ, vt limites magis
 notos, et expeditiores ad vsum disponderet, tã vltra
 quàm citra verũ. Qui quidẽ limites $\frac{1}{7}$, dico et $\frac{10}{71}$
 sicut exigua differunt inter se particula, vtpote
 $\frac{1}{497}$, ita & ex alterutro constabit mensura pusil-
 lo discrimine. Nam circulus cuius diametros 14,
 ex primo quidem limite, quoniam perimetros exce-
 dit triplum diametri minus quàm $\frac{1}{7}$, habebit
 aream minus quàm 154. Ex secundo autem, quo-
 niam talis excessus plus est, quàm $\frac{10}{71}$, aream ha-
 bet plus quàm $153 \frac{64}{71}$. Est igitur inter areas diffe-
 rentia $\frac{7}{71}$. Vter autem istorum limitum sit vero
 propior incertum est. Quoniam verum ipsum vbi
 consistat non habemus, hoc est, vtrum distet equa-
 liter, an in equaliter ab vtroque. Talis enim cog-
 nitione permagni ad rem esset momenti. Vsus tamen
 propter facilitatẽ obtinuit, vt ex priori limite sta-
 tuatur $\epsilon\mu\beta\alpha\delta\omicron\upsilon$ circulo dato. Et ita velle videtur
 Archimedes ex theoremate secundo. Vbi dicit
 circulum ad id quod ex dimetiente quadratum ra-
 tionem habere, quam 11 ad 14. Nec curauit, sicut
 verè potuisset, ita proponere. Circulus ad id quod
 ex dimetiente quadratum rationem habet mino-
 rem, quàm 11 ad 14, maiorem autem, quàm 223
 ad 284. Istud autem demonstrabitur hoc modo.

Esto

Estō circulus cuius diametros *A* sit 14, & ex li-
nea quæ sit æqualis diametro *A* describatur qua-
dratum *F*, quod quidem erit 196, fiântque duo tri-
gona ortegonia *B* & *C*, quorum vtræque catheti
sint ei quæ ex centro circuli *A* æquales. Basis au-
tem trigoni *B* sit ipsius diametri *A* tripla sequi
septima, hoc est 44. Erit itaque trigonum *B* 154.
Basis verò trigoni *C* sit eiusdem diametri tripla su-
perdecupartiens septuagesimas primas, hoc est,
 $43 \frac{62}{71}$, eritque trigonum *C* $153 \frac{64}{71}$. Et quoniam

basis trigoni *B* maior
est circuli perimetro,
& basis trigoni *C* mi-
nor est eadem peri-
metro, trigonum *B*
maius est circulo *A*,
& trigonum *C* minus
eodẽ circulo *A*. Inæ-
qualium autẽ magni-
tudinum (veluti pro-
ponit octava quinti)
maior ad eandem, ma-
iorem rationem ha-
bet, quàm minor. Et
eandem ad minorem
rationem maiorem ha-
bet, quàm ad maiorẽ.



Circ

Circulus igitur *A* cum sit minor quam 154, & maior quam $153 \frac{64}{71}$ ad quadratum *F* rationem habet minorem, quam 154 ad 196, hoc est, quam 11 ad 14. Et idem circulus ad quadratum *F* rationem habet maiorem, quam $153 \frac{64}{71}$ ad 196, hoc est, quam 223 ad 284. Circulus igitur ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habet minorem quam 11 ad 14, maiorem autem, quam 223 ad 284. Et e contrario quadratum quod à dimetiente quale est *F* ad circulum rationem habet maiorem, quam 14 ad 11, minorē autem, quam 284 ad 223. Quod erat demonstrandum.

Dimensionum exempla.

Sed iam dimensionum exempla tractemus, eorum respectu, qui nondum plenam in calculis geometricis notitiam habent. Estō circulus *B*, quē ex traditionibus Archimedis oporteat dimetiri. Querenda est in primis longitudo diametri in circulo, mensura qualibet, utpote digitorum, siue pedum. Quam nunc ponamus esse digitos 14. Quadra, hoc est in se multiplica diametron 14, fit 196, Dispone Regulam dicendo. Si secundum Archimedem id quod ex dimetiente quadratum 14 habet circulum 11 quid diametri quadratum 196? Multiplica in 11, fit 2156, partire in 14, prouenit 154. Quæ est dimensio circuli *B* ex limite priori.


Ex

Ex altero autem Regulam ita disponito. Si diame-
tri quadratum 284 dat circulum 223, quid qua-
dratum 196? Operare sicut prius, multiplicando
223 in 196, & productum 43708, partiendo
in 284, eritque proueniens $153\frac{64}{71}$ dimensio cir-
culi B ex limite secundo. Dicendum itaque aream
circuli B continere digitos quadratos paulò minus,
quàm 154. Et paulò plus, quàm $153\frac{64}{71}$. Sed nunc
facito diametrum circuli B grandioribus mensu-
ris esse digitorum decem. Erit igitur ipsius diame-
tri quadratum 100. Dispone Regulam, Si 14 fit
11, quid 100? Operare, sicut antea, & habebis
 $78\frac{4}{7}$, pro dimensione circuli B. Ex ratione au-
tem secundi limitis dispositione facta in hunc mo-
dum. Si 284 dat 223, quid 100? inuenies operan-
do $78\frac{37}{71}$. Et ita se habet dimensionis calculus in
circulis, quanquam alijs etiam modis. Sed hic, &
facilitate, & intelligentia præstat.

Quemadmodum & alij ad dimen-
sionem limites vero pro-
piores inueniantur.


SI quis autem limites alios vero propiores attu-
lerit, rem magis impediet, quàm iuuabit. Istud
tamen cognoscere quomodo fiat non erit inutile, nec
est etiam tam expeditum, ut præstari possit à quo-
libet

libet. Ad hos igitur perquirendos, viam Archimedis ingressus, inde progrediar ubi constitit ille. Resumatur id quod supra demonstratum est in angulo qui sub LEG , scilicet quod linea EG ad GL rationem habet maiorem, quam $4673 \frac{1}{2}$ ad 153 . Rursus itaque bipartiatur equaliter angulus qui sub LEG ducta EP ipsa igitur EG ad GP rationem habet maiorem, quam $9349 \frac{269}{534}$ ad 153 . Sed EG dimidium est ipsius AG , & GP dimidium est lateris circa circulum descripti polygoni laterum 192 . Et ipsa igitur AG ad huius polygoni perimetron rationem habet maiorem, quam $9349 \frac{269}{534}$ ad 29367 , hoc est, quam 4992635 ad 15686784 . Econtrario igitur ipsa polygoni, & multò magis circuli perimetros ad AG diametron rationem habet minorem, quam 15686784 ad 4992635 .



Similiter autem resumentes angulum qui sub LAG litem alterum investigabimus. Bipart

partiatur æqualiter angulus qui sub $L A G$, du-
 cta $Q A$. Ipsa igitur $Q A$ ad $Q G$ rationem ha-
 bet minorem, quàm $4033 \frac{5}{12}$ ad 66 . Ipsa autem
 $A G$ ad $Q G$ minorem, quàm $4033 \frac{777}{1067}$ ad 66 .
 Sed $Q G$ est latus intra circulum descripti polygo-
 ni laterum 192 . Econtrario igitur polygona, &
 multò magis circuli perimetros ad diametrum $A G$
 rationem habet maiorem, quàm 34070784 ad
 10845955 . Et hac via modus erit promouendi
 limites huiusmodi, ut minus semper, atque minus
 distent à vero, nunquam tamen ut ad verum per-
 tingant. Et quò sæpius fiet, eo magis erit usus di-
 mensionis impeditus, propter diminutionem parti-
 cularum, & in numeris augmenta, quæ multiplica-
 tionibus magnis negotium facessunt. Quare qui
 post Archimedes numeris alijs rationem hanc exa-
 ctius demonstrare voluerunt, ut fuit Apolonius
 Pergæus, Porus Nicæus, Philon Gadareus. Omnes
 isti quidem (ut verissimè testatur Eutocius) vno
 sese tenore demonstrant Archimedis scopum non
 intelligere. Quid si nunc reuiuiscens Eutocius tot
 falsas multorum quadraturas in circulum videat?
 nec dimensionis quidem nomine censendas, ut quæ
 sint extra limites Archimedis. Quid, inquam, di-
 ceret Eutocius? Id profecto quod res est, ineptos
 omnes istos non quidem operis scopum in Archi-
 mede, sed opus ipsum non intelligere.



His itaque demonstratis, conclusio fiet per theorema secundum, quod circulus ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habet minorem, quam 3921696 ad 4992635, maiorem autem, quam 8517696 ad 10845965. Et hoc voco secundos limites, per quos inito calculo inuenitur circulus cuius diametros 14 aream habere minorem, quam $153 \frac{4779261}{4992635}$. Maiorem autem, quam $153 \frac{10035771}{10845965}$.

Aliarum dimensionum inuentio.

Alias item dimensiones, quot quisque voluerit, inuenire Archimedis etiam ductu faciliore monstrabo. Circulus cuius est diametros 14 calculo quem per utrunque limitem ex prioribus antea posui, inuenitur potissimo continere minus, quam 154 & plus quam $153 \frac{64}{71}$. Cum sit igitur mensuratum differentia in septem septuagesimis primis, recte poterit pars ipsius differentiae quaelibet ad

ad aream minorem adijci, vt ipsa numero 153 adherens particula $\frac{64}{71}$ fiat $\frac{65}{71}$, vel $\frac{66}{71}$, siue $\frac{67}{71}$. Et ita deinceps quousque fuerit adiectio differentia minor, vel si minutioribus incrementis agere libeat. Augeatur particula $\frac{7}{71}$ grandioribus numeris, æqualitate seruata, ita vt sit vel $\frac{14}{142}$, aut $\frac{21}{213}$, siue $\frac{35}{355}$. Et sic poterit ad numerum 153 adiectio fieri particulae vel $\frac{17}{213}$, vel $\frac{31}{355}$, & aliàs mille modis inter se diuersis, omni quidem propostita multitudine pluribus, cùm numeri particularũ, quantitate non mutata, incrementum infinito recipiant. Nec poterit vlla dimensionũ huiusmodi extra limites primos Archimedis incidere. Erunt quoque singulae alterutro limitum propius vero, incertum tamen an vtroque, & quonam duorum. Quod cùm videatur obscurius, ito demonstro. Ponamus, maioris euidentie gratia primũm limitem esse duodecim, & alterum sex. Et ipsam 12 11 10 9 8 7 6 veri sedem in numero septem consistere. Itaque si feceris dimensionem vnã nouem, & alterã decem, ambæ quidem intra limites, & vero propius erũt quã duodecim, longius tamen quã sex. Si autem veri locus esset in medio, vtpote in nouem, tunc omnis intra limites dimensio veritati vtroque propior esset. Ignota autem, prout est, sede veri, hoc solũ constat dimensiones istas intra limites

haberi, & altero duorum vero propius esse. Quod erat demonstrandum. Est tamen opinabile, verum istud circa medium propinquissimè concludi. Constituetur autem, si quis desiderat, dimensionum huiusmodi singulis sua cuique ratio. Velut si aream circuli dati feceris esse $153 \frac{67}{71}$, sequitur, ut circulus ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habeat, quàm 5465 ad 6958. Sed hoc, ut est ad traditionem scientius, ita & ad dimensionis usum operosius. Vnam adhuc exequi mensuræ speciem per numeros breuiter, nō erit superfluum. Si ponatur circulus ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habere, quàm 2771 ad 3528, tunc in circulo cuius diametros 14 fiet dimensionis area $153 \frac{17}{18}$. Quæ quidem non solum est intra primos limites Archimedis, sed etiam intra secundos. Ad huius rei demonstrationem, cum sit operi toto valde requisita, formulam quandam expeditam indicabo, cuius erit etiam usus frequenter in sequentibus.

Quomodo dignoscatur vna ratio esse maior altera.

Sint quatuor quilibet numeri proportionales $A B C D$, sicut quidem A ad B , ita C ad D , & ita disponatur, ut sit A super B , & è regione sit

sit C super D , ductis que A in D , & B in C , ponan-
 tur ipsa producta super suis cuiusq;
 numeris A & C . Quae quidem pro-
 ducta inuicem sunt equalia. Nam
 si quatuor numeri proportionales
 fuerint, qui ex primo & quarto fit
 numeris, equalis est ei qui fit ex se-
 cundo & tertio. Et e contrario, prout habet deci-
 manona propositio septimi. Sic igitur examen erit
 utrum rationes in diuersis numeris propositae sint
 eadem. Quod etiam verum habet in particulis.
 Velut in exemplo nostro ponamus quod $A B$ sint
 duae tertiae, & $C D$ quatuor sextae, sunt igitur ipse
 $\frac{2}{3}$ idem quod $\frac{4}{6}$. Disponantur iterum, sicut
 prius, $A B C D$, & iungatur ad C quilibet nume-
 rus, utpote F . Et quoniam $C F$ maior est ipso C ,
 maior est ratio $C F$ ad D , quam C ad D , hoc est,
 quam A ad B . Quare & productum $C F$ in B
 maius erit producto D in A , hoc est, producto A
 in D . Rursum dispositis $A B C D$ addatur ad D
 numerus G . Maior est igitur ratio C ad D , hoc est,
 A ad B , quam C ad $D G$. Quare & productum
 $D G$ in A , maius erit producto D in A , hoc est,
 producto B in C . Sic igitur dispositis numeris illa
 semper ratio vel particula, super qua maius erit
 productum, maior erit altera. Quod erat demon-
 strandum.

12	12
A	$4 C$
	X
B	$6 D$

12 18

2 4. 2

 $A \times C \quad F$

3 6

B D

20 12

2 4

 $A \times C$

3 6. 4

B D G

Nunc autem superest ut probemus, quòd prima quam dedi ratio peripheriæ circuli ad diametrò in limitibus secundis, scilicet 15686784 ad 4992635, minor est tripla sesquiseptima, hoc est, quàm 22 ad 7. Et maior tripla superdecupariente septuagesimas primas, hoc est, quàm 223 ad 71. Et similiter de secunda scilicet 34070784 ad 1084565, quod minor est, $3 \frac{1}{7}$, et maior $3 \frac{10}{71}$. Hoc autem fiet multiplicando rationum numeros ad formam modò constitutam, prout in subscriptis quatuor dispositionibus feci.

109807488 109837970

15686784 22

4992635 \times 7

238495488 238611230

34070784 22

10845965 \times 7

$$\begin{array}{r} 1113761664 \\ 15686784 \\ 4992635 \end{array} \begin{array}{r} 1013357605 \\ 223 \\ 71 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2419025664 \\ 34070784 \\ 10845965 \end{array} \begin{array}{r} 2418650195 \\ 223 \\ 71 \end{array}$$

S Imiliter etiam ex quatuor subiectis formulis
 apparet de secundis à me datis rationibus cir-
 culi ad quadratum diametri, videlicet 3921696
 ad 4992635, & 8517696 ad 10845965,
 quòd sint intra priores, scilicet 11 ad 14, & 223
 ad 284.

$$\begin{array}{r} 54903744 \\ 3921696 \\ 4992635 \end{array} \begin{array}{r} 54918985 \\ 11 \\ 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 119247744 \\ 8517696 \\ 10845965 \end{array} \begin{array}{r} 119305615 \\ 11 \\ 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{III}3761664 \\
 3921696 \\
 4992635 \\
 \times 223 \\
 \hline
 284
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2419025664 \\
 8517696 \\
 10845965 \\
 \times 223 \\
 \hline
 284
 \end{array}$$

A *Lia autem, quam supra posui, ratio circuli ad id quod ex dimetiente quadratum, scilicet 2771 ad 3528, quod sit intra limites secundos, duæ formulæ sequentes ostendunt.*

$$\begin{array}{r}
 13834591585 \\
 2771 \\
 3528 \\
 \times 3921696 \\
 \hline
 4992635
 \end{array}$$


$$\begin{array}{r}
 30054169015 \\
 2771 \\
 3528 \\
 \times 8517696 \\
 \hline
 10845965
 \end{array}$$

Circuli dimensiones per lineas quomodo fiant.

D *E circuli mensuribus numeratione faciendis, iam satis (utputo) dissertum. Nunc autem figur*

figuratione rem prosequi, adiectionem multam intelligentia faciet, & suo modo scientia constabit utroque.

Esto circulus BFA , quem oporteat figuratone metiri secundum rationem Archimedis, quae est subsupertripartiens undecimas, hoc est sicut 11 ad 14. Secetur diametros BA equaliter in partes quatuordecim, quarum sit BC trium. Et ex puncto C agatur ipsi BA pros orthas linea CF , & connectantur FA . Dico lineam FA esse la-




tus quadrati dimensionis quæsitæ circuli BFA . Quoniam enim linea CF media proportionalis est inter BC & CA , erit ipsa CF tetragonicum latus 33. Est autem CA tet. lat. 121, & angulus qui sub FCA rectus. Quare quadratum lineæ FA æquale est quadratis duarum linearum, FC & CA . Ipsa igitur linea FA est tet. lat. 154. Est autem diametros BA tet. lat. 196. Cum sit itaque 154 ad 196 ratio subsupertripartiens undecimas, hoc est, sicut 11 ad 14, erit quadratum ex linea FA , quod sit GK , dimensio proposita circuli BFA . Quod erat demonstrandum.

V Idemus itaque quàm facile dimensio procedat ex limite primo. Ex secundo autem plus habet operis. Quàm hucusq; tradidit nemo, tametsi faciat non leuiter ad Archimedis scopon. Sit ergo propositum ex limite secundo dimensionis lineam inuenire. Esto qui prius idem circulus BFA duabus diametris BA & CI sese rectis angulis decussantibus in centro G , quem secundum minorem Archimedis limitem oporteat dimetiri. Sumatur linea recta nõ determinata EH , quæ secetur æqualiter in partes 71, quarum sint decem EL , et producta diametro CI in M , subtendatur angulo recto BGM ipsi EH æqualis BM , & ex BM abscindatur ipsi EL æqualis BN , & ex puncto N agatur ad diametron cathetos NK . Et ipsa GM

ex

extendatur donec sit æqualis triplo lineæ GC , & in super lineæ BK , sitq; lineæ sic extensa GQ . Et super lineæ QC describatur semicirculus QPC , et GB producatu quousq; secet semicirculũ in puncto P . Dico lineã GP esse dimensioẽ circuli BFA . Quoniã enim lineæ BG secta est in signo K ad ratioẽ sectionis lineæ EH , ipsa BK , taliũ est decẽ qualiũ BG , hoc est GC 71. Quare lineæ CG ad GQ rationem habet subtriplã superdecu-partientẽ septuagesimas primas. Pone id quod ex BGA dimetiente quadratum esse 284, erit igitur id quod ex GB , hoc est, ex GC quadratum 71. Cũ sit autem GP media proportionalis inter CG & GQ , ipsa GP est tetragonum latus 223. quare & dimensio circuli BFA secundũ minorem Archimedis limitem. Quod erat demonstrandum. Cũ itaque ex duobus istis limitibus, ambæ dimensionum lineæ tantillo discrimine constant, ut peruestigatione curiosa, & in abaco grandiori deprehendi vix possit, ab his etiã qui norunt uti peritẽ circino, patet apertẽ quanta vicinitate verum concluderit author. Quare nihil ad dimensionem refert, alterutro limite quis utatur, nisi quòd erit, sicuti res apparet, figuratio per maiorem longè magis expedita. Prior igitur nobis datur in usum, alter autem ne sit abusus diminutionis ex maiore. Nam si nos Archimedes

solum




*solum docuisset rationem peripherie circuli ad
diametrum esse minorem tripla sesquiseptima,*

pu

putaret forsitan aliquis esse triplam sesquioctauam, vel adhuc minorem. Nec etiam ex alterutro limite tam esset apertum intelligere vero proximum, quàm ex utroque simul.


Sed quemadmodum antea docui per numeros limites alios intra priores inuenire, idem quoque nunc lineamentis ostendere locus erit. Reponatur figura præcedens, & ad signum A intra circuli portionem $F A$ coaptetur ipsi $G P$ æqualis linea $A R$, sicut hîc factum est, sed interstitio linearum maiore, quàm veritas patiatur, aliàs enim differentie visio in paruo schemate non esset. Si quis igitur ex signo A inter $A F$ & $A R$ lineam coaptauerit in peripheria terminatã, ipsius circuli dimensionem habebit, intra limites Archimedis, alterutro quidem vero propiorem, sed incertum an utroque, & quonam duorum, sicut antea monstravi. Cùm tamen sciamus ex demonstratis in theoremate tertio aliquam lineam rectam ex signo A inter puncta F & R conclusam, esse latus quadrati æqualis circulo $B F A$, locus erit fortunæ, vt ex tali ductu lineæ, non iam dimensionem circuli, sed & tetragonismom assequamur. Ad alias insuper quas libuerit dimensiones numero constitutas, lineamenta faciemus paucis quibusdam ad priorem formam additamentis. Velut in illa quàm supra posui intra li-

mites



mites secundos. Videlicet circuli rationem ad id quod ex dimetiente quadratum esse sicut 2771 ad 3528, unde fit in circulo cuius diametros 14 dimensionis area $15\frac{17}{18}$. Reponatur circulus BFA cum trigono FCA, sumaturque linea recta LK, ex qua abscindatur vni decimæ quartæ diametri BA equalis LN, & ipsa LN secetur equaliter in partes decem & octo, & qualium est LN 18, talium sit NK vnus, descriptoque super LK semicirculo, sumatur inter LN & NK media proportionalis ND, quæ quidem erit tetragonum latus $\frac{1}{18}$. Et ex linea CB abscindatur

datur ipsi ND equalis CP , & angulo qui sub PCF subtendatur ipsi CF equalis PR , & connectantur RA . Cùm igitur id quod ex PC sit $\frac{1}{18}$, & id quod ex PR sit 33 , & æquale his quæ ex PC & CR , erit CR tetragonicum latus $32 \frac{17}{18}$. Quare & linea RA erit tetrago. latus $153 \frac{17}{18}$. Quadratum igitur descriptum ex linea quæ sit equalis ipsi RA erit, secundùm rationem quam dedi, dimensio circuli $BF A$. Quæ quidem, sicut in præcedentibus ostendi, est intra secundos limites Archimedis. Hæc autem descriptio ad omnes dimensionum lineas habendum vniuersè facit, mutata solum linea PC , secundùm rationem datam.




Exig

Exigit tamen figura spatium grandius, quam recipiat angustia chartæ.


Circuli dimensio organicos quomodo fiat.

Ceterum ne quicquam prætermittatur eorum quæ nobis speculatio suggestit ad dimensionis usum facilem, imperitis etiam purvium, organi parabilis & expediti fabricam ad hoc indicabo. Describatur in tabula grandiori complanata diligenter ad regulam linea recta BA , super qua divisionibus quatuordecim signatis æqualiter, delinietur semicirculus, cum inscripto trigono ACF , sicut in figura dimensionis prima docui, vel etiam maiore producta extra semicirculum linea AF quantum libuerit, velut in hoc loco factum est trigonum AMH . Deformatum itaque ex materia qualibet trigonum AMH alterum ex suis ad basim angulis habens æqualem angulo qui sub CAF , organon erit paratum, & expeditum ad omnis circuli propositi dimensionem statim habendum. Applicando siquidẽ organi basim AH super diametro circuli, & angulo A congruente super alterutro terminorum diametri linea ex angulo A secundum organi latus MA in peripheriam ducta, erit dimensio circuli propositi secundum

dum priorem Archimedis limitem.



Prætereà si describantur circuli quilibet, quorū



semidiametri ex linea HA terminetur in puncto A , suam quisque sibi dimensionis lineam abscindet ex trigoni latere MA , prout hic quinque semicirculos in exemplum deformaui super centris $LKNPR$.

Similiter quoque si quis desiderat, dispositis aliarum dimensionum lineis, quas supra monstravi, ab alterutro terminorum diametri in peripheriam, trigona designabuntur organis quibuslibet, eo quod dictum est modo, formandis. Unde circuli dimensio simplici lineae ductu citra calculum proueniet.

Hæc mihi tum ad explanationem, tum et ad amplificationem dictorum Archimedis commentari visum est. Quorum ignoratio temeritatem multorum ad tetragonismorum pseudographias incitauit, pessimum quidem arrogantiae virus. Quod ne sui contagio serpat latius in studijs, et incautos occupet, huiusmodi deliramenta confutationis inuista cauterio, sequenti libro discutiam.

Buteonis commentarij finis.

Dimensio circuli ex Ptolomæo.

Superest adhuc è Græcis C. Ptolomæus, qui libro sexto magnæ syntaxeos in construendis tabulis eclipticis ponit peripheriam circuli ad diametrum rationem habere, quam 3.8.30 ad vnum.

f 2

Quæ quidem ratio ad minimos redacta numeros, eadem est, quæ 377 ad 120. Vnde conclusionem facimus hanc. Circulus ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habet, quàm 377 ad 480. Et sic habetur dimensio circuli cuius diametros 14 esse $153 \frac{113}{120}$. Huius autem propositionis demonstrationem nullam attulit author, sed tantum illud. Hæc (inquit) ratio proximè est inter triplam sesquiseptimam, & triplam superdecupartientem septuagesimas primas, quibus ad faciliorem modum usus est Archimedes. Et verum quidem est rationem istam non solum intra limites primos consistere, sed etiam intra secundos, sicut ex subiectis formulis probatur.

$$\begin{array}{r}
 1882223395 \\
 377 \\
 120
 \end{array}
 \times
 \begin{array}{r}
 1882414080 \\
 15686784 \\
 4992635
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 4088928805 \\
 377 \\
 120
 \end{array}
 \times
 \begin{array}{r}
 4088494080 \\
 34070784 \\
 10845965
 \end{array}$$


Quemadmodum autem dimensiones satis approbat istiusmodi ad limites Archimedis inclusio, ita & tetragonismorum falsitatem abundè notat exclusio. Quorum alterutro simpliciter
 uti

vti, astronomica numeratio non patitur, propterea
 quod diuisio sexagenaria minorum partibus, se-
 ptima dico, & decem septuagesimis primis, non
 metitur. Ex istis itaque perspicuum est, quanti fe-
 cerit Ptolomæus Archimedem, cuius instituto ra-
 tionem à se datam probari maluit, quam sicut non
 erat operosum, ex suis admirandis illis, in primo li-
 bro, theorematibus, atque lemmatibus demonstrare.
 Quibus tam paucis, & expeditis totum quantita-
 tis negotium rectarum in circulo linearum mira-
 biliter absoluit. Quod (vt ait Theon) totis sex li-
 bris Menelaus, et etiam Hyparchus duodecim fue-
 rant prosequuti. Cum igitur ex alijs subtiliter in-
 uentis, tum ex hoc maxime dimensionis opusculo
 apud doctos, & antiquos omnes auctoritatem, si-
 mul & ingenij nomen Archimedes obtinuit. Quò
 magis venit improbandus Orontius tempore no-
 stro, qui traditiones Archimedis semel, iterum,
 atque tertio corrumpere, deinde & reprehendere
 sit ausus. Quod quam impudenter, & indocte sit
 ab eo factum, operis à me suscepti ratio postulat
 vt ostendam. Nam neque minus, imo certe nescio
 an magis confutandi sunt, qui rectas maiorum vias
 prauè distorquent, quam qui nouiter ipsi prauas
 instituunt. Vt autem dimensio Ptolomæi vberius
 intelligatur, ipsam per lineamenta cum demon-
 stratione subieci.

Dimensionis circuli lineam
secundum Ptolomæi ra-
tionem inuenire.

Esto circulus BFA , cuius diametros BA ,
quam ponimus esse tetragonicum latus 480 ,
secetur equaliter in partes octo, quarum septem
sint BH . Rursum pars HA secetur equaliter
in partes quindecim, fiatque HP talium nouem-
decim, qualium est HA 15 , & inter PH &
 HA inueniatur media proportionalis HL , &
connectantur BL . Cum sit itaque HA pars
octaua diametri, ipsa est tetragonicum latus
 $7\frac{1}{2}$, sicut autem HA ad HP , ita & qua-
dratum ex HA ad quadratum ex HL . Ipsa
igitur HL est tetragonicum latus $9\frac{1}{2}$. Est au-
tem linea BH tetragonicum latus $367\frac{1}{2}$.
Cum sit autem quadratum lineæ BL equale qua-
dratis duarum linearum BH & HL , ipsa BL
est tetragonicum latus 377 , quare & dimensio
circuli BFA secundum rationem Ptolomæi.
Quam oportuit inuenire. Si autem linea BL ex
termino A , vel B ad peripheriam applicetur,
& extra producatur quantum libuerit, fiet ichno-
graphia organi dimensionis secundum Ptolomæum,
sicut

sicut antea docui, & hic exhibeo.



f 4



LIBER SECVN-
DVS.

Orontii in dimensionem
Archimedis deprava-
tio prima.



P *SE* igitur Orontius, in ope-
ris sui, quod inscribitur Pro-
tomathesis, libro secūdo Geo-
metriæ capi. 26, loquitur in
hunc modum. Placet autem
(inquit) consequenter demon-
strare circumferētiam ad cir-
culi diametrum, iuxta vulgatum ipsius Archi-
medis inuentum, rationem habere minorem tri-
pla sesquiseptima, maiorem autem tripla super-
decupartiente septuagesimas primas, hoc est, cir-
cunferentiam ter continere diametron, & pau-
lò minus septima, sed plus octaua ipsius diametri
parte. Quod autem dicit, plus octaua ipsius dia-
metri parte, istud est verè corrumpere limitem mi-
norem, hoc est, longius ab altero ponere. Quoniam

pars

ex appositâ formula. Ipsa igitur circuli circumferentia ad diametron rationem habet minorem tripla superdecupartiente septuagesimas primas. Non habet autem sed maiorem, sicut ostēdit Archimedes. Ipsa igitur circuli perimetros ad diametron rationem non habet minorem, quàm 416 ad 133. Falsa est igitur Orontij conclusio, contrariâque proposito. Quòd sit etiam absurda, sic patet. Quoniam enim secundum Orontium perimetros circa circulū descripti polygoni laterū 96 ad circuli diametron rationem habet minorem tripla superdecupartiēte septuagesimas primas. Sed perimetros intra circulum descripti polygoni laterum 96 ad circuli diametron rationem habet maiorem tripla superdecupartiente septuagesimas primas, sicut demonstravit Archimedes. Polygonon igitur descriptum intra circulum maius est polygono descripto circa circulum eundem, pars toto, quod est absurdum. Ex istis igitur apparet, quàm præpositè sit ab Orontio factum, qui maiorem Archimedis limitem citra verum, & infra minorem alterum disponat. Post hæc autem, in conclusione secunda vult Orontius, peripheriam circuli ad diametrum rationem habere maiorem, quàm 1440

ad

$$\begin{array}{r}
 29536 \quad 29659 \\
 416 \quad 223 \\
 \times \\
 133 \quad 71
 \end{array}$$

ad $458 \frac{1}{2}$, hoc est, quàm 2880 ad 917. Sed huiusmodi ratio 2880 ad 917 minor est tripla superdecupartiente septuagesimas primas, velut indicat apposita formula. Ambo igitur limites ab Orontio dati sunt minores vero. Sed ab Archimede limites, alter quidè

maior vero, & alter minor positi sunt, sicuti res exigebat. Ex hoc præterea sequitur

$$\begin{array}{r} 204480 \\ 2880 \\ \times 223 \\ \hline 917 \end{array} \quad \begin{array}{r} 204491 \\ 223 \\ \times 71 \\ \hline 71 \end{array}$$

absurdum, hoc modo. Quoniam enim secundum Orontium in conclusione priori, perimetros polygoni laterum 96 circa circulum descripti ad diametron rationem habet minorem, quàm 416 ad 133, in hoc verò perimetros polygoni laterum totidem descripti intra eundem circulum rationem ad diametron habet maiorem, quàm 2880 ad 917. Sed ratio 2880 ad 917 maior est ratione 416 ad 133, sicut patet ex formula. Polygonon igitur descriptum intra circulum maius est polygono descripto circa eundè cir

culum pars toto. Quod est absurdum. Ipse igitur Orontius dum Archimedem magis du-

$$\begin{array}{r} 383040 \\ 2880 \\ \times 416 \\ \hline 917 \end{array} \quad \begin{array}{r} 381472 \\ 416 \\ \times 133 \\ \hline 133 \end{array}$$

cere quàm sequi voluit, foedè corrupit vtrumque limitem, rationum numeros, contradictione sibi

mag

magna deprauando.

Orontii in dimensionem Archimedis deprauatio
secunda.

Rursum Orontius, post annos duodecim, se ipse vincens turpiter, idem Archimedis inuentum deprauatius quam antea contaminauit, et accessu temporis factus insolentior confidenter arguit. Quod ne fingere videar, iam ipsius verba subscribam, quæ sunt ex libro cuius est inscriptio. Quadratura circuli tandem inuenta, quam ego in Geometricis operibus confutavi. Deinde & post illud opus, subiunxit aliud, cui titulus est. Eiusdem Orontij demonstrationes duæ, altera de area circuli, altera verò de ratione circumferentiæ ad diametrum, quæ duo Archimedis existimantur inuenta. Post hæc autem profequitur in hunc modum. Receptum est (inquit) ab omnibus Archimedem Syracusanum, inter alia monimenta mathematica, duo reliquisse posteris admodum singularia, quorum alterum est de circuli area, reliquum verò de ratione circumferentiæ ad ipsius circuli diametrum. Et paulò post. At quoniam (inquit) ipsa duo Archimedis, quæ nunc citauimus inuenta, succinta nimium, & scabrosa deductione ab ipso demon-
stran

strantur Archimede, adeo ut his solis innotescant, qui diu ac non infœliciter in mathematicis versati sunt. Rem meo officio dignam, & ijs omnibus gratam, ac vtilem simul me facturum existimaui, qui mathematicis oblectantur institutionibus, si post nostram circuli quadraturam vtrumque nouis clarioribusque demonstrationibus elucidarem, & præcisiorẽ vtcunque rationem circumferentiæ ad ipsum diametrum, aliãque non aspernanda tandem colligerem. Iam primum videmus hîc, Orontium impudenter ascribere sibi quod est Archimedis, dum dicit demonstrationes suas esse & nouas. Constat enim & Aristotelis traditione, obseruationeque Geometrarũ perpetua, de qua Proclus multa satis, ratiocinationem eam quæ Græcè ἀποδείξις, Latine demonstratio dicitur, suas habere leges, atque partes ordine certo, cõstitutõque dispositas, suum quoque loquendi modum, vocẽsq; proprias, et ut omnia complectar vno verbo, suam habere methodon, quam qui Geometrica tractant legitimè obseruant perpetuò. Et quicquid ex ea mutatur, fit in peius. Nec est vlla barbaries deterior in disciplinis, quàm abuti methodo. Si quis igitur, prout Archimedes, demonstrationem scienter ordinauerit, alius autem postea super eodem proposito, per eandem constructionem, eadẽque principia, sed inuerso, prauõque modo inculcans multa

teme

temerè, demonstrationem infarciat verius quàm instituat, si sit exprimèda res aptè suo nomine, demonstratio talis præpostera, cōfusa, corrupta, barbara denique, & quidlibet potius quàm nova dici potest. Et quò quisque magis est temerarius, corruptoque iudicio, & artem minus intelligens, hoc illi procliuius fiet aliorum demonstrationes & inuenta isto modo nouare quo fecit Orontius, non solum in Archimede, sed etiam in Euclide, cuius demonstrationes, in sex totis libris Elementorum, altera iam editione fœda barbarie contaminauit. Quas quidem demonstrationes suas etiam appellare non dubitauit ad singularum capita nomen Orontij grandioribus literis appingens. Nulla tamen lex, vel consuetudo transferendi ius dominiij temeratoribus istis attribuit, atque vtinam esset aliqua quæ licentiam tam infrenem multando cohiberet. Verùm permittamus istos, quatenus quidem corruerunt, demonstrationes suas, vt dicant. Ceterum vt ad propositum iam reuertar. Dicit Orontius Archimedis inuenta succinta nimium, & scabrosa deductione ab ipso demonstrari. Quauis enim dura satis, & impropria translatione, et inusitato verbo in hoc significatu deductione loquatur Orontius, & vox succinta magis ad laudem, quàm ad vitium pertineat, puto tamen hic Archimedem breuitatis, simul & obscuritatis argui, de quibus iã satis antea dixisse videor, ad theo

*rema primum in commentario: vnde constat eam
 quæ est in Archimede breuitatem reprehendi iu-
 re non posse, quæ rem mathematicam nihil obscu-
 rat, sicut falso creditur à multis. Quin potius lo-
 quacitas, latè que vagans demonstrando barbaries
 legentium mentibus tenebras offundit. Quæ autem
 rebus ipsis inest obscuritas commentario, vel scho-
 lijs est declaranda, quemadmodum fecit Eutocius
 in Archimede, Proclus in Euclide, Theon in Pto-
 lomæo, alijq; semper in alijs disciplinis ita fecerūt
 versati legitimè. Qui verò scriptorum monumen-
 ta corrumpunt omnibus seculis audiēdo malè, pro-
 bris, & infamia sunt agitati, aliàs enim, cū sit
 hoc expeditum ignaro, & improbo cuique, nihil
 iam syncerum in scientijs haberemus. Ad Orontiū
 redeo, qui dicit se præcisiorem vtcumque rationē
 circumferentiæ ad diametron tandem collecturum.
 Ego autem ostendam suo loco id longè secus eue-
 nire, vt nec ad rationem quidem datam ab Archi-
 mede pertingat. Post hæc Orontius Theorema pri-
 mum Archimedis versibus circiter viginti conclu-
 sum plusquàm ducentorum versuum loquacitate
 prosequitur, lectorem miserum obruens, & ene-
 cans fastidio antequã perducatur ad cōclusionē, qua
 demū posita vbi demonstracionem finiuit ita dicit.
 Quod demonstrandū tadē susceperamus. Iterū cōclu-
 sionē ipsam reposuit Corollarij titulo, quo verbo se-
 pius abutēs ostēdit se ipse nō intelligere quid sit co-*

rollarium. Pergamus reliqua. Orontij propositio
 secunda sic est. Circunferentiam circuli ad eius
 diametron rationem habere tripla sesquiseptima
 minorem, maiorem autem tripla sesquioctava.
 Ineptè satis, & præter Geometricum morem, pro-
 ponitur hîc theorema per infinitiui modi verbum,
 quod problematis est propriû. Sed nimirum author
 ἀμεθοδικός, prauo nouandi studio, passim confun-
 dit omnia, sicut hîc iterum, sed magis apertè quàm
 prius Archimedis limitem longius à vero transpo-
 suit, dicens, circunferentiam circuli ad diametron
 rationem habere minorem tripla sesquioctava.
 Hunc errorem in deprauatione priori satis indi-
 caui. Post hæc autem in demonstratiõne suam pro-
 loquitur ipse, Archimedi primùm blandiens, vt
 acrius postea mordeat. Ait enim. Hoc præstan-
 tissimum Archimedis inuentum de ratione circû-
 ferentiæ ad circuli diametron, quemadmodum et
 proximum de ipsius circuli area longè faciliori,
 magisque succinta, atque fida demonstratiõne,
 quàm fecerit idem Archimedes, vel illius sequa-
 ces conabimur reddere manifestum. O temeritas,
 ò gloria, quæ transuersum rapis Orontium in Ar-
 chimedem, cuius sensum non videns, clausis (quod
 dicunt) oculis Andabatarû more depugnat. Quod
 autem de facilitate se iactat, assentior equidem,
 sed in eam partem, qua demonstratio bona longè
 facil

facilius mala fit, quàm melior. De magis succincta verò gloriari mirum est, cùm id tanquam vitiũ notauerit antea. Et res est quidem longè contraria dicto. Nam qui demonstrationem Orontij legerit, nunquam puto dicturus est, Archimedes se vidisse succintum, sed magis quod apud Terentium Dauus, Cantharam suffarcinatam. Quæ quidem demonstratio quauis plusquam centum quinquaginta versibus sit inculcata, est tamen eiusmodi, vt etiam sine constructione figuræ concludi breuissime possit, in hunc modum. Quoniam, secundum quasdam sinuum tabulas, descripti circa circulum polygони laterum 384 vnum ipsius lateris talium est 980, qualium diametros 119996. Ipsa igitur polygони perimetros ad diametrum rationem habet, quam 376320 ad 119996, hoc est, quàm 94080 ad 29999. Sed peripheria circuli minor est perimetro circũscripti polygони. Ipsa igitur peripheria circuli ad diametron rationem habet minorem, quàm 94080 ad 29999. Et sic primam theorematis partem concludit Orontius. Secunda verò pars totidem verbis absoluetur, fietque conclusio quæ ipse ponit, scilicet quòd peripheria circuli ad diametrum rationem habet minorem, quàm 376320 ad 1200000, hoc est, quàm 392 ad 125. Harum autem conclusionum prima & falsa est, & propositioni contraria. Quod sic patet. Quoniam enim

ratio 94080 ad 29999 minor est tripla superdecupartiente septuagesimas primas, ipsa igitur circuli perimetros ad diametron rationem habet minorem tripla superdecupartiente septuagesimas primas, non habet autem, sed maiorem, sicut ostendit Archimedes. Ipsa igitur circuli perimetros ad diametrum rationem non habet minorem, quam 94080 ad 29999. Aliter etiam confutari potest. Quoniam enim, secundum Orontium, perimetros circa circulum descripti polygoni laterum 384 ad circuli diametrum rationem habet minorem, quam perimetros intra circulum descripti polygoni laterum 96 ad eandem diametron, quae quidem ratio (sicut demonstravit Archimedes) maior est tripla superdecupartiente septuagesimas primas. Ipsa igitur perimetros intra circulum descripti polygoni maior est perimetro circa circulum eundem descripti polygoni, quare, & inscriptum polygonon circumscripto polygono maius erit, pars scilicet toto, quod est impossibile. Haec igitur Orontij conclusio falsa est, & propositioni contraria. Quod oportuit demonstrasse. Secunda autem conclusio, scilicet quod peripheria circuli ad diametron rationem habet maiorem, quam 376320 ad 120000, hoc est, quam 392 ad 125 est etiam

$$\begin{array}{r}
 6679680 \quad 6689777 \\
 94080 \quad 223 \\
 \times \\
 29999 \quad 71
 \end{array}$$

fal

falsa. Quòd sic ostendo. Ponit Orontius, ex quibusdam sinuum tabulis intra circulum descripti polygoni laterum 384 vnum latus talium esse 980, qualium diametros 120000, Ptolomæus autem, libro primo magnæ syntaxeos, demonstravit, lineam rectam in circulo quæ subtenditur vni gra-
 du minorē esse talium 1.2.50, qualium est dia-
 metros 120. Talis ergo linea ad ipsam diametron
 rationem habet minorem, quàm 347 ad 43200,
 & est huiusmodi linea latus intra circulum descri-
 pti polygoni late-
 rum 360. Sed ratio 347 ad 43200 minor
 est ratione 980 ad 120000. Erit igitur intra circulum descripti
 polygoni laterum 360 latus vni minus latere in-
 tra circulum eundem descripti polygoni laterum
 384, sed & maius, quod est absurdum. Non igitur
 intra circulū descripti polygoni laterum 380
 perimetros ad circuli diametron rationem habet
 maiorem, quàm 376320 ad 120000, hoc est,
 quàm 392 ad 125. Falsa est igitur Orontij con-
 clusio secunda. Quod erat demonstrandum. Cete-
 rum in hac depravatione mirum quiddam, et præ-
 posterum contigit authori. Constat enim ex his
 quæ suprâ ad Archimedis dimensionem dixi, &

$$\begin{array}{r}
 41640000 \quad 42336000 \\
 347 \quad 980 \\
 \times \\
 43200 \quad 120000
 \end{array}$$



exemplo monstravi, rationem peripheriæ circuli ad diametron eo semper magis vero propinquam dari posse, quò per polygona plurium laterum demonstratio fiet. Primum enim Archimedes per polygona laterum 96 duos limites vero propinquos instituit. Et ego deinde viam Archimedis ingressus, per polygona laterum 192, duos limites alios vero propinquiores demonstravi. Ad postremum Ptolomæus quintum limitem propinquissimum vero constituit, cuius demonstratio facile posset institui, per inscriptum circulo polygonon laterum 360. Itaque si per ea quibus utitur polygona laterum 384 legitimè ratiocinatus esset Orontius, limites satis propinquos adduxisset. Quod nequam fecit, sed retro lapsus est turpiter & ab eadem parte, quæ deficit à vero. Quoniam utraque rationum quas ipse dedit minor est tripla superdecupartiente septuagesimas primas. Quod statim per eas quas subieci formulas erit in prospectu.

6679680	6689777	27832	27875
94080	223	392	223
29999	71	125	71

EX his itaque patet nescio quas istas sinuum tabulas, quibus nititur author, vel esse depravatas ab ipso, vel nō intellectas. Cui tam preposterus

rus

rus error adeo placet in hoc loco, ut in Archimedis reprehensionem aperte prorumpat, his verbis. Non habet ergo circumferentia circuli ad diametron rationem tripla superdecupartiente septuagesimas primas, ut asserit Archimedes, maiorem. Hoc autem Archimedes non verbis asserit, sed legitima demonstratione probavit, cui contradicere, nisi falsam ostendas, arrogantiae stultae plenum est. Et ex hoc Orōtius videtur catulus (quod ait) allatrare leonem. Satis itaque videor ostendisse, quam egregie sit conatus author, inuentum istud Archimedis, ut ipse gloriatur, reddere manifestum, demonstratione magis fida, quam fecerit idē Archimedes, vel illius sequaces. Quasi verò fieri possit in demonstrationibus, ut una sit verior alia, vel sicut inepte dixit, magis fida. Et tanquam parū esset Archimedi se prætulisse, posteris etiam insultat, quos barbarè vocat sequaces: in quorum patrocinium respondeo breuiter. Nullum unquam omnium, quos equidem legerim (legi enim multos) nullum inquam me vidisse tam ineruditum, nec tam prauo tumidoque iudicio, qui propositū istud referendo ita deprauarit, ut falsum, & contrariū propositioni concludens, & extra limites delatus, insurgat postea tam impudenter in Archimedem. Alia deinde molitur author ad hoc propositum demonstrare, quae qualia sint despiciamus.

Ratio (inquit) tripla sesquiseptima magis accedit ad veram rationem circumferentiae ad diametron, quàm tripla sesquioctava. Hoc autem asseritur temerè, quoniam non probatur per ea quae sequuntur, dum ait. Nam differentia inter residuum triplati diametri à toto ambitu circumscripti, vel inscripti polygoni regularis habentis latera 384, & septimam totius diametri partem, minor est differentia eiusdem residui & octavae partis ipsius diametri, iuxta enim huiusce propositionis primam partem ipsum residuum fuit partium 16332, iuxta verò partem secundam 16320. Et utrobique pars septima diametri partium ferè 17142, octava autem partium circiter 15000. Differentia porrò inter 16332 & 17142 est 810. Inter verò 15000 & 16332 est 1332. Differentia rursus inter 16320 et eadem 17142 est partium 822, & ipsa 15000 partium 1320. Minus ergo distat ipsum residuum à parte septima, quàm ab octava, & proinde ratio tripla sesquiseptima præcisiior est tripla sesquioctava. Hæc longa cantilena brevius, & ad intelligentiam facilius explicari potuit in hunc modum. Descriptis intra, & extra circulum duobus polygonis, quoniã excessus uterque perimetri polygonorum in triplum diametri minus excedit septimam, quàm octavam partem diametri, propterea ratio tripla sesquiseptima magis accedit

cedit ad verum, quàm tripla sesquioctava. Huiusmodi probatio satis confutatur ex eo quod nullis principijs Geometricis constat. Mirum etiam auctorem non vidisse numeros in exemplum adductos nullo modo convenire proposito, cum non contineant rationes ipsas quæ ponuntur. Ex quo planè videri possit seipse non intelligere quid velit in hoc loco. Sed ut iam intelligatur, fiet in minimis numeris disposito ad propositum ipsius hoc modo. Esto circuli diametros A 56, cuius partes septima & octava sint B 8, & C 7, & descripti circa circum polygoni perimetros in ratione tripla sesquiseptima ad diametron, sit D 176, cuius excessus in triplū diametri sit F 8, & intra circum descripti polygoni perimetros sit E 175, scilicet in ratione tripla sesquioctava ad diametron, cuius quidem perimetri excessus in triplum diametri sit G 7. His itaque dispositis, quoniam uterque polygonorum excessus, scilicet F & G , nihil excedit septimam partem B , manifestum est probationem istam, qua nititur, esse falsam, & absurdam.

F 8		G 7
D 176	56	E 175
B 8	A	C 7

Sed quid attinet ista perquirere, cum iam tres
 datæ sint aliæ rationes quæ minus à vero defi-

g 4

ciunt ipsa ratione tripla sesquioctava. Quarum prima est secundi limitis ab Archimede data, secunda quarti limitis, quam ego dedi, tertia est Ptolemei, pro limite quinto. Cæterum non contentus author secundum Archimedis limitem iam semel, atque iterum longius à verò semouisse, itidem & primum limitem citra verum constituit, dicens. Precisior adhuc est ratio tripla superbipartiens quindecimas (vt 3 & $\frac{2}{15}$ ad 1) ipsa ratione tripla sesquiseptima. Sed quomodo limitum differentiam ostendat Orontius? qui ne limites quidem ipsos videre potuit, Archimede monstrante. Ad hoc autem probandum cantilenam rursus eandem, sed prolixius quàm antea, canit. Cui nihil occinendum ultra putavi, quàm quod per formulas subiectas breuiter ostendo, rationem vtrunque datam ab ipso esse minorem tripla superdecupartiente septuagesimas primas, quæ quidem sicut demonstratum est, deficit à vero. Ratio autem tripla superbipartiens decimas quintas in minimis numeris est 47 ad 15, tripla verò sesquioctava est 25 ad 8.

3337	3345	1775	1784
47	223	25	223
15	71	8	71

ET in hac quidem tractatione simile quiddam accidit Orontio, quod errantibus solet in mund

mundo syderibus. Quæ tametsi raptu firmamenti circumferantur, nequaquam tamen eandem cum ipso circulationem perficiant, sed motibus alijs quos habent primæ versationi contrarios, retrogradationes quasdam in obliquum occultè patiuntur, quas inueniunt qui diligenter obseruant. Sic Orontius quauis instituerit cum Archimede cursum, non tamen cum eo peruenit ad metã, sed relictus substitit, propterã quod inter currendum ad novos quosdam numeros, & ineptos sese commouit. Et sanè (iuxta prouerbiũ vetus) Mandrabuli more res illi processit. Satis enim constat ex prædictis, limites Archimedis deterius hîc, quàm in deprauatione priori fuisse corruptos. Supererat adhuc ex dimensione theorema secundum, in quo nihil admodum inueniens quod innouaret Orontius, & nomen, & ordinem mutauit, inscribens Corollarium 4. Quo nomine semper abutens (sicut iam antè notauimus) ostendit se non intelligere quid sit Corollarium. Tertium quoque deprauationis genus in Archimedem fecit Orontius ad finem quadrature, quam adhuc ipso viuente reprobauimus. Fuerunt & alij nonnulli (quemadmodum iam suprã testatus sum) qui in hac Archimedis demonstratione, ne parum ingeniosi viderentur, quædam commutarunt, sed (vt fieri solet) in deterius, hæctenus tamen, vt saluo proposito, solam turbauerint me-

thodon. His igitur omiſſis traditiones aliorum de circuli tetragonismo, ſeruato temporis ordine, proſequamur. Ex quibus in primis ſeſe proferunt Arabes, quos & in quæſtionem hanc, nullius authoris, quem legerim nomine certo, incubuiſſe ferunt. Horum autem ſententia proponi poterit breuiter, in hunc modum.

Tetragonismus ſecundum Arabes.

Omnis circuli perimetros ad diametrum decupla eſt potentia. Huius propoſiti demonſtrationem nullam inueni, ad quod reſpondetur, ſicut temerè proponētibus ſolet hoc non eſſe verum. Non erit tamen inutile, nec alienum ab inſtituto, demonſtrare paucis, hoc eſſe falſum. Eſto, ſi fieri poſſit, vt perimetros circuli ad diametron ſit decupla potentia, & ponatur eſſe diametros I. Erit igitur perimetros maior, quàm $3\frac{1}{7}$, ſed oſtēdit Archimedes eſſe minorem. Nam $3\frac{1}{7}$ eſt tetragonum latus numeri $9\frac{43}{49}$, qui minor eſt quàm 10. Non eſt ergo circuli perimetros ad diametrum decupla potentia. Quod erat demonſtrandum. Patet igitur huiusmodi tetragonismo, ſecundum Arabes, eſſe falſum, & extra limites Archimedis. Nunc autem poſt Arabes conuertamur ad inuen-

ta nostrorum de circuli quadratura.

Tetragonismus Campani.

EXtat libellus cuius est inscriptio circuli qua-
dratura per Campanum adinuenta. De qua
primùm in inscriptione dico quod est falsa, si Campa-
num intelligas eum qui fuit Euclidis interpres, Geo-
metra sanè non indoctus, sicut alia ab ipso scripta
testantur. Quisquis autem istius de quo loquor,
tetragonismi fuit inuentor statim qualis fuerit suis
se coloribus ipse depingit, hoc est, indoctum, barba-
rum, temerarium, in quo ne vocabulorum quidem
artis, eorum quæ nota ferè sunt in vulgus, vesti-
gium possis agnoscere. Huius ego disputationem,
nec etiã reprobatione dignam mecùm ipse reputabã,
nisi probari nonnullis vidissem, præsertim astrolo-
go satis etate nostra prædictione futurorum cele-
brato, is est Lucas Gauricus Iuphanensis, qui dili-
genter, quantum in se fuit, commentario prolixo,
quem vocat additiones, hanc ipsam illustravit.
Hunc sequutus quidam Brauardinus, totum Cam-
pani tetragonismon, authoris nomine supresso cõ-
pilauit ad verbum. Adeo nihil est tam ineptum,
& absurdum, quod non suos sectatores, vel etiam
fures inueniat. Sed iam Campanum istum subditi-
tium audiamus suas conclusiones balbutientem, sic
enim problemata simul & theoremata conclusio-

NUM

num impropria voce confundit, quem ab usum cōmentarius est sequutus dum ita præfatur in authorem. Gaur. Ad demonstrandam igitur circuli quadraturam Campanus noster primò quatuor præmittit conclusiones, & quidem facillimas, secundò autem ex his inducitur quinta, quæ simul cum sexta totam de circuli tetragonismo demonstrationem manifestissimè concludit. Camp. Prima conclusio. Lineam orbiculariter ductam bina diametro in quatuor equalia secare. But. in hoc proposito pauciora penè sunt verba quàm vitia. Primum enim cum ait, lineam orbiculariter ductam, intelligens peripheriam circuli, hoc improprium, & falsum est, quoniam incertum. Nam linea orbiculatim, neque enim barbarè cum ipso dicam orbiculariter, linea, inquam, orbiculatim ducta non magis significat peripheriam circuli, quàm ambitum curvilineæ figuræ cuiuslibet. Deinde quòd dicitur, bina diametro, superfluit, & præposterè ponitur in hoc loco, qui proprius erat in constructione figuræ. Post hæc autem prosequitur author, ut problema demonstraret, hoc modo. Camp. Diameter est linea recta ab extremo in extremum per centrum ducta diuidens figuras in partes equales, si sint igitur duæ diametri sese interfecantes in centro ad angulos rectos diuiderent figuram in quatuor partes equales. Et notandum, quod diameter

dic



dicitur à dia, quod est duo, & metros, quod est mensura, duarum medietatum quasi mensura. But. Hic tot in vnum concurrunt vitia, vt sit operosum ea ipsa distinguere. Nam diametri definitio, præter id quod deprauatè refertur, est etiam superflua, quia nihil ad propositi demonstrationem facit, & est confusa propter vniuersalem dictionem, figuras, ex qua sequitur etiam falsum, quia non in omni figura dici potest diametros, nec etiam centrum, nec item verum est vniuersè, quòd duæ lineæ sese intersecantes ad angulos rectos diuidant figuram in quatuor partes equaliter. Author deinde noster, ne minus Græcè scire quàm Geometricè videretur, egregium illud etymon facit, à dia, quod est duo, cum Græcè dia præpositionem esse norint etiam pharmacopole. Ex his itaque dici non potest quàm sit euidentis signum hominis imperiti, & alieni prorsus ab institutis Geometricis, qui se per etymologiam vocabuli demonstrationem fecisse putauit. Quem demonstrandi modum sequitur Gauricus, longius etiam à proposito digrediens, adductis superflue definitionibus figuræ, circuli, lineæ rectæ, diametri ad cuius etymon hoc amplius addit. Gauricus. Diametros dicitur, quasi per medium metiens, videlicet duarum medietatum equalis diuisio ac mensura. But. duarum medietatum equalis diuisio facit quatuor partes

inui

inuicem, æquales, quale secundum Gauricum, diametros circulum diuidit in quatuor partes, quod est absurdum. Quemadmodum autem hæc omnia nihil ad demonstrationem pertinent, ita & ipsum problema ad tetragonismi propositum nihil facit. Et si quid faceret, satis erat dicere, secetur peripheria circuli in quatuor partes æqualiter, ad hoc enim est problema 30 libri tertij Elementorū. Cap. Secunda conclusio. Lineæ orbiculariter ductæ lineam rectam æqualiter dare, supple, est possibile. Nam iuxta mathematicorum scientiam, ac phisicam veritatem circulus diuiditur in 22 partes, et remota vna scilicet vigesima secunda particula tertia remanens scilicet septima est diameter circuli, tripletur igitur diameter, & addatur septima, & ordinentur huiusmodi partes in rectum, et habebitur linea recta æqualis circulari. Gauric. Additio. Antequam ad enodandum Campani literam deueniamus, est notandum quòd nonnulli Geometræ imaginantur hoc pacto circulum in 22 partes æquales diuidi. In primis duo seorsum describantur circuli eiusdem magnitudinis. Deinde alter ipsorum, constricto circino, in tres æquales porciones diuidatur, postea vna illarum trium partium rursus in septem æquas portiunculas reseceatur. Deinde vna ipsarum septem particularum, nõ variato circino, constituitur in altero circulo. Po-




stare

streinò totum circuli residuum, dempta particula
 in eo designata, incipiendo tamen à punctis illius
 particulae illic designatae resceces in tres portiones
 equales. Et quamlibet illarum triū partiū diuidas
 iterū in septē equales particulas, & sic circulū in
 22 equales ferè portiunculas diuisum. But. istorū
 barbariem, cū in verbis, tum magis in rebus tam
 manifestam, vt neminem, vel leuiter in mathema-
 ticis institutum fallere possit, subtilius esse puto
 videre, quàm notare. Multa deinde Campanus se-
 cundū ea quae tradit Archimedes de ratione pe-
 ripheriae circuli ad diametron ita balbutit, vt ab
 his quibus aliàs nota res est, satis perspiciatur se
 ipse non intelligere. Et tandem ad conclusionum
 suarum ordinem reuersus, tertiam & quartam
 ita ponit. Camp. Tertia conclusio. Lineam rectam
 in quatuor equalia secare. Quarta conclusio. Ex
 quatuor lineis rectis equalibus quadratum equi-
 laterum, atque rectangulum collocare. But. Hæc
 duo problemata Campanus & Gauricus quamuis
 ducentorum propè versuum loquacitate prose-
 quantur, vt demonstrant, nihil tamen minus quàm
 demonstrationem faciunt, ex quo sese produnt
 apertissimè ipsa problemata in Elemētis nunquam
 intellexisse, quae decimum & quadragesimum
 sextum ordinem tenent, libro primo. Vbi mi-
 nus quàm triginta versibus ostenduntur. Quis
 etiam

etiam non videt id esse ridiculum in problemate quinto, cum dictum esset ex quatuor lineis equalibus, addidisse postea, equilaterum, quasi fieri possit, ut figura constans quatuor lineis inuicem equalibus non sit equilatera. Superuacuum etiam fuit addere rectangulum, quod satis importabat ipsa quadrati dictio, cuius definitionem ex hoc ignorasse videtur. Sed tandem ad rem ipsam veniens ait. Camp. Quarta conclusio. Omnis figura plana vnica linea orbiculariter ducta contenta, cuius diametros transcēdit præcisè quartam eiusdem figuræ in semipartibus tribus, est equalis quadrato cuius latus eiusdem circuli diameter transcēdit præcisè in semipartibus tribus. Huius veritas sic patet. Nam quæcunque ab eodem superantur equaliter inter se sunt equalia. Si enim tetracubito aureo, & tetracubito argenteo à pentacubito ligneo equaliter superantur, quia in cubito vno tetracubitū aureū et tetracubitū argenteū necessariò equantur. Quia igitur quælibet quarta, & quodlibet latus huius quadrati à diametro circuli equaliter superantur, quia in semipartibus tribus, quælibet quarta circuli, & quodlibet latus quadrati huius sunt equalia. Et sic circulus & huiusmodi quadratum sunt equalia. But. Ad istiusmodi traditionem tetragonismi hoc theorema satis erat, in quo prætermisissis verborum vitijs, quibus

quibus totum scetet, rem ipsam discutiamus, quæ magis erit in promptu, si Geometricè proponatur, hoc modo. Omnis circulus est æqualis quadrato, cuius latus talium est quinque semis, qualium circuli diametros est septem. Esto centrum \odot circulus A , cuius diametros BC secetur æqualiter in partes 7, \odot ex linea recta DF , quæ sit talium $5\frac{1}{2}$ qualium est diametros 7 conscribatur quadratum $D F G H$. Vult itaque Campanus, vt circulus A sit æqualis quadrato $D H$. Cuius ratio qua demonstrationem facere conatur nihil aliud est, quàm ideo circulum æquale esse quadrato, quoniam ipsius peripheria circuli æqualis est perimetro quadrati, hoc est, quatuor ipsius lateribus. Quod minimè verum est, quanuis proximum vero. Sed iam dato, vt circulus \odot quadratum sint isoperimetra, nequaquam tamen ex hoc sequitur vt sint inuicem æqualia, quanuis ita credi possit naturali quodam, vulgarique iudicio. Sicut Quintilianus ipse testatur, cuius verba subscripsi. Quis (inquit) non ita proponenti credat? Quorum locorum extreme lineæ eandem mensuram colligunt, eorum spatium quoque, quod ijs lineis continetur, par sit necesse est. At id falsum est. Nam plurimum refert cuius sit formæ ille circuitus, reprehensiq; ab Geometris sunt historici, qui magnitudinem insularum satis significari nauigationis

ambitu crediderunt. Nam ut quæque forma perfectissima, ita capacissima est, ideoque illa circuncurrens linea si efficiet orbem, quæ forma est in planis maxime perfecta, amplius spatium complectetur, quam si quadratum paribus oris efficiat. Rursus quadrata triangulis, triangula ipsa plus æquis lateribus, quam inæqualibus. His itaque verbis Fabij propositum Campani verissime confutatur. Est etiam expeditum probare circulum *A* esse maiorem quadrato *DH*. Constat enim ex Archimedis dimensione, embadon circuli *A* esse $38 \frac{1}{2}$, ipsius autem quadrati *DH* est $30 \frac{1}{4}$. Maior est igitur circulus *A* quadrato *DH*. Sed istud quoque statim patebit



bit experimento, etiam imperitis. Excitentur in quadrato DH diagonij sese decussantes in signo K . Et ipsum quadratum superponatur, appliceturque circulo, ita ut signum K congruat cum centro A . Quis est igitur oculorum sensu tam hebes qui non illico deprehendat, quatuor illa circuli segmenta extra quadratum esse maiora quatuor excessibus quadrati in circulum? Ex his igitur manifestum est tetragonismon Campani falsum esse, & procul extra limites Archimedis.

Supereft ut ostendam quomodo sit ipsa demonstrationis ratio verbis, & exemplo corruptissima. Camp. Quaecunque ab eodem superantur equaliter inter se sunt equalia. But. Hic sensus est, sed verbis deprauatus, illius theorematu in Elementorum quinto, quod sic habet. Quae ad eandem habent rationem eandem aequales sunt inuicem. Et hoc ad propositum ita debuit applicari. Quoniam ratio circumferentiae circuli ad diametron est tripla sesquiseptima (quod tamen falsò ponit Campanus) est autem & ratio perimetri quadrati ad eandem diametron tripla sesquiseptima, equalis est igitur peripheria circuli perimetro quadrati. Sed nunquid superuacuum est, vel stultum potius, equalitatem istam velle probare? quae iam per constructionem facta est. Attendamus etiam, quam alienum, & ineptum rationis suae proferat exem-

plum. Camp. Si enim tetracubitus aureus, & tetracubitus argenteus à pentacubito ligneo equaliter superantur, quia in cubito vno, tetracubitus aureus, & tetracubitus argenteus necessario equantur. But. Tetracubitus & pentacubitus vocabula sunt barbara Græcè Latinèque confusa, & nihil aliud signare possunt, quàm cubitos quatuor & quinque. Sed ideo cubitos aureos, argenteos, & ligneos apposuit, cum nihil proposito seruiant, ne stultè loqui deprehenderetur, si prout res exigebat, numeros solum in exemplo dixisset, hoc modo. Si quatuor & quatuor à quinque superantur equaliter, quia in monade, quatuor & quatuor necessario equantur. Hæc etiam ratio, prout à Campano dicta est, ad alia transferri poterit, vnde proueniet absurdum. hoc modo. Si enim quatuor formicæ, & quatuor leones à quinque bobus superantur equaliter, quia in vno boue, quatuor formicæ, & quatuor leones necessario sunt æquales, quod est absurdum, simul & ridiculum. Ad huiusmodi nugamentorum expositionem tantum diligentie Gauricus adhibuit, vt magistro suo Campano videatur ineptior. De cuius commentario toto verius nihil dicere possum, quàm (quod veteri prouerbio fertur) dignum patella operculum. Expeditis quæ ad confutationem Campani sufficere visa sunt, iam conuertamur ad ea, quæ Nicolai Cusani

sani

sani nomine sunt inscripta, de Quadratura circuli, quæ tametsi per Regiomontanum eius coætaneum, simul & conterraneum fuerint peritè discussa, exigit tamen operis instituti ratio, vt sententias vtriusque scriptis meis interferam.

Tetragonismus Cusani I.

Primùm itaque Cusanum audiamus suam quadraturam sic exordientem. Cusan. Quãuis iandudum à studio Geometrico nos altior speculatione, ac publica retraxerit utilitas, tamen inter innumeras, seriosasque curas se inter colloquia studiosorum, delectabiliter immiscuit de quadratura circuli scibilis, & nondum scita assertio. Quam dum nuper equitando reuolueremus, quod attigimus, conscripsimus. *But.* Hic author in operis principio ad opinionem ingenij sese latenter insinuans, excusationis prætextu, hanc animis nostris cogitationem cautius ingerit. En qualis iste vir, quantus ingenij bonis, quem tametsi speculatione sublimior à Geometricis studijs abduxerit, curæq; graues, atque multiplices circunsteterint, cum tamen delectamenti gratia ad circuli tetragonismum respicere voluit, eo cognitionis æquitando peruenit occupatus, ad quam nullus vnquam sedendo quietus. Post hæc deinde, quò magis opinionem hanc

de se firmaret, in Archimedis reprehensionem aperte prorumpit, quæ iam qualis sit dispiciamus. Cusan. Non legimus quenquam propinquius accessisse ad huius notitiam quam Archimedem, qui primo quadrangulum circulo æquari ostendit, in quo semidiameter circuli ducta est in mediam peripheriam, hoc quidem sic esse necesse est, si hoc censendum est esse æquale, quod nec maius, nec minus esse conuincitur. In omnibus enim polygoniis isopleuris, & isoperimetris, de quibus solum in hoc scripto loquimur, semidiameter circuli inscripti, si ducitur in medietatem peripheriæ, oritur quadrangulum æquale. Posse autem inter semidiametrum & medietatem peripheriæ medium proportionale facile constitui, Euclides ostendit. Quare tale cum sit latus quadrati æquivalentis, conscito quæ linea recta æquetur peripheriæ circuli, scitur & eius quadratura, & hæc est certior ostensio. Sed dum per helicam hanc ultimam partem se reperisse crederet Archimedes, à vero defecit. Helica enim describi nequit, nisi signum à centro per semidiametrum in tanto tempore moueatur, in quanto semidiameter pro circuli descriptione circunducitur. Descriptio igitur helicæ hos motus supponit, quorum habitudo est, ut semidiametri ad circumferentiam. Præsupponit igitur id quod querit. Citius enim recta dari potest circulari lineæ
 æqua

*æqualis, quàm helica vera figurari. But. Priusquã
 ad ista respondeam consentaneum videtur, qualis
 sit iste reprehensor Archimedis paulisper inqui-
 rere. Et vt à leuioribus ordiar, satis in ipso Cusano
 frequens Barbaries, & improprietas verborum
 deprehenditur. Qualis est iandudum, pro iam pri-
 dem, quoniam longi temporis spatium signare vo-
 luit, quod præposterè fit per iandudum, cuius signi-
 ficatio intra paucas horas coarctatur. Item serio-
 sas barbarè positum pro serias. Delectabiliter au-
 tem, & scibilis non sunt latina vocabula. Nec sci-
 ta reperitur in hoc sensu. Assertio, cùm nihil sit
 aliud quàm affirmatio, contra rei naturam dicitur
 assertio de quadratura circuli, & est dura trans-
 latio in verbo reuolueremus. Nam propriè dicas
 reuoluere librum, non assertionem. Præterea dum
 dicit, quadrangulum circulo æuari, bis peccat,
 abutens quadrangulo, pro paralellogrammo or-
 thogonio. Deinde quod ait, in quo semidiameter
 circuli ducta est in mediam peripheriam. But. Si
 ducta semidiameter, in propria significatione ca-
 piatur, aliter erit sensus quàm locus patiatur,
 quem per ipsius Archimedis verba, cuius propo-
 situm refert, explicare debuit. Sed nimirum, dum
 ostentationis causa, theorematum verba mutan-
 tur, se ipsa statim prodit imperitia, sicut etiam in
 eo quod sequitur paulò post. Cusan. In omnibus*

polygonijs isopleuris, & isoperimetris, de quibus
 solum in hoc scripto loquimur, semidiameter cir-
 culi inscripti, si ducitur in medietatem peripherie
 oritur quadrangulum equale. But. Totum propo-
 situm huiusmodi, quam ostensionem vocat, ita
 corrumpitur per illa verba isopleuris, & isoperi-
 metris, ut nihil ad rem pertineat. Constat enim ex
 dimensionis theoremate primo, omne polygonon
 descriptum circa circulum, esse equale triangulo
 orthogonio, in quo quæ quidem ex centro linea
 equalis est vni earum quæ circa rectum angulum,
 basis autem perimetro polygoni. Sed non intelli-
 gens Cusanus hoc esse verum vniuersè in omni po-
 lygono descripto circa circulum, dixit se tantum
 loqui in polygonis isopleuris, & isoperimetris, pro-
 pter hoc igitur, & etiam quia non adiecit, circa
 circulum descriptis, nec cui sit equale rectangu-
 lum, est propositio nulla, atq; ridicula. Nam equi-
 angula polygona si isopleura, simul & isoperime-
 tra fuerint, ipsa sunt inuicem equalia, & perinde
 est ac si dixisset: Aequalia inter se polygona ei-
 dem rectangulo sunt equalia. Cusan. Posse inter
 semidiametrum & medietatem peripherie me-
 dium proportionale facile constitui, Euclides ostē-
 dit. But. Istud minimè verum est, sed inter duas li-
 neas rectas mediam proportionalem inuenire do-
 cet Euclides. Verum si pergam ineptias istas in
 verbis

verbis persequi, rem faciam legentibus molestam,
 cum plures propemodum dictionibus ipsis notari
 possint. Sicut cum dicitur quadrati equivalentis,
 pro equalis non adiecta figura cui sit equale qua-
 dratum. Item helica pro helix. Et illud conscito,
 quæ vox est, & forma loquendi rustica. His igi-
 tur ommissis ad ea quæ dicuntur in Archimedem
 veniamus. Cusan. Sed dum per helicam hanc vl-
 timam partem se reperisse crederet Archimedes,
 à vero defecit. But. Nisi cui sit alioquin nota ma-
 teries, non constabit ex verbis istis sensus autho-
 ris, qui talis est. Archimedes defecit à vero, dum
 credit se per helicen inuenisse lineam rectã equa-
 lem peripheriæ circuli. Huius reprehensionis oc-
 casio non aliunde venit, quàm quòd ignorauit Cu-
 sanus id quod non est apud Geometras impossibi-
 le, scilicet aliquid posse demonstrari, quanuis non
 detur id ipsum. Exempli gratia. Discretam quan-
 titatem aliquam esse, ex cuius in seipsam multipli-
 catione proueniat decem, non esset operosum de-
 monstrare, hanc tamen dare nemo vnquam possit.
 Quoniam non est in rerum natura. Et Archime-
 des in dimensione circuli demonstrauit, quali nam
 trigono sit equalis circulus, sed huius circuli basim
 non dedit. Idem etiam in Helicis semel atque ite-
 rum id de quo nunc agitur ostendit, quæ nam scili-
 cet linea recta sit equalis peripheriæ circuli, ne-

que tamen tradit modum, quo talis linea detur. Hoc igitur non intelligens Cusanus Archimedem à vero defecisse pronunciat, neque demonstrationem ipsius refellens, neque contrarium ipse demonstrans, quod planè temerarium est, ne dicam etiam stultum. Huius tamen sententiæ rationem quandam afferre conatur, quæ talis est. Lineam rectam æqualem peripheriæ circuli per helicen inueniri non posse, quoniam helicis descriptio propter quosdam suppositos motus est difficilis, ut magis possit talis recta linea dari, quàm helix verè figurari. Fateor equidem non esse tam expeditum helicen describere, quàm circulum, si quis tamen helicis definitionem, & accidentia, prout ab Archimede traduntur, intelligat, parum hîc difficultatis inueniet, perspicietque Cusanum ita loqui de motibus helicis, ut non intelligat quid sit helix. Et manifestam esse calumniam id quod in Archimedem concludit, inquiens. Præsupponit igitur id quod querit. Vnde autem hoc absurdum colligat in Archimedem Cusanus ipse viderit. Ego certè video, multique mecum (ut spero) videbunt Cusanum carpere, quod non intelligit. Et hæc sint in defensionem Archimedis præmissa. Nunc quod huius quadraturæ superest unà cum figurationibus sequitur. Cusan. Nos autem considerantes trigonum & circulum in capacitate extrema loca


tene

tenere, in trigono semidiametros circuloꝝ & inscripti & circumscripti contrario modo se habere, cum semidiametro circuli, in quo circuli inscriptus & circumscriptus coincidunt, qui differunt in trigono maximè, esseque ibi semidiametrum circumscripti maximam, & inscripti minimam, & simul iunctas breuissimas, contrario modo in circulo ubi simul iuncta sunt diameter circuli maxima. Ob hoc scimus omnes medias polygonias isoperimetas, & isopleuras secundùm capacitatem in illis ad equalitatem semidiametri circuli accedere. Si igitur signata fuerit quantitas excessus semidiametri circuli super diametrum inscripti trigono, & quantitas quo ipsa semidiameter circuli fuerit minor semidiametro circumscripti trigono, tunc omnis polygonia media secundùm suam capacitatem in excessu semidiametri sibi inscripti super semidiametrum inscripti trigono, & diminutione semidiametri sibi circumscripti à semidiametro circumscripti trigono proportionaliter se habebit. Nã cum illa ex diuersa capacitate varientur, non potest diuersa esse habitudo illorum, ab habitudine capacitatũ. Sic semper necesse est, quod sicut se habet excessus ad excessum, etiam sic se habeat diminutio ad diminutionem, cum capacitas ita sequatur vnã diuersitatem, sicut aliam, & non plus nec minus vnã quàm aliam. Erunt igitur in

omni

omnibus polygonijs excessus & diminutio tales se ad inuicem habentes in proportione vna, quare data vna habitudine per illorum scientiam in nota aliqua polygonia, tunc scitur & in circulo. Et quia excessus, & diminutio in circulo simul iuncta æquantur semidiametro inscripti trigono, vt de se patet. Igitur si reperta habitudine diuidantur secundum eam semidiameter inscripti trigono, & maior portio adderetur ad ipsam semidiameterum circuli inscripti trigono, haberetur semidiameter circuli isoperimetri, & ita omne quæsitum. Faciemus autem hanc partem tibi hoc modo clariorem. Ex AB linea in tres partes diuisa CDE triagulus designetur, et in eius latere CD signetur pars quarta AB , quæ sit IK , quæ quadretur, et sit $IKLM$. Describatur inscripti, et circumscripti circuli, et sit inscripti trigono semidiameter FG , & circumscripti FH , et inscripti tetragono NG , circumscripti NO . Signetur deinde linea FH , et in eius medio G lineis de FGH tractis, quatuorlibet trahatur ad FH æque distans TN , cuius medium sit AA , & signetur semidiameter inscriptæ alicuius polygoniæ isoperimetræ, puta tetragonæ, quæ sit NP , & semidiameter circumscriptæ quæ sit NO , & trahere de G per P in infinitum, & similiter de H per O lineam in infinitum, & ubi illæ concurrunt signa Q , trahere per Q equidistan

distantem ad FH , quæ sit SR , in cuius medio si-
 gna BB . Dicimus RQ esse semidiametrum cir-
 culi quæsitæ, & eius circumferentiam æqualem
 AB lineæ rectæ. Multipliciter probatur & faci-
 liter. Seruata igitur priori figura ponatur GBB
 lineam esse differentiam capacitatum trigoni &
 circuli isoperimetri, & quod linea de R S mouea-
 tur versus FH æquidistanter. Manifestum est
 lineas HQ & GQ de illa abscindere omnes dif-
 ferentias semidiametrorum circulorum inscripto-
 rum, & circumscriptorum omnium figurarum po-
 lygoniarum de trigono vsque ad circulum, ubi coin-
 cidunt. Est etiam manifestum quòd simul linea
 illa mota abscinderet de linea BBG omnes diffe-
 rentias capacitatum inter trigonum & circulum.
 Nam quantò differentia semidiametrorum diffe-
 rentiarum est minor, tantò figura capacior. Ideo
 circulus capacissima figurarum, quia ibi coinci-
 dunt, & trigonus minima capacitatis, quia ibi
 maximè differunt. Sit igitur linea mota TN , quæ
 abscindat lineam GBB in AA puncto, & sit
 PO differentia semidiametrorum in tetragono, quare
 si GBB est vt differentia capacitatum trigoni
 & circuli isoperimetri, erit GAA vt differen-
 tia capacitatum trigoni & tetragoni. Et quia
 NP est, ex præsupposito, semidiameter inscripti
 tetragono AA , excessus eius super FG semi-
 dia



diametrum inscripti trigono, ideo BBQ erit excess

cessus semidiametri circuli isoperimetri super se-
 midiametri inscripti trigono. Nam quæ proportio
 BBG ad $AA G$, illa $BB Q$ ad $AA P$, ut
 notum est. Correspondent autem differentiæ semi-
 diametrorum inscriptorum in polygonijs isoperi-
 metris cum differentijs capacitarum. Non enim
 euenit aliunde capacitarum differentia in isopleu-
 ris & isoperimetris, nisi ex semidiametrorum cir-
 culorum inscriptorum differentia, quoniam capa-
 citas ex multiplicatione illius semidiametri, quæ
 variatur in diuersis talibus figuris in semiperiphe-
 riam, quæ semper est eadem exoritur, ut est no-
 tum. Sic si posueris $BB S$ lineam duorum exces-
 suum semidiametrorum ut excessum capacitatis
 circuli super trigonum, erit in tetragono excessus
 talis capacitatis, ut linea æqualis duabus TO &
 $PA A$ lineis, & quia vna est habitudo illius ad
 SBB , quæ $PA A$ ad $BB Q$. Igitur ut supra.
 Vel si dixeris capacitatem trigoni minorem esse,
 quàm circuli, ut linea AG , erit tetragoni minor,
 ut PO . Si adhuc negaueris & dixeris semidia-
 metrum circuli minorem esse, puta quòd determi-
 netur in puncto medio inter S , & terminum lineæ
 G , quæ sit V , ita quòd EV sit semidiameter cir-
 culi isoperimetri, tunc si sic extendatur VS quo-
 usque æquetur RV , ut sit RX , & similiter exten-
 datur FH ad æqualitatem RX , & sit FZ ut
 RX ,

$R X$, trahere $Z X$ lineam deinde de V lineas ad G et H , & ubi secauerint $T N$ lineam signa 2 & 9 , & $T N$ extendatur vsque ad $Z X$, & sit $C C N$, ut $R X$. Dico quod si diameter inscripti circulo isoperimetro addit super semidiametrum inscripti trigono quantum est $B B V$, tunc semidiameter inscripti tetragono addit quantum est $A A 2$. Igitur si semidiameter inscripti tetragono addit quantum est $A A P$, tunc semidiameter circuli isoperimetri addit, quantum est $B B Q$. Hoc de se patet, si habitudo additionum est ut $B B V$ ad $A A 2$. Et nota est additio in tetragono, que est ut $A A P$. Igitur erit in circulo ut $B B Q$, cum una sit habitudo $A A P$ ad $B B Q$, que $A A 2$ ad $B B V$. Quod autem illa sit habitudo probatur. Nam si $R V$ ponatur semidiameter inscripti circulo, erit $V X$ semidiameter circumscripti, que coincidunt in circulo isoperimetro. Et manifestum est quod $R X$ est linea ex duabus illis semidiametris, et similiter $F Z$ est linea illi equalis, & est ex semidiametro inscripti trigono, & semidiametro circumscripti eidem. Omnium igitur polygonarum inter trigonum & circulum due semidiametri tales non erant minores $F Z$, nec maiores $R X$. Et ita semper equalis. Erit igitur $N C C$ equalis duabus illis semidiametris in tetragono. Et quia $2. 9$ equatur necessario $P O$, cum $G H Q$

triang


triāgulus æquetur $G H V$ ob æquidistitiam $Q V$
 & $E H$, & similiter $O 2$ sit æquidistās ad $G H$,
 hinc $9. 2$, erit vt $P O$, vt ex Euclide scilicet 37
 primi & quinta sexti notum tibi existit. Sed $P O$
 est excessus semidiametri circumscripti trigono su-
 per semidiametrum inscripti eidem, igitur et $2. 9$,
 & cum $N 2$ æquetur $C C 9$. Igitur $N 2$ erit vt se-
 midiameter inscripto tetragono. Et $2 C C$ vt semi-
 diameter circumscripti eidem. Si igitur ponitur se-
 midiametrum circuli super semidiametrum inscri-
 pti trigono addere quantum est $B B V$, addet ne-
 cessario semidiameter inscripti tetragono quan-
 tum est $A A 2$. Et hæ additiones possent capa-
 citates super capacitatem trigoni nominari, cum
 in isopleuris & isoperimetris capacitatum exces-
 sus ex his solum proueniat. Habitus igitur ad-
 ditionum erit vt $A A 2$ ad $B B V$. Quod erat
 probandum. Et ita in omnibus polygonijs pariformiter
 procedi poterit sicut in tetragono. Ex hoc
 constat propositum. But. In hac inuentione sua
 Cusanum valde sibi placuisse, vel inde licet conij-
 cere, quod eam ipsam est iterum prosequutus alio
 tractatu in dialogi formam digesto. Vbi nititur
 alijs etiam rationibus multipliciter idem quod hic
 ostendere, quarum nullam Regiomontanus discu-
 tiendam putauit, quamuis propositum ipsum tribus
 opusculis valide confutauerit, demonstrando con-

trarium. Nam (vt ipse ait) mathematico demonstrandi genere Cusanus non utitur. At ego dicam amplius, quòd nec etiam sophisticò. Ipsa enim sophismata, & si fallacia, vera tamen aliquatenus apparent. Hic autem argumenta cum falsa sint, vt quæ falsum concludant, verisimilia quomodo videri possint? cum nec etiam intelligantur, non lectoris quidem, sed scriptoris imperitia, qui sensus ineptos verbis ineptis explicauit ineptissime. Quale est id in ipso statim principio, vbi demonstrandi facit initium. Trigonum & circulum in capacitate extrema loca tenere. Hic nisi verba temerè distorqueas à suo sensu, nihil aliud intelligi potest, quàm trigonum & circulum secundum suas capacitates esse in locis extremis, hoc est occupare extrema loca. Sed cum figuræ ad disponentis arbitrium loca teneant, & de positione nulla sit mentio, cur in locis extremis potius quàm in medijs esse dicantur? Itaque quis non videt in hoc loco, quàm sit inepta dignaque risu sententia? suspicor tamen his verbis Cusanum hoc exprimere voluisse, quòd omnium figurarum isoperimetrarum maxima est circulus, & minima trigonum. Et primum quidem verum est, sicut ex Quintiliani verbis supra docui: Secundum verò falsum. Quoniam dari potest isoperimetron trigono quadrilaterum minus ipso trigono. Sed hoc et si verum esset, nihil tamen

men ad rei demonstrationem facit, sicut nec aliæ multæ quas author frustra conuoluit ambages, in quibus, præter cætera, illud præposterū, & absurdum videas, quod nulla propositione facta demonstrationem instituit. Si demonstratio dici possit, verborum inter se pugnantium indigesta congeries, sine sensu, quem Geometricum possis agnoscere. Demonstrationis istiusmodi vocat Regiomontanus Lutianas, sed magis proprium, & verius erat dicere nullas. Verendum est itaque ne si diutius ineptias istas discutere pergam ineptus magis ipse videar. His igitur omiſſis ad ipsius propositi confutationem veniamus, quod per Cusani verba disparsum colligitur in hunc sensum. Si ex dati circuli semidiametro & latere quadrati intra circulum ipsum descripti in rectam lineam iunctis statuatur diametros alteri circulo, triangulum æquilaterum descriptum intra circulum secundum isoperimetron erit circulo dato. Esto datus circulus cuius centrum F , & intra circulum describatur quadratum $A B C D$, & posita linea $G H$, quæ sit æqualis duabus lineis $C D$ & $D F$, super $G H$ describatur circulus $G I H L$, & intra circulum describatur triangulum æquilaterum $I H L$. Dicit itaque Cusanus, triangulum $I H L$ esse isoperimetron dato circulo $A B C D$. Quod minimè verum est. Nam minor est perimetros trigoni perime

tro circuli. Quod demonstratur in hunc modum. Supponatur semidiametros $B F$ esse partium equalium inter se 497. Habebit igitur circuli perimetros $A B C D$ talium partium plusquam 3122. Ipsius enim perimetri ratio ad diametron, (sicut demonstravit Archimedes) maior est tripla superdecupartiente septuagesimas primas. Et quoniam angulus qui ad F reclusus est, quadratum quod ex $C D$ æquale est quadratis, quæ ex $C F$ & $F D$. Ipsa igitur diametros $G H$ minor est, quam 1200.

Quare et semidiametros $H P$ minor est, quam 600. Et quoniam trianguli æquilateri intra circulum descripti latus potentia triplum est eius quæ ex centro circuli, prout habet duodecima tertij solidorũ, ipsa trianguli perimetros $I H L$ mi-




nor est, quàm 3120, quare & multò minor circuli perimetro $A B C D$, quæ demonstrata est esse maior, quàm 3122. Nō est igitur triangulū $I H L$ isoperimetron circulo $A B C D$. Quod erat demonstrandum. Sic Regiomontanus, sed per dialogum longè prolixius Cusani quadraturam reprobavit. Cui tamen postea blanditur, hoc modo. Propinquè igitur (inquit) veritati concessit vir ille, adeò vt sudoris sui fructu haud penitus frustrari videatur, & quidem non sine gloria. Ego autem non video quem fructum laboris, aut quid gloriæ consequi possit, qui rem bene prius institutam ab alio, in diuersum postea deteriusque retractet. Et ex hoc videtur Regiomontanus non aduertisse, quadraturam huiusmodi extra limites Archimedis incidere, longius etiam, quàm ex calculo videatur, propter lineas irrationales, quarum quantitatem numeri, non nisi prope verum, attingunt. Et reuera omnis extra dimensionem tetragonismus quid aliud quàm imperitiam ostendit authoris? Alios præterea quatuor Cusani modos Regiomontanus prosequitur, authoris demonstrationibus omisis, propter eam quam supra retuli causam.

Tetragonismus Cusani II.

Esto circulus in quo diametros $B A$, & centrum D . Et abscindantur vtrinq̃ equales

inuicem peripheriæ BM & BC , connexisque DM, DC, CB , ducatur ex signo B in lineam DC ipsi BC æqualis BE . Et centro quidem E , spatio verò EB describatur circulus secans lineam DM in signo F , & lineam DC productam extra circum BAL in signo G , ita vt linea DF sit dimidium lineæ DG . Et centro quidem D spatio verò DG describatur circulus GPS , cui inscribatur trigonum æquilaterum QPR . Vult itaq; Cusanus QPR esse isoperimetrò circulo $BCAM$. Quod non est verum, sicut ostendam.



Confutatio.

IN hac descriptione illud primùm inest vitij,
 quòd peripheriæ BM , & BC nisi fortuitò, vel
 reiteratione molesta abscindi non possunt, ita vt
 linea DF sit dimidium lineæ DG . Disponatur
 intra circulum $BCAM$ inscripti quadrati latus
 BL . Inuenitur autem per dimensionem in tabula
 grandiori factam diligentius, duas simul lineas
 LB & BD esse maiores diametro SP . Quibus
 lineis, si esset æqualis diametros SP , duo circuli
 $CALB$ & $SQPR$ cū inscripto trigono RQP
 præscriptum figuræ præcedentis seruarent. Vbi de-
 monstratum est perimetron inscripti trigoni cir-
 culo maiori esse minorem perimetro circuli mino-
 ris. Quare perimetros istius minoris trigoni RPQ
 multò magis erit minor perimetro circuli $BCAM$.
 Vnde manifestum est quadraturam istam magis
 esse falsam præcedente, & extra limites Ar-
 chimedis. Quod erat demonstrandum. Ad huius
 confutationem problematis Regiomontanus ratio-
 cinio numerali progressus est, via sanè longissi-
 ma, laborisque plena, vt & ipse testatur, & res
 apparet, ex tanta congerie, & vt sic dicam,
 silua calculorum. Quam quisque vi-
 derit, in eam sese dare meri-
 tò perhorrescat.

His ita dispositis ait Cusanus quadratum NSO esse æquale circulo ALG . Quod minimè verum est, sicut probavit Regiomontanus demonstratione quidem longa nimis, atque molesta, quàm propterea non sequor, sed aliam ipse facio magis expeditam. Intelligatur ipsa circuli diametros AG æqualiter esse divisa in partes 14, ipsa igitur BC , cum sit partium 7, est tetragonicum latus $4\frac{9}{2}$, ponatur ipsa BS esse tetragonicum latus $38\frac{1}{2}$. Et quoniam angulus qui sub $BS C$ rectus est, quadratum quod ex BC æquale est quadratis quæ ex BS & SC , quorum quod ex BS est $38\frac{1}{2}$, reliquum igitur quod ex CS , est $10\frac{1}{2}$. Et quoniam ipsa trigona $BT R$, BSC , BAP sunt similia, est sicut BS ad SC , ita BA ad AP , & BT ad TR . Ipsa igitur PA est tetragonicum latus $13\frac{4}{11}$. Et quoniam est sicut BA ad AP , ita BT ad TR . Et permutatim igitur sicut BA ad BT , ita PA ad RT . Est autem BA ipsius BT potentia dupla, quandoquidem quadratum HK duplum est quadrati LM , linea igitur PA ipsius RT est potentia dupla. Quare RT est tetragonicum latus $6\frac{15}{22}$. Quadratum ergo duarum linearum PA & RT tanquam ab una descriptum maius erit, quàm $38\frac{1}{2}$. Ipse igitur duæ simul lineæ PA & RT sunt maiores lineæ BS , hoc est, ipsa NS . Non est ergo lineæ BS tetrago-

nicum latus $38 \frac{1}{2}$. Si autem linea BS ponatur esse latus teragonicum minus quam $38 \frac{1}{2}$, ipse duæ lineæ PA & RT multò semper magis erunt maiores semilateræ NS , & sic nunquam fiet problema. Necesse est igitur, ut linea BS sit latus teragonicum maius quam $38 \frac{1}{2}$. Quare quadratum NO maius erit, quam 154 . Sed sicut ad dimensionem Archimedis demonstravi, quadratum 154 maius est circulo ALG , multò magis igitur quadratum NO maius est ipso circulo ALG . Quod oportuit demonstrasse. Constat itaque tertium hunc Cusani tetragonismum, nec verum esse, nec intra limites Archimedis. Idem habet insuper vitium figuræ descriptio, quale notatur in precedenti. Quartum authoris eiusdem tetragonismum videamus, cuius confutatio cum sit omnium quas Regio montanus edidit brevissima, hæc ipsam totam inserui.

Tetragonismus Cusani III.

Regiomontanus in æditionem Cusani quo pacto semicircunferentiæ circuli æqualis designetur linea recta.


Georgius ille doctissimus mathematicorum, præceptor olim meus quandam curvi rectificationem brevem ad modum mihi obiecit, ac factus expeditissimam. Cui principio quidem pluri-

mum

mum fidei habuit, auctoritate inventoris persua-
 dente. Vbi verò pro acumine ingenij sui inuentum
 huiusmodi examinare coepit, nam demonstrationē
 nunquam comperit, longè aliter quàm ratus erat
 accidere didicit. Lineam enim rectam quam in-
 uentor ille prædicauit æqualem semicircunferen-
 tiæ circuli, multò minorem eandem semicircunfe-
 rentia conclusit. Modus tamen Georgij acutissimi
 quem huic negotio discutiēdo accommodauit, me-
 moriam reliquisse videtur meam, si tamen is est
 quem inferius exponam, non pudebit vnquam alie-
 na scripta retractare, quò recentior ad memoriam
 redeat imago præceptoris. Sententiam igitur inuen-
 toris in primis recitandam censui. Sit circulus
 $A B C D$ super centro E descriptus, quem duæ dia-
 metri suæ $A C$ & $B D$ quadrent, educatúrque
 altera earum $B D$ vtrique ad longitudinem in-
 definitam. Latus trianguli æquilateri inscriptibi-
 lis huic circulo sit $A F$, cui ponatur æqualis $A G$,
 super G itaque factò centro secundum distantiam
 $G A$, circulus describatur, cuius circumferentiæ
 secet diametrum $B D$, vt supra vtrique prolon-
 gatam in punctis H & K . Dicitur lineam rectam
 $H K$ æqualem esse semicircunferentiæ $B A D$,
 vnde & duplam eius toti circumferentiæ circuli
 $A B G D$ æuari oportebit. Hanc conclusionem
 nulla demonstratione firmatam video, quare more
 meo

meo experiar per lineas racionales quid sequatur si talis dispositio subijciatur, qualem hæc conclusio præsupponit. Continuabo duo puncta G & K per lineam GK , ducta etiam in circulo chorda FC , quæ erit latus exagoni circulo proposito inscriptibilis. Si igitur posuerimus semidiametrum EA 497 particularum equalium, erit per 13 præambulum, semicircunferentia BAD inter hos duos terminos 1561 & 1562. Linea autem AF , scilicet latus trianguli æquilateri circulo inscriptibilis potentialiter triplat semidiametrum circuli, quæ admodum ex trigesima tertij, vel octava tertij decimi, & penultima primi Elementorum concluditur. Sed quadratum semidiametri est 247009. Quare quadratum AF erit 741027. Hic autem numerus radicem quadratam non habet, minor tamen eo proximè quadratus hanc habet radicem 860, & proximè maior eo habet 861. Quamobrem necessariò chorda AF reperietur inter hos duos terminos 860 & 861. Erat autem AG equalis ipsi AF . Quare & AG inter eosdem continebitur terminos. Cùmque semidiameter EA per se nota sit, erit, per 2 præambulum, linea EG residua inter duos terminos cognitos qui sunt 363 & 364. Iam consequenter ad quantitatem lineæ EK veniendum est. Quoniam EG inter duos notos cõcluditur terminos erit per 5 præambulum

præambulum, & quadratum eius inter duos ter-
 minos notos, qui sunt 131769 & 132496. Sed
 erat quadra-
 tum GK per
 se notum, est
 enim GK æ-
 qualis chordæ
 AF , quadra-
 tū autē GK ,
 per penultimā
 primi, duobus
 quadratis li-
 nearum EG et
 EK equipol-
 let, per 2 præā-
 bulum igitur
 quadratū EK
 inter notos ter-
 minos habebi-
 tur. qui sunt



608531 & 609258, & ideo, per 7 præambu-
 lum, ipsa quoque linea EK inter notos terminos
 habebitur, scilicet 780 & 781. Hinc tandem
 per 8, præambulum, tota HK dupla ipsi EK , in-
 ter duos comprehendetur terminos notos, qui sunt
 1560, & 1562, erat autem circumferentia circuli
 inter hos 1561 & 1562, & idcirco etiam inter
 hos

hos 1560 & 1562, quicquid enim maius est ma-
 iore, maius quoque minore existet. Vnde non pos-
 sum non mirari quonam pacto ad verum ita pro-
 pinquè accesserit inventor ille, vt inter binos ter-
 minos lineæ HK , & semicircunferentiæ BAD
 non nisi vnica particula intersit. Veruntamen non-
 dum certitudo apparet huius sententiæ, sicut neq;
 incertitudinem comprehendere potui minus. Nam
 & si inter hos duos terminos 1560 & 1562 con-
 tineatur tã lineæ HK , quàm semicircunferentiæ
 BAD , in tãto tamen interuallo infinitæ quanti-
 tates inæquales intercidere possunt. Id autem eue-
 nire palam est, propter grossitiem particularum
 497, quas semidiametro EA tribuimus. Vt igitur
 animo nostro quietem comparemus, ponatur
 denuo semidiameter EA 4970 particularum,
 quo demum fit vt semicircunferentiæ BAD inter
 hos duos terminos reperiat 15610 & 15620,
 præambulo 13 id edocente, quadratum itaque se-
 midiametri EA erit 24700900, quemadmo-
 dum ex superiori computo elicitur, sicut enim ter-
 minos fecimus decuplos, ita multiplicationes eorũ
 centuplas fieri oportet. Triplum autem huius est
 74102700, & tantum erit quadratum chordæ
 AF syllogismo priori resumpto, quadratum late-
 ris trianguli æquilateri circulo inscripti quadrato
 semidiametri eiusdem circuli triplum fore demon-
 stra

stratum est. Numerus autem ille radicem quadratam non habet, verum minor eo proximus quadratus radicem habet 8608, maior autem habet 8609, quamobrem chorda AF inter hos duos terminos reperietur 8608, & 8609, & inter eosdem quoque linea AG habebitur, unde, per 2 praeambulum, residua EG continebitur inter illos 3638 & 3639, et ideo erit per 5 praeambulum, eius quadratum inter hos duos reperietur 13235044 & 13242321, quadratum autem EG demptum ex quadrato GK relinquit quadratum EK , per penultimam primi Elementorum, atque idcirco, per 2 praeambulum, duo termini noti quadratum EK circundabunt, qui sunt 60860379 & 60867656, & ex septimo praeambulo ipsa linea EK inter duos notos comprehendetur terminos, videlicet 7801 & 7802. Unde & tota HK dupla ad ipsam EK duos terminos circa se positos habebit notos, qui sunt 15602 & 15604. Linea itaque HK minor est, quam 15604, atque idcirco multò minor, quam 15610, sed semicircunferentia BAD ex supra cōmemoratis maior erat, quam 15610, quare linea HK multò minor erit, quam semicircunferentia circuli ABD . Non est igitur linea HK equalis semicircunferentiae circuli BAC , cuius contrarium inuentor ille asserebat. Quantum autem veritati & opinioni inuentoris

toris

toris intersit, nemo satis docere poterit. Nondum enim semicircunferentia BAD , neque ipsius etiam linea recta HK longitudo mensurata est, tametsi utraque earum duobus terminis notis interiaceat. Verum differentia huiusmodi necessario maior erit sex particulis, quales 4970 semidiametro AE dedimus, minor autem decem octo huiuscemodi particulis, erat enim semicunferentia BAD maior, quam 15610, sed 15610 superavit 15604 in sex particulis, quare semicircunferentia BAD excedit 15604 in pluri, quam sex particulis, amplius 13604 superat lineam rectam HK excessu quanuis ignoto: manifestum igitur est excessum semicircunferentia BAD ad rectam HK maiorem esse sex dictis particulis. Præterea cum recta HK maior sit 15602, & semicircunferentia BAD minor, quam 15620, differentia autem terminorum commemoratorum est 18, constat differentiam semicircunferentia BAD & recte HK , minorem esse decem octo dictis particulis. Propè igitur accessit vir ille quanuis medio fruere tur facillimo, non tamen idcirco satisfacit intellectui, veritatem magis, quam propinquitatem inuestiganti. Nam si ad metam ipsam propinquius etiã quam Archimedes veniendi fuerit libido, viam in promptu habemus ab Archimede sumptam, qui quemadmodum proportionem circunferentia ad diametron

tron conclusit inter duas scilicet triplam sesquiseptimam, & triplam superpartientem decem septuagesimas primas. Ita inter duas proportionem multò inter se viciniores eandem constituere poterimus circūferentiæ ad diametrum proportionem. Sed in hoc non quiescit animus, cùm recta æqualis circūferentiæ circuli non sit data, atque idcirco spes omnis circulum quadrandi adempta. Si quis ergo, siue modernorum, siue posteriorum huius rei gloriam venari velint curvæ lineæ rectificandæ, vel circuli quadrandi, problema sibi noviter obiectum habent, quamvis plurimi quidem vetustissimi philosophi id agressi sint, nemo autem Archimedes in hoc philosophandi genere vsque ad hodiernum diem superaverit, admirandus profecto esset, qui tantùm, tamque inexplicabile curvi & recti discrimen rumperet, alterumque in alterum commutandi facultatē traderet, is enim maiores nostros uniuersos ingenio suo, præsertim in Geometricis exercitijs, longè anteuentre crederetur.


Venetijs die octaua Iulij Anno 1464.

B Ut. Ego autem ad iudicium falsitatis istius demonstratione magis aperta procedam, et breuius. Resumatur itaque Cusani propositiū. Est o circulus BCD A , in quo sese rectis angulis inter-

k

secantes diametri in centro E educantur, altera
 quidem BD utrinque ad HK , altera verò ad
 partes C in L . Et coaptetur intra circulū $BCDA$
 descripti trigoni æquilateri latus AF . Et abscin-
 datur ex CA ipsi AF æqualis AG , & centro
 quidem G , spatio verò GA describatur circulus
 $AHLK$. Vult itaque Cusanus, ut linea recta
 HEK sit æqualis peripheriæ BAD . Quod non
 est verum, sed ipsa HEK minor est peripheria
 BAD . Intelligatur quæ ex centro circuli ABC
 CD secari in partes septem æqualiter, cum autem
 æquilateri trigoni intra circulum descripti latus
 sit triplum potentia eius quæ ex centro, sicut osten-
 dit duodecima tertij solidorum, erit ipsa FA , hoc
 est AG tetragonicum latus 147 , & diametros
 AL tetragonicum latus 588 , quod est minus
 quàm $24\frac{1}{4}$, quare ipsius apotome LE minor
 est, quàm $17\frac{1}{4}$. Et quoniam intra circulum
 $HLKA$ duæ lineæ rectæ AL & HK se inui-
 cem secant, quod igitur sub AE & EL rectan-
 gulum æquale est ei quod sub HE & EK rectan-
 gulo. Quod autem sub AE & EL rectangulum,
 hoc est quod ex HE quadratum, minus est quàm
 $120\frac{1}{4}$. Quare quod ex linea HK quadra-
 tum minus est, quàm 483 . Ipsa ergo linea HK
 minor est, quàm $21\frac{70}{71}$. Sed sicut demonstravit
 Archimedes peripheria BAD maior est, quàm

21 $\frac{70}{71}$. Non est igitur linea recta *HEK* peripheriæ *BAD* equalis, sed minor. Quod erat demonstrandum. Ex istis palam est formam istam tetragonismi falsam esse, & extra limites Archimedis.



Tetragonismus Cusani V.


Quintam denique tetragonismi constructionem Cusanus ædedit, quàm Regiomontanus circuitu longo numerorum confutavit. Et operis sui difficultatem Græcis verbis in fine testatur, ita dicens, τέλος τουτου πραγµατος του δυσκολοτατου, hoc est, finis huius negotij difficil-

limi. Et re vera imposturas huiusmodi demonstratione carentes lineis irrationalibus, & innominatis involutas, quæ vel ab imperitis facile constipantur, non est modici laboris, aut industriæ cuiuslibet retexere. Cùm sit eruendum rationibus apertis quod alius, vel inscitia, vel dolo fraudulenter occuluit. Ego autem Geometricis elementis ratiocinando, nec longum, nec difficilem reprobationis modum instituam. Ipsa autem Cusani descriptio sic habet. Est circulus $A B C D$ in quo centrū E . Et agantur angulis sese rectis decussantes diametri $B D$ & $C A$. Et intra circulum statuatur linea recta $A F$, secans diametron $B D$ in signo G , ita ut $G E$ sit ipsius $F A$ dimidiū, quod sit $K A$, & connectantur $K E$. Ait Cusanus lineam $F A$ esse æqualem peripheriæ $B A$. Quod nequaquam verum est, sed maior est $F A$ ipsa peripheria $B A$. Ponatur linea $F A$ qualium est diametros 28, talium esse 22. Erit igitur $K A$ 11, & $A E$ 14. Et quoniam angulus qui sub $E K A$ rectus est, quadratum quod ex $A E$ æquale est quadratis quæ ex $A K$ & $K E$. Ipsa igitur $K E$ est tetragonum latus 75. Et quoniam in orthogonio trigono $A E G$ ab angulo recto in basim acta est cathetos $E K$, quæ ad catheton trigona similia sunt & toti et inuicem, sicut igitur $A K$ ad $K E$ & $A E$, ita $E K$ ad $K G$ & $G E$, quare ipsa

G K

GK est tetragonici latus $46 \frac{52}{121}$, et ipsa GE maior, quam 11 , quod est impossibile, quoniam ipsa GE per constructionem est equalis ipsi KA , quæ ponitur esse 11 . Ipsa ergo FA non est 22 . Dico etiam quod nec minor quam 22 . Nam decrescen-
 te linea FA necesse est semper crescat EG , & sic minuendo FA nunquam fiet problema, cuius est præscriptum ut ipsi KA sit equalis GE . Cum igitur linea FA non possit esse 22 , nec minor, quam 22 , sequitur ut ipsa sit maior, quam 22 . Itaque si linea recta FA , cum sit maior, quam 22 , sit equalis peripheriæ BA , perimetros circuli $BADC$, utpote ipsius BA quadruplum, maior erit, quam 88 . Est autem CA diametros 28 . Ipsa igitur circuli perimetros ad diametron rationem habebit maiorem, quam 88 ad 28 , hoc est, maiorem tripla sesquiseptima, non habet autem, sed minorem, sicut demonstravit Archimedes. Ipsa ergo linea FA , cum sit maior quam 22 , non est equalis peripheriæ BA , sed maior. Quod erat demonstrandum.

Apparet itaque




k 3

manifestè tetragonismon istū Cusani falsum esse, & extra limites Archimedis. Est autem & hic incerta figuræ descriptio, cuiusmodi vitium prius etiam notavi. Et ita Cusanus in eodem proposito quinquies ab Archimede, & quod turpius est, a se ipse toties discrepavit.

Tetragonismon Alber- ti, siue Fortij.

Exstat & alia quadraturæ species, cuius inventionem duo sibi scriptores Germani vendicant, Albertus scilicet Durerus, & Ioachimus Fortius, sola figuratione rem prosequuti. Poterit autē ita proponi. Circulus cuius est diametros octo equalis est quadrato, cuius est diametros decem. Quod esse falsum sic ostēdo. Secundū rationem peripheriæ circuli ad diametrū, quam demonstravit Archimedes esse maiorem tripla superdecupartiente septuagesimas primas, ini-




to calculo, circulus cuius est diametros octo, inuenitur aream habere maiorem, quam $50 \frac{18}{71}$. Est autem in quadrato cuius diametros decem area 50. Quare maior est circulus quadrato. Vnde fit perspicuum speciē istam quadraturæ falsam esse, & extra limites Archimedis. Quod erat demonstrandum.

Ioachimi Fortij tetragonifinus.

Ioachimus Fortius in libro, cui nomen est Chaos mathematicum, inuentionem quadrati circulo equalis sine demonstratione docuit, in hanc formā. Est quadratum $ABCD$, in quo fiant diametri sese decussantes in signo N , & latus BA secetur equaliter in quatuor partes ad signa $G F H$. Connexisque NG & NF , centro quidem N , spatio verò NG describatur circulus GML . Dicit Fortius circulū GML esse equalem quadrato $ABCD$. Ego autem dico circulum GML esse minorem quadrato $ABCD$. Quoniam enim linea NF duplum est lineæ GE & angulus qui sub NFG rectus, ipsa NG est tetragonicum latus — 5 —. Quare & circuli diametros GL est tetragonicum latus 20. quadratum autem $ABCD$ quod asseritur equale circulo GML est 16. Circulus

igitur ad id quod ex dimetiente quadratum rationē habet, quā 16 ad 20, hoc est, quā 4 ad 5. Non habet autem, sed minorē, etiam quā 11 ad 14, sicut in dimensionis commentario



docui. Minor est igitur circulus quadrato. Quod erat demonstrandum. Manifestum est itaque quadraturam Ioachimi nō esse veram, nec intra limites Archimedis. Hic est insuper inuersum illud, quōd quadratum priusquam circulum deformare figuratio cogit.

Caroli Bouilli tetragonismus I.

ANnos ab hinc circiter quindecim Carolus Bouillus, edito libro lingua nostra Gallica, cui est titulus de Geometria, inter alia operis huius nugamenta quæstionem quoque nostram duobus modis absoluit, ut ipse quidem affirmat. Nullum enim aliud habet demonstrandi genus. Quem vix etiam confutatione dignum putabam, nisi

nisi me mouisset, quòd opus ipsum vulgò recipi viderem, & etiam ab Orontio, omnium in Geometricis ætate nostra celebratissimo, probari. Sicut author ipse testatur in fronte libri, epistola Latine scripta ab abbate Vrſicampi, quam super laudibus Orontij multa loquutus, concludit distichotali, quod vocat obrepticium.

Vuas expressi, vina ille bibenda propinat:

Torcular impleui, guttura at ille rigat.

Cui recantauit Orontius epigrammate Gallico, quem Rithmum circularem appellat. In hoc autem inuento sibi tantum arrogat Bouillus, vt antiquis omnibus insultet, Euclidi tamen, & Archimedi præcipuè, quos in hoc frustra laborasse iactitat. Cusani tamen quadraturas valde probat, in quibus asserit veritatem ratione, & experimento constare. Post hæc autem speculationis suæ primordia sic exorditur. Cum essem (inquit) aliquando Parisius super paruo ponte respiciendo ad rotas plauſtri circumductas super pavemento, superuenit mihi visibilis, & facilis occasio assequendi finem intentionis meæ. Sed iam ex tam subtilibus, & exquisitis initijs, locoque contemplationi tam apto progressionem videamus. Esto (inquit) datus circulus $A B C E$, in quo ducantur diametri $C A$ & $B E$ sese decussantes angulis rectis in centro D . Et producaturs linea $D A$ in H , ita vt qualium est $D A$

quatuor segmentorum equalium inter se, talium sit
 DH quinque, & connexis HB , agatur per si-
 gnum A circulum contingens linea recta FAG .
 Et centro quidem H , spatio vero HB describa-
 tur circulus $FBE G$. Dicit Bouillus lineam AG
 esse equalē quadrati peripheriæ circuli $ABCE$.
 Quoniam (inquit) si circulus $ABCE$ esset rota
 circumducta super plano FG ad partem G , ipse
 punctus E caderet in punctum G , & ab altera
 parte punctus

B in punctum

F . Hæc est

demonstratio

Bouilli, digna

certè bubulco

plaustrum suū

speculāte. Ego

autem dico li-

neam AG , nō

esse equalē

quadrati peri-

pheriæ circuli

$ABCE$, sed


maiorē. Quod

sic ostendo. Cō-

nectantur pun-

ctæ HF . Et

quon




niam angulus qui sub $H D B$ rectus est, quadratum quod ex $H B$ equale est quadratis quæ ex lineis $H D$ & $D B$, quæ quidem duo simul quadrata fiunt 41 , quare ipsa $H B$ est tetragonicum latus 41 . Est autem quod ex $H F$ equale his quæ ex $F A$ & $A H$, rectus est enim angulus qui ad A , ipsa igitur $F A$ est tetragonicum latus 40 , quare & ipsius duplum $F G$ est tetragonicum latus 160 , & ipsa $F G$ duplicata erit tet. lat. 640 , quod quidem maius est, quam $25 \frac{1}{4}$. Si ergo linea $F A$ sit æqualis peripheriæ quadranti $B A$, erit $F G$ æqualis peripheriæ $B A E$, & ipsa $F G$ duplicata æqualis peripheriæ circuli $B A E C$. Quare peripheria $B A E C$ maior erit, quam $25 \frac{1}{4}$. Non est autem, sed minor, quam $25 \frac{1}{7}$, sicut demonstravit Archimedes. Non est igitur linea $A G$ æqualis peripheriæ quadrantis $B A$, sed maior. Quod erat demonstrandum. Constat itaque tetragonismum istum Bouilli falsum esse, & extra limites Archimedis.

Tetragonismus Bouilli II.

AD aliud quoque huius argumenti problema progressus est author, per quod molitur inuenire quartam partem peripheriæ circuli, quæ sit æqualis datæ lineæ rectæ, constructionem suam
ita

ita faciens. Esto data linea recta BA , oportet
 iam inuenire circulum, cuius peripherie quadrans
 sit equalis datæ lineæ BA . Constituatur angulus
 rectus qui sub DCE , & ex duabus lineis angu-
 lum rectum comprehendentibus abscindantur duæ
 partes CF & CG , quarum utraque sit equalis
 trienti datæ lineæ BA , & connexis FG punctis,
 bipartiatur equaliter rectus angulus qui ad C du-
 ctæ $CHML$. Et intra lineas CD & CE dispo-
 natur ipsi FG parallelus IK , ita ut sit equalis tri-
 bus simul lineis FC , CG , GH . Et centro quidem
 C , spatio verò CK describatur circulus $ILKP$,
 cuius sit diametros LP . eritque ILK circuli peri-
 pherie quadrans, quandoquidem angulus qui ad
 centrum C rectus est. Asserit itaque Bouillus, nil
 demonstrando, peripheriam, ILK esse æqualem
 datæ lineæ BA . Ego autem dico lineam BA esse
 maiorem peripheriæ ILK . Esto si fieri possit peri-
 pheria ILK equalis lineæ rectæ BA , quam po-
 no esse 3. Erit igitur circuli perimetros 12. Et quo-
 niam duo trigona CHG , & CMK sunt similia,
 & anguli qui ad M & H sunt recti, est sicut CG
 ad GH , ita CK ad KM . Est autem CG ipsius
 GH potentia dupla, equalis enim GH ipsi HC ,
 quare & CK , hoc est CL ipsius KM dupla est po-
 tentia. Et diametros igitur LP ipsius IK est po-
 tentia dupla. Ipsa autem IK posita fuit equalis
 duab

duabus tertijs lineæ BA , & insuper ipsi HG .
 Quare ipsa IK est alogos, quæ vocatur ex binis
 nominibus quarta, & sic notatur $2P$ tetragoni-
 cum latus $\frac{1}{2}$, & ipsius quadratum maius est,
 quàm $7 \frac{39}{119}$. Quare & quod ex diametro LP
 quadratum maius erit, quàm $14 \frac{78}{119}$. Sed quem-
 admodum demonstratur ab Archimede, cum cir-
 culi perimetros $ILKP$, quæ ponitur esse 12 , ad
 diametron rationem habeat maiorem tripla su-
 perdecupartiente septuagesimas primas, erit ipsa
 LP minor, quàm $3 \frac{183}{223}$, et quod ex LP quadratū
 minus, quàm $14 \frac{2969}{49719}$. Ostensum est autem quòd



& maius, quàm $14 \frac{78}{119}$. Erit itaque in minimis
 numeris quadratum quod ex LP maius, quàm
 5420461 , & minus quàm 5398911 . Quod est
 absurdum. Non est igitur peripheria ILK equa-
 lis lineæ rectæ BA . Si verò ponatur ipsa ILK mi-
 nor lineæ BA , multò magis sequetur absurdum.
 Cùm itaque peripheria ILK non sit æqualis lineæ
 BA , nec minor ipsa, necesse est vt sit maior.
 Quod erat demonstrandum. Palam est igitur te-
 tragonismum istum Bouilli falsum esse, & extra
 limites Archimedis.

In hac deformatione præposterū est illud, quod
 nō datur circulus cuius peripheriæ quadrati quæ-
 ratur æqualis lineæ rectæ, sed è cōtrario datur quod
 erat querendum. Et etiam dispositio lineæ IK vi-
 tium illud affert molestiæ, quale iam in alijs ante
 notavi. Sed hæc erant ferenda quodammodo, si bo-
 ni quicquam haberet problema. Tertium insuper
 tetragonismū quem ponit Bouillus Ioachimo For-
 tio suppilavit, cuius confutatio ante duos præce-
 dentes habetur. Scripsit autem Fortius annis plus-
 quam decem ante Bouillum.


Tetragonismus Orontij I.

Orontius in libro cui nomen est Protomathe-
 sis, statim post suam in dimensionem Ar-
 chi

chimedis depravationem primam, modum quen-
dam super quadratura circuli tradit, in hæc ver-
ba. Oron. Alium excogitavimus modum, quo da-
to quovis circulo quadratum eidem circulo æqua-
le immediate describatur, nulla circumferentie
ad diametrum præsupposita ratione. Quem qui-
dem modum studiosis Mathematicarum adinven-
tionum amatoribus haud ingratum futurum spe-
ramus. Sed ut rem seriò tractemus, duo nobis præ-
mittenda, atque demonstranda videntur. Primum
est. Quotlibet magnitudines inter duas quascun-
que magnitudines eadem proportione mediantes
sunt adinvicem æquales. Secundum verò quod no-
bis præmittendum, atque ostendendum videtur, est
huiusmodi. Omne quadrilaterum rectangulum est
medium proportionale inter duo quadrata à con-
currentibus eiusdem rectanguli lateribus descri-
pta. But. Quoniam huiusmodi præmissa nihil ad
rem faciunt, sicut ostendam postea, demonstratio-
nes ipsarum longas ex authore non apposui, tedium
etiam prolixitatis evitans. Sequitur autem Oron.
His præostensis, Sit descriptus circa centrum A
circulus BCD , cuius diametens BD , intra quem
describatur quadratum EF , per sextam quarti,
& per septimam eiusdem, eidem circulo BCD
circumscribatur quadratum BGD . Post modum
ab angulo E ipsius inscripti quadrati ad circun-
scrip

scripti angulum G recta linea ducatur, per primū postulatū, quæ secet diametrum BD in puncto H , circulum verò BCD in puncto I . Deinde ex data linea recta quæ sit ipsius AH dupla per datum punctum H quadratum rursus describatur HLM , per 46 primi, utriq; $\&$ inscripto EF , et circūscripto BGD quadrato parallelū. Erit igitur quadratū HLM mediū proportionale inter ipsa EF $\&$ BGD quadrata. Accipitur enim inter ambo quadrata, per intersectionem diametri utriusque quadrati lateribus æquidistantis, quemadmodum in vulgato planisphærio iuxta ipsius Ptolomæi demonstrationem, per similes diametralis $\&$ meridianæ lineæ intersectiones, inter duos circulos datos medium proportionale describere solemus. Duabus enim magnitudinibus datis, possibile est tertiam assignare proportionalem, per 13 sexti. Consequenter à puncto I ad punctum L recta ducatur IL , per idem primum postulatū, quæ secet eundem diametrum BD in puncto N . Et centro A intervallo autem AN circulus describatur NO , tertia magnitudo post quadratum BGD $\&$ inscriptum BCD circulum responder proportionalis. Deducitur enim ex quadrato BGD , $\&$ circulo BCD , atque EF quadrato, quod est mediū proportionale inter EF et BGD quadrata, per intersectionem ipsius dimetientis BD .

B D. Duabus namque magnitudinibus datis possibile est tertiam proportionalem inuenire, per *II* sexti. Circulus igitur *BCD* est medium proportionale inter *BGD* quadratum, & circulum *NO*. Huic demum *NO* circumscribatur quadratum *NOP*, per *7* eiusdem quarti. Quoniam igitur per secundam duodecimi, circuli se ad inuicem habent, sicut quæ ex dimetientibus quadrata. Sicut igitur quadratum *BGD* ad quadratum *NOP*, ita circulus *BCD* ad circulum *NO*. Et vicissim igitur sicut quidem *BGD* quadratum ad circulum *BCD*, sic quadratum *NOP* ad circulum *NO*, per *8* quinti. Circulus itaque *BCD*, & quadratum *NOP* inter idem quadratum *BGD*, & circulum *NO* sunt proportionalia, ea propter & ad inuicem equalia, per primum suppositum nuper demonstratum. Idem quoque licet aliter concludere. Quoniam circulus *ABC*, & quadratum *NOP* ad eundem circulum *NO* eandem habent rationem, nempe quæ ipsius quadrati *BGD* ad circulum *BCD*. Quæ autem ad eandem, eandem habent rationem illa sunt ad inuicem equalia, per *9* quinti. Igitur circulus *BCD*, & quadratum *NOP* æquantur ad inuicem. Dato igitur circulo *BCD* datum est æquale quadratum *NOP*. Quod faciendum proposuimus. *But.* Hoc totum Orontij propositum errores continet in se varios,



*falsitatēque multiplicem, quorum confutatio, ut
 fiat expeditius, repetitis primoribus verbis autho-
 ris, ad loca singula sensum meum breuiter indica-
 bo. Oron. Alium excogitauimus modum. But. hoc
 est, diuersum ab Archimede modū intelligit. Iam
 enim capite præcedenti illud Archimedis theore-
 ma de ratione peripheriæ circuli ad diametron,
 longo sermone tractando deprauauerat, sicut in
 præcedentibus ostendi. Oron. Dato quouis circulo
 quadratum eidem circulo æquale immediate de-
 scribetur. But. Hic cum multa superfluant, tum
 præcipuè illud, quouis, quod minimè conuenit circu-
 lis, inter quos non est, sicut inter triangulos, dissimi-
 litudo*

litudo. Et immediatè, falsò dicitur, & contra rei naturam. Neque enim dato circulo quadratum æquale statim describitur, nisi per lineamenta peculiariter ad hoc instituta, quæ sunt veluti quædam media, quibus efficitur opus. Oron. Speramus. But. Nec sanè sua spes authorem, nisi prius opinio fefellisset. Oron. Serio. But. Hoc perinde est ac si ioco præcedentia tractasset, aut aliqua nugamenta. Oron. Eadem proportione mediantes. But. Locutio nec Latina, nec Geometrica. Nam dicuntur magnitudines mediæ proportionales, non eadem proportione mediantes. Oron. Quascunq;. But. Hæc dictio facit propositionem hanc esse falsam duplici modo. Quod sic demonstratur. Sint quinque lineæ $A B C D F$, & prima quidem A ponatur esse longa pedem 1, B 2, C 4, D 8, F 16. Quoniam igitur duæ magnitudines B & D sunt mediæ proportionales

in eadem ratione, scilicet dupla, inter duas magnitudines A & C , & F , vel inter A & F , sicut in demonstratione sua utitur author, erit linea B

A	1
B	2
C	4
D	8
F	16

duorum pedum, equalis lineæ D pedū octo. Quod est impossibile. Rursum positis tribus lineis $A B C$

in ratione dupla, & tribus in eadem ratione dupla quadratis $CD F$, concludetur lineam B esse æqualem quadrato D . Quod est penitus absurdū. Hoc ergo præmissum authoris utroque modo falsum est. Et sic quoque superfluum erit, cum nihil proponat aliud, quàm quod theorema nonum in quinto Elementorum, scilicet: Quæ ad eandem magnitudines rationem eandem habent, æquales inuicem sunt. Cuius demonstratio, tribus penè verbis, ibi concluditur. Sed author noster, ut nouum aliquid præmississe videretur, verba propositionis inuertit, & demonstrationi πολυλογίαυ adhibuit.

Oron. Omne quadrilaterum rectangulum est medium proportionale. But. Hoc præmissum est pars eius lemmatis. quod ad 55 præmittitur Elementū in decimo, sed propositione demonstratione que mutatis in longius, hoc est, in peius. Et nihil omnino necessarium est ad sequentia. Oron. per 13 sexti. But. Miror equidem, quòd simul & malè citet, & corrumpat Elementa. Nam problema 13 sexti non proponit vniuersè de magnitudinibus, sed de lineis tantum, nec tertiã dicit, sed mediam. Sic enim habet problema. Datis duabus lineis rectis, mediã proportionalem inuenire. Oron. Erit itaque. But. Quod circulus NO sit tertia magnitudo proportionalis post quadratum BGD et circuli BCD , nullo modo probatur ex his quæ sequuntur. Oron.

Ded

Deducitur enim ex quadrato BGD , & circulo BCD atque EF quadrato. *But.* Huiusmodi ratio prorsus inepta est, imo nulla. Quid enim sit deduci figuram ex figuris inauditum est apud Geometras. Nisi fortè quis putet intelligendum, eo quo dicitur modo, aliquid de summa deducere, hoc est demere, vel subtrahere. Sed omnino repugnat locus ab hoc sensu. *Oron.* per 11 sexti. *But.* Iterum, sicut antea, decimum tertium, corruptè citat undecimum problema, in quo de lineis tantum proponitur, his verbis. Datis duabus lineis rectis, tertiam proportionalem inuenire. Itaque quoniã non probatur huiusmodi proportio in circulo NOP , hoc est, quod sicut se habet quadratũ BGD ad circulum BCD , ita circulus BCD ad circulũ NOP . Quoniam (inquam) non probatur hoc, sed asseritur temerè, totius propositi demonstratio nulla est. Et hoc quidem ad huius quadraturæ confutationem sufficere posset. Cũ sit tamen huiusmodi ut dimensionis experimento discrimen notabile recipiat, contrarium facilè patebit, hoc est, quadratum NOP non esse æquale circulo BCD . Quod autem sit minus, sic ostendo. Inuentum est à nobis circinatione diligenter in abaco grandiori facta. ipsum quadrati NOP latus talium esse $14 \frac{1}{20}$. qualium est diametros $BA D 16$. Est igitur embadon quadrati $NOP 197 \frac{161}{400}$. Sed secundũ

minorem Archimedis limitem, dimensio circuli BCD maior est, quàm $201\frac{1}{71}$. Quare quadratum NOP non est æquale (vt vult Orontius) circulo BCD, sed minus. Quod erat demonstrandum. Si quadrati NOP latus esset 14 cum vna sexta, quæ multò maior est vna vicesima, sic quoq; quadratũ NOP adhuc minus esset circulo BCD. Fit igitur ex istis euidentissimum huiusmodi tetragonismõ Orontij falsum esse, & extra limites Archimedis.

Tetragonismõ Orontij II.

ORontius iterum post annos duodecim libellum edidit inscriptum. Quadratura circuli tandem inuenta, quo titulo suam illam priorem modò relatam damnare videtur, adeo sibi posteriore placens, vt eam regi nostro dicauerit, epistola gloriante supra modum, quod vix credat quisquam aliter, quàm authore dicente, quem iam propter hoc ipsum audiamus. Oron. Diuina prouidentia factum esse puto Franciscæ Rex Christianissime, vt quæ præclara sunt & difficilia quantò magis ab ipsis desyderantur & perquiruntur hominibus, tantò tardius à paucis quàm plurimum inueniantur, et in sua differuntur tempora, illisque destinantur inuentoribus, quos solus Deus ad hæc nouit esse delectos. Cum ob multa, tum vt igneus, & planè celestis

lestis ille diuini splendoris vigor mentibus nostris insitus magis, atque magis elucescat. Et ad perscrutanda latentium rerum arcana acriori nos urgeat stimulo, in illorumque assidua contemplatione, & indagatione fixam oblectet intelligentiam. Quod si tam in diuinis & naturalibus, quam mechanicis, & ciuilibus rebus locum habere compertum est, in ijs artibus quæ solæ Mathematicæ, hoc est, disciplinæ nuncupari meruerunt, vsu maximè venire, opinor, negabit nemo. Quanquam enim Mathematicæ medium inter intellectilia sensiliaque locū obtinētēs ceteris artibus tū fide, et ordine, tū certitudine, ac integritate, præter summā quæ illis inest utilitatē, longè præstare videtur, variores nihilominus semper habuere professores, et insigniora theoremata maiori cum difficultate, longiorisque temporis successu adinuēta, atque demonstrata. Quemadmodum in ea disciplina, quæ Geometria vocitatur, de circuli licet intueri quadratura. Quæ tametsi ab omnibus philosophis scientia contineri fuerit existimata, & tanto tempore à tam doctis perquisita viris, hæctenus tamen videtur fuisse desiderata, facta interim non modica rerū Mathematicarum accessione. Multa enim scitu dignissima, quæ prius erant abstrusa, prodire nota. Cū igitur præfatam circuli quadraturam extra artem non esse intelligerem, & illius inuentio-

nem ad me, non sine diuino numine iure quodam
 deuolui, qui & patre philosopho, ac mathematico
 insigni Francisco Fineo natus sum, & ad has disci-
 plinas natura factus, quas à mutis (quod aiunt) ma-
 gistris acceptas octo & viginti annos Lutetiae pu-
 blicè docendo, interpretando scriptis, & nouis in-
 uentionibus exornando illustraui, præteritum operæ
 facturum me putauit, si nodum hunc dissoluerem.
 Et Galliam tuam sub tuo foelici nomine hoc rarif-
 simo munere donarem. Quod, ni me fallit ipsa ve-
 ritas, & Mathematicarum inexpugnabilis certi-
 tudo, à diuina tandem impetraui clementia. Ipsam
 namque circuli quadraturam, via hæctenus à ne-
 mine tentata, & methodo inaudita clarissimè de-
 monstraui. Atque non vni tantummodo circulo
 æquale quadratum, sed tribus circulis tria simul
 æqualia quadrata, vel è diuerso figurare docui, to-
 tumque inuentionis ac demonstrationis artificium
 quinque problematibus, & vnica, eaque simpli-
 cissima conclusi figuræ contextura. Ex ipso autem
 primo problemate à Græcis olim tot modis inuesti-
 gata, sed nondum planè demonstrata cubi dupli-
 catio euidentissimè colligetur. Huic porrò circuli
 tetragonismo duas adiunxi demonstrationes, alte-
 ram de ipsius circuli dimensione, alteram verò de
 ratione circumferentiæ ad diametrum. Quæ tot fœ-
 licia ingenia, vt circulo æquale darent quadra-
 tum,

tum, haëtenus defatigarunt. Ego igitur tum verbis Aristotelis, tum supradictorum philosophorũ prouocatus exemplo, & qui sub tanto rege, in tanta vniuersitate, tantóque tempore Mathematicarum interpres deputatus sum, iniquam rem, ac meo officio indignam me facturum existimaui, si id quæstionis genus intactum prætermitterem. Et ni pro mea virili parte, ac dexteritate animi aliquã, quæ cæteros hac in parte leuaret excogitarem ad inuentionem, qua circulus quadrari vel facilè posset, idque prætermissa ratione circumferentiæ ad circuli diametrum, quam puto esse surdam, hoc est hominibus ignotam, & proinde sub aliqua numerorum expressione nusquam fore reperibilem. Post varias itaque, ac subtiles, aut si mauis laboriosas, partimque suppressas partim verò editas inuestigationes, cum ex duarum linearum rectarum ad inuentionem quæ inter duas rectas lineas propositas sub continua eiusdem rationis proportione constituuntur. Atque ex ipsa rationum compositione multa, & sanè quàm difficilia comprehendere suboririue, ac demonstrari sæpius animaduertentem: tentauit demum earundem quatuor linearum continue proportionalium adminiculo, ac ipsa rationũ compositione mediante, hanc quæ sequitur de circuli quadratura contexere, ac tandem elucidare demonstrationem. Quæ an pro mea successerit

animi sententia, cuius equo, ac in Mathematicis
 vtcunque versato lectori relinquimus dijudican-
 dum. Ipsis autem inuidis, ac malevolis nostri nomi-
 nis obtrektoribus perpetuum inuidiæ tormentum
 exoptamus. *But.* Hæc, & alia multa iactanter,
 inanisque plena gloriæ de se præteritur Orōtius.
 Ut taceam interim quàm sit stolidum arbitrari,
 inuentionem tetragonismi ad se quodam iure diui-
 no deuolutam, quòd patre sit philosopho natus.
 Quasi Deus ista debeat philosophorum filiis, &
 infundat scientiam genitura. Mirum autem quòd
 non præterea fingat Mathematicam sibi fuisse ma-
 trem, vt eo posset colore gloriari Geometriam si-
 mul cum lacte bibisse. Ceterum posteaquam (iuxta
 prouerbiū vetus) montes parturire videmus, nasce-
 tur tandē ridiculus mus. Quem iam perquiramus.
 Conatur in primis author necessarium proposito suo
 problema demonstrare, de quo sic loquitur. *Oron.*
 Ad construendā confirmandamque circuli qua-
 draturam, à nobis tandem, & ni me fallit animus,
 foeliciter excogitatam, necessum est imprimis, ob-
 latis duorum quadratorum lateribus, quorum al-
 terum dato fuerit circumscriptum circulo, reliquū
 verò in eodem circulo descriptum binas medias li-
 neas rectas in eadem ratione continuè proportiona-
 les reddere notas. Quæ ratione autem Mathema-
 tica id problema dissoluatur, ex nemine valuimus
 planè


planè deprehendere, quanuis plerique Græci philo-
 sophi, ac Mathematici vt illud explicarent proble-
 ma, quod cubi duplicatio dicitur, diuersis & subti-
 libus admodum inuestigationibus, quas omnes
 Georgius Valla Placentinus, capite secundo libri
 quarti suæ Geometriæ citat, & summam inter-
 pretatur, ostendere conati sunt, qualiter inter duas
 quasuis inæquales lineas rectas duæ mediæ lineæ
 rectæ sub eadem ratione continuæ proportionales
 obtineantur. Nullam tamen illorum offendimus in-
 uentionem, quæ alicuius instrumenti mechanici nõ
 vteretur adminiculo, & proinde quæ aperta suspi-
 cione, vel inexplicabili difficultate careat. Ne igitur
 infirmis adniteremur fundamentis, & Mathe-
 maticam simul, atque suscepti negotij violaremus
 integritatem, nouum ac fidissimum modum inue-
 stigandi eiusmodi lineas proportionales tibi de-
 mum excogitauimus: sed huic nostro tetragonis-
 mo specialiter inseruientem. Habent enim ipsa
 quadratorum circulo dato circumscriptorum late-
 ra peculiarem quandam rationis fœlicitatẽ, quàm
 aliarum inæqualium linearum prorsus non admit-
 tit natura. *But.* Videmus hic authorem non pro-
 bare vestigationes illas, quæ per organa mechani-
 ca fiunt, quibus Mathematicam (vt ipse loquitur)
 integritatem violari putat. Itaque posteaquam
 nouum suum (vt ait) modum ac fidelissimum du-
 centis

centis fermè versibus inculcans, & infarciens occultavit potius quàm demonstravit, nihilominus tamen, vel oblitus propositi, seu magis ludificatione quadam circulatoria, id apertè facit ad finem problematis, quod in principio damnauerat. Ad hoc etiam abutens voce corollarij, sicut alias sæpe. Oron. Corollarium. Si has itaq; binas lineas rectas inter ipsorum quadratorum latera continuè proportionales mechanico, promptissimòque reperire uolueris artificio, fabricetur gnomon ex dura quapiam, & electa materia ipsi RFM similis, & constitutis duobus eorundem quadratorum lateribus supra scripto modo datis, cuiusmodi sunt AB & BC ad angulum rectum atque indirectum utrinq; productis &c. But. Quis igitur non videt, quàm sibi non constet author in hoc loco? Sed procedamus ad alia. Oron. Problema secundum. Dato circulo æquale quadratum, aliisque duobus circulis duo simul equalia quadrata alterum alteri describere, datòue quadrato circulum æqualem, aliisque duobus quadratis duos æquales circulos alterum alteri simul delineare. But. In hoc problemate & sequentibus non est propositum barbarissimos verborum discutere, qualis est delineare, pro deliniare, sed rerum tantùm notare vitia. In quibus primum est illud ineptissimum, quod cum satis esset ita proponere. Dato circulo æquale quadrat

dratum describere. Non contentus hoc, intricatio-
nem illam molestam adhibuit, de duobus alijs cir-
culis, & quadratis, quæ non solum est superflua,
sed etiam ridicula. Quasi qui vni circulo æquale
quadratum describere nouerit, nesciat hoc in duo-
bus, vel tribus, aut quotquot velit circulis facere.
Aut si velit in vno tantum, cogatur in tribus.
Quis itaque vel Euclidem ipsum meritò non ri-
deat? si cum proposuit, Dato rectilineo æquale
quadratum describere, Statim infarciat proposi-
tum de duobus alijs rectilineis, & quadratis, sicut
hìc fecit Orontius. & tamen adeo sibi placet hoc
nugamento, vt id tanquam virtutem aliquam in
arte reconditam, quam non omnes aduertere pos-
sent, sepè iactauerit. Primum quidem apud regem
in epistola, quem locum supra retuli. Deinde &
statim post hoc problema, abusus etiam loco sacræ
scripturæ, in hæc verba. Oron. Dum porro vni tan-
tummodo circulo æquale quadratum, aut vni qua-
drato circulum æqualem, per hanc nostram obti-
nere volueris inuentionem tria simul offendes qua-
drata tribus circulis æqualia, trësue circulos tri-
bus quadratis respondententer æquales. Quasi trini-
tas vnitæ, vel vnitas ipsa trinitate sub hoc nostro
comprehendatur inuento. But. Istud etiam vocat
author amplitudinem mirabilem per scholion hoc
modo. Oron. De mirabili huiusce tetragonismi,
tum

tum facilitate, tum amplitudine. But. Solet enim appendices huiusmodi scriptis suis inserere. Et hoc iterum, atque iterum inculcans ad finem operis, quem locum infra recitabo, appellat vbertatem huius quadraturæ. Post hæc sequitur. Oron. Neq; hîc cognitam supponimus circûferentiæ rationem ad ipsum diametrum, siue curvæ in rectam lineam conuersionem, quæ tot foelicissima hæctenus contorsit ingenia. Sed per viam proportionum, à nemine tentatam, nodum ipsum dissoluere foeliciter (vt spero) sum adgressus. Sit igitur in primis datus circulus AH , cui oporteat æquum designare quadratum. Circa eundem itaque circulum AH quadratum describatur AE , per septimam quarti Elementorum, intra verò eundem circulum AH aliud describatur quadratum DH , per sextam eiusdem quarti Elementorum, inter ipsa post modum horum duorum quadratorum latera, utpote A & D binæ rectæ lineæ sub eadẽ ratione continuè proportionales inueniantur, per antecedentis problematis traditionem, sintque B & C , vt quem admodum latus A ad lineam B , sic eadem B ad C , atque C linea ad latus D . Ex ipsis consequenter lineis rectis B & C quadrata describantur BF & CG , per quadragesimam sextam primi eorundem Elementorum, sintque ipsorum quadratorum BF & CG latera, tum inuicem, tum prædi-

Et or



Etorum quadratorum AE & DH lateribus
 equidistantia, siue parallela. In ipsis rursus qua-
 dratis BF & CG singuli describatur circuli BI
 & CM , per octauam quarti prædictorum Ele-
 mentorum. Qui quidem circuli erunt, tum inuicem
 tum ipsi AH circulo concentrici, atque paralleli,
 ob ipsam quadratorum, siue laterum hypothesim.
 Quod si datum fuerit imprimis quadratum DH ,
 cui equalem oporteat describere circulum, eadem
 figuræ resultabit contextura. Sed retrogrado, &
 paululum variato descriptionis ordine, in hunc qui
 sequitur modum. Circa datum quadratum DH
desc


describatur AH circulus, per nonam quarti Ele-
 mentorum. Atque circa ipsum AH circulum
 quadratum describatur AE , per septimam eius-
 dem quarti. Postmodum inter eorundem quadra-
 torum latera, quæ sint rursus A & D , binæ repe-
 riantur lineæ rectæ sub eadem continua ratione
 medio loco proportionales, per ipsius antecedentis
 primi problematis traditionem, quæ sint rursus B
 & C . Ex quibus lineis rectis describantur quadra-
 ta BF & CG , per ipsam penultimam primi Ele-
 mentorum, in ipso demum quadrato BF circulus
 BL describatur. Et in ipso pariter quadrato CG
 circulus describatur CM , per octauam quarti eo-
 rundem Elementorum. His altero duorum modo-
 rum constructis, aio quadratum BF æquari impri-
 mis ipsi dato circulo BL , atque DH quadratum
 ipsi CM circulo simul æquari, quemadmodum ex
 succedentibus problematibus manifestum facie-
 mus. Cum igitur circulus proponitur, cui æquale
 quadratum desyderatur, is erit trium circulorum
 in ipsa descriptione concurrentium primus atque
 maximus. Quoties autem quadratum offeretur,
 cui æqualem volueris dare circulum, ipsum erit
 quatuor quadratorum in eadem figuræ descriptio-
 ne simul occurrentium ultimum, atque omnium mi-
 nimum. Quemadmodum ex ipsa potes elicere figu-
 ra. Quæ & si utrique, & quadraturæ circuli, &
 ipsius

ipsius quadrati circulatorum (ut ita loquar) indifferenter inseruiat, & præpostero aut si maius gemino construatur ordine, ipsa nihilominus figura, & proinde via demonstrationis ex omni parte manet eadem. *But.* Cum in omni problemate constructionem figurae demonstratio sequi statim debeat, & demonstrationem conclusio. His tamen omisissis author noster à methodicos interserit problema, quod quidem non est problema. Sed hoc vocabulo, & hinc & in sequentibus abutitur, non minus imperitè quàm antea corollarijs abusus est sæpe. *Ait enim.* *Oron. problema 3.* Prædictorum quadratorum, atque circulorum inuicem accidentes proportionales in vniuersum colligere. Triaque interiora & minora quadrata tribus ipsis circulis, qui in tribus primis & maioribus quadratis distribuuntur ordinatim esse proportionalia demonstrare. *Problema 4.* De rationum compositione pauca subnotare. Atque circulum tertium & minimum ad secundum quadratum eandem habere rationem, quam rectangulum triangulum ipsius maximi quadrati dimidium ad ipsum primum & maximū circulū cōsequēter ostēdere. *Problema 5.* Quòd tria interiora et minora quadrata ipsis tribus circulis, qui in tribus primis, et maioribus quadratis describuntur singulatim, & ordine coequentur tandem efficere manifestum. *But.* Quæ autem

inter istiusmodi problemata ad obscurationem potius quam ad demonstrationem propositi contempserit author, nihil attinet referre, satis enim intelligentur ex consequentibus esse falsa. Sunt insuper proluxa tam immodicè, ut iustum penè librum expleant. His igitur prætermisissis conclusionem ipsam videamus, quæ sic habet. Oron. Dato igitur circulo AH æquale quadratum BF , aliisque duobus circulis BL & CM duo simul æqualia quadrata CG & DH alterum alteri descripsimus. Datæque quadrato DH æqualis circulus CM , aliisque duobus quadratis CG & BF duo æquales circuli BL & AH alter alteri simul delineati sunt. Quod secundo, & principali problemate faciendum susceperamus. Vno igitur figure contextu dato circulo hîc simul quadrantur circuli, datæque quadrato tribus quadratis tres circuli simul describuntur æquales. Eisdem insuper argumentis, & Mathematicis inductionibus ipsorum quadratorum circulatorum, quibus & eorundem circulatorum quadratura demonstratur. Et quod magis admirabitur aliquando posteritas, per ipsasmet figure partes coassumpto solummodo extremo, & omnia complectente quadrato propositam quadratorum & circulatorum conclusimus æqualitatem. But. Quoniam authoris propositio, quam vocat principale problema, nihil habet unde con-

stru

structio figuræ percipi valeat, quæ postea satis
 confusè describitur, to-
 tum istius tetragonismi
 sensum, quo melius in-
 telligatur, reiectis su-
 perfluis ita propono. Si
 fuerint quatuor rectæ
 lineæ proportionales cõ-
 tinuè, quarum prima sit
 ad quartam potentia du-
 pla, circulus cuius est
 prima diametros equa-
 lis est quadrato, cuius
 erit latus secunda. Sint
 quatuor rectæ lineæ pro-
 portionales $A B C D$,
 sicut quidem A ad B ,
 ita B ad C , & C ad D .
 Sitque A ipsius D po-
 tentia dupla. Et ex li-
 neis $A B C D$ describã-
 tur quadrata quatuor
 $A P$, $B F$, $C G$, $D H$.
 Et intra quadratũ $A P$
 describatur circulus K .
 Vult igitur Orõtius, vt
 circulus K sit equalis



quadrato $B F$. Ego autem dico ipsum quadratum
 $B F$ esse maius circulo K . Esto figura T rationem
 habens ad quadratum $A P$, quam 11 ad 14 . Igi-
 tur secundum ea quæ demonstravit Archimedes
 in dimensione circuli, ipsa figura T maior est cir-
 culo K . Et quoniam quatuor quadrata $A P, B F,$
 $C G, D H$ sunt proportionalia, ratio primi ad quar-
 tum, quæ quidem est dupla, est ratio primi ad se-
 cundum triplicata. Ex ratione autem 14 ad 11
 triplicata, fit ratio quæ est 2744 ad 1331 , quæ
 quidem maior est, quàm dupla. Quadratum igitur
 $A P$ ad quadratum $B F$ rationem habet minorem,
 quàm ad figuram T , hoc est, quàm 14 ad 11 , maius
 est igitur quadratum $B F$ figura T . Quare & mul-
 to magis ipsum quadratum $B F$ maius est circulo
 K . Quod erat demonstrandum. Descripto etiam
 intra quadratum $B F$ circulo L , & intra quadra-
 tum $C G$ circulo N , demonstrabitur quadratum
 $C G$ maius esse circulo L , & quadratum $D H$
 maius circulo N . Quoniam enim sicut demonstra-
 tum est, $A P$ ad $B F$ rationem habet minorem,
 quàm 14 ad 11 . Sicut autem $A P$ ad $B F$, sic $B F$
 ad $C G$, & $C G$ ad $D H$. Igitur ipsius $B F$ ad $C G$
 & $C G$ ad $D H$ ratio minor est, quàm 14 ad 11 .
 Sed secundum Archimedes, utraque ratio qua-
 drati $B F$ ad circulum L , & quadrati $C G$ ad cir-
 culum N maior est, quàm 14 ad 11 , maius est ergo
 quad

quadratum CG circulo L , & quadratum DH
 circulo N . Quod oportuit demonstrasse. Aliter.
 Pone quadratum AP esse 14 . Igitur, secundum
 ea quæ super dimensione circuli demonstravit Ar-
 chimedes, circulus K minus erit, quàm 11 . Et quo-
 niam ratio quadrati AP ad quadratum BF talis
 est, quæ triplicata duplam constituit, impossibile
 est ut quadratum BF non sit plusquam 11 . Non
 est igitur circulus æqualis quadrato BF , sed mi-
 nor. Est itaque manifestum ex istis Orontij tetra-
 gonismon esse falsum. & extra fines Archimedis.
 Unde etiam consequens est, ut ea quibus ad de-
 monstrationem usus est, non sint vera. Nunquam
 enim ex veris sequitur falsum. Nihil est igitur
 quod amplius ex hac inuentione sua gloriatur Orō-
 tius de philosopho patre, qui si degat adhuc in
 terris ætatem, simile quiddam postulet à filio, quod
 Lucianus Mercurium Pani dixisse fabulatur. Ro-
 go te fili, ut cum istiusmodi tetragonismos tuos ia-
 ctabis, nunquam me patrem tuum dixeris esse. Re-
 liquum nunc est, ut authoris epilogum, quam ipse
 vocat conclusionem audiamus, ubi solito more, ele-
 phantum (quod aiunt) de musca facere conatur,
 inquit. Oron. Habes igitur candide, ac huma-
 nissime lector à nobis tandem adinuentam, & sub
 compendiosa admodum traditione demonstratam
 ipsius circuli quadraturam, quam philosophorum

parens Aristoteles scibilem esse, ac nondum suo tempore scitam pluribus in locis affirmavit. In qua circuli quadratura non vni tantum modo circulo æquale quadratum, vel vni dato quadrato æqualem circulum describere, seu figurare docuimus. Sed tribus ciculis tria quadrata singulatim æqualia, tresue circulos tribus quadratis respondentem æquales, vbi nuper citatum est, inuenire ac simul conscribere monstrauimus. Eam namque inuentum nostrum præ se ferre videtur vbertatem, vt ex vna trinam, & ex trina vnicam elicere valeamus ipsius circuli quadraturam. Adde quod vniuersum nostræ inuentionis, atque demonstratiõis artificium sub vnica, atque simplicissima conclusimus figuræ contextura, & ex puris Geometricorum Elementorum theorematibus, quæ certa & ab omnibus recepta sunt, ipsius demonstratiõis certitudinem confirmauimus. Quod illius fauente clementia qui solus trinus & vnus metitur singula facere, ac tandem ostendere posse non diffidebamus. Hunc porrò laborem nostrum tibi, ac cunctis bonæ volūtatis hominibus tam gratum ac utilem fore percupimus, quàm durum, & graue illis ad futurum non dubitamus, si palmam hanc reportauerimus, qui in foelicissimo sydere nati, dum nihil agunt, omnibus omnia inuident, & meæ inciuiliter nimium aduersantur foelicitati. Quos aut meliores

liores reddet, aut malè perdet Dominus, cui soli sit honor & gloria. But. Postè àquam hanc suam quadraturam publicavit Orontius, aliam iterum paucis quibusdam commutatis emisit, eadem tamè tetragonismi substantia, formàque manente, quod ad finem libri testatur, his verbis. Impressa (inquit) huius quadraturæ tabula multa in melius commutauimus. Non miraberis igitur, si eiusdem tabule litera ab ipso contextu vtcunque differat. But. Nec post hæc dies, & annus de more solito librariorum apponitur. Sed prout vterque mihi liber venit in manus, inter primam, & secundam editionem vix tempus bimensis intercessit. Itaque miratus sum quid sua tam cito displicuissent auctori, tanta potissimum venditatione iactata: et quid per tabulam & contextum velit intelligi. Sed longè magis illud quòd epistolam suam, cuius suprà feci mentionem, ab operis fronte sustulerit, tanquam qui reposceret quod regi, Mæcenatiquæ suo dicauerat. Quanquam magis est vt credam, id esse factum conscientia quadam vanitatis animi remordente, quòd apud regem gloriatus esset tam insolenter, super doctrina sua, natura & ingenio. Et quod super omnia stultum erat, de patre philosopho. Nam quæ sunt huiusmodi nec ipsis etiam authoribus placere diu possunt. Cæterum in hac Orontius mutatione ipsum etiam problema

ad Archimedis regulam examinavit. Vnde suum errorem non solum non agnoscit, sed regulam ipsam ad propositum suum distorquet. Quod & in alijs suis scriptis semel, atque iterum antea fecit. Cum enim Archimedis via progrediens vel inuitus cerneret, id quod dato circulo æquale vult fieri quadratum esse maius ipso circulo, sicut & re vera est, & iam supra demonstravi. Ne tamen limites transgredi videretur, ipsum limitem maiorem ad errati sui mensuram extendit, inquiens. Oron. Ex his omnibus subsequi videtur, rationem circumferentia ad diametrum paulò maiorem esse tripla sesquiseptima. Et quadratum consequenter ad inscriptum circulum minorem habere rationem, quam 14 ad 11. Qualium igitur partium diameter est septem, talium circumferentia erit duarum & viginti cum duabus nonis. Et proinde circumferentia ad diametrum rationem habebit tripla sesquiseptima utcumque maiorem. But. Post hæc autem rem ipsam circulatorici quadam garrulitate multis prosequitur, nihil aliud ad probationem potissimum adducens, quam oculorum inspectionem, & suas quasdam sinuum tabulas indentidem inculcans, & errorem tabulis ipsis inesse fatetur, nihilominus tamen ita concludit. Oron. Rei ergo veritas ita se habet, ut circumferentia ad diametrum rationem propemodum habeat, quam 22 cum duabus

bus nonis ad 7. Et quadratum ad inscriptum circulum, quàm 14 ad 11 cum vna nona. But. Quid rogo magis vnquam stultum, temerarium, & absurdum in arte fieri possit? quàm propositionem ab Archimede demonstratam ex oculorum aspectu, & à falsis, te confessore, tabulis reprobare. Et quod est præcipuæ leuitatis indicium. Hanc eandem propositionem Orontius aliàs approbavit in operis sui quod inscripsit Protomathesis libro secundo, ita scribens. Oron. Placet consequenter demonstrare circumferentiam ad circuli diametrum, iuxta vulgatum ipsius Archimedis inventum rationem habere minorem tripla sesquiseptima, maiorem autem tripla superdecupartiente septuagesimas primas. Hoc est circumferentiam ter continere diametrum, & paulò minus septima, sed plus octava ipsius diametri parte. But. Sic igitur se habet Orontij in Archimedem depravatio iam tertia. Cum autem in hac editione secunda nihil circa tetragonismi propositum mutauerit, & idem quod prius concludat, confutatione nova nihil est opus. Cæterum si viderit Orontius insignis iam diu, ac nunc etiam ab arte professor ista non reprobare legitime, in apologiam operis sui materiam habet in promptu. Nec est illi molestè ferendum, si mihi de scriptis suis aliqua non probantur. Nam & dimensionem Archimedis ipse, & à Ptolomæo, &

ab omni posteritate receptam, & à se etiam demonstratam, non semel postea, nec vno modo reprehendere conatus est. Quod quale sit in alijs operibus, quæ propediem sum æditurus, ostendam. Vbi multas adhuc aliorum falsas circuli quadraturas examinabo,

Huius tetragonismi confutatio aliàs ædita fuit in Geometricis operibus Buteonis, dum vitam adhuc ageret Orontius.

Ad tetragonismos Orontij posteriores.

CVM mihi iam peruenisset operis concepti liber ad umbilicum, finemque laboris adesse putarem, ecce subito, tanquam reuiuiscens Orontius, quem fato functum nuper audiueram, negotium ex insperato redintegrauit. Ingens enim huius argumenti volumē, titulo de Rebus Mathematicis hæctenus desideratis, ædendum testamento reliquit. Ad quod (sicut in proœmio testatur epistola) totum septennium indefesso labore consumpserat, cuius maximam partem, imò penè totum, exhibuit quadratura circuli modis plusquam centum

tum inculcata, vnde certò conijcere dedit, quanta
 nominis cupiditate flagrauerit, vt hanc inuenti sibi
 gloriam vsurparet. Quam & si supra vires inge-
 nij vel ex eo sentire posset, quòd aliam ex suis qua-
 draturis à me reprobata[m] vidisset, quam annis
 abhinc plus minus duodecim, totus in suæ commē-
 dationis, & gloriæ præfationem effusus regi no-
 stro dicauerat, nulla tamen res hominem, præter-
 quam mors, ab incepto pertinaci diuertere potuit
 vnquam. Huius autem nunc multiplicis quadratu-
 re falsitatem præterire silentio, vereor ne mihi di-
 sputationem hanc multum iam, diuque versanti,
 vel approbatio quedam tacita, aut certè refellen-
 di desperatio confessa possit ascribi. Si verò modos
 omnes tanta multitudine particulatim discutere
 pergam, erit mihi longo supra modum processu cū
 Cretensi (vt dicitur) Cretissandum, vnde negotiū
 maius, quàm operæ prætium studiosus lector habe-
 bit. Si enim crambe bis posita (veteri prouerbio)
 mors est, quid plus quàm centies reposita fiet? Inter
 hæc igitur animum versando dubius, ne me vel ta-
 citurnitas suspectum, vel loquacitas ineptum, ridi-
 culumque faciat, et ne quid indiscussum extrà re-
 linquam, compendiosum ad hæc iter ipsa mihi res,
 suapte natura breuis, & in arctum contracta, mon-
 strauit. Paucis enim quibusdam, quæ sunt veluti
 fundamenta, propulsis structure reliquum statim
 proc

procumbet.

Constat enim ex his quæ sunt à nobis in commentario dimensionis exposita, ad circuli tetragonismo deesse nil aliud, quàm lineam rectam, quæ sit æqualis peripheriæ dari. Et hanc æqualitatem in æqualitatis via procedendo haberi nunquam posse, sed id tantum quod est magis semper, atque magis vero propinquum. Ipse tamen Orontius, in tota suæ quadraturæ silua, verum ipsum cum veri propinquo sic implicat, atque confundit, ut propositi planè videatur oblitus, nec intelligere quid sibi velit. Quod ne mihi tantum dicenti credatur, ipsius verba subscribam, prout sunt ad propositionem primam libri secundi, quod est quadraturæ suæ principium. Oron. Consentaneum (inquit) esse videtur, ut hoc libro secundo rationem quam habet circumferentia ad circuli diametrum ostendamus, saltem, quantum fieri poterit, vero proximam, ipsive circumferentiæ, vel datæ eius parti rectam æqualem assignemus, & è conuerso. Deinde circulum ipsum metiri, & tandem in quadratum æquale, datumve quadratum in æqualem circulum pluribus modis reuocare doceamus. But. In hoc principio authoris propositum, & contradictionem statim videmus apertam, dum ait, se daturum rationem quam habet circumferentia ad diametrum, saltem verò proximam. Non igitur veram. Sed contradi-

ctio

Etionem sibi facit illico, subiungens. Ipsive circumferentiæ rectam æqualem assignemus. Quod est impossibile, scilicet, vt ex data ratione non vera, æqualitas lineæ vera sequatur. Nam dare rationem peripheriæ circuli ad diametrum, nil est aliud, quàm dare lineam rectam ipsi peripheriæ æqualem. Ex ratione autem vero proxima, hoc est, non vera, datur lineam rectam, quæ peripheriæ non sit æqualis. Quæ quidem inæqualitas, quantulacunque fuerit, ad veram quadraturam non solum nihil operatur, sed eam ipsam sic implicat, atque perturbat, vt tali via progrediens ad verum penetrare nunquam possit. Non magis quàm si in eo qui non est quadratus numero tetragonum latus inquirat. Post hæc autem Orontius more in alijs suis quadraturis solito, sed ambagibus diuersis, conatur idem quod Archimedes ostendere, videlicet rationem peripheriæ circuli ad diametrum esse minorem tripla sesquiseptima, & maiorem tripla superdecupartiente septuagesimas primas, nulla prorsus Archimedis mentione, non solum hîc, sed nec etiam toto volumine facta, & quem aliàs semper mordacitate premebat, nunc taciturnitate suppressit. Infert deinde propositionem huiusmodi. Peripheriam circuli ad ipsam diametrum rationem habere triplam vndecupartientem septuagesimas octauas. Quæ ratione vix (inquit) speramus à quo-

piam

piam mortalium posse dari fideliozem. Quid autē per fideliozem intelligi velit, alibi non ineptē minus explicuit, dicens. Hac ratione præcisiorē aliquando inueniri posse omnino diffidimus. Huiusmodi autem ratio ad minimos redacta numeros est sicut 245 ad 78, & quāuis intra primos Archimedis limites inueniatur, nequaquam tamen intra secundos, prout ex subiecta formula constat. Quare non est ista ratio vera.

$$\begin{array}{r} 1223569152 \\ 15686784 \\ 4992635 \end{array} \begin{array}{r} 1223195575 \\ 245 \\ 78 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2657521152 \\ 34070784 \\ 10845965 \end{array} \begin{array}{r} 2657261425 \\ 245 \\ 78 \end{array}$$

ET alie multe, ne dicam infinite, vero propiores dari possunt, eo quem in dimensionis commentario more docui. Veluti fuerit illa quæ ponitur ibi, scilicet circulum ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habere, quam 2771 ad 3528, vel ea quam dedit Ptolomæus 377 ad 480, quas intra secundos limites esse monstravi. Quamuis igitur propinquitas ista nihil ad quadra-

TURAM

turam præter impedimentum faciat, hanc tamen primum, atque præcipuum totius operis fundamentum ponit Orontius, super quo tam ineptis postea structuris insurgit, ut extra suam basim progredi cogatur, propositam rationem triplam undecupartientem septuagesimas octavas subinde variando. Et qua iustiore aliquando dari posse negavit, eam statim Astrologica numeratione depravat, inquiens. Hanc rationem propemodum observant partes 376, & minuta 55.23.4.36.52 ad partes 120. Sed huiusmodi sexagenaria minutorum partitio ad propositum inutilis est prorsus, & inepta, ut quæ rationem dictam ad verum nunquam exprimere possit, longè tamè tolerabilior ea quam multis postea modis, conatu magno, prosequitur. Nam ad omnes suas figurationes, quibus speciem aliquam demonstrationis adhibuit, lineis abutitur, quæ dicuntur irrationales. Et eam sibi diuisionem, in eadem linea repositam pluries, assumpsit, quæ secundum rationem mediam & extremam vocatur, nulla quidem alia, quam possim conijcere causa, quàm ut falsitatem, ne foret conspicua, tenebris infuscaret. Cuius vnum pro multis exemplum intricationis affectatissimæ subiiciam, quod est in propositione secunda. Sit igitur (inquit) datus semicirculus ABC , cuius circumferentia bifariam sit diuisa sub DB semidiametro in ipso puncto B .

Et

Et operæ præteritum sit quadranti AB rectâ æqualem inuenire. Diuidatur itaque dimetiens AC proportionaliter, rursúmque segmentum minus proportionaliter, & deinceps in hunc modum, per 30 sexti Elementorum, minoribus segmentis in punctum C continuè terminatis, quatenus in toto dimetiente AC nouem occurrant proportionaliũ segmentorum distinctiones, nouem maiora, totidemque minora segmenta distribuentes, quæ numeris suo annotentur ordine. Secetur postmodum ex AB semidiametro recta quedam linea DE , quæ constet ex dimidio segmenti maioris ipsius dimetientis AC , & dimidio segmenti ordine quinti, atque dimidio octauæ segmenti, vnâ cum segmento decimosexto, & quarta parte segmenti quindecimi, atque demum vnius octauæ partis segmenti ordine decimiseptimi parte sexagesima. Connectatur deinde linea recta CE , cui equalis coaptetur CF , per primam quarti Elementorum. Tandem connectatur AF linea recta, quam aio æqualem esse quadranti circumferentiæ AB . Hoc autem per ipsorum proportionalium segmentorum numeros fiet illico manifestum coadiuuante præostensa ratione circumferentiæ ad diametrum. Supponatur ergo dimetiens AC partium inuicè æqualium 120. Hactenus Orontius. In hoc descriptionis proposito cum explicatione sequenti tot in vnũ,

præter

præter falsitatem, vitia confluunt, ut ea sit operosum percurrere. Primum enim ipsa diametri partitio secundum rationem mediam & extremam facit, ut singula decem & octo segmenta sint irrationalia, sicut propositione sexta tertij solidorum demonstravit Euclides. Quorum quantitas quavis numerorum facultatem excedat, prout est notissimum, eam tamen in omnibus assignavit per numeros & tabulas minutim, nulla quam ostendat ratione dispositas, perinde ac si verè & exactè fieri posset. Deinde, quod est aliud super alijs absurdum, in huiusmodi segmentorum quadratis latera tetragonica numeratione longa, molestaque prosequitur. In quibus posteaquam se multum diuque frustra defatigavit, ipsa rei necessitate coactus est fateri, lineam $A F$, quam esse æqualem quadranti circumferentiæ circuli determinauerat, ab ipso quadrante tribus quartis minutis, & triginta ferè quintis differre. Cum igitur (inquit) præmemorata differentia adeo sit exigua, & vitari nullo modo possit, concludemus rectã ipsam $A F$ æqualem esse quadranti circumferentiæ $A B$, cuius dimidium est $A B C$. Quod faciendum receperamus. Hæc est Orontij conclusio planè quidem & euidenter propositioni contraria. Quam & falsam ostendit. Quo quid magis vanum, stultum, & impudens in re suscepta fieri possit, certè non vi-

deo. In hac tamen calculi positione tam stupida quæ citra lineas etiam expeditior erat, adeo sibi placet, ut eandem cantilenam sæpe recantans modos alios, super alijs affectata, & importuna figurationum varietate prosequatur, nulla re magis inter se, quàm minorum quantitate diuersos, quæ modo plura, modo pauciora, equalitatis abusu solito, concludit, ubique sibi magna leuitate contradicendo. Ut nedum circuli quadraturas, sed ne dimensiones quidem legitime constituat. Quibus nõ contentus fallaciam lunularum Hyppocratis, ab Aristotele, & antiquis reprobata, suis quadraturis immiscuit, authore suppresso, & quò magis suas ipse faceret, longo circumductu solitis minorum calamistris infucavit. Quæ cum ita sint, ad istius generis problematum tumultuariam turbam confutatio iam facta satis erit, cum re vera sit vnicum mutatione vana calculi, linearumque fucò variatum. Cæterum suspicatus ipse forsitan, quod res erat, videlicet implicationem istam numerorum factam verbosius ad demonstrationem propositi nil aliud præter fucum & molestiã afferre, compendiarias aliquot circuli quadraturas à se recens (ut ait) inuentas, alijs interponit. Quas nullis (inquit) prorsus alijs, quàm ocularibus ostensionibus in presentiarum confirmabimus, ne volumen in iniustam molem producere cogamur, neue illo


illorum confundamus ingenia, qui talibus inuentis
 solent utcunque delectari. Item alibi. Has porrò
 (inquit) compendiaras circuli quadraturas præ-
 ostensis, atque numeris confirmatis, circuli quadra-
 turis ad amussim conuenire ipsa te docebit expe-
 rientia. Quapropter illas quàm breuissima potui-
 mus traditione perstringere libuit, absque videli-
 cet ampliori demonstrationis examine. Id enim
 iniustum, atque odiosum volumen producere fo-
 ret operæpretium. Si quis autem morosus Oron-
 tio mastix his minimè contentus fuerit, aut ferat,
 aut meliores si possit, excogitet. But. Ad odiosam
 voluminis prolixitatem vitandam legitimum, &
 ex arte fuerat, paucis integris, rectèque demon-
 stratis propositionibus uti, & non tanta multitu-
 dine confusis, ac truncis abuti. Est enim sine de-
 monstratione propositio, veluti corpus anima pri-
 uatum. Est etiam proponere cuiuslibet, demon-
 strare autem non nisi docti, & exercitati. Sed ita
 fieri solet, ut qui demonstrationem non habent,
 causam breuitatis inscitie prætendant. Ad oculos
 autem demonstrationes reijcere, tale est, ut nihil
 vnquam magis rusticum, & ineruditum, idio-
 tisque proprium dici possit. Præterea quòd ista
 nos vel inuitos ferre, vel meliora proferre perscri-
 bit, id arrogantie stultæ plenum est. Nemo enim
 assertionibus temerarijs trahitur inuitus, sed Geo-

metricis argumentis, quæ (prout verissimè Cicero testatur) non persuadent, sed cogunt. Et satis meliora profert, qui mala ne recipiantur, ostendit. Quod in huiusmodi rudibus fragmentis multò subtilioris, ac molestioris est operæ, quàm si speciem aliquam demonstrationis haberent. Quæ sicut bona verum, ita & mala falsum statim iudicat. Ad hanc insuper difficultatem accedit, quod in omnibus istis studiosè cavuit Orontius, ne lineis ad circuli diametrum commensurabilibus, vel aliàs explicatis vteretur, sed quanto potuit astu, ad tegendam falsitatem, simul ne ad se refellendum relinqueret ansam, omnia tenebris involuit. Quamvis igitur ad confutationem satis esset, quæ non sunt probata negare simpliciter, vel potius ridere; experiar tamen pauca reprobando, ex his quæ magis intricata videntur, omnium retegere vanitatem.

Quadratura circuli secundum
Orontium, quæ est ad præ-
positionem nonam
penultima.

Resumatur iterum circulus $A B C D$, cuius centrum E , dimetientes verò $C A$ & $B D$
ad

ad rectos angulos circa idem centrum E sese inuicem bifariam dissepcentes. Subtendatur itaque latus quadrati in eodem circulo descripti FG , ipsi diametro BD parallelum, quod secet AE semidiametrum in puncto H . Et diuidatur FH proportionaliter in puncto K , cuius segmentum maius sit FK , minus verò KH . Connexa postmodum EK linea recta secetur illi æqualis EL , & connectatur demum recta BL , ipsi autem BL æquales secentur EM & EN , ad angulum rectum sub MEN consistentes. Nam connexa MN linea recta erit latus quadrati, quod dato æquum est circulo. Ita proponit Orontius.



Confutatio.


Pono lineam FH esse 7, quae cum sit diuisa secundum rationem mediam & extremam in puncto K , quod sub FH & HK continetur rectangulum aequale est ei quod fit ex KF quadrato. Pone FK esse 19, erit igitur KH 7 M 19. Multiplica in 7, fit 49 M 79 [10]. Et equatione facta habes 79 10 [49]. Operare per canonem primum, hoc est, quadra $3 \frac{1}{2}$, fit $12 \frac{1}{4}$, adde ad 49, fit $61 \frac{1}{4}$, aufer $3 \frac{1}{2}$, restat latus $61 \frac{1}{4} M 3 \frac{1}{2}$. Est igitur linea FK latus $61 \frac{1}{4} M 3 \frac{1}{2}$. Quod quidem supputatione facta inuenitur esse minus, quam $4 \frac{1}{3}$. Cum sit igitur linea FK minor, quam $4 \frac{1}{3}$, linea HK maior est, quam $2 \frac{2}{3}$, quare & ipsius quadratum maius, quam $7 \frac{1}{9}$. Est autem EH ipsi FH aequalis, cum sit utraque dimidium lateris quadrati circulo inscripti. Quare quod ex EH quadratum est 49, adde quadratum lineae HK quod est plusquam $7 \frac{1}{9}$, fit plusquam $56 \frac{1}{9}$, pro duobus quadratis linearum HK & HE , quibus aequale est quadratum quod ex KE linea, cui posita est aequalis linea EL . Est igitur ipsius EL quadratum maius, quam $56 \frac{1}{9}$. Sed quod ex linea EF , hoc est, EB quadratum duplum est eius quod ex FH . Quare quod ex BE quadratum est

98. Adde quadratum LE , quod est plus quàm $56 \frac{1}{9}$, fit plusquam $154 \frac{1}{9}$ pro quadrato lineæ BL . Quod cùm sit æquale quadratis duarum linearum BE & EL , & ipsi BL , posita sit æqualis EN , erit quod ex EN quadratum maius quàm $154 \frac{1}{9}$, & ipsius EN dupla, scilicet diametros NO , erit latus quadrati plusquam $616 \frac{4}{9}$, quare & quadratum $MNOP$ maius est, quàm $208 \frac{2}{9}$. Quod vult Orontius esse æquale circulo $ABCD$, cuius quod ex ipsius dimetiente BD quadratum est 392 . Vnde fit, vt circulus ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habeat maiorem, quàm $308 \frac{2}{9}$ ad 392 , hoc est maiorem, quàm 1387 ad 1764 , quæ quidem maior est quàm 11 ad 14 , sicut apparet ex formula. Sed sicut in dimensionis cõmentario mōstravi, circulus ad id quod ex dimetiente quadratum rationem habet minorem, quàm 11 ad 14 . Quare & multò magis quàm 1387 ad 1764 . Falsa est igitur Orontij quadratura, & extra limites Archimedis, cùm sit quadratum maius circulo. Quod erat demonstrandum.

19404	19418
11	1387
14	1764

Alia eiusdem quadratura circu-
li quæ est ad Pro, decimam
quartam, ordine sexta.

Poterit & idem quadratum dato circulo
æquale alia ratione colligi, admodum com-
pendiosa, atque facili. Exponatur itaque rursus
præfatus circulus $A B C D$, cuius centrum E , &
diametri sese in eodem centro orthogonaliter di-
videntes $A C$ & $B D$. Et abscindatur ex $A E$
semidiametro pars quarta, per nonam sexti Ele-



ment

mentorū, quæ sit EF . Connectatur deinde re-
cta BF , cui æqualis subtrahatur, coapteturve BG ,
per primam quarti ipsorum Elementorum. Et per
punctum G ipsi diametro BD parallela ducatur
 GH , per 31 primi eorundem Elementorum. Quo-
niam EH recta erit dimidium latus quadrati, quod
ipsi dato circulo est æquale. Sic Orontius proposuit.

Confutatio.


AD figurationem istam addo catheton GK
ad semidiametrum BE & connecto pun-
cta GE . Pone trianguli latus BE esse 7, erit igitur
quarta pars ipsius, cui est æqualis EF , latus
quadrati $3\frac{1}{16}$. Quare & quod ex BF , hoc est,
 BG , cum sit æquale quadratis duarum linearum
 BE & EF , erit quadratum $52\frac{1}{16}$. Partire in
duplum BE , quod est 14, provenit $3\frac{161}{224}$, pro li-
nea BK , cuius quadratum est $13\frac{41601}{50176}$. Cum autem
sit angulus qui sub BKG rectus, quadratum quod
ex BG æquale est quadratis duarum linearum
 BK & KG , quare ex $52\frac{1}{16}$ detractis $13\frac{41601}{50176}$,
restat $38\frac{11711}{50176}$, quod est quadratum ex catheto
 GK , cui cum sit æqualis linea HE , ipsa duplica-
ta, hoc est HL , est latus quadrati $152\frac{11711}{12544}$. Quod
vult Orontius esse æquale circulo $ABCD$, cuius
est diametros 14. Sed demonstravit Archimedes

huiusmodi quadratum esse maius, quàm $153 \frac{64}{71}$.
 Falsa est igitur Orontij quadratura, & extra li-
 mites Archimedis, præcedentique contraria, cum
 sit quadratum minus circulo. Quod erat demon-
 strandum.

Ex his nunc, & ante discussis, quæ non solum
 falsa, sed & contraria videmus apertè, satis sese
 profert ad inuentionem istam quadraturæ homi-
 nis ingenium. Qui nec etiam toties conatus intra
 dimensionem Archimedis cōsistere potuit vsquã.
 Quod & si multis acciderit, quos hucusque repro-
 bavi, omnes tamẽ ludificationis molestæ calumnia,
 vano multiplicique labore superauit. Quare ne
 confusam pertinaciam nimium prosequendo per-
 tinax & ipse videar, inuentorem istum deinceps,
 & cum Archimede, & secum modis suis omni-
 bus, & copijs pugnare relinquo. Et alioquin ad se
 sibi refellendum abundè sufficit Orontius. Cum au-
 tem omnium quæ supra recensui post Ptolomæum,
 problemata extra limites ferantur Archimedis,
 quò facilius pateant, & intuenti, velut ad specu-
 lum, ponantur ob oculos, exempla singulorum per
 lineas, quo sunt in consultationibus ordinata mo-
 do, subiiciam. Estò datus circulus H, pro cuius
 quadratura disponendæ sint lineæ secundùm tra-
 ditiones suprâ relatas. Agatur linea recta DG,
 in qua signetur vtraque dimensionum Archime-
 dis

dis linea, maior quidem DC , minor verò CG . Et centro quidem C , spatijs autem CD , & CG semicirculi describantur ad easdem partes. Sed erunt disparandi paulò magis quàm discrimine vero, ne visum differentia fallat. Erit igitur inter peripherias circuncurrens spatium veri locus ad quadraturam, & ipsæ peripheriæ limites, extra quos non potest consistere verum. Ducatur ex centro C intra semicirculum dimensionis linea CP , secundùm Ptolomæi rationem, quæ cum sit intra limites, terminabitur etiam intra peripherias linea CP . Et similiter aliæ, quotquot libuerit, si rationibus his ponantur, quas in dimensionis commentario docui, intra limites finientur, pro quibus in summa faciat exemplum linea CS . Item ex puncto C ducta, secundùm Arabes, linea CA exhibit semicirculum maiorem, & ex contrario posita Campani dimensio CC intra minorem deficiet. Actis insuper ordine quadraturis prout tradunt Cusanus, Fortius, Albertus, Bouillus, & Orontius, videbuntur ipsæ lineæ vel excessu, vel defectu peccare, quemadmodum vnâ quamque notis suis, cum authoris nomine signavi.

*



Ptolom

Ptolomæi CP intra limites.

Buteonis CS, vna pro multis, intra limites.

Arabum CA, excedit.

Campani CC, deficit.

Cusani 1. CK, deficit.

Cusani 2. CK, deficit.

Cusani 3. CK, excedit.

Cusani 4. CK, deficit.

Cusani 5. CK, excedit.

Alberti CL, deficit.

Fortij CF, excedit.

Bouilli 1. CB, excedit.

Bouilli 2. CB, deficit.

Orontij 1. CO, deficit.

Orontij 2. CO, excedit.

Orontij 3. CO, excedit.

Orontij 4. CO, deficit.

EST autem sciendum inter istas septem lineas excedentes nullam esse æqualem alteri. Nec etiam inter octo deficientes vllas inuicem æquales. Vnde videmus gloriosos istos sua sibi presumptione stolidi magisterium sumentes in Archimedem, ne discipulorum quidem nomine dignos, qui tam negligenter, modisque diuersis, & inter se pugnantis, à prescriptis veri limitibus aberrarunt. Itaque simile quiddam cum Martiali

conc

concludere possum. Dispeream si quisquam istorum Archimedi præstare matellam dignus est. Hæ sunt, in hunc vsque diem vise mihi de quadratura circuli finitiones, quarum disquisitio labore nostro peracta facilem studiosis, in re difficili, notitiam veritatis efficiet.

FINIS.

IO.



I O. B V T E O N I S

A N N O T A T I O N V M

L I B E R I N E R R O R E S

Campani, Zamberti, Orontij,

Peletarij, Io. Penæ inter-

pretum Euclidis.

P R O O E M I V M.



Interpretationem in elemen-
ta Geometrica scriptores ali-
quot nomine suppresso fecisse
dicuntur. Quibus succedens
quæ Campani titulo fertur,
quòd omnium haberetur opti-

ma, tanquã sol ex ortu suo lucẽ syderibus obtẽdere
solet, sic authoritatẽ et vsum alijs eripuit. Tametsi
multa nimis è Græco diuersa, mutila, corrupta, &
etiam aliena, barbaráque contineat. Sed ad excu-
sationem Campani, non aliàs ᾱγεωμετρικου, dici
potest, quòd & Græca nunquam viderit, & ab
Arabibus iam deprauata, sit interpretatus, sicut
vocabula quedam gentis illius relicta manife-
stant.

stant. Veluti sunt *helmuain*, *helmuaripha*, *mutekesia*. Huius tamen errata si cum alijs subsequentium expendantur, plura quidem numero fiēt. sed ineptijs, & absurdo longè pauciora. Zambertus postea Venetus versionem aliam fecit. Qui tametsi lectionem Græcam sequutus videatur ad verbum, non pauca tamen artis imperitia corripit. Hanc nihilominus studiosi vulgò recipiunt, ita tamen vt Campanum non abijciant. Quorum versiones alternatim permistās exemplaria præbent. Post Zambertum Orontius sex libros Elementorum priores ab alijs detruncatos ædedit, propositiones Græco sermone, cuius erat ignarus, Zamberti versionibus interserens. Ad demonstrationes autem, ne non aliquid noui de suo videretur afferre, nil accuratius præter cætera studuit, quàm Euclidi, vel (vt existimabat) Theoni contrarius ire. Vnde methodon illam exactissimam Geometræ totam conturbauit, ita vt in propositionibus nihilo sit melior Zamberto, in demonstrationibus autem longè deterior. Ad cuius exemplum Peletarius Cenomanus, mensibus ab hinc paulo minus decem, sex libros itidem priores, sed maiori licentia contaminauit. Nihil enim ad Græcam veritatem respiciens, imo nec etiam (vt puto, atque res apparet) intelligens, modò Campanum, modò Zambertum vtcunque sequutus, multa etiam quæ sibi

non

non sapiunt, aut quæ non concoquit, amputans ab Euclide, & alia de suis infarciens ex malis interpretationibus aliorum vnam omnium pessimã ipse conflavit. Alij præterea Græcè prorsus ignari nõ Euclidem, sed Campani versionem Italica lingua vtcunque reddiderunt. Quo quid ineptius fieri possit in arte non video. Nisi quòd idem aliqui sermone nostro Gallico parturire dicuntur. Istos autem ne reprehensione quidem dignos existimo. Res igitur in hanc vsque diem (sicuti prouerbio fertur) Mandrabuli more processit. Visum est itaque pauca quedam ex multis istorum errata perstringere. Vt qui disciplinas Latinè sectantur, intelligant ex turbidis adhuc se riuulis haurire.

Quæ in exemplaribus Græcis
demonstrationes habentur
Euclidis esse, non
Theonis.



Etus est opinio recepta communi-
ter, eas quæ Græcè leguntur in Ele-
mentis demonstrationes non esse
Euclidis, sed Theonis Alexandri-
ni. Hunc errorem non aliunde ma-

gis inualuisse puto, quàm ex ipsa græci codicis sententia tituli malè percepta. Qui sic habet, Euclidis Elementorum libri XV, ἐκ τῶν θεῶνος συγγραμμάτων, hoc est, ex omilijs vel expositionibus Theonis, non autem ex demonstrationibus, quæ Græcè dicuntur ἀποδείξεις. Constat enim Theonem, vel suo ipsius testimonio, aliqua commentatum in Euclidem. Nam libro primo ὑπομνημάτων quæ scripsit in Ptolomæum δὲ δεῖξαι (inquit) ἡμῖν ἐν τῇ ἐκδόσει τῶν στοιχείων πρὸς τὸ τέλος ἕκτου βιβλίου. Hoc est, demonstratum est à nobis in expositione Elementorum ad finem sexti libri. Non autem negauerim Theonem aliquid demonstrationum in eo opere fecisse, sicut nec etiam Pappum, cuius commentarium in Elementa citat Eutocius Ascalonita ad theorema 13 de Sphæra et Cylindro. Hoc tamen dico factum separatim, atq; distinctè inter exponendum locis quibusdam. Quemadmodum et fecit Proclus in primum Elementorum. Nam suas & aliorum demonstrationes passim adducens, ab his quas habemus in Græcis libris authoris mentione distinguit. quem vel στοιχείστην, vel γεωμέτην sæpius appellat, interdum etiam nomine proprio. Et ipsius demonstrationum artem diligenter explicat, earum verba citando, idque potissimè in problemate primo. Item in decimo, post recitatam Apollonij Pergæi demonstrationem, subiungit

πολλῶ δὲ ὁμῶ κρείττω ἢ τοῦ στοιχειωτοῦ ἀπό-
 δεῖξις ἀπλούσερα καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. Hoc est,
 multò igitur melior Elementarij demonstratio, sim-
 plicior, & ex principijs. Sed quid attinet aliunde
 testimonia proferre? cùm se satis res ipsa probet.
 Quis enim apud antiquitatem omnem theoremata
 vidit vnquam sine demonstratione proferri? aut
 quid est aliud in omni theoria, in quo dexteritas,
 & ingenium scribentis magis eluceat? estque ve-
 luti lucis organon in corpore cæco. Et qui rem intel-
 ligunt attendentes subtilius inuenient longè plus
 nobilitatis ex tam absolutis demonstrationibus Eu-
 clidem sequi quàm ex propositionibus solis. Neque
 enim omnia quæ proponuntur inuenit, sed (vt ait
 Proclus) Elementa colligens multa quidem ab Eu-
 doxo disponens, multa & ex Theeteto perficiens,
 insuper autem & quæ à prioribus fuerant osten-
 sa pinguius, atque negligentius ad demonstratio-
 nes ἀνελέγκτους ipse redegit. Huiusmodi autem
 Theonis συνουσίας iniuria temporis, sicut & alia
 multa, nobis ademit, saluo tamen titulo, alicuius
 (vt puto) fraude librarij, vt existimarent Geome-
 tricæ traditionis ignari ex propositionibus solis Eu-
 clidem totum, & ex demonstrationibus interpre-
 tamenta Theonis. Quod & si verum esset demon-
 strationes scilicet à Theone factas, nihilo magis ta-
 men ita deprauare liceret. Hæc non abs re præ-

mittenda putavi, vt intelligant temeratores isti se-
iam & artem, & Euclidem corrumpere simul.

Ex definitionibus & prin- cipiis libri primi Ele- mentorum.

Z Ambertus superficiei definitionem ita
vertit. Superficies est, quæ longitudinem,
latitudinemque tantum habet. But. Loco quæ, di-
cendum fuit quod, vt subaudiatur id. Quoniam
Græcè ponitur ò cum accentu graui, Latine va-
lens relatiuum quod, vnde finitio magis impletur,
nec propter generis diuersitatem referri ad epi-
phaniam potest. Zamb. Angulus planus est dua-
rum linearum in plano sese tangentium, & non in-
directo iacentium ad alterutram inclinatio. But.
Malè, & contra rei naturam dicitur, ad alteru-
tram, cuius dictionis sensus est, ad vnã, vel alte-
ram. Est enim ipsa linearum inclinatio communis,
vtriusque scilicet ad alteram, & Græcè legitur
πρὸς ἀλλήλας, hoc est inuicem, vel si Latine dice-
retur ad inuicem. An etiam rectè dicatur, & in
directo iacentium? viderit interpres. Quare sine
propositione mallet. Et nõ directo iacentium, vel
potius ad verbum ἐπευθείας, hoc est, in lineam re-
ctam.

Etiam. Quod rei sensum magis exprimit. Nec ferè quicquam citra vitium mutatur in istis. In quæ tamen nihil est quod non Peletarius audeat. Adeo sibi placens, vt statim in Theonem, reuera tamen in Euclidem apertè prorumpat, in operis fröte, vbi ad ostentationem multa summam, quò magis appareant, veluti sequentiurũ capita præmisit. Quorum nonnulla subieci, vt hominis propositum magis intelligatur. Nouas (inquit) demonstrationes passim ad Euclidem adiecimus. Demonstrationes nonnullas Theonis, & Campani, quum non satis probabiliter, aut non satis appositè confirmarent emendauimus. Ceteras concinniores, clariorèsq; reddidimus. Improbias demonstrationes à Geometria exclusimus, illas scilicet quæ figurarum, quas vocant, superpositionibus nitebantur. Principia Geometriæ nouis meditationibus illustrauimus. Euclidis verba non religiosè, sed sententiam fideliter sequuti sumus, et Latine, quo ad eius fieri potuit, expressimus. Hæc sunt Peletarij promissa titulis magnificis. Quæ quàm vana sint, factisq; contraria, ex sequentibus satis apparebit. Quòd autem de Latinitate se iactat, videat imprimis quomodo solæcismum excuset in his suis verbis. Quæ figurarum, quas vocant, superpositionibus nitebantur. Sed quod est temeritatis, & inscitie plenum, nõ pauca ex principijs, finitionibus, atque

propositionibus ab interpretibus alijs non omiffa, ipse tanquam superflua, vel falsa rejecare non dubitavit, sicut in proposito sustulit illud, & non in rectam lineam iacentium, sine quo non habet definitio verum. Possunt enim duæ lineæ rectæ in plano iacentes sese contingere, nec tamen angulum efficiunt. Vt ipse si iaceant in directum. Propterea necesse fuit omnino talem positionem excipi. Quod & facit Campanus, licet alijs verbis. Angulus planus est (inquit) duarum linearum alternus contactus quarum expansio est super superficiem, applicatioque non directa. Sed in hoc est error, quod nimis generaliter superficiem pro plano posuit. Aliam anguli plani finitionem Peletarius affert, hoc modo. Angulus planus est duarum linearum in plano sectio. Cessante enim (inquit) sectione cessat angulus. Hoc autem non esse verum sic ostendo. Esto, si fieri possit angulus duarum linearum sectio. Manifestum est autem per corollarium decimæ quintæ primi, ex tali sectione quatuor angulos fieri, quatuor rectis æquales. Quomocunque igitur linea recta super lineam rectam constituta angulos fecerit, quatuor efficiet, totidem rectis æquales. Non facit autem, sed duos tantum, duobus rectis æquales, veluti proponit decima tertia primi. Non est igitur angulus duarum linearum sectio. Quod erat demonstrandum. Falsa est itaq;

Pelet

Peletarij finitio. Ex qua etiam sequeretur vnicum
 angulum planum nunquam posse constitui. Quod
 est plusquam absurdum. Zamb. Obtusus angulus
 maior est recto. Acutus verò, minor est recto.
 But. Hoc ita positum enunciatio potius est, quæ
 Græcè dicitur ἄξιωμα, quàm definitio. Ad ver-
 bum è Græco sic erit. Obtusus angulus est, qui
 maior recto. Acutus verò, qui minor recto. Zāb.
 Terminus est, quod cuiusque finis est. But. Hic fit
 interpretatio falsa in dictione, cuiusque, quæ est
 Græcè τινός, id est, alicuius. Istum & proximum
 errorem sequitur etiam Peletarius. Zamb. Circu-
 lus est figura plana vna linea contenta, quæ cir-
 cunferentia appellatur, ad quam ab vno signo in-
 trorsum medio existente, omnes prodeuntes lineæ,
 in ipsiusque circuli circumferentiam incidentes ad-
 inuicem sunt æquales. But. In hac definitione cir-
 culi adijcitur importunè illud, medio. Quod in exē-
 plaribus Germanicis rectè sustulit Heruagius,
 & alia quædam in sequentibus nō malè correxit,
 quorum mentionem suis locis habebo. Superfluit
 etiam hoc, in ipsiusque circuli circumferentiam in-
 cidentes lineæ, & inscienter admodum post lineæ
 prætermittitur, rectæ. Quoniam non omnes lineæ,
 generaliter, sed rectæ solùm ex centro in periphe-
 riam sunt inuicem æquales. Hoc vltimum inuicem
 Peletarius abstulit, non leui dispendio sensus. Est

enim imperfectum hîc, atque confusum dicere lineas æquales, si non adieceris inuicem, vel inter se. Ego autem sic ad literam verterem. Circulus est figura plana sub vna linea comprehensa, quæ peripheria vocatur, ad quam ab vno puncto, eorum quæ sunt intra figuram, omnes procidentes lineæ rectæ inuicem sunt æquales. Caue credas in Elementis quicquam, citra vitiũ, vel adijci, vel detrahi posse. Quod parum attendens noster interpret, in alterutram partem sæpius impingit, & morbo pallet utrobique. Zamb. Centrum verò ipsius circuli punctum appellatur. But. Hîc articulus ð non expressus sensum facit ambiguum. Quare certior fiet interpretatio sic. Centrum autem circuli, punctum illud vocatur. Quod etiam Peletarius aduertit. Zamb. Semicirculus est figura, quæ sub diametente, & ea quæ ex ipsa circuli circumferentia sublata est, continetur. But. Dictio, sublata, contradictionem implicat quodammodo. Nam lineæ quæ cum diametro semicirculum continet ex peripheria non est sublata, sed relicta potius, idque potissimum cum ducta diametro circulus bipartitò secatur. Et ad hoc Græcè est participium ἀπολαμβανομένης, quod comprehensam, vel interceptam indicat. Heruagius autem emendauit hoc modo. Et ea quæ per ipsam circuli circumferentiã sublata est. Sed hoc errorem mutat in peius. Sic igitur

tur ego vererē. Semicirculus autem est figura contenta, & sub diametro, & sub ea quæ intercipitur ex ipsa circuli peripheria. Hoc insuper apud Proclum inueni. Centrum autem semicirculi, idem quod & circuli est. Zamb. Sectio circuli est figura, quæ sub recta linea, & circuli circumferentia, aut maiore, aut minore, semicirculo, continetur. But. Si circulum intelligas secari semel, fiunt duæ partes & vna sectio, quæ quidem nihil aliud est, quàm ipsa linea circulum secans. Vtraque autem partium segmentum, siue portio dicitur, Græcè τμήμα. Sed non videntes hoc interpretes, sectionem loco segmenti transtulerunt, errore non leuiori, quàm si linea pro superficie poneretur. Et de suo insuper adiecerunt hoc. Aut maiore, aut minore semicirculo. Cùm sit semicirculus superficies, & circumferentia sit linea, quod inconcinnius, & absurdius in arte fieri potuit, quàm lineam superficiei, hoc est, magnitudines diuersi generis inter se comparare? Hoc tamen non sic imperitè protulit Campanus. Portio (inquit) circuli est figura plana recta linea, & parte circumferentiæ contenta, semicirculo quidem, aut maior, aut minor. Sciendum est præterea, hanc segmenti finitionem apud Proclum non haberi. Quæ cùm sit etiam inter principia libri tertij, & in precedentibus nusquam fiat mensio segmenti, videtur hïc esse superflua,

& à quopiam inscienter adiecta. Zamb. Trilaterarum porrò figurarum æquilaterum est triangulum, quod sub tribus æqualibus lateribus continetur. But. Mallem æquilatera dicere. Orontius autem mutavit in hunc modum. *Æquilaterum est triangulum quod tria continet æqualia latera. Sed hæc est emendatio præpostera, Quandoquidẽ ipsa figura latera non continent, sed sub lateribus continentur.* Zamb. *Altera parte longius est quod rectangulum quidem, & æquilaterum non est.* But. *Ego autem vitium cauens in grammaticam dicerem. Altera parte longior est, quæ rectangula quidem, non autem æquilatera. Quia subauditur figura, cum ante dicatur. Quadrilaterarum autem figurarum.* Zamb. *Et si æqualibus æqualia adijciantur, omnia erunt æqualia. Et si inæqualibus æqualia adiungantur omnia inæqualia erunt.* But. *In utroque loco ubi est omnia, reponendum est tota. Græcè est τὰ ὅλα. Erit etiam in secunda sententiâ falsum si dixeris omnia. Quandoquidẽ ipsa æqualia quæ adduntur, inæqualia esse nõ possunt. Hoc cum sit evidentissimũ, Hervagius ita ut dico restituit. Sequiturque Peletarius. Orontius autem emendatum errorem ab alio, ipse post annos septem in editione secunda refricavit.*

Ad propositiones libri primi.

Pro

Problema primum Zambertus rectè vertit, hoc modo. Super data linea recta terminata triangulum æquilaterum constituere. Peletarius autem dictionem terminata, tanquam ex superfluo positum, sustulit. Quæ est in Græco περιεσπασµένῃς, non intelligens ad exactam rationem problematis necesse dari lineam rectam terminatam, sicut doctissimè Proclus ostendit. Vel fortassis quòd Græcè nesciat Campani versionem sequendam putavit. Quod est aliud ex alio malum. Pro. 2. Zamb. Ad datum signum datæ rectæ lineæ, æquam rectam lineam ponere. But. Quamvis æquus adiectivum pro æquali ponatur interdum, velut apud Comicum in Eunuchò. Utinam esset mihi pars æqua amoris tecum. Nullibi tamen in comparatione dativo iunctum in eo sensu me legisse recordor, sed pro iusto, cui opponitur iniquus. Quod Ovidianus ille versus satis ostendit. *Æqua Venus Teucris, Pallas iniqua fuit.* Sed noster interpres varietatis affectator, non solum æquo pro æquali, quod Græcè est ἴσος, sæpius abutitur, sed alijs etiam multis, & artem, & latinitatem passim confundit. Nusquam enim minus, quàm hîc habet variatio locum. Videmus enim Geometrem ipsum rem eandem, eodem semper dicere verbo. Hunc abusum Peletarius alio commutavit, vertendo ducere quod Græcè est ἕδω, hoc est,

est, ponere. Sed hoc magis est in artem, quàm in verba peccare. Habet enim sensus problematis, ut in dato puncto linea ponatur, id est, terminus alter ipsius lineæ, non autem ut alibi terminata ducatur ad punctum datum. Et talem ductum figuratio demonstratioque tota respuit, quare mirum est tam apertam repugnantiam Peletarium non vidisse. Campanus tamen eodem hic usus est verbo non imperitè dicens. A dato puncto cuilibet lineæ rectæ propositæ equam rectam lineam ducere, non autem ad datum punctum. Pro. 4. Zamb. Si duo triangula duo latera duobus lateribus equalia habuerint, alterum alteri, & angulum angulo equallem, sub equalibus rectis lineis contentum, & basim basi equallem habebunt, & triangulum triangulo equum erit, & reliqui anguli reliquis angulis equales erunt alter alteri, sub quibus equalia latera subtenduntur. But. Vbi ponitur alterum alteri, & item alter alteri, ego secundum lectionem Græcam, saluòque rei sensu dicerem, utrumque utrique, & vterque utrique. Sed hoc leue est, præ his quæ peccat, atque corrumpit Peletarius in proposito. Si duo (inquit) triangula duo latera duobus lateribus equalia habuerint, alterum alteri, et angulos binis equis lateribus contentos equales, basis quoque basi equalis erit, ac reliqui anguli equis lateribus contenti mutuò equales, totum denique

nique triangulum toti triangulo æquale. But. Primum quod dicitur, angulos binis æquis lateribus contentos æquales, nec additur inuicem, vel angulum angulo, incerta est collatio, imo nulla. Deinde quod sequitur, ac reliqui anguli æquis lateribus contenti mutuo æquales, & indeterminatam ac dubiosam comparationem angulorum facit, quia, nimis quidem inscienter, sublatum est illud, quibus æqualia latera subtenduntur. Postremò abundat illud totum toti, quod iterum in conclusione demonstrationis ineptius expressit dicens, duo triangula omni ex parte inter se sunt æqualia. Neque enim potest inter æquales inuicem figuras quaslibet, æqualitas ex parte constare. Et cum triangulum dicitis, non nisi totum intelligitur. Post demonstrationem suam Peletarius subdit. Hæc est (inquit) vulgata omnium interpretum demonstratio, si modò hæc demonstratio dici debeat. Longo deinde sermone demonstrandi modum impugnare conatur, nulla ratione magis, quàm quòd illa communi sententia constet. Quæ sibi congruunt inuicem sunt æqualia. At (teste Proclo) demonstratio nulla melior, quàm quæ simpliciter, & ex principijs ordinatur. Post impugnationem subditur. Vt Euclidem (inquit) à reprehensione vendicemus, huic obiectioni sic occurri poterit, vt dicamus, hoc theorema per se clarum esse, neq; probatione egere, sed definitio-

nis

nis cuiusdam loco habendum. Hoc etiam repetit in octava propositione sequenti, dicens se rationem istam demonstrandi abundè refutasse. Quid hac obiectione, & responso dici possit imperitius, & quod iudicium magis corruptum in istis ostendat, nihil video, præter aliud quiddam post multa positum ab eodem in hoc loco. Nulla (inquit) evidentiore specie æqualitas figurarum dignoscitur, quàm ex laterum æqualitate. Et alibi rursus. Quis enim negaverit (inquit) duas superficies esse æquales quarum latera, & quantitate & numero sunt æqualia. Ego (inquam) nego istud esse verum in omni superficie. Dabuntur enim mille figure æquilateræ quidem inter se, non autem æquales veluti sunt rhombi, rhomboides, trapezia, ac figurarum genus omne. Quod aliàs abundè docui in explanatione ad locum Quintiliani Geometricum. En qualis iste confutator Euclidis, qui etiam quæ sunt aperte falsa proponit. Pro. 6. Zamb. Super eadem recta linea duabus eisdem rectis lineis aliæ duæ rectæ lineæ æquales altera alteri non constituentur, ad aliud atque aliud punctum, ad easdem partes, eosdem fines primis rectis lineis possidentes. But. Hanc propositionem Peletarius invertit, hoc modo. Si à duobus punctis lineam terminantibus duæ lineæ exeuntes concurrerint, ab eisdem punctis ad eandem partem duæ aliæ non educuntur, his duabus

bus, & utraque suæ conterminæ æquales. Vix dici potest quàm imperitè prætermittatur ad aliud, atque aliud punctum, vbi datur linearum concursus, sine quo falsum proponis apertè, cum possint citra concursum infinite lineæ rectæ secundum reliquam perscripti formam ad easdem partes educi. Pro. 8. Pele. Si duo triangula duo latera duobus lateribus mutuò æqualia habuerint &c. But. Aduerbiū mutuò, nec verè, nec satis explicat quod est ἐκατέρωθεν ἐκατέρωθεν, hoc est, utriusque utriusque. Possunt enim duo latera vnius trigoni duobus lateribus alterius esse mutuò, vel inuicè æqualia, nec tamen utrunque utriusque, quod exigit omnino veritas propositi. Hac insuper dictione mutuò abusus est supra Pro. 4 & infra 24. 25. 26. Pro. 9. Pele. Datum angulum bifariam diuidere. But. Hic adiectionem rectilinei, tanquam superfluum ab Euclide sustulit interpretes. Quod est scopon problematis, alioquin apertum, non intelligere, qui διχοτομίας non omnis anguli, sed rectilinei solum habet. Sed neque minus inscienter, in problemate sequenti, quod ad lineam adiectiuum erat, terminatam, resecavit. Pro. 11. Zamb. Data recta linea, à puncto in ea dato rectam lineam ad angulos rectos excitare. But. Rectum erat hoc tertio casu proferre sic. Data lineæ rectæ, prout habet Græca lectio τῆς ὀρθῆς ἐυθείας. Quæ diligenter est inse-

quenda,

sequenda, nusquam enim proprietatis artificio caret. Sed quid his facias, qui Græcè non norunt. Pro. 13. Zamb. Cum recta linea super rectam consistens lineam angulos fecerit, aut duos rectos, aut duobus rectis æquales efficiet. But. Principium theorematis est ὡς ἄν, id est, quomodocunque, & est sensus, quomodocunque recta linea super rectam lineam constituta angulos fecerit, & reliqua. Malè igitur prætermittitur hic à Zamberto vniuersalis dictio, quomodocunque. Sed longè magis à vero sensum detorquet Peletarius, ita proponens. Cum recta linea super rectam steterit, duos angulos, aut rectos, aut duobus rectis æquales efficiet. Quod non est verum semper. Nam si linea recta super alterutro terminorū alterius constituerit, non angulos, sed angulum faciet. Videmus itaque quam parua detractio propositum corrumpat. Pro. 14. Pele. Si ad aliquod rectæ lineæ punctum duæ rectæ lineæ coierint duosque angulos cum ipsa aut rectos, aut duobus rectis æquales fecerint, ambæ in continuum erunt, & linea vna. But. Quod Græcè est μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κείμηναι, hoc est, nō ad easdem partes positæ, Campanus licet alijs verbis, saluo tamen sensu sic expressit. Si lineæ in diuersas partes exierint. Nouus autem demonstrator hoc sustulit, nō tam imperitia Græci sermonis, cum apud interpretes legeretur, quàm quod vacare putaret,

taret, cum sit alioquin ad exactam propositi veritatem necessarium. Nihil enim prohibet duas lineas rectas ab alterius recte lineae puncto ad easdem partes positas duos utrinque angulos duobus rectis aequales facere, nec tamen esse in lineam rectam. Pro. 16. Zamb. Omnis trianguli vno latere producto, exterior angulus utrisque interioribus, & ex opposito maior est. But. Dictiones utrisque interioribus pluraliter posita theoremati falsitatem inducunt, ex quibus fit sententia, ut angulus exterior utrisque simul interioribus sit maior. Quod minimè verum est, sed utroque interiore, id est vno, & altero separatim maior est. Hoc autem Peletarius emendare se putans, pro utroque reposuit utrolibet, cuius dictionis sensus est. altero duorum quem tibi capere libet. Quo nihil incertius, & inscitius dici potuit. Idem etiam studio novandi, in quatuor theorematibus quae sequuntur, ubi scriptum est Graecè $\omega\alpha\upsilon\tau\omicron\varsigma\ \tau\epsilon\tau\alpha\gamma\omega\upsilon\upsilon\upsilon$, hoc est, omnis trigoni, loco omnis abutitur cuiuslibet. Ex his palam est in Euclidis interprete, & artis peritiam maximè & cognitionem in utraque lingua, supra mediocritatem etiam requiri. Pro. 22. Zamb. Ex tribus lineis quae sunt tribus datis rectis lineis aequales triangulum construere. Oportet autem duo latera reliquo esse maiora, quomocunque assumpta. Quoniam trianguli bina la-

tera quomodocunque assumpta reliquo sunt maio-
 ra. *But.* Si rectè sensum & verba sequamur è
 Græco, dicendum erit. Oportet autem duas reli-
 qua esse maiores, quomodocunque assumptas. Nam
 quod omnis trigoni duo latera reliquo sint maiora,
 iam ante propositum erat. Fieret igitur imperitè,
 ne dicam absurdè, quæ sunt demonstrata, prius, in
 conditionem dare posterius, & idem probare per
 idem. Hunc autem errorem, & quem proximè no-
 tavi, cum sint in aperto, et in exemplaribus Germa-
 nicis emendati, non tamen aduertit Orontius. Sciẽ-
 dum est præterea vltimum illud in propositione.
 scilicet. Quoniam trianguli duo latera & c. quã-
 uis habeatur Græcè, ab aliquo tamen parum scien-
 ter adiectum. Nam & apud Proclum non legi-
 tur, & demonstrationi magis conuenit. In proposi-
 tione decima nona bis Græcè ponitur ἐπι τὰ αὐτὰ
 μέγη, hoc est, sicut vtrobique rectè vertit Zamber-
 tus, ad easdem partes. Peletarius autem primum
 posuit, ex eadem parte, secundum, ex alterutra par-
 te. Et in pro. 33. ex aduerso. Quod tantum distat
 à veritate, quantum idem ab alterutro. Idem etiã
 theorema 32. inuertit hoc modo. Angulus exte-
 rior trianguli duobus interioribus sibi oppositis est
 equalis. Et cuiuslibet trianguli tres anguli duobus
 rectis sunt æquales. *But.* Ad verbum autè è Græ-
 co sic habet. Omnis trigoni vno laterum producto,
 exte

exterior angulus, duobus qui sunt interiores, & ex opposito æqualis est, & qui sunt intra trigonū anguli tres duobus rectis sunt æquales. Abusio nō parua est dicere, angulus exterior trianguli, nisi cum Euclide præmiseris illud. Omnis trigoni vno laterum producto, cum nullus sit angulus exterior in trigonis, si non producatur aliquod laterum extra figuram. Faciunt igitur temeratores isti non intelligendo, vt requisita maximè tanquam superflua demant. Zamb. Pro. 34. Parallelogrammorum locorum latera quæ ex opposito, & anguli æqualia sunt adinuicem. Et dimetiens ea bifariā secat. But. Dubium fit in relatiuo ea, num referatur ad latera, quod res non patitur. Quare vt amphibolon tollatur ita verterem. In parallelogrammis areis, & latera, & anguli ex opposito æqualia inuicē sunt. Et ipsas areas diametros per æqualia secat. Pele. Pro. 35. Quæ super eandem basim parallelogramma, & inter easdem parallelas consistūt, inter se sunt æqualia. But. Quod in hoc theoremate, & sex continuè sequentibus Græcè est ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, hoc est in eisdem parallelis, perperam, magnòque veri dispendio vertitur, inter easdem parallelas. Multum enim distat figuræ esse in parallelis, & inter parallelas. Sunt enim prout figuratio docet, parallelogramma in eisdem parallelis, quando opposita ipsorum latera super

eisdem iacent, siue congruunt parallelis. Trigona autem, quando bases, & vertices ipsorum super eisdem consistunt parallelis. Sed inter parallelos possunt esse figurae, & in eadem basi, etiam si lateribus suis ex opposito, seu verticibus ad alteram ex parallelis non pertingant. Et sic parua mutatio inscienter facta septem theorematum veritatem corrumpit. Pele. Pro. 42. Dato triangulo æquale parallelogrammum constituere, habens angulum angulo dato æqualem. But. Quia angulo dato non additur, sicut Græcè est, rectilineo, locum non habet vniuersè problema. Vtpote si detur angulus nõ rectis lineis contentus. Idem est etiam detractionis vitium in problemate sequenti 43, vbi dicitur supplementa sunt æqualia, non adiecto inuicem.

Ex libro secundo.

Prop. I. Zamb. Si fuerint binæ lineæ, seceturque ipsarum altera in quotcunque segmenta, rectangulum comprehensum sub duabus rectis lineis æquum est eis quæ ab insecta, & quolibet segmento rectangulis comprehenduntur. But. Dicitio quolibet, & propositi sensum, & veritatem perturbat omnino, cuius est significatio, ab vno segmentorum quod tibi capere libet. Est autem intelligendum, sub vno quoque segmentorum coniun-
ctim

Etiam, id est, sub omnibus simul, prout habetur Græcè ὑπὸ ἐκάστων τῶν τμημάτων. De significato quilibet si quis mihi dicenti non credat, ex multis antiquorum exemplis luculentum unum proferre sufficiet, quod est in Institutionibus, sub titulo de heredibus instituendis, in hæc verba. Si plures conditiones in institutionibus scriptæ sint, si quidem coniunctim, ut puta, si illud & illud factum fuerit, omnibus parendum. Si separatim, veluti, si illud, aut illud factum erit, cuilibet conditioni obtēperare satis est. Pro. 2. Zamb. Si linea recta secetur utcumque, quæ sub tota, & quolibet segmentorum rectangula comprehenduntur, &c. But. Hic iterum, non minus imperitè quàm antea, dicitur quolibet, pro eo quod Græcè legitur ἐκάτερον, hoc est utroque. Abutitur etiam Peletarius dictione quolibet, in utroque loco. Pro. 5. Zamb. Si linea recta secetur in equalia, & nō equalia, rectangulū cōprehensum ab inæqualibus sectionibus totius, unā cum quadrato quod à medio sectionū, æquum est ei quod à dimidia fit quadrato. But. Cū linea per equalia, et per inæqualia secatur, sunt in ipsa due sectiones, & tria segmenta, quæ τμήματα dicuntur, & sunt tres ipsius lineæ partes, quarum quæ media est dicitur esse μεταξύ τῶν τομῶν, hoc est, inter sectiones, quæ nihil aliud sunt, quàm duo puncta. Interpres autem non advertens eam quæ est

inter sectionem, & segmentum differentiam, sectionibus usurpat pro segmentis, hoc est puncta pro lineis. Quod est plusquam absurdum. Cui simile est quod statim sequitur. Vnà cum quadrato quod à media sectionum. Medium istud sectionum, id est, punctorum nihil est. Quia punctum neque medium, neque fines habet, nec etiam partem. Errorē primum Heruagius emendauit, loco sectionibus reponens segmentis. Alterum autem sic. Vnà cum quadrato eius quæ media est sectionum, sed in eodem heret adhuc ipse luto cum interprete. Quoniã ipsa linea duarum media est linearum, quæ sunt segmenta, & non sectionum, quæ (sicut dixi) puncta sunt, & ipsius lineæ termini. Nec etiam tolerabiliter dixeris, mediam sectionum lineam, pro eo quod est inter sectiones, non magis quàm mediã urbem montium, quæ sit inter montes. Peletarius autem non abutitur sectionibus, & pro media sectionum reponit, quod à medio segmentorum. Ego autem theorema totum sic interpretor. Si linea re-
cta per equalia, & per inequalia secetur, quod sub inequalibus segmentis totius rectangulum continetur, vnà cum quadrato, quod ex ea quæ est inter sectiones equale est ei, quod ex dimidia quadrato. Pro. 7. Pelet. Si recta linea secetur in duas quantascunque partes &c. But. Vix dici potest, quàm sit barbarum, atque præposterum in hoc lo-

co dicere, quanta scunq̄ue partes, pro qualescūque, vel vtcunq̄ue, quod in Græco est, ὡς εἴπῃ, & hunc sensum locus exigit omnino. Turpe est autem scriptori in re tam aperta cæcutire. Pro. 9. Zamb. Si linea recta secetur in equalia, & non equalia, quæ ab inequalibus totius segmentis fiunt quadrata dupla sunt eius quod à dimidia, & eius quod à medio sectionum fit quadratorum. But. Quod dicitur, & eius quod à medio sectionum fit, Hervagius ad modum præcedentis emendavit, scilicet, & eius quod ab ea quæ media est sectioni. Quod quæ sit, iam dictum est. Et quod multitudinis numero ponitur, quadratorum, vix erit Latinitas ferenda. Malem igitur ita vertere. Si linea recta per equalia, & per inequalia secetur, quæ ex inequalibus segmentis quadrata, dupla sunt, et eius quod ex dimidia, & eius quod ex ea quæ inter sectiones est, quadrati. Peletarius autem inuertit hoc modo. Si recta linea in duo equalia, duoque inequalia dividatur, quæ ab inequalibus totius segmentis fiunt quadrata, dupla sunt eius quod à dimidia, cum eo quod à medio segmentorum fit quadrato. But. Cùm linea per equalia, & per inequalia secari dicitur, statim intelligimus duas in linea fieri sectiones, & tria segmenta. Sed cùm audis lineam secari in duo equalia, & in duo inequalia, vix est vt aliter accipias, quàm ex ipsa linea fieri qua-

tuor segmenta. Item ubi dicitur, cum eo quod à medio segmentorum fit quadrato, sententiam propositi non minus conturbat, quàm si quis volens intelligi numerum decem & octo sicut est, esse duplum & numeri quatuor & numeri quinque, ita proponat, numerus decem & octo duplus est numeri quatuor cum numero quinque. Quod non est verum. Nam duplum numeri quatuor, cum numero quinque facit tredecim. Pro. 10. Zamb. Si linea recta secetur bifariam apponatur autem ei quæpiam recta linea in directum, quod ex tota cum apposita, & quod ex apposita, utraque quadrata dupla sunt eius quod ex dimidia, & eius quod ex composita ex dimidia & adiuncta, tanquam ex una descriptorum quadratorum. But. Mirari satis non possum quid interpreti tam ineptè venerit in mentem, quadratorum, sicut antea, numero vertere plurali, quem viderit utrobique singularem, τὸ ὕπερ ἢ τὸ τετραγώνου. Sed nihil insolitum rem non intelligenti, malè etiam procedere verba. Erit autem sic interpretatio vera. Si linea recta bipartitò secetur æqualiter, adijciatur autem aliqua ipsi linea recta in lineam rectam, id quod ex tota cum adiacente, & id quod ex adiacente, utraque simul quadrata dupla sunt, & eius quod ex dimidia, & eius quod ex ea quæ constat ex dimidia & adiacente, tanquam ex una perscripti quadrat

drati. Peletarius autem sic. Si recta linea secetur in duo equalia, apponatur autem ei alia in continuum, quod ex tota iam composita, quodque ex apposita ambo fiunt quadrata, dupla sunt amborum, eius scilicet quod ex dimidia, eiusque quod ex dimidia tum apposita quadratorum.

Ex libro tertio.

Z Amb. Sectio circuli, est figura comprehensa &c. But. τμήμα κύκλου, id est, segmentum circuli, & hic, & in precedentibus, sicut admonui, & in sequentibus perperam interpretatur sectio. Peletarius autem in sequentibus modò sectione, modò segmento indifferenter abutitur. Zamb. In sectione autem angulus est, cum in circumferentia sectionis contingit aliquod punctum &c. But. Vix dici possit quàm imperitè, & hic, & aliàs sit abusus interpres verbo contingit. Nam (vt ait Donatus) quod vix euenit contingere dicitur. Qui sensus valde quidem à propositi veritate recedit. In Græco est λεφθῆ, id est, sumitur, sicut restituit Heruagius. Zamb. Cum verò comprehendentes angulum rectæ lineæ aliquam susceperint circumferentiam in illa angulus esse dicitur. But. Dubium facit interpres Græca ne minus, an Geometrica perceperit. Qui verbum Βεβυκέναι transtulit, esse. Quod quãuis variè

capiatur, nil tamen hîc aliud intelligi res ipsa patitur, quàm ascendere, siue consistere. Neque enim est angulus in peripheria, quam lineæ ipsum continententes intercipiunt, sed in opposita consistit, & ideo super alteram, quæ est veluti basis linearum, dicitur ascendisse. Hoc etiam veteranum professorem decepit Orontiū turpiter, qui & figuratio- ne, & expositione, quantum in se fuit, diligenter, approbat errorem. Erit igitur interpretandum hoc modo. Quando autem comprehendentes angulum rectæ lineæ aliquam interceperint peripheriam, super illam dicitur angulus ascendisse. Peletarius autem tantum sibi iuris arrogat in Euclidem, ut non solum addat, aut minuat aliquid ad sensum, sed etiam ut totas finitiones, sicut & hanc, cum libuerit, expungat. Pro. 6. Zamb. Si duo circuli se adinuicem tetigerint eorum non est idem centrum. But. Dictio ἐντός, hoc est, interius, non rectè præmittitur. Sic enim habet propositum. Si duo circuli sese contingant interius, nõ erit ipsorum idem centrum. Orontius in æditione secunda, ab aliquo forsân admonitus, (nihil enim Græcè sciebat) reposuit aduerbium intus. Quod tanquam in propositione non esset, demonstrationem suam orditur hoc modo. De circulis (inquit) potissimum intelligit Euclides quorum vnus intra alterum collocatur. Sic igitur, & expositionem emendatio, & emend

emendationem expositio ridicula perdit. In propositione septima ubi dicitur: *Aliarum autem linearum semper quæ propius ei quæ per centrū, remotione maior est.* In his verbis comparatur lineæ propior lineæ remotiori singulatim, & ordine. Peletarius autem mutatione numeri sensum corrumpit, hoc modo. Sed quæ centro (inquit) propiores sunt cæteris longiores. Ex hoc itaque omnes simul lineæ conferuntur cæteris. Quod est confusum, & incertum. Præterea quod est ad finem, scilicet, ad utrasque partes minimæ, putans ex superfluo positum, amputavit. Et item ex theoremate sequenti, ubi non pauca disturbat. Quæ cum sint modò dictis ferè similia, transeo. Pro. 10. Zamb. *Circulus circulum in pluribus duobus punctis nõ secat.* But. Ego autem, quod erat lucidius, dicerem. *Circulus non secat circulum in pluribus punctis, quàm duobus.* In propositionibus undecima, & sequenti,figurationes descriptioni Geometræ ex vero non respondent. Quas Orontius in editione secunda, admonitu meo restituit, pollicitus mihi sese scriptis suis proditurum vnde profecisset. Quem cum postea de promissi fide compellarem, dicebat restitutionem huiusmodi non admodum sibi placere, ideòque figuras veteres adhuc ante meas reliquisse, ac ea me sic impostura delusit. In his Hervagius, ubi est ad centra eorum, pro applicata recta linea mu-

tauit coniungens, sed parum rectè. Neque enim per lineam puncta iunguntur, sed cōnectuntur potius. Pro. 14. Zamb. In circulo rectæ lineæ sunt æquales, quæ æqualiter distant à centro. Et quæ æqualiter distant à cētro æquales adinuicem sunt. But. Hoc theorema duas habet partes inter se cōuersas. Nam quod est in vna conclusio, in altera fit hypothesis, & conclusio secundæ hypothesis fuit in prima. Zambertus autem oscitans adiectione verbi, sunt, in parte priori ex hypothesi conclusionem facit. Ex quo duo propositi membra conuersa turbantur in idem bis repetitum. Ad literam de Græco verti poterat in hunc modum. *Æquales in circulo lineæ rectæ æqualiter distant à centro. Et quæ æqualiter distant à centro, æquales inuicem sunt.* Pro. 15. Zamb. In circulo maximus est quidem dimetiens. Aliarum autem semper propinquior centro, remotiore maior. But. Cūm dimetiens nil referat aliud quàm lineam, non video quid ita genere masculino citra solœcismum dici possit. Non igitur abre correxit Heruagius maxima est dimetiens. Mihi autem magis placet diame-tros, sua sibi voce relicta, quæ ius latinitatis iam authoritate Vitruuij, Columelle, & aliorum vsurpauit. Peletarius insuper in dimetiente quidem genus emendat, sed vltimam propositi partem fœde corrumpit, hoc modo. Aliarum verò vnaquæque quanto

quanto prior centro, tanto maior. Hic nulla fit comparatio linearum inter se, sed hoc tantum verba sonant, ut linea quantum propinquitate ad centrum accedit, tantum longitudine crescat. Quod tam procul à vero est, ut nec author quidem intelligat ita se dicere, sicut ex ipsius demonstratione constat aperte. Non leue est igitur in istis vitium, quæ sentias nescire loqui, alio præsertim monstrante. Pro. 16. Zam. Quæ à diametri circuli extremitate ad angulos rectos ducitur extra ipsum circulum cadit &c. But. Rectum erat, imo necessarium prorsus, τῆ διαμέτρου, suo sibi reddere casu, sic. Quæ diametro circuli ad angulos rectos ab extremitate ducitur extra circulum cadet. Nam priori modo, si dicas, recipit propositio falsum. Potest enim ab extremitate diametri ad angulos rectos linea duci, ut puta cuilibet lineæ datæ, & non sicut proponitur, extra circulum cadere. In hoc etiam aliàs erravit interpres, sicut ad propositionem II primi supra notavi. Pro. 17. Zamb. A dato signo dato circulo contingentem rectam lineam ducere. But. Si participio contingentem dato circulo iniunxeris, veluti sensus exoptulat, solœcismus erit insignis. Quis enim verbum contingo, & quæ ab eo fiunt, in sui simplicis tange significatu dativo iunctum vidit unquam? vel etiam accusativo cum præpositione, sicut facit Campanus ita proponens.

A dato

A dato puncto ad datum circulum lineam contingentem ducere. Si verò contingentem sine casu quem regat, aut dato circulo capias absolutè, problema nullum facies. Legitimum igitur, & sine solœcismo fuisset ita dicere. Ex dato puncto, quæ datum circulum tangat, rectam lineam ducere. Peletarius autem, ut eum sapere, & intelligere plusquam Euclidem arbitraremur, addit extra circulum, sic. A puncto extra circulum signato lineam ad circuli contactum ducere, tanquam si à puncto intra circulum dato problema fieri posset. Quod est contra definitionem rectæ lineæ circulum tangentis. Omitto quòd lineam generaliter pro recta lineâ posuit, quæ diuersè finiuntur in principijs. Vitiôsè etiam dicitur ad circuli contactum lineam ducere, cum diuersum à proposito fieri & intelligi possit, utpote, si circulus alium circulum, vel lineam tangat. Videmus itaque adiectiones, detractiones, & inuersiones istas in Euclidem imperitiam simul atque temeritatem suis authoribus exprobrare. Pro. 26. Zamb. In equalibus circulis æquales anguli in equalibus circumferentijs subtenduntur, etsi ad cœtra, etsi ad circumferentias deducti fuerint. But. Hic pluribus fermè vitijs, quàm verbis interpretatio cõstat, ut nescias sensusne magis, an verba turbentur. Nam prepositio in bis iuncta equalibus, amphibologiã facit, nullibi magis quàm in Elementis

cauend

cauendam. Sed in secundo loco super amphibolon vitium orationis accedit. Neque enim rectè dixeris separatim, anguli in circumferentijs æqualibus subtenduntur. Si autem coniunctim, in æqualibus, ut sit vna dictio, repugnabit propositi sensus. Est etiam præposterum dicere, angulos subtendi circumferentijs, quæ quidem aut angulos subtendere, aut angulus subtendi semper dicuntur. Præter hæc autem verbum Βεβηκασι, & participiū Βεβηκῆαι contra verum, atque diuersè transferuntur, scilicet, subtenduntur, & deducti, de cuius verbi significatu aliàs admonui. Quapropter ut tot in vnum errata vitemus, ita mutandum. In circulis æqualibus, æquales anguli super æquales peripherias ascenderunt, siue ad centra, siue ad peripherias ascenderint. Sequens autem propositio huius conuersa, cùm eodem morbo laboret, curari poterit in hunc modum. In circulis æqualibus, qui super æquales peripherias anguli conscenderunt, æquales inuicem sunt, siue ad centra, siue ad peripherias conscenderint. In his Peletarius, ad imitationem Campani, ipsas peripherias partim suo nomine, partim & arcus appellat. Quod nulla quidem ratione consistit, ut rem eandem, in eodem proposito diuerso, nomine reddas. Propositio 28, ad verbum sic habet. In circulis æqualibus æquales rectæ lineæ, æquales peripherias auferunt, maiorem quidem maiori, minorem autem minori. Cùm recta linea,

hoc est, quæ non sit diametros, circulum secat, ex tota peripheria auferuntur, hoc est, distinguuntur duæ peripheriæ inæquales, maior scilicet, atque minor, quæ cùm in circulis æqualibus proponantur æquales, ne confusa, & incerta maneret collatio, subiunxit Euclides, maiorem peripheriã esse æqualem maiori, & minorem minori. Et sic apertum, ac indubitatum fit theorema. Quod Peletarius Campani barbariem sequutus ab vltima parte totum corrumpit, hoc modo. In circulis æqualibus æquales rectæ lineæ æquos arcus abscindunt, & maior lineæ maiorem arcum, minor verò minorem. Hoc autem extremum principio cõtradicit apertè, vbi lineæ dantur æquales. Quare fieri non potest vlllo modo, vt vna sit maior altera. Item cùm vtraque linearum etiam inæqualium peripherias auferat inæquales, verè etiam, nec minus tamen importunè diceretur: Et maior lineæ minorem arcum, minor verò maiorem abscindit. Idem insuper in problemate 33, & sequenti, vbi datur angulus, non generaliter, sed rectilineus, quod ad rei veritatem vtrobique necessarium fuit. Ex priore quidem sustulit rectilineo, in sequenti verò reliquit. Quod est indicium parum sibi constantis, in homine iudicij. Pro. 35. Zamb. Si in circulo duæ rectæ lineæ se adinuicem secuerint rectangulum comprehensum sub sectionibus vnus, æquum est ei, quod

quod sub segmentis alterius comprehenditur re-
ctangulo. But. Interpres noster varietatis quàm
veritatis studiosior, sui semper similis dictionem
τμημάτων bis positam, modò sectionibus, modò
segmentis interpretatur. Differt autem in propo-
sito, à sectione segmentum, sicut punctum à linea.
Hoc etiam Hervagius emendavit, reponens in pri-
mo loco segmentis. Sed idem in ultimo theoremate
loco ceciderint, cadat, cadente, cadens, malè repo-
suit, inciderint, incidat, incidente, incidens. Etenim
propriè dicimus incidere casu aliquo, & fortuitò
venire. Vt incidit aliquis in latrones.

Ex libro quarto.

IN ultimo problemate libri quarti, quinti deca-
gonum. Zambertus parum Latine posuit, in
cuius locum repono quidecagonum.

Ex libro quinto.

ZAmb. Multiplex est maior minore, quan-
do eam metitur minor. But. Dictio mino-
re, quæ debuit esse casu secundo, minoris, definitio-
nem ita perturbat, ut nulla sit. Cuius est sententia
ex superiore dependens scilicet. Quemadmodum
magnitudo minor est pars magnitudinis maioris,

ita & magnitudo maior est multiplex magnitudi-
 nis minoris. Sunt enim pars & multiplex inuicem
 relatiua. Interpres autem artis ignarus, in maior
 minore nil aliud quam comparationem esse puta-
 uit. Quāuis & sic quoque fieret ineptè. Sicut de
 duabus lineis inæqualibus rectè dixeris, vnā esse
 maiorem altera, non autem quod vna sit maior mi-
 nore. Heruagius autem è mutata in i reposuit mi-
 nori, quod est dubium tertione, an sexto casu dica-
 tur. Sed rectè Campanus dixit, minoris. Zamb.
 Ratio est duarum magnitudinum eiusdem generis
 aliquatenus adinuicem quædam habitudo. But.
 Quod Græcè est κατὰ πηλικότητα, hoc est, secun-
 dum quantitatem, per aduerbium aliquatenus
 transtulisse, dubium mihi facit, in scitiāne maior
 artis, an linguæ fuerit. Quod Heruagius mutare
 dubitans, asterisco signauit, cū huiusmodi ad mar-
 ginem scholio, κατὰ πηλικότητα, id est, quò ad
 quantitatem. Hoc autem, secundum quantitatem,
 Peletarius sustulit præsumpta licentia resecandi,
 quæ vel non placent, vel non intelligit esse necessa-
 ria. Huiusmodi finitiones corruptas, in Arithme-
 tico cuiusdam libello nuper edito, citatas inueni,
 priorem quidem, de multiplici totidem verbis, al-
 teram verò de ratione, sic immutatam. Ratio est
 duarum magnitudinum eiusdem generis aliqua ex
 parte adinuicem quædam comparatio. Hoc autem

non est emendare vitium, sed alijs verbis latius explicare. Item Zambertus in definitione analogie verbum ὁμοιότης, quod est similitudo, non minus improprie, quam barbarè vertit identitas. Zamb. In eadem ratione magnitudines dicuntur esse, prima ad secundam, & tertia ad quartam, quando primæ & tertiæ æquè multiplicia, secundæ & quartæ æquè multiplicia, iuxta quavis multiplicationem, utraque utranque, vel unà excedunt, vel unà æquales sunt, vel unà deficiunt, sumptæ adinvicem. But. Cùm sit multiplex ad magnitudinem adiectivum, substantivi sui genere multiples, non multiplicia, transferri debuit. Nil enim est aliud multiplex magnitudinis, quam ipsa magnitudo multiplicata. Sed interpretem pueriliter decepit neutrum in τὰ πολλαπλάσια genus, quod non advertit ad suū τὰ μέγιστα respicere substantivum, Latine magnitudines. In eo tamen sibi non constat, illa quæ statim sequuntur ἐκάτερον ἐκείνου, ἴσα, λεπθέτερα vertendo, utraque, utrâque, æquales, sumptæ. Discrepat etiam casus dicendo, utraque utrâque sunt æquales. Heruagius autem generum quidem solœcismos emendavit, sed in discordia casus cum interprete concordat. Peletarius etiam multiplicia posuit, & illud, secundum quamlibet multiplicationem, transponendo, sensum definitionis conturbat. Zamb. Quando verò

æquè multiplicium multiplex primi excesserit multiplex secundi, multiplex autem tertij non excesserit multiplex quarti, tunc primum ad secundum maiorem rationem habere dicitur, quàm tertium ad quartum. But. In definitione precedenti, unde procedit sensus istius, luscus tantum fuit interpret, hïc autem cæcus omnino. Qui videre non potuit, quod erat luce clarius, scilicet illa, primi, secundi, tertij, quarti, primum, secundum, tertium, quartum, contra Grammaticæ canones masculino genere dici, cum ad nihil aliud, quàm ad magnitudinem referri possint. Quæ quidem Hervagius rectè suo genere restituit. Orontius autem foedum istud interpretis erratum primò sequitur, vt solet. Deinde in expositione sua quavis mala, generis tamen discrepantiam vitavit. Postremo tanquam insciens fecisset, vel inuitus, in eodem se rursus volutabro foedavit, ita concludens in editione secunda. Hinc est (inquit) vt cum æquè multipliciũ, supra scripto modo, coassumptorum, multiplex primi non excesserit multiplex secundi, sed multiplex tertij excesserit multiplex quarti, tum primum ad secundum minorem rationem habere dicitur, quàm tertium ad quartum. Zamb. Proportio autem in tribus terminis minima est. But. Quamuis analogia proximè ex Græco in Latinum translata, Quintiliano teste, proportio dicatur, cum ta-

men

men sit analogia, doctorum usu, Latinè recepta,
 eã sua sibi voce malim vsurpare quàm vertere. Et
 quod dicitur, minima, Græcè est ἐλαχίστοις, ad ver-
 bum minimis. Quod Heruagius, parum quidem
 Latinè, mutavit, ad minus. Peletarius autem re-
 ctè, minimum. Zamb. Quando tres magnitudines
 proportionales fuerint, prima ad tertiam duplicem
 rationem habere dicitur, quam ad secundam.
 Quando autem quatuor magnitudines proportio-
 nales fuerint, & semper ordinatim vna plus, pri-
 ma ad quartam triplicem rationem habere dici-
 tur, quàm ad secundam, ex quo fuerit proportio
 extensa. But. Duplicem, & triplicem, non cohe-
 rent cum particula quam. Et illud, ex quo fuerit
 proportio extensa, vel sicut Peletarius, donec sit
 absoluta proportionalitas, lectioni Græcæ non re-
 spondet, quæ est ἕως αὐτῆ ἀναλογία ὑπάρχῃ. To-
 tum autem ita dicerem. Quando tres magnitudi-
 nes Analogæ fuerint, prima ad tertiam habere
 rationem dicitur duplam illius, quam habet ad se-
 cundam. Quando autem quatuor magnitudines
 Analogæ fuerint, prima ad quartam habere ra-
 tionem dicitur triplam illius, quam habet ad se-
 cundam. Et ita semper ordinatim vnus addita-
 mento, vsque dũ Analogia fuerit. Zamb. Aequa
 ratio est, pluribus existentibus magnitudinibus, et
 alijs eis equalibus multitudine, cum duabus sum-

ptis, & in eadem ratione, quando fuerit sicut in primis magnitudinibus primum ad ultimum, sic in secundis magnitudinibus primum ad ultimum. Vel aliter, Acceptio extremorum per subtractionem mediorum. But. Improperie vertitur, æqua ratio, nec Græcum satis implens, quod est $\Delta\iota' \iota\sigma\sigma \lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$, hoc est, ex æquali ratio, quia subintelligitur, ex æquali subtractione mediarum magnitudinum. Et caue dixeris, mediorum, extremorum, primum, ultimum, ne solœcismos cum interprete facias, quos emendat Heruagius. Retinent tamen Orontius, atque Peletarius. Zamb. Ordinata proportio est, cum fuerit antecedens ad consequens, sicut antecedens ad consequens, & consequens ad rem aliã, sicut consequens ad rem aliam. Perturbata autem proportio est, quando tribus existentibus magnitudinibus, & alijs eis æqualibus multitudine, fit sicut quidem in primis magnitudinibus antecedens ad consequens, sic in secundis magnitudinibus antecedens ad consequens, sicut autem in primis magnitudinibus consequens ad rem aliam, sic in secundis magnitudinibus res alia ad antecedens. But. Quod habetur Græcè $\pi\acute{\epsilon}\omicron\varsigma \acute{\epsilon}\lambda\lambda\omicron\tau\iota$, ad rem aliam interpretari, nil aliud magis est, quàm rem ipsam ignorare. Cum enim non sit aliter ratio, quàm inter magnitudines homogeneas, ut ex definitione constat, quid rationis habere possit antecedens ad

rem

rem aliam, hoc est diuersam, aut res alia ad antecedens certè non video. Sed interpretem res quidem modica valde turbauit, quod non intelligentibus accidit frequenter. Putauit enim dictionem ἀμοτι, non vnã, sed duas esse, quasi τι significaret aliquid, sicut aliàs ferè solet, non aduertens τι encliticum ex superuacuo sepius in oratione poni, & abundare, apud Atticos præsertim, & in Platone, & apud Proclum non rarò sic legitur. Hoc itaque non est vertere, sed invertere subter, & supra, non minus verba, quàm sensum. Allucinatio tam turpis Heruagium, Orontium, ac recentiores alios fefellit, apud quos de finitionem totidem verbis citatam inueni. Peletarius autem, vel intelligentiam, vel emendationem rei non habens, ambas finitiones sustulit omnino. Sed ne serpat longius error, translationè ita facio. Ordinata analogia est, quando fuerit sicut antecedens ad consequens, sic antecedens ad consequens, fuerit autem et sicut consequens ad aliud, sic cõsequens ad aliud. Hic in utroq; loco, ad aliud, subintelligendũ est antecedens. Inordinata analogia est, quãdo tribus positis magnitudinibus, et alijs equalibus ipsis multitudine fit, sicut quidẽ in primis magnitudinibus antecedens ad consequens, sic in secundis magnitudinibus antecedens ad consequens, sicut autem in primis magnitudinibus consequens ad aliud, sic in secundis

magnitudinibus antecedens ad aliud. Hic in primo loco, ad aliud, subaudi consequens, in secundo autem intellige antecedens. Scire oportet in hac duorum ordinum analogia primas utrobique magnitudines antecedentia fieri, secundas consequentia, & antecedentia simul. Tertias autem, consequentia tantum. Ac proinde sensus, & ordo collationis ita procedit, ac si diceretur: Fit sicut quidem in primis magnitudinibus prima ad secundam, sic in secundis magnitudinibus secunda ad tertiam, sicut autem in primis magnitudinibus secunda ad tertiam, sic in secundis magnitudinibus prima ad secundam. Est etiam quod aduertas, quamuis antecedens, & consequens ad magnitudinem referantur, vsitatus tamen substantiua neutro genere poni, quam adiectiua foemineo. Interdum tamen ut in principijs libri sexti, adiectiua substantiuorum suorum genere masculino leguntur. Post haec autem Venetus interpres quaedam super extensa, & perturbata, ut ipse vocat, proportione de suo quidem oscitans, & verè perturbatus adiecit. Nam & antecedentia ferè repetit, pauca mutando, & Graecè nusquam habentur.

Pro. 1. Zamb. Si fuerint quaelibet magnitudines quarumlibet magnitudinum equalium numero singula singularum aequè multiplices, quotuplex est vnus vna magnitudo, totuplices erunt, &

omnes

omnes omnium. But. Rursum interpres & Peletarius, ut ante notavi, abutitur verbis quælibet, et quarumlibet, quæ sunt Græcè ὁποσάουῃ, & ὁποσωνούῃ, pro quibus reponit Hervagius quotcunq; Mallē tamen ita vertere. Si fuerint quotlibet magnitudines quotlibet magnitudinum equalium multitudine, singulæ singularum æquè multiplices, quotuplex est vna magnitudinum vnius, totuplices erunt & omnes omnium. Pro. 2. Zamb. Si prima secundæ æquè fuerit multiplex & tertia quartæ, fuerit autem & quinta secundæ æquè multiplex, & sexta quartæ, & composita prima, & quinta secundæ æquè multiplex erit, & tertia & sexta quartæ. But. Repositio copulæ &, frequentior in hoc loco, legentis sensum dubiè versat. Quare multum lucis orationi parua mutatio dabit, hoc modo: Si prima secundæ fuerit æquè multiplex, ac tertia quartæ, fuerit autem & quinta secundæ æquè multiplex, ac sexta quartæ, erit & prima posita cum quinta æquè multiplex secundæ, ac tertia cum sexta posita quartæ. Pro. 3. Zamb. Si primum secundi æquè fuerit multiplex, & tertium quarti, sumantur autem æquè multiplicia primi, & tertij, & æquè sumptorum vtrunque vtriusque æquè erit multiplex, alterum quidem secundi, alterum quarti. Pro. 4. Si primum ad secundum eandem habuerit rationem, & tertium ad quartum, &

æquè multiplicia primi, & tertij ad æquè multiplicia secundi & quarti, iuxta quamvis multiplicationem eandem habebunt rationem, sumpta adinuicem. *But.* Interpretis leuitatem demiror, Uqui cum dictionibus illis videlicet, prima secunda, & tertia quarta, quinta, & sexta toto theoremate proximo rectè fuisset vsus genere fœmineo. Quoniam (sicut antea dixi) ad nihil aliud quam ad magnitudinem referri possunt, in his tamè duobus easdem voces, ac eodem sensu, ad idèmq; re-latas neutro genere protulerit, ac etiam Peletarius. Sed magis minor à Campano $\omega\lambda\alpha\pi\lambda\alpha\sigma\iota\alpha$ diuerso genere poni, multiplicia scilicet, deinde statim & in vtraque propositionum multiples æquales. Istud Heruagius in Zamberto non emendauit, mala iam, vt puto, solœcismorum imbutus consuetudine. Sed illud $\delta\iota\iota\sigma\omicron\upsilon$, perperam versum per aduerbium æquè, nihilo melius ipse commutauit, ex æquo, quod significat æqualiter, vel ex æquitate. Valet autem $\delta\iota\iota\sigma\omicron$ ex æquali, siue ab æquali. Vnde signatur modus ille syllogismi, ab æquali subtractione mediarum, super cuius definitione alium interpretis errorem antea notavi. Item $\kappa\alpha\theta' \delta\pi\omicron\iota\omicron\upsilon\sigma\omega\upsilon \omega\lambda\alpha\pi\lambda\alpha\sigma\iota\alpha\sigma\mu\omicron\upsilon$, verti debuit secundum quamlibet multiplicationem, & non iuxta, cuius sensum locus non recipit. Istud etiam transponendo Peletarius sensum propositi conturbat

bat

bat. *Ambas igitur propositiones sic interpretor. Si prima secundæ fuerit æquè multiplex, ac tertia quartæ, sumantur autem æquè multiplices primæ, & tertiæ, etiã ab æquali, ex ita sumptis utraque utriusque erit æquè multiplex, una quidem secundæ, & altera quartæ. Si prima ad secundã rationem habuerit eandem, ut tertia ad quartam, etiam æquè multiplices secundæ, & tertiæ ad æquè multiplices secundæ, & quartæ, secundum quamlibet multiplicationem, eandem rationem habebunt inuicem sumptæ. Pro. 5. Zamb. Si magnitudo magnitudinis æquè fuerit multiplex, & ablata ablate, & reliqua reliquæ erit multiplex, quotuplex tota totius est multiplex. But. Ad illud multiplex secundo loco positum deest, æquè, & aliud in fine multiplex abundat. Heruagius autem dum alienum corrigit errorem, proprium & ipse profert. Et reliqua (inquit) reliquæ, ita erit multiplex, ut tota totius est. Putauit enim $\iota\sigma\alpha\kappa\iota\varsigma$, quod est æquè, satis explicari per similitudinis aduerbium ita, sed multò est aliter. Cum enim dicis reliquam reliquæ ita esse multiplicem, ut est tota totius, nihil aliud infers necessariò, quam ut ambæ sint utcunque, multiplices. Sed habet quæsitum, ut utraque sit $\iota\sigma\alpha\kappa\iota\varsigma$, hoc est æquè multiplex, eadem scilicet multiplicatione, ut puta dupla, vel quadrupla, aliãue qualibet una, & non duabus. Quod ut significan-*

tius

tius esset, quasi diuinaret Euclides aliquando futuros, qui non sic intelligerent, post ἰσᾶκίς πολλαπλασίου, non καὶ, vel ὡσαύτως, ut alibi saepius, sed ex abundantia penè subiunxit ὅσαπλασίου, id est, quotuplex. In huius theorematis demonstratione ad κατὰσκαδὴν dicitur. Quotuplex est magnitudo $A E$ ipsius $G D$, totuplex fiat $E B$ ipsius $G H$. Super hoc Peletarius disputat, dicens non vacare scrupulo, dum iubetur fieri id quod nō ante doceat Euclides, quàm in duodecima sexti. Et esse duriusculum, ut id cogamur facere, aut concedere, quod posterius erit ediscendum. Multa deinde ad solutionem inculcat non vana minus, quàm ipsa est obiectio, in qua duodecimam sexti falsò citavit, quod est problema docens, quomodo datis tribus lineis rectis quartam proportionalem inuenias, ab hoc loco prorsus alienum. Amplius dico, nihil eorum quæ in totis elementis proponuntur, demptis principijs, ad huius quinti libri demonstrationes facere quicquam, ubi generaliter de magnitudinibus agitur, quarum constructio figurationem nullam, sed nuda tantum signa per notas lineasve requirit. Et in proposito datæ magnitudini aliã equè multiplicem facere, nil aliud habet, quàm ipsam magnitudinem multiplicare, hoc est bis, ter, pluriesve quocūque libuerit signo disponere, ad quod præmissa problemata, imo vel finitiones, & peti-
tiones

tiones abundè sufficiunt. Sed non est propositum
 quæ sunt ad demonstraciones huiusmodi passim
 discutere. Pro. 9. Zamb. Quæ ad eandem, eandem
 habent rationem æquales inuicem sunt. Et ad quas
 eadem eandem habet rationem, ipse sunt æquales.
 But. Cùm bis Græcè ponatur ἴσα ἀλλήλοις, hoc
 est, æquales inuicem, postremum illud inuicem in-
 terpres, quasi vacaret omisit, quod erat alioqui
 necessarium. Est enim incertum, & imperfectum
 sensu dicere, magnitudines sunt æquales, si non ex-
 presseris cui, vel quibus sunt æquales, aut inuicem.
 Sic igitur restituendum putavi. Quæ ad eandem
 habent rationem eandem æquales inuicem sunt. Et
 ad quas eadem rationem habet eandem, & ille
 etiã æquales inuicem sunt. Pro. 11. Pelet. Quæ eidem
 sunt æquales rationes, et inter se sunt æquales. But.
 Quãuis in cõparatiõne rationũ inter se vna dicatur
 esse maior, aut minor altera, nequaquã tamen dici
 solët, ab his qui vocibus artis nõ abutũtur, rationes
 inuicem æquales, sed eadem. Et cùm fuerint qua-
 tuor magnitudines analogæ, non eas esse dici-
 mus in ratione æquali, sed in eadem. Nec quòd ra-
 tio primæ ad secundam sit æqualis rationi tertie
 ad quartam, sed sicut ratio primæ ad secundam,
 ita & tertie ad quartam. Dicuntur etiam in fi-
 guris latera, eiusdem vel similis rationis inter se,
 non autem æqualis. Nec in hoc etiam erravit

Zamb

Zambertus, sed nec ipse Peletarius alias. Vnde nō minus ipse sibi, quā Græcæ veritati contrarius, quæ verbum de verbo sic habet. Quæ eidem rationes sunt eadem, etiam hæ ipse inuicem sunt eadem. Ipsa insuper analogia finitur λόγων ὁμοιότης, καὶ οὐκ ἰσότης, id est, rationum similitudo, et non æqualitas. Pro. 12. Zamb. Si fuerint quælibet magnitudines &c. But. Admonui supra in artem peccari dicendo quælibet, pro quodlibet, Græcè est ὅποσσοῦν. Pro. 15. Zamb. Partes eodem modo multiplicium eandem rationem habent, sumptæ adinvicē. But. Nescias in hoc loco sensus ne peius, an verba procedant. Nam si multiplicium iungatur ad partes, fit comparatio nulla, si verò ad eandem, non erit sermo Latinus. Sic igitur restituo: Partes eandem, quam æquè multiples, rationem habent, inuicem sumptæ. Si quis contendat ὡσαύτως, hic non esse transferendum æquè, Euclidem opponam, qui quod in propositione dixit ὡσαύτως, in demonstratione repetit ἰσῶς. Pro. 24. Zamb. Si primum ad secundum eandem habuerit rationem, & tertium ad quartum, habuerit autem & quintum ad secundum eandem rationem, et sextum ad quartum, & composita primum & quintum, ad secundum eandem habebunt rationem, & tertium & sextum ad quartum. But. Huiusmodi solæcismos, quorum causas in superioribus explicui,

Pelet

Peletarius sequitur, & Heruagius nihil emendat, ego autem sic. Si prima ad secundam rationem habuerit eandem, ac tertia ad quartam, habuerit & quinta ad secundam rationem eandem, ac sexta ad quartam, etiam composita prima cum quinta ad secundam rationem habebit eandem, ac tertia cum sexta ad quartam.

Ex libro sexto.

Z Amb. Similes figuræ rectilineæ sunt, quæ & angulos æquales habent ad vnum, & quæ circum æquales angulos latera proportionalia. But. Orontius atque Peletarius dictionem $\epsilon\upsilon\delta\upsilon\gamma\gamma\alpha\mu\mu\alpha$, id est, rectilineæ, non intelligentes esse necessariam, sustulerunt. Qua sublata non habet definitio verum. Possunt enim dari figuræ non rectilineæ, quæ & angulos habebunt singulos singulis æquales & quæ circum æquales angulos latera proportionalia, & tamen non erunt similes. Et quod dicitur ad vnum, non congruit significatio rei, sed sigillatim, sicut adnotauit Heruagius in margine, vel quod erat significantius, singulos singulis. Zamb. Reciproce autem figuræ sunt, quando in vtraque figurarum, & antecedentes & cōsequentes termini rationales fuerint. But. Non intelligens interpres sententiam propositi, ad suum
detor

detorsit sensum dictionem λόγος, vertendo termini rationales. Unde fit definitio falsa, imo nulla. Omnis siquidem rationalium mentio, non solum ab hoc loco, sed à totis nouem prioribus libris Elementorum prorsus est aliena. Est igitur ad literam definitio vera sic. Reciprocae autem figurae sunt, quando utrique figurarum rationes & antecedentes, et consequentes fuerint. Peletarius autem ita definit. Reciprocae figurae dicuntur, quum utriusque ipsarum mutua latera fuerint proportionalia. Hoc autem à Græco sensu prorsus est aliud, & idem explicatur per idem, non aliter quam si diceres: Reciprocae figurae dicuntur quum utriusque ipsarum reciproca latera fuerint proportionalia. Ac proinde cum ex hoc non intelligatur quænam sint mutua in figuris latera, ita nec etiam quæ sint reciprocae figurae. Super quibus expositionem ipse faciens, Sic (inquit) stat proportionalitas, ut duo latera unius sint antecedentia, & duo alterius sint consequentia. Istud autem & falsum est, & exemplo figurationis quam ibidem posuit ipse contrarium. Hanc insuper finitionem ita protulit Campanus: Superficies mutuorum laterum sunt, inter quarum latera incontinua proportionalitas retransitiuè habetur. In secundo theoremate huius libri, quod Græcè est ἐπὶ τῶν τομῶν, malè vertit Zambertus, ad segmenta, erat enim ad sectiones dicendum.

dum. cuius rei causam ad propositiones libri secun-
 di antea monstraui. Et in theoremate sequenti
 eandem vocem scilicet ἐπὶ τὴν τομήν, hoc est, ad
 sectionē aliter interpretatur, videlicet ad basim,
 vnde non tam dictio, quàm theorema corrumpi-
 tur. Hæc vtraque Heruagius emendat, sequitur
 tamen Peletarius errorem. Qui etiam quartum
 theorema dimidiatum protulit, hoc modo. Aequi-
 angulorum triangulorum latera, quæ circum æqua-
 les angulos sunt proportionalia. Hoc autem sequēs
 refecavit, scilicet. Et eiusdem rationes sunt, quæ
 æqualibus angulis latera subtenduntur. Putans
 enim proportionalia, & eiusdem, vel similis ra-
 tionis latera, hoc est, analogæ, & homologa nihil
 inter se differre, iudicavit Euclidem bis idem osci-
 tando posuisse. Quam opinionem ex propositione
 sequenti huius conuersa, & similiter decurtata
 plenius indicat, ita proponens. Triangula (inquit)
 proportionalium laterum æquales habent angulos
 sub quibus latera proportionalia subtenduntur.
 Græca autem sic habent. Si duo trigona latera
 proportionalia habuerint, æquiangula erunt ipsa
 trigona, & æquales habebunt angulos quibus ho-
 mologa latera subtenduntur. Hac iterum de cau-
 sa propositionem sextam posteriore dato mutila-
 uit, quod est, Et æquales habebunt angulos, quibus
 homologa latera subtenduntur. Ex his itaque con-

stat euidenter ignorantia differentie inter analogon & homologon. Vnde theorematum deprauatio processit. Pro. 9. Pelet. A data linea constitutam partem abscindere. But. Hoc problema, & quatuor quae sequuntur non in lineis vniuersè procedunt, sed in rectis tantummodo. Quare ex linea, & lineis recta, & rectis auferendo, ipsa rei veritas ex propositis aufertur. Pro. 18. Zamb. A data recta linea, dato rectilineo simile, similiterque positum rectilineum describere. But. Non minus ineptum, & absurdum dictu est. A data linea rectilineum describere, quàm si tu dicas, à lapide secto parietem struere, pro eo quod est dicendum, ex lapide secto. Sic igitur ex data linea verendum erat. Huiusmodi forma loquendi, & in precedentibus, & in sequentibus frequenter abutitur interpres. Pro. 20. Zamb. Similia polygona in similia triangula diuiduntur, & in equalia numero, & equa ratione totis. Et polygonum ad polygonum duplo maiorem rationem habet, quàm similis rationis latus, ad similis rationis latus. But. Pro equa ratione totis, repone homologa totis. Hoc autem Peletarius, more suo, detruncavit. Quod autem rationes inter se non dicantur equales, sed eedè vel similes, iam satis antea probavi. Pro. 25. Zamb. Dato rectilineo simile, & alij dato equali idem constituere. But. Peletarius particulam, idem,

idem, sustulit, non aduertens ab Euclide poni, ne locus esset amphibolice, intelligendo problematis constitutum de duobus rectilineis, vno simili, & altero equali datis fieri. Iam enim speculatione longa didici nullam detractionem, aut adiectionem ad Elementa, citra vitium, consistere. Pro. 27. Zāb. Omnium parallelogrammorum circum eandem lineam rectam proiectorum &c. But. In hac propositione, & duabus quæ sequuntur, quarum est sententia difficilis, & implicita, verbum $\omega\alpha\rho\alpha\beta\alpha\lambda\epsilon\upsilon$, cum suis participijs variè nec satis accommodatè transfertur, cōparare, prætere, proiectum, proiectorum. Quamuis enim diuersa significet, ipsa tamen res exigit in hoc loco, vt pro applicare, vel aptare, siue accommodare capiatur. Verbum etiam $\delta\epsilon\iota$, quod est oportet, perperam vertitur, expedit, in duobus locis. Sunt & errores alij, quos ex parte notauit Heruagius. Pro. 33. Zamb. In equalibus circulis anguli eandem habent rationem ipsis circumferentijs in quibus deducuntur, & si ad centra, & si ad circumferentias fuerint deducti. Tum etiam sectores ad centra constituti. Hæc ita corrigo. In circulis equalibus anguli eandem habent rationem, quam peripheriæ in quas ascenderunt, siue ad centra, siue ad peripherias fuerint qui conscenderunt. Emendationis istius rationem antea dixi ad propositionem 26 tertij.

Quæ autem in cæteris nouem libris malè verterit Zambertus excutienda non putavi, ne crescat libellus in immensum. Et hæc in admonitionem satis erunt studiosis, ne se falsis interpretationibus ultra decipi patiantur. Sed fontibus Græcis assuescant. Quisquis verò deinceps Elementorum interpretationem aggredietur certò sciat opus se non vulgare moliri.

Quod autem ad demonstrationes Euclidis passim interferantur ab interpretibus antecedentium numeri citando, nulla mihi ratione probatur. Nusquam enim hoc, aut quàm rarissimè, ab antiquis factum inueni. Ipse enim Euclides demonstrando theorematum præcedentium verba recitat, idque non passim, sed vbi ad faciliorem intelligentiam res exigit. At interpretes nostri propositionum, sententiarum, finitionumque numeros locis etiam non oportunis infarciunt, & quod est ridiculum omnino, ipsa etiam ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, quæ postulata dicuntur, passim inculcant, cuius vnum pro multis exemplum subiiciam. Ducatur (inquiunt) linea recta BC, per primum postulatatum, & per secundum postulatatum producatatur vsque ad F, & super linea BC constituatur triangulum æquilaterum, per primam primi, & centro B describatur circulus BCD, per tertium postulatatum, atque per secundum postulatatum,
ducatur

ducantur lineæ rectæ ex centro B in ipsius circuli circumferentiam, quæ quidem, per decimam quintam definitionem primi, erunt æquales inter se, ex quibus si auferantur æquales residua erunt inuicem æqualia, per tertiam communem sententiam. In his autem sic ineptè congerendis alios Orontius diligentia superauit. Quæ quidem ad intelligentiam rei nihil omnino conferunt, sicuti falsò creditur à multis. Sed è contrario tanquam vanis, atque superfluis, legentium sensus offenditur. Si quid autem reconditius videatur, quam vt à quibuslibet, præsertim nouitijs, erui possit, notatione, vel scholio separatim declarandum.

Cæterum, super ista, Zambertus in demonstrationibus propositiones interdum perperam citauit: Quod ne videar affingere, quosdam locos huiusmodi falsitatum breuiter indicabo. In trigesima prima propositione libri primi non rectè, & inscienter adducitur propositio decima quarta primi, cum nihil ad propositum, probationemque faciat. Et in quinta secundi similiter 36 primi. Et in sexta secundi iterum 36 primi. Et in octaua sequenti, primum 6 eiusdem libri, deinde & 43 primi. Et in duodecima quæ sequitur 47 primi. Item in septima tertij 8 primi. Et in octaua tertij 23 primi, & hæc iterum in decima sequenti, & in vigesima sexta quæ sequitur, 24 eiusdem tertij.

Rursum in decima septima quinti, 11 eiusdem bis. Et in vltima quinti, 13 primi. Præterea in prima sexti 11 quinti, qua sæpius abutitur. Et in decima quæ sequitur, 2 quinti. Item in decima sexta sequente, 14 eiusdem sexti, & in trigesima sequenti, 34 primi. Huiusmodi autem vitio caret Oron-tius, quod tamen alia peculiari prauitate compen-sat. Cùm enim artem demonstrandi passim inuer-terit, ipsa perturbatione rerum cogitur communes illas principiorum sententias conuerso, corruptoque modo producere, qui verum sæpius non habet. Si-cut ad theorema quartum libri primi, cuius de-monstrationem fecit Euclides ex illa communi sententia. Quæ sibi inuicem congruunt, inter se sunt equalia. Hanc & in hoc loco bis, & in vige-sima quarta propositione tertij ita conuertit. Quæ sunt (inquit) adinuicem equalia, sibi metipsis con-ueniunt, per conuersam octauæ communis senten-tiæ. Sed verum non est hoc vniuersè. Dabitur enim trigonum, vel trapezium equalè quadrato, neque tamen sibi congruent. Et item orthogonia, equalia quidem inter se, non congruentia tamen. Rursum in propositione vigesima tertij. Quæ autem (in-quit) sunt equalia eiusdem duplicia sunt, per con-uerfionem sextæ communis sententiæ. Atqui non est hoc vniuersale, sed contingens. Vtpote si fue-rint duæ lineæ rectæ tripedalis vtraque, quamuis
equal

æquales inter se, nequaquam tamen ad bipedalem
 duplices erunt. Hoc etiam aliter protulit in tertia
 quinti. *Æqualia porro (inquit) eiusdem sunt æquè
 multiplicia, per sextæ diffinitionis primi libri con-
 uersionē. Hic autē abutitur diffinitionis voce pro
 cōmuni sentētia. Et in quinta rursus eiusdē. Æ-
 qualia (inquit) eiusdem sunt æquè submultiplicia,
 per ipsius septimæ communis sententiæ conuersio-
 nem. Neque solūm conuersionibus istis frequen-
 ter abutitur, sed ipsas etiam sententias à sua veri-
 tate manifesta distrahit. Quale est illud in deci-
 ma tertia primi. Anguli porro (inquit) qui eisdē
 sunt æquales angulis adinuicem quoq; sunt æqua-
 les, per primam communem sententiam. Ac rur-
 sum in vigesima octava sequenti. Qui autem (in-
 quit) eisdem, utpote binis rectis, sunt æquales angu-
 li, & adinuicem sunt æquales, per primam com-
 munem sententiam. At hoc euidenter est falsum,
 etiam ex eo cuius demonstrationem instituit theo-
 remate primi. In quo proponitur linea recta quo-
 modocunque super lineam rectam constituta, an-
 gulos fecerit, aut duos rectos, aut duobus rectis
 æquales efficiet. Cum igitur talis constitutio linea-
 rum duos fecerit angulos non rectos, hoc est, unum
 maiorem, & alterum minorem recto, isti non erūt
 inuicem æquales, quāuis eisdem duobus rectis sint
 æquales angulis. Falsitatem istam solius numeri*

mutatio facit ex sententia communi, scilicet: Quæ eidem æqualia, & inuicem sunt æqualia. Non autem quæ eisdem, vt ponit Orontius, qui magnus est error. Ex his itaque patet quàm malè Geometrica tractantur à nostris. Si viderit Peletarius præter verum ista notari, suam, vt par est, sententiam responso tutabitur. Est enim literaria concertatio, cum ad excitandum ingenij vigorẽ stimulus acer, tum & ad intelligentiam rerum non inutilis. Sed quid de quodam alio temeratore dicendum? qui cum facultatem aliam nouandi non haberet totas demonstraciones, atque figuras, quas vocat aliorum commenta sustulit ab Euclide. Et sic Elementorum fragmentis impresso libro, suos sectatores specie facilitatis, atque compendij ludificatos, tandem nihil scire docuit. Neque enim in demonstrabilibus aliter, quàm per demonstrationem (Aristotele teste) scientia constat. Quod nullibi melius, quàm in Geometricis apparet. Quorum demonstraciones cum sint propositionibus captu difficiliiores, ab his quos leuioribus ingenijs, corruptoque iudicio natura composuit, contemni solent, atque reijci. Refert enim Proclus in tertio commentariorum super Elementis, demonstracionem illam theorematis, quod est: Omnis trianguli duo latera reliquo maiora sunt, ab Epicureis derideri solere. Hoc enim (inquiunt) vel asino constat, quem si
quis

quis ad septum trigoni forma, in angulo cōstituat,
 & in opposito pabulum viderit, ad id petendum
 recta latus vnum, & non duo perambulabit. Et sic
 breuius iter, naturali captu, eligens animal osten-
 dit apertè, duo trigoni latera reliquo esse maiora.
 Hoc igitur nulla prorsus figuratione opus habet.
 Nec minus est imperiti, ea quæ sunt manifesta de-
 monstratione dignari, quàm & his quæ sunt incer-
 ta, & indeprehensa indidem ex ipsis fidem habe-
 re. Qui enim ista confundunt apertè declarant, se
 & id quod indemonstrabile est ignorare. Ad hæc
 autem respondet doctissimè Proclus: Manifestum
 quidem est (inquit) ad sensum theorema, nondum
 tamen evidens κατὰ τὸν ἐπισημονικὸν λόγον.
 Multa enim sunt in rerum natura, quibus hoc ac-
 cidit idem. Veluti calefacit quidem ignis, & hoc
 sensui manifestè. Sed quomodo calefaciat scien-
 tiæ proprium est opus assequi. Vtrum incorporea
 vi, an corporea sectione, Sphericisne particulis,
 an pyramidalibus? Rursum, quòd moueamur aper-
 tè quidem fit ad sensum. Quomodo autem mouea-
 mur rationem ostendere difficile. Vtrum κατὰ
 ἀμερές ἢ κατὰ διάσημα. Sit igitur in trigono, duo
 latera reliquo esse maiora, sensui manifestum. Sed
 quomodo fiat hoc, scientiæ facultatis est aperire.
 Talia Proclus in Epicureos. At Epicureus noster
 iste simiolus, accessu temporis, factus insolentior,

post aliquot annos ab Elementorum depravatione priori libellum ædedit. In cuius præfatione verbosa nimirum, & insolentiæ plena, nihil aliud quàm criminationes falsas nebulo ventosus latrauit in Euclidem, atque Theonem. Heterogenian, tautologian, hystrogenian, non perfectam, & amethodicam institutionem, ac si quid deterius istis impudenter exaggerans, ignavissimo cuique scriptori nulliusque bonæ frugis assignanda. Nihilque magis præter cætera conatur eleuare, quàm ordinationem ipsam σοφιστικῆς. Ex qua potissimè, cum sit omnium quæ fuerunt vnquã, vel esse possunt exquisitissima, laudem præcipuam, atque nobilitatem Euclides ab omni posteritate reportauit. Hanc inter alios admiratus præcipuè Martianus Capella vir, & ingenij dote, & encyclopedis clarissimus, ad Philologiæ nuptiarum celebritatem, in concessu Deorum Euclidi constituto, ab omnibus philosophis astantibus acclamari festiuè, & applaudi facit, ipsamque Geometriam laudibus se perfectantis gratulabundam libros Elementorum ab authore correptos, Ioui, ac Senatui cælitum, in omnis astruccionis Geometricæ documentum ablatis intinasse. Eos inquam libros, publica temporum omnium laude sacros, futilis iste nugator, modis omnibus lacerare, & incessere non dubitauit, ex Aristotelicis institutionibus testi-

monia

monia detorquens imperitissimè. In quas etiam aliquando, scriptis æditis, sycophanta leuissimus indoctam suam mordacitatem exercuit. Et quem ab initio protulit testē, paulò post reprobabat. Quid huic versipelli facias? Sed nimirum in authorem suum recidit omnino calumnia. Nullum enim vitij genus in Euclide falsò notauit in quod, præter alia, suis se ipse scriptis reuera non impingat. Ut cum nullo magis, quàm secum pugnare videatur.

Sed iam me tedet cum delirante Momo con-

tendere. Hinc igitur aliorum operum

Euclidis interpretationem no-

uam, qualis sit, di-

scutiemus.



F I N I S.

I O.



IO. B V T E O N I S

A N N O T A T I O I N

E R R O R E S I O. P E N A E

interpretis Catoptrico-
rum Euclidis.



P R O O E M I V M.



X P E T I T A mihi
diu votis omnibus res ac-
cidit nuper, vt Euclidis
Catoptrica, simul et Opti-
ca Graecè primùm vide-
rem, opera quidem Io.
Pena, qui se Mathemati-
cum regium profitetur,
hoc anno typis excussa Lutetiae. Ad quorum in-
terpretationem nouam incitatum se ipse testatur,
quod aliam veterem Zamberti Veneti in multis
peruersam, atque mutilam esse videret. Ex quibus
nonnulla quidem ipse mutauit in melius, multa
etiam in deterius, vt dubium faciat boni ne plus,

an

an mali versione sua contulerit. Cum videam igitur Euclidis labores malis interpretationibus hucusque vexari. Visum est, sicut prius in Elementis, ita nunc aliquot in istis errores, ne legentibus imponant, adnotando retegere.



Atoptricornum principium, quod Græcè est ὄψιν εἶναι εὐθείαν ὑπεκείδω ἢς τὰ μέσα πάντα τοῖς ἀκείοις ἐπιπρόδῃ, Io. Pena vertit in hunc modum.

Ponamus radium esse rectam lineam, cuius media omnia extremis officiant. But. Cum sit ὄψις Latine visus, aut visio, unde rei sensus perspicue, & indubitate redditur, non admodum probo radium pro visu poni, cum sit æquiuocum, nec adiectionem habet unde discernatur. Quamuis enim visio radijs procedat, qui Græcè dicuntur ἀκτίαι, quibus & Euclides in Opticis utitur, nequaquam tamen hæc usurpatio radij legitima videtur in hoc loco, authori tamen adeo placet, ut vocem visus refigerit opere toto. Verbum insuper officiant, quod nil aliud est, quam nocent, aut impediunt, sic est alienum à rei veritate, ut nihil dici possit absurdus. Nam cum ponatur visus esse linea recta, & sit linea longitudo sine latitudine, quid inter medium habere potest unde visus offendatur? Præterea si verum esset media omnia lineæ rectæ extrem

tremis officere, nihil iã omnino, aut cū difficultate videretur. Talis itaque versio aut cæcitatem, aut lipitudinem oculis inducit. Zambertus autem quãuis aliàs malus interpretes, non sic ineptè, officiunt, sed correspondent, transtulit. Quod tamen si Græco verbo ἐπιπεδῶν non respondeat, parum tamen, aut nihil sententiam distorquet. Ego autem dicerem. Cuius media omnia obtenduntur extremis, hoc est, contra, & directò tenduntur. Quod definitioni lineæ rectæ, quæ ex æquo suis punctis interiacet, congruit optimè. Pen. Omne aspectabile secundum rectam lineam cerni. But. Composita dictio aspectabile, etiam si Latina esset, sensum nõ haberet diuersum à sua simplici spectabile, quod est spectatione, & admiratione dignum, vel etiã magni nominis, sicut Apuleius dixit, pulchrum, & spectabilem currum. Item Plinius, fauos cereæ spectabiles, & alibi, Asanam flumen portu spectabile. Quæ significatio non solùm ab hoc loco, sed etiam ab opere toto prorsus est aliena. Quæ tamen semper, & in catoptricis, & in opticis abutitur interpretes, pro eo quod dicitur τὰ ὀρώμενα, hoc est, ea quæ videntur. Et quãuis sit idem cerno quod video, non conuenit tamen in istis rem eandem in eadem periodo, verbis efferre diuersis. Vera igitur, & secundum naturã interpretatio sic erat. Omnia quæ videntur, secundum rectam lineam videri. Id autem

autem quod sequitur ἐν ὀπίσθῳ τε δέντος ἐν ἐπιπέ-
 δω reliqua. Hoc ad verbum ego sic interpretor.
 Speculo in plano collocato, & spectata aliqua al-
 titudine, quæ sit pros orthas ad planum, sunt pro-
 portionales, sicut quidem ea quæ est inter speculū,
 & spectatorem linea recta, ad eam quæ est inter
 speculum, & pros orthas altitudinem, ita specta-
 toris altitudo ad eam quæ est ad planum pros or-
 thas altitudinem. Quod autem Græcum pros or-
 thas, hoc est, ad angulos rectos, sua sibi voce relin-
 quam, id exemplo Vitruuij, perspicuitatis gratia,
 facio. Nouus interpretes ita vertit. Si speculum col-
 locetur in plano, cui ad rectos angulos altitudo ali-
 qua recta sit, quam rationem habet linea interie-
 cta inter spectatorem, & speculum ad lineam in-
 teriectam inter speculum, & erectam altitudinē,
 eandem rationem habere spectatoris altitudinem
 ad altitudinem insistentem ad rectos angulos ei
 plano in quo est speculum. But. Non leui detri-
 mento veritatis, ubi dicitur, altitudo aliqua, præ-
 termissum est, spectata. Neque enim satis est in
 proposito, imo nihil est altitudinem ad planum
 esse pros orthas, nisi & ipsa, hoc est, summitas
 ipsius à spectatore, accessu vel recessu tentando,
 videatur in speculo. Item ubi est linea, perperam,
 & contra verum omittitur recta, & etiam ad
 angulos rectos, secūdo loco post erectā altitudinē.

Quon

Quoniam non omnis altitudo erecta ad planum est
 pros orthas. Sed qui rem non intelligunt multa ne-
 cessario, & scienter expressa, pro vanis, & abun-
 dantibus auferunt, & superflua quaedam adiiciunt.
 Quale est illud, ei plano in quo est speculum. Iam
 enim dictum erat speculo in plano collocato, nec
 de pluribus planis agitur, ut sit amphibolie locus.
 Non ita tamen in hoc Venetus interpret, & de-
 tractione, & adiectione peccavit, quamuis alti-
 tudinem, affectata varietate, modò fastigium, mo-
 dò sublimè dixerit. Pen. In planis speculis oculo
 posito in eo speculi loco, in quem cadit perpendicu-
 laris ducta à re aspectabili ad speculum, rem aspe-
 ctabilem non cerni. But. Hic planè conuincitur
 interpret totum hoc phenomenon cum duobus alijs,
 & omnia quæ per ipsa demonstrantur in sequen-
 tibus non intelligere. Qui τόπου κατὰληφθέντος,
 hoc est, occupato loco, τὰ absurda paraphrasi pri-
 mùm reddat, oculo posito in eo speculi loco, deinde
 oculo occupante locum. Quis enim vidit vnquam
 oculum in speculo poni? aut quis ignorat oculo con-
 tingente speculum, non magis quàm ipso clauso,
 nihil quicquam posse videri? Talis igitur occupa-
 tio loci cum ab oculo fieri non possit, quem & ali-
 bi esse oportet, ut videat, intelligenda est necessa-
 rio de re qualibet obtendente, non pellucida, in
 quam ab eo quod videtur cathetos incidit. Et in
theo

theoremate quinto, ubi datur oculi positio in pe-
 ripheria concaua, ea debet accipi non in hemispæ-
 rio speculi, sed in opposita parte Spheræ paten-
 tis. Zambertus non admodum procul à vero dixit,
 loco assumpto. Huiusmodi autem errores non
 aliunde magis, quàm ex ignorantia rei proue-
 niunt. Ad theorema sextum in demonstratione,
 ubi est ἰσῶν περιφερειῶν γωνία, hoc est, equaliū
 peripheriarum anguli, loco peripheriarum, abusu
 non leui, sectionum posuit. Quod si sectionum pro
 segmentorum velit accipi, ostendit se non intelli-
 gere eam quæ est inter segmentum, & sectionem
 differentiã, super qua errores etiã aliorū supra no-
 tauit. Theo. 7. τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ βάθη ἀπὸ τῶν ἐπι-
 πέδων, ἐν ὀπίσθω ἀνεστραμμένα φαίνονται. Zam-
 bertus ita vertit. Celsitudines, & crassitudines à
 planis speculis conuersæ videntur. Pena autem
 sic. Altitudines, & profunditates in planis spe-
 culis euersæ apparent. But. Si conferantur inui-
 cem interpretes, primas secundus, & primus se-
 cundas partes obtinebit. Nam celsitudines dicere
 barbarū est, & crassitudines alienum, sed à planis
 speculis conuersæ, et ad rē, et ad verbū melius est,
 quàm in planis speculis euersæ. Nam turres & vr-
 bes dicuntur euersæ, id est, dirutæ, & solo equa-
 tæ, & euersa vi tempestatis quercus à Plinio di-
 citur. Quæ significatio propositum non assequitur,

nec profunditati congruit. Vitellio, qui & Optica scripsit, recto quidem sensu, sed voce barbara protulit, reuerſe, & hoc inſuper adiecit, cùm ſpeculorum ſuperficiebus perpendiculariter inſiſtunt. Quod nihil erat neceſſe, quia propoſitionis veritatem reſtringit. In theoremate octauo & ſex ſubſequentibus ordinatim res exigit omnino, vt propoſitio à πὸ recte, & ſecundùm naturam vertatur in à, & non per in, ſicut vbique facit nouus interpres veram ſententiam non capiens. Quod in demonſtratione declarat euidenter. Nam vbi dicitur, longitudo oblique poſita, hoc addit de ſuo, id eſt, (inquit) orizonti parallela. Quod non eſt verum ſimpliciter. Quia neceſſe eſt vt altera pars longitudinis propoſita ſit à plano ſpeculo remotior, et altera propior, ſicut habet demonſtrationis concluſio. Et ſic obliquitas à planis ſpeculorum, non in planis dicitur. Videmus itaque vnius abuſu dictiuncule tota ſeptem theoremata contaminari. Theor. 16. Pen. Aſpectabile quodlibet in planis ſpeculis cernitur in perpendiculari ducta ab aſpectabili in ſpeculum. But. ἐκασου τοῦ ὁρωμένου, hoc eſt, vnumquodque eorum quæ videntur, hîc & in duobus locis ſequentibus parum aptè, nec quod ſenſum vniuerſalem ſatis impleat transfertur, aſpectabile quodlibet. De dictione aſpectabili iam ſupra monui, locum in totis catoptricis idoneum non habere.

bere. In his etiam tribus locis aptius erat propositionem κατὰ secundum perpendicularem, quam in perpendiculari vertere. In hoc theoremate, & duobus quæ sequuntur demonstrationem faciunt tria quæ sunt in principijs phænomena. Quæ non intelligere sua se versione prodidit novus interpres, sicut ibi docui. Sed in demonstrationibus istis talis inscitie testimonium abundantius exhibet. Nam quoties inuenit κατὰ λαμβάνεις τὸν τόπον οὐχ ὁράται, hoc est, occupato loco non videtur, toties ad captum suum detorquendo mutauit, oculo posito, vel collocato, hoc est, in superficie speculi, non videtur, risu quidem non minore prosequendam, quam si diceret, oculo clauso non videtur. Theor. 20. Pen. In conuexis speculis sinistra apparent dextra, & dextra sinistra, & imago propius abest à speculo, quam aspectabile. But. Quod dicitur imago propius abest à speculo, pro eo quod propior est speculo. forma est noua loquendi, atque præpostera. Dicimus enim propius adest, & longius abest. Ad hunc etiam modum in demonstratione 23. dixit propius distare, pro minus distare. Planum, & citra vitium erat dictionem Græcam sectari, hoc modo, & distantiam à speculo minorem habet imago. Theor. 22. Pen. In conuexis speculis minoribus minores imagines apparent. But. Cum ex alijs, tum ex hoc non dubito, quin se


putauerit nouus interpres hoc theorema breuius, & exactius protulisse, quàm ipse fecerit author. Breuius quidem, sed incertius, quod est in istis vitandum maximè. Videtur enim inferre vt in minoribus speculis conuexis res tantum minutæ, & non grandiores idola faciant. Quod non est ita, sed hoc habet sensus propositi, vt si fuerint duo specula conuexa, vnum maius, & alterum minus, eiusdem imago rei minor apparebit in minore quàm in maiori. Quod planè, & indubitatè Græca verbum de verbo sic explicat. In speculis conuexis, ex minoribus speculis idola apparent minora. Theor. 23. Pen. In conuexis speculis aspectabilium imagines plerunque apparent conuexæ. But. Sicut antea superfluum aliquid (vt putabat) interpres repurgauit ab Euclide, ita nunc aduerbium plerunque adijciendum necesse putauit, tanquam non semper verum haberet theorema. Quod certe est corrumpere, non interpretari. Non me latet à Vitellione dictum in speculis conuexis lineam, prout est, rectam aliquando videri. Sed dico talem lineam intelligendo sanè, nec idolon quidem habere. Multa etiam inania proponit Vitellio, & quæ parum demonstrat. Theor. 24. Pen. Si oculus ponatur in centro speculi concaui, seipsum cernet tantum. But. Oculus idolon quidem suum videt, seipsum autem nequaquam. Sed varietas affectata nimium

*miùm veritatem sæpè corrumpit. Quæ sic habet
è Græco. In cauis speculis, si super cen-
tro statuatur oculus, idem solum
apparet oculus.*

Annotationum in Catoptrica

FINIS.

s 3





IO. B V T E O N I S
 A N N O T A T I O I N
 E R R O R E S I O. P E N A E
 interpretis Optico-
 rum Euclidis.



N suppositionibus Opti-
 corum, vel ut volunt dici
 magis Latinè positioni-
 bus, prima est τὰς ἀπὸ τοῦ
 ὀμματός ὄψεις κατὰ εὐθείας
 γραμμὰς φέρεσθαι, διὰ-
 ση μάλι ποιούσας ἀπ' ἀλ-
 λήλων. Hanc ego, prout
 ferè Zambertus, ita verterem. *Visus* ab oculo se-
 cundùm lineas rectas procedere, interuallū quod-
 dam inter se facientes. Io. Pena id quod est secun-
 dùm lineas rectas, singulari numero proferre ma-
 luit, in rectam lineam ferri. Parua quidem mu-
 tatio, sed quæ contradictionem statim habeat.

Nam

Nam si visus ab oculo in lineam rectam, hoc est, in unam ferantur, intervallum inter se quomodo facient? aut ubi conus, qui statim supponitur, erit? Idem in sequentibus principijs, quoties legitur φαίνεσθαι, hoc est, apparere, magis variè, quàm propriè interpretari voluit, nunc existimari, modò putari, aliàs videri. Et in fine, item in theoremate secundo, quod dicitur, ἀκριβέστερον φαίνεσθαι, reddidit accuratius videri, durè quidem, et absurdè, quod est animi ad oculum transferendo. Quod Zambertus vertit expeditius, & evidentiùs, Vitellio autem perspicatius. Qui & Catoptricen, & Opticem totam, authores nusquam mentione facta suppilavit. Theor. I. Pen. Nullum aspectabile simul totum cernitur. But. Dictionem aspectabile, nec voce Latinam, nec sensu congruam, sicut in Catoptricis ante notavi, sic in Opticis novus interpretis abusu non parvo semper usurpat. Theor. 2. Pen. Aequalium magnitudinum inter se distantium, quæ propius posite sunt, accuratius cernuntur. But. Cùm aliàs ferè noster interpretes Græcas figuras sine causa refugiat, hìc observando nimium pueriliter erravit. Etenim Græci, cum ablativo careant, in his quæ more nostro ponuntur absolute, genitivis semper utuntur, sicut hìc ἴσθαι μετὰ τὸν ἐν διασπᾶν καὶ διόρυ, ne sit inepta locutio, parùmque Latina, necesse est casu sexto ver-

tere sic. Aequalibus magnitudinibus in distantia positis. Et cum sit hæc abusio frequentior, ne fiam singulatim notando prolixior, loca suis tantum numeris indicabo, quæ sunt ad theoremata 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 52, 53, 56. Et in horum quibusdam similiter Zambertus erravit. Theor. 3. Pen. Aspectabilium quodlibet certam habet intervalli longitudinem, qua expleta iam non cernitur. But. Dicitio quodlibet, qua sæpius abutitur, non satis implet Græcam ἐκασου, hoc est, unumquodque. Malè etiam respondet certam longitudinem, ad τὴν μήκος, hoc est, quandam longitudinem. Theor. 7. Pen. Magnitudines æquales in eadem recta linea procul à sese positæ, inæquales apparent. But. Cum sit impossibile, & plusquam manifestum, nullam magnitudinem procul à seipsa posse constitui, quid absurdius, atque repugnantius dici potuit? quàm magnitudines procul à sese positæ, pro eo quod rectæ versum erat à Zamberto, remotius inuicem positæ. Theo. 8. Pen. Aequales magnitudines inæqualiter ab oculo distantes, non servant eandem rationem angulorum, quàm distantiarum. But. Huiusmodi versio facit, ut vix quicquam ad opticem theorema pertineat, ubi nulla de visu mentio. Sed ut subtilius aliquid interpres supra Græcum videretur afferre, rectam, ac propriam loquendi formam deseruit, quæ sic habet.

bet. *Aequales magnitudines inæqualiter distantes nequaquam suis distantijs proportionaliter videntur.* In theoremate 17 ubi est $\epsilon\pi\epsilon\upsilon\delta\epsilon\acute{\iota}\alpha\varsigma$, hoc est, in lineam rectam, contra sensum requisitum, et etiam barbarè dicitur, perpendiculariter, cuiusmodi aduerbio carent etiam Græci. Theor. 29. Pen. Quomocunque columna unico oculo cernatur, minus dimidia parte columnæ cernetur. But. Quædam sunt in arte finita vocabula, quæ iure Latij recepto, Græcam sibi vocem adhuc retinent, prout est *Cylindrus*, *Hemicylindrus*, *Conus*, *Hemiconium*, quas nouus interpres, & in hoc theoremate, & in quinque sequentibus vertit: *columna*, *pars columnæ dimidia*, *turbo*, *pars turbinis dimidia*, non minore sensus, quàm dictionis vitio. Diuersum est enim *Cylindri corpus* à *columna*, dicta Græcè $\kappa\acute{\iota}\omega\upsilon$, quæ cum tendat in acutum maius est *truncus Coni*, quàm *cylindrus*, in quo bases oppositæ duos faciunt, ex definitione, circulos inuicem æquales. Insuper etiam si *columna* legitimè pro *Cylindro* diceretur, nequaquam tamen hîc *pars columnæ dimidia* pro *Hemicylindro*, quem exigit locus intelligi *dimidiatum*, plano secante per æqualia bases. Pars autem *columnæ dimidia* magis intelligitur *columnæ truncus* ex tota, *basim*, & *verticem* habens circulos. Nec minor etiam fuit *abusus* in *turbine*, & *turbinis parte dimidia*.

Theor. 32. Pen. Oculo per idem planum propius ad turbinem accedente, maior turbinis pars cerne-
tur, quàm oculo recedente, minor tamen aspectui
apparebit. But. Hic ego colorem non video, quo
defendatur interpretis à crimine falsi. Est enim theo-
rema prorsus inuersum, cuius veritas ad literam
sic habet. Oculo autem transposito propius in eo-
dem plano, minor quidem erit sub visibus compre-
hensa pars, putabitur autem maior videri. In de-
monstrationibus theorematum 38 & 39, multo-
rumque sequentiũ quoties legitur τμήμα κύκλου,
hoc est, segmentum circuli, toties habet interpre-
tatio noua, sectio circuli. Quem abusum, & in Ele-
mentis, & Catoptrici ante notauì. In theoremate
40 ad demonstrationem vbi est, παραφερομένηου
δὲ τοῦ ἄρματός, hoc est, præteruecto autem curru,
contra rei, & verbi sensum vertitur, curru verò
inordinatè, & celeriter delato. Nullus enim mo-
tus inordinatus, aut celer ad hoc est necessarius,
quin potius impedimento. Theor. 50. Pen. Sunt
quædam loca è quibus spectata vna magnitudo ex
duabus inæqualibus inter se additis composita
vtrique inæqualium æqualis apparet. But. In red-
dēdis Latinè particulis nō raro noster allucinatur
interpretis, sicut hic, ἐν οἷς, vertēdo è quibus, pro in-
quibus, sensum theorematìs inuertit. Quod Græcè
veritati prout ferè Zambertus ita restituo. Sunt
que-

quædã loca in quibus inæquales duæ magnitudines in vnã compositæ, æquales vtrique inæqualium apparent. Theo. 5 4. Pen. Si magnitudines aliquæ ad eandem partem ferantur, vna verò quiescat, ea quæ quiescit in contrariam partem moueri videbitur. But. Interpretatio Zamberti ferè sic habet. Si aliquibus delatis differat aliquid non delatum, putabitur id quod non fertur in contrarium ferri. Sed non intelligens nouus interpres verbum διαφεραται, hoc est, differat, esse necessarium proposito, non vltra ferendum, sed tollendum putauit. Alia præter hæc in translationibus istis

diligens & intelligens lector inueniet, nec Euclidis literam neq;
sensum satis explicare.

FINIS.

Errata.

*Pagina 19, in figura deest linea diagonos
F G C. Pag. 58 linea 10 ubi est G E ponatur
D E, & in figura loco Z ponatur F. Pag.
26 in figura deest circulus inscriptus qua-
drato D G F I.*